新型噻唑并[3,2-*a*]嘧啶衍生物的合成及其抗肿瘤活性张磊^{*,a} 林娅^a 王京^{*,a} 朱心玲^a 姚秋丽^a 姚其正^b^(a) 遵义医学院药学院 遵义 563003^(b) 中国药科大学药学院 南京 210009

摘要 以取代苯肼盐酸盐为原料, 通过 Vilsmeier-Haack, Biginelli 和 Knoevenagel 等多步反应合成了 9 个含有吡唑取代基的噻唑并[3,2-*a*]嘧啶衍生物, 并利用 IR, ¹H NMR, ¹³C NMR, ESI-MS 和 HRMS 对目标化合物进行了结构表征. 用四甲基偶氮唑盐(MTT)法测试了目标产物对人前列腺癌 PC-3 细胞和人肝癌 HepG2 细胞的体外抗增殖活性, 部分化合物表现出了较好的生物活性, 其中化合物 **5b**, **5c**, **5g** 和 **5i** 对 PC-3 细胞的抗肿瘤活性优于阳性对照药 5-氟尿嘧啶, IC₅₀ 值分别为 29.98, 27.69, 26.36 和 12.56 μmol/L. 进一步的研究表明, 化合物 **5i** 能够诱导 PC-3 细胞凋亡, 并使其周期阻滞在 G2/M 期.

关键词 噻唑并[3,2-*a*]嘧啶; 抗肿瘤活性; 细胞凋亡; 细胞周期

Synthesis and Antiproliferative Activity of Novel Thiazolo[3,2-*a*]pyrimidine DerivatesZhang, Lei^{*,a} Lin, Ya^a Wang, Jing^{*,a} Zhu, Xinling^a Yao, Qiuli^a Yao, Qizheng^b^(a) School of Pharmacy, Zunyi Medical College, Zunyi 563003^(b) School of Pharmacy, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009

Abstract Nine novel thiazolo[3,2-*a*]pyrimidine derivatives with pyrazole substituent were synthesized from substituted phenylhydrazines via Vilsmeier-Haack, Biginelli and Knoevenagel reactions and characterized by IR, ¹H NMR, ¹³C NMR, ESI-MS and HRMS. The antiproliferative activities of target compounds against human prostate cancer PC-3 and human hepatoma HepG2 cell lines were evaluated by methyl thiazolyl tetrazolium (MTT) assay. The results displayed that several compounds showed moderate to potent antitumor activity. Particularly, compounds **5b**, **5c**, **5g** and **5i** exhibited slightly stronger antitumor activity than positive control 5-fluorouracil (5-FU) against PC-3 cells with IC₅₀ values of 29.98, 27.69, 26.36 and 12.56 μmol/L. Moreover, the cellular mechanisms showed that compound **5i** could induce apoptosis and G2/M cell cycle arrest of PC-3 cells.

Keywords thiazolo[3,2-*a*]pyrimidine; anticancer activity; cell apoptosis; cell cycle

二氢嘧啶酮是一类重要的 Biginelli 反应产物, 因其具有多种药理活性, 所以在药物发现与设计领域中, 二氢嘧啶酮也被认为是一种优势骨架^[1]. 近年来, 二氢嘧啶酮受到了人们广泛的关注和研究, 越来越多的二氢嘧啶酮衍生物被合成出来^[2], 并进行了生物活性的筛选, 发现了许多具有研究价值的先导化合物, 为进一步的药物筛选提供了前期物质基础. 在二氢嘧啶酮衍生物中,

噻唑并[3,2-*a*]嘧啶是一类具有多种重要生物活性的氮、硫杂环化合物, 如抗氧化^[3]、抗惊厥^[4]、抗肿瘤^[5]、抗病毒^[6]、镇痛^[7]、抗炎^[8]、抗细菌^[9]和抗真菌^[10]等. 近年来, 人们发现一些噻唑并[3,2-*a*]嘧啶类化合物能够抑制 5α-还原酶^[11]、5-羟色胺-2 受体^[12]和 2-*C*-甲基-*D*-赤藓醇-2,4-环焦磷酸合成酶(IspF)^[13]. 此外, 研究还表明, 噻唑并[3,2-*a*]嘧啶衍生物能够有效抑制 Bcl-2 家族抗凋亡蛋白

* E-mail: lzhang@zmc.edu.cn; wangjing@zmc.edu.cn

Received August 31, 2014; revised November 9, 2014; published online November 18, 2014.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21462056), the Priming Scientific Research Foundation for Doctoral Program of Zunyi Medical College (No. F-631), the Department of Science and Technology of Guizhou Province (Nos. [2014]7565, [2014]7557, [2014]4002) and the Education Department of Guizhou Province (No. QJHRCTDZ-2012-03).

国家自然科学基金(No. 21462056)、遵义医学院博士科研启动基金(No. F-631)、贵州省科技厅(Nos. 黔科合 LH 字[2014]7565 号, 黔科合 LH 字[2014]7557 号, 黔科合人才团队[2014]4002 号)和贵州省教育厅(No. 黔科合人才团队字[2012]03 号)资助项目.

(如 Bcl-2, Bcl-x_L 和 Mcl-1)^[14~16] 或蛋白磷酸酶 CDC25B^[17,18] 而产生抗肿瘤活性。

如图 1 所示, 王任小等^[14]通过荧光偏振结合试验发现化合物 **a** 对 Bcl-2 家族抗凋亡蛋白具有较强的抑制活性, 对 Bcl-x_L, Bcl-2 和 Mcl-1 三种蛋白的抑制常数 K_i 值分别为 1.64, 2.67 和 1.05 $\mu\text{mol/L}$; 柳红等^[16]也发现化合物 **b** 对 Bcl-x_L, Bcl-2 和 Mcl-1 蛋白具有较好的抑制活性, IC_{50} 值分别为 3.4, 3.1 和 6.4 $\mu\text{mol/L}$, 此外化合物 **b** 能够抑制多种人肿瘤细胞株的增殖, 其中对人卵巢癌细胞 OVCAR-3 的细胞毒活性最强(IC_{50} 值为 1.54 $\mu\text{mol/L}$); 此外, Kolb 等^[17]还发现噻唑并[3,2-*a*]嘧啶类化合物能够显著抑制蛋白磷酸酶 CDC25B 的活性, 其中化合物 **c** 的活性最强(IC_{50} 值为 4.5 $\mu\text{mol/L}$), 同时化合物 **c** 也能显著抑制人前列腺癌细胞 LNCaP 的生长(IC_{50} 值为 3.4 $\mu\text{mol/L}$).

图 1 已报道的噻唑并[3,2-*a*]嘧啶类化合物

Figure 1 Reported thiazolo[3,2-*a*]pyrimidine derivatives

吡唑也是一种具有众多生物活性的药效团, 近年来的研究表明吡唑衍生物具有抗菌^[19,20]、抗肿瘤^[21]、抗炎^[22]、抗氧化^[23]、杀虫^[24]、除草^[25]等活性. 如图 2 所示, Arai 等^[26]发现吡唑衍生物 **d** 能够强烈抑制抗癌新靶点活性氧簇 p38a MAP 激酶的活性, IC_{50} 值为 3 nmol/L; 同时, 朱海亮等^[27]报道了吡唑衍生物 **e** 是细胞周期激酶 Aurora-A 的抑制剂(IC_{50} 值为 0.16 $\mu\text{mol/L}$), 其对结肠

癌细胞 HCT116 和人乳腺癌细胞 MCF-7 显示出较强的细胞毒性, IC_{50} 值分别为 0.39 和 0.46 $\mu\text{mol/L}$.

图 2 已报道的吡唑类化合物

Figure 2 Reported pyrazole derivatives

基于噻唑并[3,2-*a*]嘧啶骨架和吡唑药效团均表现出一定的抗肿瘤活性, 为了得到活性更好的抗肿瘤先导化合物, 根据基于片段的药物发现(FBDD)方法, 我们将噻唑并[3,2-*a*]嘧啶骨架和吡唑药效团进行拼合, 合成了含有吡唑基团的噻唑并[3,2-*a*]嘧啶类衍生物, 并采用 MTT 法测试目标化合物对人前列腺癌细胞 PC-3 和人肝癌细胞 HepG-2 的细胞毒性. 合成路线见 Scheme 1.

1 结果与讨论

1.1 目标化合物的合成

以取代苯肼盐酸盐 **1** 为起始原料, 在醋酸/醋酸钠碱性体系中游离出取代苯肼, 再与乙酰乙酸乙酯环化得到中间体吡唑啉酮 **2**; **2** 与 Vilsmeier-Haack 试剂反应生成中间体吡唑甲醛 **3**; **3** 在氨基磺酸的催化下与乙酰乙酸乙酯、硫脲发生 Biginelli 反应得到中间体二氢嘧啶-2(1*H*)-硫酮 **4**, 最后通过“一锅煮”的方法, 先与氯乙酸环化得到噻唑并嘧啶中间体, 随后与甲酰基苯氧基乙酸发生 Knoevenagel 反应, 一步制得目标化合物 **5**, 方法简单、高效; 目标化合物结构均经 IR, ¹H NMR, ¹³C NMR, ESI-MS 和 HRMS 确证.

1.2 体外抗肿瘤活性

以 5-氟尿嘧啶(5-FU)为阳性药, 用 MTT 法评价了噻唑并[3,2-*a*]嘧啶衍生物 **5a~5i** 对 PC-3 和 HepG2 细胞株的体外抗肿瘤活性. 化合物的半数抑制浓度(IC_{50})见

Compd.	R ¹	R ²
5a	4-F	
5b	3-Cl	
5c	4-OCH ₃	
5d	4-F	
5e	3-Cl	
5f	4-OCH ₃	
5g	4-F	
5h	3-Cl	
5i	4-OCH ₃	

Reagents and conditions: (a) Ethyl acetylacetate, NaOAc, AcOH, reflux, 12 h. (b) POCl₃, dry DMF, 0 °C, 0.5 h then 90~95 °C, 1 h. (c) Thiourea, ethyl acetylacetate, NH₂SO₃H, EtOH, reflux, 10 h. (d) Chloroacetic acid, R₂CHO, AcOH, Ac₂O, NaOAc, reflux, 6 h.

图式 1 目标产物的合成

Scheme 1 The synthesis of target compounds

表 1. 目标化合物表现出对 PC-3 细胞较好的抗增殖活性, 对 PC-3 细胞的活性显著强于 HepG2 细胞. 其中化合物 5b, 5c, 5g 和 5i 对 PC-3 细胞株的抗肿瘤活性优于 5-FU (IC₅₀=36.36 μmol/L), IC₅₀ 值分别为 29.98, 27.69, 26.36 和 12.56 μmol/L; 化合物 5e 和 5f 对 PC-3 细胞株的抑制活性接近 5-FU, IC₅₀ 值分别为 40.36 和 46.84 μmol/L. 在所有目标化合物中, 只有化合物 5i 对 HepG2 细胞株显示出了温和的抗肿瘤活性, IC₅₀ 值为 49.99 μmol/L, 较 5-Fu 弱(IC₅₀=28.38 μmol/L).

从体外抗肿瘤活性测试结果初步推断, 当 R¹ 取代基为 3-Cl 或 4-OCH₃ 时, 化合物对 PC-3 细胞的抑制活性显著强于 4-F 基团, 如化合物 5b, 5c, 5e 和 5i; 当化合物分子结构中的氧代乙酸片段处于苯环邻位或对位时, 化

表 1 化合物 5a~5i 的体外细胞毒活性

Table 1 Cytotoxic activities of 5a~5i *in vitro*

Compd.	IC ₅₀ ^a /(μmol·L ⁻¹)	
	PC-3	HepG2
5a	>50	>50
5b	29.98	>50
5c	27.69	>50
5d	>50	>50
5e	40.36	>50
5f	46.84	>50
5g	26.36	>50
5h	>50	>50
5i	12.56	49.99
5-FU	36.36	28.38

^a 实验数据为 3 次平行实验平均值.

合物的对 PC-3 的活性较强; 但如果氧代乙酸片段处于苯环对位且邻位有乙氧基取代时, 化合物的活性显著降低, 如化合物 5e 和 5f.

1.3 化合物 5i 对 PC-3 细胞凋亡的影响

PC-3 细胞经 5i (2.5, 5 和 10 μmol/L) 作用 72 h 后, 用 Annexin-V FITC/PI 双染法检测, 结果显示 PC-3 细胞凋亡率分别为 16.55%, 32.14% 和 49.28%, 而对照组细胞的凋亡率为 8.46%, 见图 3. 上述结果表明, 化合物 5i 能够有效的诱导 PC-3 细胞凋亡.

1.4 化合物 5i 对 PC-3 细胞周期的影响

PC-3 细胞经 5i (2.5, 5 和 10 μmol/L) 作用 72 h 后, 用 PI 单染法检测, 结果显示细胞周期分布发生显著变化. 与对照组相比, G1 期细胞显著减少, G2/M 期细胞显著增加, S 期细胞无明显差异, 以上结果显示 5i 能够诱导 PC-3 细胞引发 G2/M 期阻滞, 见图 4.

2 结论

本文以取代苯肼盐酸盐为原料, 通过多步“一锅煮”反应, 快速、高效地合成了 9 个新型的含有吡唑的噻唑并[3,2-a]嘧啶类衍生物. 体外抗肿瘤活性结果显示, 目标产物对 PC-3 细胞具有较强的抗增殖活性, 部分化合物的抑制活性优于阳性对照药 5-氟尿嘧啶, 其中化合物 5i 的活性最强, IC₅₀ 值为 12.56 μmol/L. 进一步的研究结果表明其还能够有效的诱导 PC-3 细胞凋亡, 并阻滞 PC-3 细胞停滞在 G2/M 期. 目前进一步的结构优化和构效关系的深入研究正在进行.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

熔点用 Mel-TEMP 熔点仪测定(温度计未经校正); 红外光谱仪为 Nicolet Impact 410 型(KBr 压片); 质谱仪为 Agilent 1100 LC/DAD/MSD 型(ESI-MS)和 Agilent

图3 化合物 **5i** 对 PC-3 细胞凋亡的影响Figure 3 Effects of compound **5i** on the apoptosis of PC-3 cells 图4 化合物 **5i** 对 PC-3 细胞周期的影响Figure 4 Effects of compound **5i** on the PC-3 cells cycle

Accurate-Mass-Q-TOF-MS 6520 型(HRMS); 核磁共振仪为 Bruke Avance 300 型和 Agilent-NMR-vnmrs 400 型 (CDCl₃ 或 DMSO-*d*₆ 为溶剂, TMS 为内标). 薄层层析板和硅胶购自青岛海洋化工厂; 所用试剂均为分析纯, 无水溶剂用常规方法干燥处理.

3.2 实验方法

3.2.1 3-甲基-1-(取代苯基)-2-吡唑啉-5-酮(**2a~2c**)的合成

将 0.2 mol 取代苯肼盐酸盐, 25.24 mL (0.2 mol) 乙酰乙酸乙酯和 16.4 g (0.22 mol) 乙酸钠加入到 50 mL 乙酸中, N₂ 保护下回流反应 12 h, TLC 监测反应完全, 冷却至

室温, 减压抽滤, 滤饼用冰醋酸洗涤 3 次, 母液倾入水中, 搅拌, 抽滤, 滤饼用水洗 3 次, 冰乙醇洗涤 1 次, 粗品用 *V*(乙酸乙酯): *V*(乙醇)=2:1 重结晶 3 次, 得中间体 **2a~2c**.

3-甲基-1-(4-氟苯基)-2-吡唑啉-5-酮(2a): 白色固体, 产率 70%. m.p. 151~152 °C (文献值^[28]: 148~149 °C); ¹H NMR (CDCl₃, 300 MHz) δ: 2.19 (s, 3H, CH₃), 3.42 (s, 2H), 7.17 (t, *J*=8.8 Hz, 2H, ArH), 7.83 (t, *J*=6.8 Hz, 2H, ArH); ESI-MS *m/z*: 193.1 [M+H]⁺.

3-甲基-1-(3-氯苯基)-2-吡唑啉-5-酮(2b): 白色固体, 产率 65%. m.p. 127 °C (文献值^[28]: 127~127.5 °C); ¹H NMR (CDCl₃, 300 MHz) δ: 2.20 (s, 3H, CH₃), 3.43 (s,

2H), 7.12 (d, $J=7.9$ Hz, 1H, ArH), 7.30 (t, $J=8.2$ Hz, 1H, ArH), 7.81 (d, $J=8.2$ Hz, 1H, ArH), 7.93 (s, 1H, ArH); ESI-MS m/z : 209.0 $[M+H]^+$.

3-甲基-1-(4-甲氧基苯基)-2-吡啶啉-5-酮(**2c**): 白色固体, 产率 67%. m.p. 127~128 °C(文献值^[29]: 124~126 °C); ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 2.17 (s, 3H, CH_3), 3.39 (s, 2H), 3.80 (s, 3H, OCH_3), 6.89 (d, $J=9.0$ Hz, 2H, ArH), 7.71 (d, $J=9.0$ Hz, 2H, ArH); ESI-MS m/z : 205.1 $[M+H]^+$.

3.2.2 5-氯-3-甲基-1-(取代苯基)吡啶-4-甲醛(**3a~3c**)的合成

在 250 mL 三口瓶中, 加入 23 mL (0.3 mmol) 无水 DMF, 冰盐浴冷却至 -10 °C 下, 缓慢滴加 64 mL (0.7 mol) 三氯氧磷, 滴毕, 0 °C 下搅拌 1 h, 向体系中加入 0.1 mol **2a~2c**, 缓慢升温至回流, 控温在 90~95 °C 左右, 搅拌反应 1 h, 冷却至室温, 缓慢倾入 600 mL 冰水混合物中, 搅拌, 过滤, 滤饼水洗至中性, 真空干燥得到中间体 **3a~3c**.

5-氯-3-甲基-1-(4-氟苯基)吡啶-4-甲醛(**3a**)^[30]: 浅黄色固体, 产率 67%. ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 2.54 (s, 3H, CH_3), 7.17~7.25 (m, 2H, ArH), 7.49~7.55 (m, 2H, ArH), 9.97 (s, 1H, CHO); ESI-MS m/z : 239.1 $[M+H]^+$.

5-氯-3-甲基-1-(3-氯苯基)吡啶-4-甲醛(**3b**)^[31]: 浅黄色固体, 产率 70%. ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 2.54 (s, 3H, CH_3), 7.44~7.51 (m, 3H, ArH), 7.60 (s, 1H, ArH), 9.98 (s, 1H, CHO); ESI-MS m/z : 255.1 $[M+H]^+$.

5-氯-3-甲基-1-(4-甲氧基苯基)吡啶-4-甲醛(**3c**)^[32]: 浅黄色固体, 产率 69%. ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ : 2.53 (s, 3H, CH_3), 3.87 (s, 3H, OCH_3), 7.00~7.02 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, ArH), 7.42~7.45 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, ArH), 9.95 (s, 1H, CHO); ESI-MS m/z : 251.1 $[M+H]^+$.

3.2.3 4-[5-氯-3-甲基-1-(取代苯基)-吡啶-4-基]-5-甲酸乙酯-6-甲基-3,4-二氢嘧啶-2(1H)-硫酮(**4a~4c**)的合成

将 75.4 mmol **3a~3c**, 11.4 mL (90.48 mmol) 乙酰乙酸乙酯, 8.6 g (114 mmol) 硫脲和 5.85 g (60.32 mmol) 氨基磺酸加入到 50 mL 乙醇中, N_2 保护下回流反应 10 h, TLC 检测反应完全后, 冷却, 抽滤, 滤饼用冰乙醇洗涤 3 次, 烘干, 得到中间体 **4a~4c**.

4-[5-氯-3-甲基-1-(4-氟苯基)-吡啶-4-基]-5-甲酸乙酯-6-甲基-3,4-二氢嘧啶-2(1H)-硫酮(**4a**): 白色固体, 产率 54%^[11]. m.p. 235~236 °C; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 300 MHz) δ : 1.09 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 2.19 (s, 3H, CH_3), 2.27 (s, 3H, CH_3), 3.99~4.09 (m, 2H, OCH_2CH_3),

5.28 (s, 1H, CH), 7.35~7.40 (m, 2H, ArH), 7.51~7.56 (m, 2H, ArH), 9.45 (s, 1H, NH), 10.35 (s, 1H, NH); ESI-MS m/z : 409.2 $[M+H]^+$.

4-[5-氯-3-甲基-1-(3-氯苯基)-吡啶-4-基]-5-甲酸乙酯-6-甲基-3,4-二氢嘧啶-2(1H)-硫酮(**4b**): 白色固体, 产率 48%. m.p. 195~196 °C; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 300 MHz) δ : 1.07 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 2.21 (s, 3H, CH_3), 2.27 (s, 3H, CH_3), 3.97~4.05 (m, 2H, OCH_2CH_3), 5.29 (s, 1H, CH), 7.49~7.60 (m, 4H, ArH), 9.45 (s, 1H, NH), 10.38 (s, 1H, NH); ESI-MS m/z : 425.1 $[M+H]^+$.

4-[5-氯-3-甲基-1-(4-甲氧基苯基)-吡啶-4-基]-5-甲酸乙酯-6-甲基-3,4-二氢嘧啶-2(1H)-硫酮(**4c**): 白色固体, 产率 57%. m.p. 248~250 °C; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 300 MHz) δ : 1.09 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 2.18 (s, 3H, CH_3), 2.27 (s, 3H, CH_3), 3.81 (s, 3H, OCH_3), 3.93~4.09 (m, 2H, OCH_2CH_3), 5.27 (s, 1H, CH), 7.05~7.08 (d, $J=8.8$ Hz, 2H, ArH), 7.35~7.38 (d, $J=8.8$ Hz, 2H, ArH), 9.44 (s, 1H, NH), 10.35 (s, 1H, NH); ESI-MS m/z : 421.2 $[M+H]^+$.

3.2.4 目标化合物 2-[4-((6-(乙氧羰基)-5-(5-氯-3-甲基-1-(取代苯基)-吡啶-4-基)-3-氧代-7-甲基-噻唑并[3,2-*a*]嘧啶-2(5H)-亚基)甲基)苯氧基]乙酸(**5a~5i**)的合成

将中间体 **4a~4c** (2 mmol)、甲酰基苯氧基乙酸(2 mmol)、氯乙酸(2.2 mmol)和乙酸钠(2 mmol)加入到 7 mL 乙酸/乙酸酐混合溶剂中($V:V=4:3$), N_2 保护下回流反应 6 h, TLC 监测反应完全后, 冷却, 倾入冰水混合物中, 搅拌, 抽滤, 滤饼水洗 3 次, 烘干, 甲醇重结晶, 得到目标产物 **5a~5i**.

2-[4-((6-(乙氧羰基)-5-(5-氯-3-甲基-1-(4-氟苯基)-吡啶-4-基)-3-氧代-7-甲基-噻唑并[3,2-*a*]嘧啶-2(5H)-亚基)甲基)苯氧基]乙酸(**5a**): 黄色固体, 产率 65%. m.p. 151~152 °C; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 300 MHz) δ : 1.15 (t, $J=6.9$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 2.29 (s, 3H, CH_3), 2.37 (s, 3H, CH_3), 4.09~4.13 (m, 2H, OCH_2CH_3), 4.78 (s, 2H, OCH_2CO), 6.08 (s, 1H, CH), 7.07 (d, $J=8.6$ Hz, 2H, ArH), 7.35 (d, $J=8.7$ Hz, 2H, ArH), 7.51~7.58 (m, 4H, ArH), 7.79 (s, 1H, CH=); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 75 MHz) δ : 12.72, 14.51, 22.90, 46.88, 60.64, 65.05, 105.52, 115.96, 116.41, 116.71, 117.02, 117.51, 126.23, 126.82, 127.62, 127.74, 132.51, 133.28, 134.24, 148.99, 152.18, 155.93, 160.17, 160.25, 163.51, 164.90, 165.41, 170.19; IR (KBr) ν : 3663, 3545, 3138, 2979, 2920, 2330, 2365, 1761, 1702, 1587, 1549, 1504, 1366, 1328, 1307, 1233, 1151, 1065 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 609.1 $[M-H]^-$; HRMS calcd for

$\text{C}_{29}\text{H}_{25}\text{ClFN}_4\text{O}_6\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 611.1162, found 611.1163.

2-[4-((6-(乙氧羰酯)-5-(5-氯-3-甲基-1-(3-氯苯基)-吡啶-4-基)-3-氧代-7-甲基-噻唑并[3,2-*a*]嘧啶-2(5*H*)-亚基)甲基)苯氧基]乙酸(**5b**): 黄色固体, 产率 71%. m.p. 164~165 °C; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 300 MHz) δ : 1.15 (t, $J=7.1$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 2.31 (s, 3H, CH_3), 2.37 (s, 3H, CH_3), 4.08~4.16 (m, 2H, OCH_2CH_3), 4.91 (s, 1H, OCH_2CO), 6.08 (s, 1H, CH), 7.10 (d, $J=8.7$ Hz, 2H, ArH), 7.49~7.61 (m, 6H, ArH), 7.79 (s, 1H, CH=); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 75 MHz) δ : 12.72, 14.51, 22.91, 46.86, 60.66, 65.11, 105.45, 116.03, 117.23, 118.06, 123.78, 124.96, 126.49, 126.86, 128.75, 131.33, 132.50, 133.19, 133.85, 139.00, 149.57, 152.27, 155.90, 159.93, 164.89, 165.38, 169.23; IR (KBr) ν : 3504, 2991, 2914, 2849, 1773, 1708, 1595, 1556, 1511, 1376, 1265, 1324, 1303, 1263, 1233, 1215, 1160, 1079 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 625.1 $[\text{M}-\text{H}]^-$; HRMS calcd for $\text{C}_{29}\text{H}_{25}\text{Cl}_2\text{N}_4\text{O}_6\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 627.0866, found 627.0865.

2-[4-((6-(乙氧羰酯)-5-(5-氯-3-甲基-1-(4-甲氧基苯基)-吡啶-4-基)-3-氧代-7-甲基-噻唑并[3,2-*a*]嘧啶-2(5*H*)-亚基)甲基)苯氧基]乙酸(**5c**): 黄色固体, 产率 74%. m.p. 152~155 °C; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 300 MHz) δ : 1.15 (t, $J=6.9$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 2.27 (s, 3H, CH_3), 2.36 (s, 3H, CH_3), 3.79 (s, 3H, OCH_3), 4.05~4.16 (m, 2H, OCH_2CH_3), 4.78 (s, 1H, OCH_2CO), 4.91 (s, 1H, OCH_2CO), 6.07 (s, 1H, CH), 7.02~7.13 (m, 4H, ArH), 7.35 (d, $J=8.8$ Hz, 2H, ArH), 7.55 (d, $J=8.6$ Hz, 2H, ArH), 7.79 (s, 1H, CH=); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 75 MHz) δ : 12.71, 14.50, 22.86, 46.95, 55.93, 60.61, 65.08, 105.67, 114.73, 115.97, 116.98, 117.07, 126.26, 126.51, 126.71, 126.93, 130.90, 132.50, 133.25, 148.42, 152.02, 155.86, 159.49, 159.92, 160.17, 164.89, 165.43, 170.15; IR (KBr) ν : 3588, 3158, 2979, 2931, 2837, 2555, 2335, 1764, 1705, 1590, 1552, 1504, 1363, 1304, 1257, 1236, 1157, 1077, 1054, 998 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 621.1 $[\text{M}-\text{H}]^-$; HRMS calcd for $\text{C}_{30}\text{H}_{28}\text{ClN}_4\text{O}_7\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 623.1362, found 623.1370.

2-[4-((6-(乙氧羰酯)-5-(5-氯-3-甲基-1-(4-氟苯基)-吡啶-4-基)-3-氧代-7-甲基-噻唑并[3,2-*a*]嘧啶-2(5*H*)-亚基)甲基)-3-乙氧基苯氧基]乙酸(**5d**): 黄色固体, 产率 71%. m.p. 165~167 °C; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 300 MHz) δ : 1.15 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 1.36 (t, $J=6.9$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 2.29 (s, 3H, CH_3), 2.36 (s, 3H, CH_3), 4.06~4.15 (m, 4H, $2 \times \text{OCH}_2\text{CH}_3$), 4.91 (s, 2H, OCH_2CO), 6.08 (s, 1H, CH), 7.02 (t, $J=8.4$ Hz, 1H, ArH),

7.14~7.21 (m, 2H, ArH), 7.35 (t, $J=8.8$ Hz, 2H, ArH), 7.51~7.56 (m, 2H, ArH), 7.78 (s, 1H, CH=); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 100 MHz) δ : 12.73, 14.51, 15.02, 22.89, 46.84, 52.35, 60.64, 64.43, 65.30, 105.48, 114.07, 114.99, 116.45, 116.69, 117.38, 117.49, 123.92, 126.80, 127.65, 127.75, 133.58, 134.25, 148.65, 148.98, 149.75, 152.19, 155.91, 160.65, 164.81, 165.39, 169.35; IR (KBr) ν : 3734, 3415, 3120, 2997, 2938, 2873, 2365, 1755, 1714, 1699, 1555, 1507, 1366, 1304, 1236, 1201, 1163, 1142, 1077 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 653.1 $[\text{M}-\text{H}]^-$; HRMS calcd for $\text{C}_{31}\text{H}_{29}\text{ClFN}_4\text{O}_7\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 655.1424, found 655.1427.

2-[4-((6-(乙氧羰酯)-5-(5-氯-3-甲基-1-(3-氯苯基)-吡啶-4-基)-3-氧代-7-甲基-噻唑并[3,2-*a*]嘧啶-2(5*H*)-亚基)甲基)-3-乙氧基苯氧基]乙酸(**5e**): 黄色固体, 产率 66%. m.p. 181~183 °C; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 300 MHz) δ : 1.15 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 1.36 (t, $J=6.8$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 2.31 (s, 3H, CH_3), 2.37 (s, 3H, CH_3), 4.06~4.16 (m, 4H, $2 \times \text{OCH}_2\text{CH}_3$), 5.14 (s, 2H, OCH_2CO), 6.08 (s, 1H, CH), 7.02 (t, $J=8.8$ Hz, 1H, ArH), 7.14 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, ArH), 7.20 (s, 1H, ArH), 7.48~7.57 (m, 3H, ArH), 7.61 (s, 1H, ArH), 7.77 (s, 1H, CH=); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 75 MHz) δ : 12.69, 14.47, 15.01, 22.77, 46.84, 60.67, 64.50, 65.44, 105.37, 114.20, 115.09, 117.25, 118.02, 123.71, 124.02, 124.91, 126.83, 128.71, 131.29, 113.84, 138.97, 148.67, 149.58, 149.87, 152.09, 156.02, 164.75, 165.29, 169.28, 170.16; IR (KBr) ν : 3557, 3410, 3126, 2991, 2920, 2849, 2330, 2176, 1733, 1712, 1592, 1544, 1369, 1308, 1255, 1234, 1162, 1145, 1067, 992 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 669.0 $[\text{M}-\text{H}]^-$; HRMS calcd for $\text{C}_{31}\text{H}_{29}\text{Cl}_2\text{N}_4\text{O}_7\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 671.1129, found 671.1133.

2-[4-((6-(乙氧羰酯)-5-(5-氯-3-甲基-1-(4-甲氧基苯基)-吡啶-4-基)-3-氧代-7-甲基-噻唑并[3,2-*a*]嘧啶-2(5*H*)-亚基)甲基)-3-乙氧基苯氧基]乙酸(**5f**): 黄色固体, 产率 62%. m.p. 191~193 °C; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 300 MHz) δ : 1.15 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 1.36 (t, $J=6.9$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 2.27 (s, 3H, CH_3), 2.36 (s, 3H, CH_3), 3.79 (s, 3H, OCH_3), 4.06~4.17 (m, 4H, $2 \times \text{OCH}_2\text{CH}_3$), 4.91 (s, 2H, OCH_2CO), 6.06 (s, 1H, CH), 7.02 (t, $J=8.5$ Hz, 3H, ArH), 7.13~7.21 (m, 2H, ArH), 7.35 (d, $J=8.9$ Hz, 2H, ArH), 7.77 (s, 1H, CH=); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 100 MHz) δ : 12.71, 14.48, 15.02, 22.74, 46.89, 52.35, 55.90, 60.64, 64.42, 65.31, 105.58, 114.05, 114.69, 114.98, 116.91, 117.25, 123.95, 126.70, 126.77, 126.93, 130.83, 133.74, 148.41, 148.64, 149.78, 151.83, 156.00, 159.45, 164.75, 165.35, 169.33, 170.22; IR (KBr) ν : 3675,

3439, 3120, 2985, 2932, 2336, 2218, 1731, 1705, 1658, 1584, 1560, 1515, 1393, 1301, 1357, 1163, 1124, 1062, 998 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 665.1 $[\text{M}-\text{H}]^-$; HRMS calcd for $\text{C}_{32}\text{H}_{32}\text{ClN}_4\text{O}_8\text{S}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 667.1624, found 667.1630.

2-[2-((6-(乙氧羰基)-5-(5-氯-3-甲基-1-(4-氟苯基)-吡啶-4-基)-3-氧代-7-甲基-噻唑并[3,2-*a*]嘧啶-2(5*H*)-亚基)甲基)苯氧基]乙酸(**5g**): 黄色固体, 产率 63%. m.p. 174~175 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 300 MHz) δ : 1.15 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 2.29 (s, 3H, CH_3), 2.37 (s, 3H, CH_3), 4.06~4.17 (m, 2H, OCH_2CH_3), 4.98 (s, 2H, OCH_2CO), 6.08 (s, 1H, CH), 7.04~7.18 (m, 2H, ArH), 7.35 (t, $J=8.7$ Hz, 2H, ArH), 7.44~7.50 (m, 2H, ArH), 7.53~7.58 (m, 2H, ArH), 8.05 (s, 1H, CH=); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 100 MHz) δ : 12.73, 14.51, 22.88, 46.89, 52.41, 60.66, 65.34, 105.66, 113.44, 116.44, 116.67, 117.35, 120.37, 122.15, 122.31, 126.84, 127.68, 129.20, 132.97, 134.26, 148.98, 152.04, 155.88, 156.86, 160.65, 164.86, 165.38, 169.27, 170.14; IR (KBr) ν : 3545, 3410, 3120, 2926, 2849, 1764, 1705, 1625, 1593, 1552, 1513, 1372, 1328, 1304, 1233, 1157, 1133, 1077 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 609.4 $[\text{M}-\text{H}]^-$; HRMS calcd for $\text{C}_{29}\text{H}_{25}\text{ClF}_4\text{N}_4\text{O}_6\text{S}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 611.1162, found 611.1159.

2-[2-((6-(乙氧羰基)-5-(5-氯-3-甲基-1-(3-氯苯基)-吡啶-4-基)-3-氧代-7-甲基-噻唑并[3,2-*a*]嘧啶-2(5*H*)-亚基)甲基)苯氧基]乙酸(**5h**): 黄色固体, 产率 73%. m.p. 174~175 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 300 MHz) δ : 1.15 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 2.32 (s, 3H, CH_3), 2.37 (s, 3H, CH_3), 4.06~4.17 (m, 2H, OCH_2CH_3), 4.86 (s, 1H, OCH_2CO), 4.98 (s, 1H, OCH_2CO), 6.08 (s, 1H, CH), 7.05~7.18 (m, 2H, ArH), 7.44~7.57 (m, 5H, ArH), 7.62 (s, 1H, ArH), 8.06 (s, 1H, CH=); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 100 MHz) δ : 12.75, 14.51, 22.89, 46.84, 52.41, 60.69, 65.21, 105.54, 113.44, 117.90, 122.32, 123.86, 125.02, 127.78, 128.77, 129.20, 131.33, 132.98, 133.82, 138.96, 149.53, 152.14, 155.95, 156.86, 157.03, 164.89, 165.36, 169.27, 170.15; IR (KBr) ν : 3404, 2967, 2926, 2342, 2117, 1734, 1702, 1594, 1547, 1483, 1448, 1367, 1307, 1231, 1161, 1133, 1060, 1009 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 625.4 $[\text{M}-\text{H}]^-$; HRMS calcd for $\text{C}_{29}\text{H}_{25}\text{Cl}_2\text{N}_4\text{O}_6\text{S}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 627.0866, found 627.0868.

2-[2-((6-(乙氧羰基)-5-(5-氯-3-甲基-1-(4-甲氧基苯基)-吡啶-4-基)-3-氧代-7-甲基-噻唑并[3,2-*a*]嘧啶-2(5*H*)-亚基)甲基)苯氧基]乙酸(**5i**): 黄色固体, 产率 64%. m.p. 162~164 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 300 MHz) δ : 1.15 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, OCH_2CH_3), 2.27 (s, 3H, CH_3),

2.36 (s, 3H, CH_3), 3.80 (s, 3H, OCH_3), 4.07~4.17 (m, 2H, OCH_2CH_3), 4.98 (s, 2H, OCH_2CO), 6.07 (s, 1H, CH), 7.02~7.18 (m, 4H, ArH), 7.37~7.50 (m, 4H, ArH), 8.05 (s, 1H, ArH); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 100 MHz) δ : 12.73, 14.50, 22.86, 46.94, 52.41, 55.91, 60.64, 65.35, 105.79, 113.44, 114.69, 116.82, 120.39, 122.05, 122.17, 122.31, 126.72, 127.75, 129.20, 130.86, 132.95, 148.40, 151.89, 155.82, 156.86, 159.46, 164.85, 165.41, 169.27, 179.16; IR (KBr) ν : 3392, 3126, 2955, 2926, 2837, 2336, 1731, 1707, 1590, 1548, 1515, 1481, 1440, 1384, 1369, 1322, 1304, 1255, 1230, 1201, 1164, 1133, 1080 cm^{-1} ; ESI-MS m/z : 621.4 $[\text{M}-\text{H}]^-$; HRMS calcd for $\text{C}_{30}\text{H}_{28}\text{ClN}_4\text{O}_7\text{S}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 623.1362, found 623.1366.

3.2.5 抗肿瘤活性测试

以 5-氟尿嘧啶(5-FU)为阳性药, 采用四甲基偶氮唑盐(MTT)还原法测试目标化合物对人前列腺癌 PC-3 细胞和人肝癌 HepG-2 细胞的体外抗肿瘤活性. 处于指数生长期的细胞, 配制成浓度为 3.5×10^4 个/mL 的细胞悬液, 96 孔细胞培养板中每孔加入 100 μL 细胞悬液(每孔 3.5×10^3 个细胞), 随后将细胞培养板置于 37 $^{\circ}\text{C}$, 5% CO_2 培养箱中培养 24 h. 用完全培养基稀释药物至所需浓度, 每孔加入 100 μL 相应的含药(50 $\mu\text{mol/L}$)培养基, 同时设立阴性对照组, 阳性对照组, 96 孔细胞培养板置于 37 $^{\circ}\text{C}$, 5% CO_2 培养箱中培养 72 h. 每孔加入 20 μL MTT (5 mg/mL), 在培养箱继续培养 4 h, 弃去培养基, 每孔加入 150 μL 二甲基亚砜(DMSO)溶解, 混匀 10 min, 酶标仪读出每孔的 OD 值($\lambda=490$ nm), 计算抑制率, 计算公式如下:

抑制率(%) = $(1 - \text{给药组吸光度值} / \text{空白组吸光度值}) \times 100\%$.

50 $\mu\text{mol/L}$ 时抑制率大于 50% 的样品, 重新设置浓度进行细节. 即将待测样品以 0.78125, 1.5625, 3.125, 6.25, 12.5, 25, 50, 100 $\mu\text{mol/L}$ 浓度加入 96 孔板中, 培养 72 h, 检测. 试验结果采用 SPSS17.0 软件计算 IC_{50} 值.

3.2.6 Annexin-V FITC/PI 双染法检测细胞凋亡

将指数生长期的 PC-3 细胞消化接种到六孔板中, 次日, 待细胞贴壁后, 根据组别设置加入相应的含有 **5i** 培养基, 同时设立阴性对照组; 药物作用 72 h 后, 用 0.25% 胰酶(不含 EDTA)消化收集细胞; 用 PBS 洗涤细胞 2 次(离心 2000 r/min, 5 min)收集 5×10^5 细胞; 加入 500 μL 的 Binding Buffer 悬浮细胞; 加入 5 μL Annexin V-FITC 混匀后, 加入 5 μL Propidium Iodide, 混匀; 室温、避光、反应 5~15 min; 最后用流式细胞仪检测 ($E_x=488$ nm; $E_m=530$ nm)细胞凋亡的情况. 实验重复 3 次.

3.2.7 PI 单染法检测细胞周期

将指数生长期的 PC-3 细胞消化接种到六孔板中,次日,待细胞贴壁后,根据组别设置加入相应的含有 5i 培养基,同时设立阴性对照组;药物作用 72 h 后,用 0.25%胰酶(不含 EDTA)消化收集细胞;用 PBS 洗涤细胞 1 次(离心 2000 r/min, 5 min)收集 5×10^5 细胞;制备的单细胞悬液用体积分数为 70%乙醇固定 2 h, 4 °C 保存,染色前用 PBS 洗去固定液;加 100 μ L RNase A 37 °C 水浴 30 min;再加入 400 μ L PI 染色混匀,4 °C 避光 30 min;最后上机检测,记录激发波长 488 nm 处红色荧光。实验重复 3 次。

辅助材料(Supporting Information) 所合成化合物的 ^1H NMR, ^{13}C NMR, ESI-MS, HRMS 谱图。这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载。

References

- [1] Welsch, M. E.; Snyder, S. A.; Stockwell, B. R. *Curr. Opin. Chem. Biol.* **2010**, *14*, 347.
- [2] Li, L.; Liu, Q. J.; Sui, X. Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2014**, *34*, 1669 (in Chinese).
(李丽, 刘庆俭, 隋雪燕, 有机化学, **2014**, *34*, 1669.)
- [3] Maddila, S.; Damu, G. L. V.; Oseghe, E. O.; Abafe, O. A.; Rao, C. V.; Lavanya, P. *J. Korean Chem. Soc.* **2012**, *56*, 334.
- [4] Abd El-Latif, N. A.; Amr, A. E. G. E.; Ibrahim, A. A. *Monatsh. Chem.* **2007**, *138*, 559.
- [5] Holla, B. S.; Rao, B. S.; Sarojini, B. K.; Akberali, P. M. *Eur. J. Med. Chem.* **2004**, *39*, 777.
- [6] Mohamed, S. F.; Flefel, E. M.; Amr, A. E. G. E.; El-Shafy, D. N. *Eur. J. Med. Chem.* **2010**, *45*, 1494.
- [7] Alam, O.; Khan, S. A.; Siddiqui, N.; Ahsan, W. *Med. Chem. Res.* **2010**, *19*, 1245.
- [8] Hu, J.; Wang, Y.; Wei, X. Y.; Wu, X. X.; Chen, G. Z.; Cao, G. Z.; Shen, X. Q.; Zhang, X. H.; Tang, Q. Q.; Liang, G.; Li, X. K. *Eur. J. Med. Chem.* **2013**, *64*, 292.
- [9] Pan, B.; Huang, R. Z.; Zheng, L. K.; Chen, C.; Han, S. Q.; Qu, D.; Zhu, M. L.; Wei, P. *Eur. J. Med. Chem.* **2011**, *46*, 819.
- [10] Ashok, M.; Holla, B. S.; Kumari, N. S. *Eur. J. Med. Chem.* **2007**, *42*, 380.
- [11] Farghaly, T. A.; Gomha, S. M.; Abbas, E. M. H.; Abdalla, M. M. *Arch. Pharm. Chem. Life Sci.* **2012**, *345*, 117.
- [12] Awadallah, F. M. *Sci. Pharm.* **2008**, *76*, 415.
- [13] Geist, J. G.; Lauw, S.; Illarionova, V.; Illarionov, B.; Fischer, M.; Grawert, T.; Rohdich, F.; Eisenreich, W.; Kaiser, J.; Groll, M.; Scheurer, C.; Wittlin, S.; Alonso-Gomez, J.; Schweizer, W. B.; Bacher, A.; Diederich, F. *ChemMedChem* **2010**, *5*, 1092.
- [14] Zhou, B. C.; Li, X.; Li, Y.; Xu, Y. C.; Zhang, Z. X.; Zhou, M.; Zhang, X. L.; Liu, Z.; Zhou, J. H.; Cao, C. Y.; Yu, B.; Wang, R. X. *ChemMedChem* **2011**, *6*, 904.
- [15] Xu, Y. C.; Zhou, M.; Li, Y.; Li, C. K.; Zhang, Z. X.; Yu, B.; Wang, R. X. *ChemMedChem* **2013**, *8*, 1345.
- [16] Feng, Y.; Ding, X. D.; Chen, T.; Chen, L. L.; Liu, F.; Jia, X.; Luo, X. M.; Shen, X.; Chen, K. X.; Jiang, H. L.; Wang, H.; Liu, H.; Liu, D. X. *J. Med. Chem.* **2010**, *53*, 3465.
- [17] Kolb, S.; Mondesert, O.; Goddard, M. L.; Jullien, D.; Villoutreix, B. O.; Ducommun, B.; Garbay, C.; Braud, E. *ChemMedChem* **2009**, *4*, 633.
- [18] Duval, R.; Kolb, S.; Braud, E.; Genest, D.; Garbay, C. *J. Comb. Chem.* **2009**, *11*, 947.
- [19] Pathak, R. B.; Chovatia, P. T.; Parekh, H. H. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2012**, *22*, 5129.
- [20] Sun, N. B.; Tong, J. Y.; Wu, H. K. *Chin. J. Org. Chem.* **2013**, *33*, 101 (in Chinese).
(孙娜波, 童建颖, 武宏科, 有机化学, **2013**, *33*, 101.)
- [21] Liu, Y. R.; Luo, J. Z.; Duan, P. P.; Shao, J.; Zhao, B. X.; Miao, J. Y. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2012**, *22*, 6882.
- [22] Chavan, H. V.; Bandgar, B. P.; Adsul, L. K.; Dhakane, V. D.; Bhale, P. S.; Thakare, V. N.; Masand, V. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2013**, *23*, 1315.
- [23] Yang, X. H.; Zhang, P. H.; Zhou, Y. H.; Wang, J. S.; Liu, H. J. *Chin. J. Chem.* **2012**, *30*, 670.
- [24] Yan, T.; Yu, S. J.; Liu, P. F.; Liu, Z.; Wang, B. L.; Xiong, L. X.; Li, Z. M. *Chin. J. Chem.* **2012**, *30*, 919.
- [25] Zhang, X. Y.; Li, Y. S.; Weng, J. Q.; Tan, C. X. *Chin. J. Org. Chem.* **2011**, *31*, 1295 (in Chinese).
(张向阳, 李永曙, 翁建全, 谭成侠, 有机化学, **2011**, *31*, 1295.)
- [26] Arai, T.; Ohno, M.; Inoue, H.; Hayashi, S.; Aoki, T.; Hirokawa, H.; Meguro, H.; Koga, Y.; Oshida, K.; Kainoh, M.; Suyama, K.; Kawai, H. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2012**, *22*, 5118.
- [27] Li, X.; Lu, X.; Xing, M.; Yang, X. H.; Zhao, T. T.; Gong, H. B.; Zhu, H. L. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2012**, *22*, 3589.
- [28] Hiroyoshi, N.; Toshiaki, W.; Satoshi, Y.; Yasuhiro, M.; Katsuhiko, I.; Hiroko, S. *EP 208874*, **1987** [*Chem. Abstr.* **1987**, *106*, 138442].
- [29] Zhou, S. G.; Ren, J. G.; Liu, M. M.; Ren, L. X.; Liu, Y. J.; Gong, P. *Bioorg. Chem.* **2014**, *57*, 30.
- [30] Khilya, O. V.; Volovenko, T. A.; Volovenko, Yu. M. *Chem. Heterocycl. Com.* **2006**, *42*, 1311.
- [31] Du, H. T.; Du, H. J.; Ouyang, G. P. *Chin. J. Org. Chem.* **2008**, *28*, 356 (in Chinese).
(杜海堂, 杜海军, 欧阳贵平, 有机化学, **2008**, *28*, 356.)
- [32] Nayak, M.; Batchu, H.; Batra, S. *Tetrahedron Lett.* **2012**, *53*, 4206.

(Qin, X.)