环丙鱼藤双脒的合成与抑菌活性

叶 姣^{*a} 颜晓维^a 张翠央^a 胡艾希^{*a} 欧晓明^b^(a) 湖南大学化学化工学院 长沙 410082^(b) 国家农药创制工程技术研究中心 长沙 410007

摘要 以鱼藤酮为原料, 经氧硫叶立德开环、环合, 再与水合肼缩合制备关键中间体(2*R*)-5-[5',6'-二甲氧基-1',1'*a*,2',7'*b*-四氢环丙并[*c*]苯并吡喃-7'*b*-基](亚联氨基)甲基]-2-(丙烯-2'-基)-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**2**), **2**与多种醛/酮反应, 合成 16 个结构新颖的环丙鱼藤双脒化合物 **3a**~**3p**, 结构经 ¹H NMR 和 LRMS 确证。初步抑菌活性测试表明, 鱼藤双脒化合物对稻纹枯病菌、油菜菌核病菌和小麦白粉病菌的抑制率/防治率较高。其中化合物 **3d** 和 **3o** 在 500 mg/L 浓度下对稻纹枯病菌的防治率分别为 55.1% 和 55.5%; 化合物 **3a**, **3c**, **3e**, **3h** 和 **3k** 在 25 mg/L 浓度下对油菜菌核病菌的抑制率分别为 76.8%, 87.0%, 70.6%, 72.5% 和 65.2%; 化合物 **3a**, **3c**, **3g**, **3i** 和 **3l** 在 500 mg/L 浓度下对小麦白粉病菌的防治率为 80.0%~90.0%。

关键词 鱼藤酮; 双脒; 合成; 抑菌活性

Synthesis and Fungicidal Activity of the Cyclopropyl Derris Dihydrazone Derivatives

Ye, Jiao^{*a} Yan, Xiaowei^a Zhang, Cuiyang^a Hu, Aixi^{*a} Ou, Xiaoming^b^(a) College of Chemistry and Chemical Engineering, Hunan University, Changsha 410082^(b) National Engineering and Technology Center for Pesticide Research and Development, Changsha 410007

Abstract A novel series of cyclopropyl derris dihydrazone derivatives **3a**~**3p** were designed and synthesized by reacting substituted aldehydes/ketones with intermediate (2*R*)-5-[5',6'-dimethoxy-1',1'*a*,2',7'*b*-tetrahydrocyclopropa[*c*]chromen-7'*b*-yl](hydrazono)methyl]-2-(prop-1"-en-2"-yl)-2,3-dihydrobenzofuran-4-ol (**2**), which was synthesized via the reactions of the rotenone, dimethyloxosulphonium methylide and hydrazine hydrate. Their structures were characterized by ¹H NMR and LRMS. The results of bioassay indicated that the title compounds exhibited potent fungicidal activity against *Rhizoctonia solani*, *Sclerotinia sclerotiorum* and *Blumeria graminis*. Compounds **3d** and **3o** showed 55.1% and 55.5% control rates against *Rhizoctonia solani* at 500 mg/L, respectively, compounds **3a**, **3c**, **3e**, **3h** and **3k** showed 76.8%, 87.0%, 70.6%, 72.5% and 65.2% inhibition rates against *Sclerotinia sclerotiorum* at 25 mg/L, respectively, and compounds **3a**, **3c**, **3g**, **3i** and **3l** showed 80.0%~90.0% control rate against *Blumeria graminis* at 500 mg/L.

Keywords rotenone; dihydrazone; synthesis; fungicidal activity

鱼藤酮作为一种传统的植物杀虫剂, 具有高效、低毒、易降解、环境相容性好、不易产生抗药性等多种优点, 广泛应用于农业病虫害的防治已有 150 多年历史^[1]。鱼藤酮类农药作用机制明确, 是经典的烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH): 泛醌氧化还原酶(线粒体复合物 I)抑制剂^[2~3]。近年来, 人们通过更深入的研究发现鱼藤酮及其衍生物生物活性广泛, 如抗癌^[4~7]、抑制脂肪形成^[4]、抑制拓扑异构酶 II^[6]、杀菌^[8]、除螨^[8]、杀虫^[8,9]、

抗抑郁^[9]、抗流感^[9]等。

对于鱼藤酮衍生物的研究主要有两大方向, 一是保留鱼藤酮母体结构, 对局部侧链上的甲氧基^[10,11]、羰基^[7,12,13]、烯丙基^[14]等进行修饰; 二是改造鱼藤酮母体结构, 获得结构新颖的鱼藤酮衍生物。Nianbai 等^[15]将鱼藤酮的 B 环扩展为七元环后, 发现其仍保持较高泛醌氧化还原酶抑制活性; Sakakibara 等^[16]将鱼藤酮的 B 环打开, 合成一系列含哒嗪环和氮唑环的鱼藤酮杂环衍生物, 其

* E-mail: yejiao@hnu.edu.cn, axhu@hnu.edu.cn

Received September 19, 2014; revised November 3, 2014; published online November 18, 2014.

Project supported by the Natural Science Foundation of Hunan Province (No. 12jj3012).

湖南省自然科学基金(No. 12jj3012)资助项目。

中鱼藤酮酸和鱼藤酮酸甲酯两种化合物都表现出较强抗肿瘤活性; Carson 等^[17]利用氧硫叶立德作用于鱼藤酮, 使鱼藤酮的 C 环打开的同时环合形成环丙鱼藤酮 **1**。

胡艾希等^[9,18,19,21]对鱼藤酮衍生物进行了深入研究, 发现环丙鱼藤酮和鱼藤酮丙酰胺对多种癌细胞具有一定的抑制活性, 以鱼藤酮为先导物合成的苯并吡喃酰胺类衍生物具有良好的抗人宫颈癌活性, 以及 *N*-酰基吡唑鱼藤系列衍生物显示较好的杀虫活性、神经氨酸酶抑制活性和抗抑郁活性。

双胍类化合物由于其独特的分子结构, 在农药和医药领域有广泛生物活性, 具有制备简单、活性优良、作用谱广、毒性小等优点, 是农药创制的一个热点^[22~26]。本文在前期研究的基础上^[9,18,19,21], 对鱼藤酮进行结构改造, 打开 C 环, 保留了鱼藤酮中具杀虫、杀菌活性的苯并呋喃和苯并吡喃结构, 对羰基进行修饰, 引入双胍活性基团, 设计合成系列环丙鱼藤双胍类化合物, 并进行抑菌活性筛选。新化合物合成路线见 Scheme 1。

3a: $R^1 = \text{CH}_3$, $R^2 = \text{H}$; **3b:** $R^1 = \text{CH}_3\text{CH}_2$, $R^2 = \text{H}$; **3c:** $R^1 = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2$, $R^2 = \text{H}$; **3d:** $R^1 = \text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CH}_2$, $R^2 = \text{H}$; **3e:** $R^1 = \text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}_2$, $R^2 = \text{H}$; **3f:** $R^1 = \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}$, $R^2 = \text{H}$; **3g:** $R^1 = \text{C}_6\text{H}_5$, $R^2 = \text{H}$; **3h:** $R^1 = \text{CH}_3$, $R^2 = \text{CH}_3$; **3i:** $R^1 = \text{CH}_3\text{CH}_2$, $R^2 = \text{CH}_3$; **3j:** $R^1 = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2$, $R^2 = \text{CH}_3$; **3k:** $R^1 = \text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CH}_2$, $R^2 = \text{CH}_3$; **3l:** $R^1 = (\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2$, $R^2 = \text{CH}_3$; **3m:** $R^1 = \text{C}_6\text{H}_5$, $R^2 = \text{CH}_3$; **3n:** $R^1 = \text{CH}_3\text{CH}_2$, $R^2 = \text{CH}_3\text{CH}_2$; **3o:** $R^1, R^2 = \text{C}(\text{CH}_2)_4$; **3p:** $R^1, R^2 = \text{C}(\text{CH}_2)_5$

图式 1 目标化合物的合成路线

Scheme 1 Synthetic route of target compounds

1 结果与讨论

1.1 目标化合物的合成

化合物 **1** 的合成参照文献^[9], 以鱼藤酮为原料, 经氧硫叶立德作用得到化合物 **1**, 收率 90%。

化合物 **1** 在乙醇中与水合肼经加成-消除过程制得酮肟 **2**。通常酸可催化该反应, 实验发现, 以冰乙酸为催化剂, pH 值为 7~8 时, 原料反应不完全, 且有副产物生成; 当以氢氧化钠为催化剂, 且控制溶液 pH 值为 12~13 时, 反应完全, 产物收率较高。这可能是因为酸对反应既有活化作用, 又有钝化作用, 肟在进攻质子化酮时, 酸会与氨基形成氨基正离子, 降低了氨基的亲核能力, 导致不能反应完全。因此, 该反应需要一个适宜的 pH 值, 控制溶液 pH 值为 12~13, 乙醇中回流 5 h, 得化合物 **2**, 收率 90%。

化合物 **2** 再与多种醛或酮于室温下发生缩合反应得到 16 个双胍类衍生物 **3a~3p**, 收率 34%~83%, 反应结果见表 2。

表 2 化合物 **3a~3p** 的合成
Table 2 Synthesis of compounds **3a~3p**

Compd.	<i>t</i> /h	m.p./°C	Yield/%
3a	0.1	68~73	83
3b	0.3	70~75	82
3c	0.3	65~71	80
3d	0.3	58~63	76
3e	0.3	55~59	80
3f	1.0	80~90	75
3g	0.3	50~52	66
3h	0.3	75~80	54
3i	0.5	65~73	38
3j	10.5	59~69	52
3k	0.5	74~78	34
3l	0.5	90~92	75
3m	17	85~89	65
3n	17.5	60~68	55
3o	7.0	82~89	72
3p	5.0	76~85	65

从表 2 可知, 化合物 **2** 与醛类化合物反应的速度较快, 反应时间较短, 收率较高。例如醛肟 **3a~3d** 的反应时间为 0.1~0.3 h, 收率为 76%~83%, 而相对应的酮肟 **3h~3k** 的反应时间在 0.3~10.5 h, 收率 34%~54%; 此外, 化合物 **2** 与苯甲醛的反应速度(0.3 h)也远快于与苯乙酮的反应(17 h)。由此可见, 醛羰基相对于酮羰基更活泼, 空间位阻较小, 反应更容易进行。

1.2 目标化合物的结构表征

化合物 **3a~3p** 的结构经 ^1H NMR 进行表征, 由于环丙鱼藤酮存在一对非对映异构体^[19], 且双胍存在顺反异构, 使得该类化合物存在多个异构体, 各组质子出

峰较为复杂. 以醛脎化合物 **3a** 为例, 在 δ 0.95~1.47 区间的峰归属为环丙环上的 3 个氢, 由于 1-H 上的两个氢化学环境不同, 存在邻位及同碳偶合, 故分别在 δ 1.37~1.47, 1.20~1.29 以两组多峰形式出现, 有类似情况的还有苯并呋喃环上的 3-H, 苯并吡喃环上的 2-H 以及烯烃末端上的两个氢; 双脎侧链上的 CH 以多峰形式出现 δ 7.66~7.74, 其他醛脎化合物 CH 的出峰位置以及峰型与化合物 **3a** 类似, 侧链亚乙基上的甲基以多峰形式出现在 δ 1.75~1.85, 由此可知双脎侧链已存在, 化合物 **3a** 结构正确; 在 δ 13.24~13.82 处出现的 8 个 OH 的单峰, 进一步验证: 由于环丙烷非对映异构体和两个 C=N 双键的顺反异构使化合物 **3a** 存在 8 个异构体, 在其他双脎化合物中也有类似现象出现.

在 LRMS 谱中, 化合物 **3a** ($C_{26}H_{28}N_2O_5$) 出现了 m/z 449.1 $[M+1]^+$ 分子离子峰, 其他化合物均出现了相应的分子离子峰.

1.3 抑菌活性测试

以咪菌酯为阳性对照, 对化合物 **2**, **3a**~**3p** 进行抑菌活性初步筛选, 对小麦赤霉病菌(*Gibberella zeae*)、辣椒疫霉病菌(*Phytophthora capsici*)、烟草赤星病菌(*Alternaria alternata*)、黄瓜灰霉病菌(*Botrytis cinerea*)、稻纹枯病菌(*Rhizoctonia solani*)、油菜菌核病菌(*Sclerotinia sclerotiorum*)和小麦白粉病菌(*Blumeria graminis*)的抑菌活性结果列入表 3.

由表 3 可知: 所测化合物对油菜菌核病菌和小麦白粉病菌的防效最好, 对稻纹枯病菌防效中等, 对其他病

菌抑制活性较差.

在 25 mg/L 浓度下, 化合物对油菜菌核病菌抑制活性普遍较好. 当 R^2 为 H, R^1 为 1~5 个碳的饱和脂肪链烷烃时, 以及当 R^2 为 CH_3 , R^1 为 1~4 个碳的饱和脂肪链烷烃时, 杀菌活性较好, 如化合物 **2**, **3a**, **3c**, **3e** 和 **3h** 对油菜菌核病菌的抑制率均大于 70.0%, 其中化合物 **3c** 的抑制率最高(87.0%); 当双脎侧链为环烷烃时, 活性中等, 化合物 **3o**, **3p** 的抑制率均为 50%; 当 R^1 为不饱和脂肪链或苯环时, 活性一般.

在 500 mg/L 浓度下, 部分化合物对小麦白粉病菌的防治率与中间体 **2** (80.0%)相当或更高. 当 R^2 为 H, R^1 为 1~3 个碳的饱和脂肪链或苯环时, 以及当 R^2 为 CH_3 , R^1 为 CH_3CH_2 或 $(CH_3)_2CHCH_2$ 时, 杀菌活性最好, 如化合物 **3a**, **3c**, **3g**, **3i** 和 **3l** 对小麦白粉病菌的防治率均达 80.0%以上, 其中 **3l** 的防治率最高(90.0%); 当双脎侧链为不饱和脂肪链烷烃、环烷烃或较长脂肪链烷烃时, 活性一般甚至无活性.

在 500 mg/L 浓度下, 化合物 **3d** 和 **3o** 对稻纹枯病菌的防治率高于阳性对照咪菌酯(50.0%), 分别为 55.1%和 55.5%.

2 结论

本文以鱼藤酮为原料, 经开环、两次脎化反应合成 16 个结构新颖的环丙鱼藤双脎类化合物, 反应条件温和, 操作简单. 化合物经 1H NMR 和 LRMS 确证结构. 初步抑菌活性测试表明, 环丙鱼藤双脎化合物对稻纹枯

表 3 化合物 **2** 和 **3a**~**3p** 的抑菌活性(抑制率或防治率/%)
Table 3 Data of fungicidal activity of compounds **2** and **3a**~**3p** (inhibitory rate or control rate/%)

化合物	赤霉病菌 ^a	疫霉病菌 ^a	赤星病菌 ^a	灰霉病菌 ^a	纹枯病菌 ^b	菌核病菌 ^a	白粉病菌 ^c
2	25.8	8.5	16.3	27.0	0.0	84.1	80.0
3a	21.0	8.5	16.3	27.0	0.0	76.8	80.0
3b	22.7	29.4	9.1	34.1	10.8	44.1	50.0
3c	4.8	16.9	10.2	6.8	0.0	87.0	80.0
3d	22.7	29.4	34.1	22.7	55.1	58.8	0.0
3e	22.7	14.7	11.4	11.4	0.0	70.6	0.0
3f	22.7	29.4	9.1	11.4	20.5	44.1	0.0
3g	12.9	0.0	10.2	6.8	0.0	36.2	80.0
3h	29.0	13.6	16.3	6.8	40.0	72.5	0.0
3i	21.0	8.5	16.3	6.8	0.0	58.0	80.0
3j	11.4	14.7	11.4	18.2	30.9	58.8	0.0
3k	21.0	8.5	16.3	0.0	0.0	65.2	0.0
3l	12.9	5.1	16.3	27.0	0.0	43.5	90.0
3m	4.8	0.0	10.2	6.8	0.0	29.0	0.0
3n	11.4	29.4	11.4	15.9	0.0	58.8	0.0
3o	34.1	44.1	9.1	22.7	55.5	50.0	20.0
3p	11.4	14.7	6.8	18.2	40.3	50.0	20.0
Azoxys-trobin	65.7	56.1	80.1	47.6	50.0	93.5	100.0

^a 离体药剂浓度为 25 mg/L, 抑制率; ^b 蚕豆叶片法浓度为 500 mg/L, 防治率; ^c 盆栽法药剂浓度为 500 mg/L, 防治率.

病菌、油菜菌核病菌和小麦白粉病菌有中等到强的抑制效果, 其中, 化合物 **3d**, **3o** 在 500 mg/L 浓度下对稻纹枯病菌的防治率分别为 55.1 % 和 55.5%; 化合物 **2**, **3a**, **3c**, **3e** 和 **3h** 在 25 mg/L 浓度下对油菜菌核病菌的抑制率分别为 84.1%, 76.8%, 87.0%, 70.6% 和 72.5%; 化合物 **2**, **3a**, **3c**, **3g**, **3i** 和 **3l** 在 500 mg/L 浓度下对小麦白粉病菌的防治率为 80.0 %~90.0%。

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

RY-1 熔点仪(天津天分仪器厂)测定熔点; R1002 型旋转蒸发仪(郑州长城科工贸有限公司); 薄层析硅胶板(烟台市汇友硅胶开发有限公司); ZF-2 型三用紫外仪(上海市安亭电子仪器厂)显色; VARIAN INOVA-400 核磁共振仪(美国 Varian 公司), ^1H NMR 核磁共振频率为 399.970 MHz, TMS 为内标; LCQ-Advantage 液相色谱-离子阱质谱联用仪(美国 Thermo Finnigan 公司); MAT 95 XP 质谱仪(美国 Thermo Finnigan 公司); VARIO EL III 元素分析仪(德国); 鱼藤酮(广东丰顺县汤西嘉兴福利化工厂, 95%~98%), 溶剂和试剂均为市售分析纯或化学纯, 化合物 **1** 按文献[11]方法自制。

3.2 化合物的合成

3.2.1 (2R)-5-[(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)(亚联氨基)甲基]-2-(丙烯-2"-基)-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**2**)的合成

化合物 **1** 7.00 g (0.017 mol), 乙醇 20 mL, 加热回流, 氢氧化钠固体 0.3 g, 调节 pH=12~13, 加入水合肼(80 %) 5.00 g (3.87 mol), TLC 监测, 5.0 h 反应结束。反应液水洗, 滴加盐酸至中性, 析出固体, 抽滤, 干燥得白色固体 **2** 7.00 g, 收率 90%。m.p. 177~178 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 1.43~1.47 (m, 1H, 1'a-H), 1.71 (s, 1H, 1'-H), 1.77~1.82 (m, 3H, 3"-CH₃), 1.96~2.05 (m, 1H, 1'-H), 3.01~3.10 (m, 1H, 2'-CH₂), 3.34~3.39 (m, 1H, 2"-CH₂), 3.65, 3.67, 3.73, 3.74 (s, 3H, OCH₃), 3.82 (s, 3H, OCH₃), 4.08 (t, $J=10.6$ Hz, 1H, 3-CH₂), 4.44 (t, $J=10.6$ Hz, 1H, 3-CH₂), 4.92 (d, $J=10.8$ Hz, 1H, =CH₂), 5.09 (d, $J=10.8$ Hz, 1H, =CH₂), 5.22~5.29 (m, 1H, 2-H), 6.26~6.60 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.12~7.45 (m, 1H, 苯环 CH); EI-MS m/z : 422.2 [M^+]. Anal. calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_5$: C 68.23, H 6.20, N 6.63; found C 68.35, H 6.18, N 6.60.

3.2.2 目标化合物 **3a**~**3p** 的合成

化合物 **2** (1.18 mmol) 以相应的醛或酮(20.70 mmol) 为溶剂和反应试剂, 室温反应, TLC 监测。反应结束后, 减压脱溶, 柱层析[V(石油醚): V(乙酸乙酯): V(三乙

胺)=8:1:1]得目标产物。

(2R)-5-[(亚乙基胍基)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2"-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3a**): 反应 0.1 h, 收率 83%。m.p. 68~73 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 0.96~1.07 (m, 1H, 1'a-CH), 1.21~1.28 (m, 1H, 1'-CH₂), 1.39~1.46 (m, 1H, 1'-CH₂), 1.61 (s, 3H, 3"-CH₃), 1.77~1.83 (m, 3H, 2"-CH₃), 2.97~3.11 (m, 1H, 3-CH₂), 3.32~3.47 (m, 1H, 3-CH₂), 3.59, 3.59, 3.61, 3.63, 3.67, 3.68, 3.69, 3.69 (s, 3H, OCH₃), 3.81 (s, 3H, OCH₃), 4.05~4.19 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.32~4.40 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.91~4.95 (m, 1H, =CH₂), 5.03~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.25~5.34 (m, 1H, 2-H), 6.28~6.54 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.16~7.97 (m, 2H, 苯环 CH, 1"-CH), 13.24, 13.28, 13.54, 13.58, 13.75, 13.76, 13.80, 13.82 (s, 1H, OH); ESI-MS m/z : 449.1 [$\text{M}+\text{H}]^+$. Anal. calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{28}\text{N}_2\text{O}_5$: C 69.63, H 6.29, N 6.25; found C 69.51, H 6.32, N 6.28.

(2R)-5-[(亚丙基胍基)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2"-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3b**): 反应 0.3 h, 收率 82%。m.p. 70~75 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 0.97~1.14 (m, 3H, 3"-CH₃), 1.45~1.56 (m, 1H, 1'a-H), 1.63~1.66 (m, 1H, 1'-H), 1.77~1.91 (m, 3H, 3"-CH₃), 2.02~2.06 (m, 1H, 1'-H), 2.29~2.44 (m, 2H, 2"-CH₂), 3.00~3.10 (m, 1H, 3-CH₂), 3.33~3.46 (m, 1H, 3-CH₂), 3.60, 3.61, 3.65, 3.65, 3.68, 3.68, 3.73, 3.74 (s, 3H, OCH₃), 3.81 (s, 3H, OCH₃), 4.12~4.20 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.34~4.38 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.92~4.95 (m, 1H, =CH₂), 5.08~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.25~5.34 (m, 1H, 2-H), 6.29~6.49 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.40~7.58 (m, 苯环 CH), 7.69~7.73 (m, 1H, 1"-CH), 13.58 (brs, 1H, OH); EI-MS m/z : 462.3 [M^+]. Anal. calcd for $\text{C}_{27}\text{H}_{30}\text{N}_2\text{O}_5$: C 70.11, H 6.54, N 6.06; found C 70.23, H 6.51, N 6.03.

(2R)-5-[(亚丁基胍基)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2"-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3c**): 反应 0.3 h, 收率 80%。m.p. 65~71 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 0.83~0.92 (m, 3H, 4"-CH₃), 1.25~1.36 (m, 4H, 2"-CH₂, 3"-CH₂), 1.77~1.80 (m, 3H, 3"-CH₃), 1.82~2.08 (m, 3H, 1'-H, 1'a-H), 2.99~3.10 (m, 1H, 3-CH₂), 3.30~3.45 (m, 1H, 3-CH₂), 3.63, 3.63, 3.64, 3.65, 3.67, 3.69, 3.69, 3.70 (s, 3H, OCH₃), 3.83, 3.83, 3.84, 3.85 (s, 3H, OCH₃), 4.08~4.19 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.39~4.46 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.93~4.96 (m, 1H, =CH₂), 5.09~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.26~5.35 (m, 1H, 2-H), 6.28~6.61 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.18~7.25 (m,

1H, 苯环 CH), 7.52~7.59 (m, 1H, 1'''-CH), 11.65, 11.68, 11.69, 11.71, 12.59, 12.61, 12.65, 12.66 (s, 1H, OH). EI-MS m/z : 476.3 [M^+]. Anal. calcd for $C_{28}H_{32}N_2O_5$: C 70.57, H 6.77, N 5.88; found C 70.44, H 6.81, N 5.90.

(2R)-5-((亚戊基胍基)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2"-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3d**): 反应 0.3 h, 收率 76%. m.p. 58~63 °C; 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 0.81~0.93 (m, 3H, 5'''-CH₃), 0.97~1.08 (m, 1H, 1'a-H), 1.17~1.36 (m, 4H, 3'''-CH₂, 4'''-CH₂), 1.63~1.71 (m, 1H, 1'-H), 1.77~1.93 (m, 3H, 3''-CH₃), 2.01~2.05 (m, 1H, 1'-H), 2.26~2.44 (m, 2H, 2'''-CH₂), 3.03~3.11 (m, 1H, 3-CH₂), 3.34~3.47 (m, 1H, 3-CH₂), 3.59, 3.60, 3.60, 3.61, 3.67, 3.68, 3.73, 3.74 (s, 3H, OCH₃), 3.81 (s, 3H, OCH₃), 4.12~4.19 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.34~4.39 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.92~4.95 (m, 1H, =CH₂), 5.08~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.25~5.35 (m, 1H, 2-H), 6.29~6.49 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.40~7.73 (m, 1H, 苯环 CH, 1'''-CH), 13.45 (brs, 1H, OH); EI-MS m/z : 490.3 [M^+]. Anal. calcd for $C_{29}H_{34}N_2O_5$: C 71.00, H 6.99, N 5.71; found C 71.14, H 6.96, N 5.69.

(2R)-5-[(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2"-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3e**): 反应 0.3 h, 收率 80%. m.p. 55~59 °C; 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 0.83 (t, $J=7.1$ Hz, 3H, 6'''-CH₃), 0.97~1.08 (m, 1H, 1'a-H), 1.15~1.49 (m, 6H, 3'''-CH₂, 4'''-CH₂, 5'''-CH₂), 1.62~1.68 (m, 1H, 1'-H), 1.77~1.82 (m, 3H, 3''-CH₃), 2.00~2.05 (m, 1H, 1'-H), 2.25~2.42 (m, 2H, 2'''-CH₂), 2.99~3.10 (m, 1H, 3-CH₂), 3.33~3.45 (m, 1H, 3-CH₂), 3.60, 3.61, 3.67, 3.68 (s, 3H, OCH₃), 3.80, 3.81 (s, 3H, OCH₃), 4.12~4.19 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.34~4.38 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.91~4.95 (m, 1H, =CH₂), 5.08~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.25~5.34 (m, 1H, 2-H), 6.29~6.49 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.40~7.72 (m, 1H, 苯环 CH, 1'''-CH), 13.50 (brs, 1H, OH); EI-MS m/z : 504.3 [M^+]. Anal. calcd for $C_{30}H_{36}N_2O_5$: C 71.40, H 7.19, N 5.55; found C 71.27, H 7.22, N 5.58.

(2R)-5-((2'''-烯-1'''-亚丁基胍基)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2"-基)-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3f**): 反应 0.1 h, 收率 75%. m.p. 80~90 °C; 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 0.97~1.08 (m, 1H, 1'a-H), 1.40~1.57 (m, 1H, 1'-H), 1.62~1.70 (m, 1H, 1'-H), 1.78~1.82 (m, 3H, 3''-CH₃), 1.89~1.98 (m, 3H, 4'''-CH₃), 3.00~3.11 (m, 1H, 3-CH₂), 3.36~3.46 (m, 1H, 3-CH₂), 3.59, 3.60, 3.66 (s, 3H, OCH₃), 3.81 (s, 3H, OCH₃), 4.08~4.20 (m, 1H, 2'-CH₂),

4.35~4.39 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.92~4.95 (m, 1H, =CH₂), 5.08~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.25~5.35 (m, 1H, 2-H), 6.25~6.30 (m, 2H, 2'''-CH, 3'''-CH), 6.35~6.49 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.71~7.75 (m, 1H, 苯环 CH), 7.88~7.90 (m, 1H, 1'''-CH), 13.81 (brs, 1H, OH); EI-MS m/z : 474.3 [M^+]. Anal. calcd for $C_{28}H_{30}N_2O_5$: C 70.87, H 6.37, N 5.90; found C 70.99, H 6.34, N 5.88.

(2R)-5-[(苯甲基胍基)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2"-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3g**): 反应 0.3 h, 收率 66%. m.p. 50~52 °C; 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 0.88~1.09 (m, 1H, 1'a-H), 1.26~1.47 (m, 2H, 1'-H), 1.75~1.83 (m, 3H, 3''-CH₃), 3.01~3.12 (m, 1H, 3-CH₂), 3.37~3.43 (m, 1H, 3-CH₂), 3.60 (s, 3H, OCH₃), 3.80 (s, 3H, OCH₃), 4.26 (d, $J=9.8$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.39 (d, $J=9.9$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.94 (d, $J=14.2$ Hz, =CH₂), 5.11 (d, $J=18.6$ Hz, =CH₂), 5.29~5.33 (m, 1H, 2-H), 6.32~6.55 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.41~7.78 (m, 6H, 苯环 6×CH), 8.30, 8.50 (s, 1H, 1'''-CH), 13.84 (brs, 1H, OH); EI-MS m/z : 510.3 [M^+]. Anal. calcd for $C_{31}H_{30}N_2O_5$: C 72.92, H 5.92, N 5.49; found C 72.79, H 5.95, N 5.52.

(2R)-5-[(2'''-亚丙基胍基)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2"-基)-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3h**): 反应 0.3 h, 收率 54%. m.p. 75~80 °C; 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 0.78~0.87 (m, 1H, 1'a-H), 1.43~1.51 (m, 1H, 1'-H), 1.59~1.65 (m, 1H, 1'-H), 1.77~2.11 (m, 9H, 1'''-CH₃, 3'''-H, 3''-CH₃), 3.01~3.11 (m, 1H, 3-CH₂), 3.34~3.47 (m, 1H, 3-CH₂), 3.59, 3.60, 3.67, 3.68 (s, 3H, OCH₃), 3.81, 3.82 (s, 3H, OCH₃), 4.18 (d, $J=10.3$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.35 (d, $J=9.6$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.91~4.95 (m, 1H, =CH₂), 5.08~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.25~5.34 (m, 1H, 2-H), 6.25~6.52 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.68~7.73 (m, 1H, 苯环 CH), 13.58 (brs, 1H, OH); ESI-MS m/z : 463.1 [$M+H$]⁺. Anal. calcd for $C_{27}H_{30}N_2O_5$: C 70.11, H 6.54, N 6.06; found C 70.23, H 6.51, N 6.03.

(2R)-5-[(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2"-基)-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3i**): 反应 0.5 h, 收率 38%. m.p. 65~73 °C; 1H NMR ($CDCl_3$, 400 MHz) δ : 0.78~0.79 (m, 1H, 1'a-H), 0.93~1.11 (m, 3H, 1'''-CH₃), 1.45~1.64 (m, 2H, 1'-H), 1.79 (d, $J=6.0$ Hz, 3H, 3''-CH₃), 1.83~2.10 (m, 3H, 4'''-CH₃), 2.21~2.42 (m, 2H, 3'''-CH₂), 3.00~3.11 (m, 1H, 3-CH₂), 3.33~3.45 (m, 1H, 3-CH₂), 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.67, 3.68, 3.73, 3.74 (s, 3H, OCH₃), 3.80, 3.82 (s, 3H,

OCH₃), 4.11 (d, $J=10.2$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.34 (d, $J=9.5$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.91~4.95 (m, 1H, =CH₂), 5.08~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.24~5.33 (m, 1H, 2-H), 6.27~6.51 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.66~7.71 (m, 1H, 苯环 CH), 13.53 (brs, 1H, OH). ESI-MS m/z : 477.2 [M+H]⁺. Anal. calcd for C₂₈H₃₂N₂O₅: C 70.57, H 6.77, N 5.88; found C 70.45, H 6.81, N 5.90.

(2R)-5-[(2'''-亚戊基胍基)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2'-基)-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3j**): 反应 10.5 h, 收率 52%. m.p. 59~69 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 0.73~0.89 (m, 3H, 1'''-CH₃), 0.97~1.09 (m, 1H, 1'a-H), 1.25~1.64 (m, 4H, 3'''-CH₂, 4'''-CH₂), 1.76~2.09 (m, 3H, 3''-CH₃, 5'''-CH₃), 2.18~2.23 (m, 1H, 1'-H), 2.33~2.37 (m, 1H, 1'-H), 3.00~3.11 (m, 1H, 3-CH₂), 3.34~3.46 (m, 1H, 3-CH₂), 3.59, 3.59, 3.60, 3.60, 3.67, 3.67, 3.72, 3.74 (s, 3H, OCH₃), 3.80, 3.81, 3.82 (s, 3H, OCH₃), 4.11 (d, $J=10.3$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.35 (d, $J=10.3$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.91~4.95 (m, 1H, =CH₂), 5.08~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.24~5.34 (m, 1H, 2-H), 6.29~6.50 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.67~7.71 (m, 1H, 苯环 CH), 12.67, 12.68, 12.71, 12.79, 13.60, 13.63, 13.98, 14.10 (s, 1H, OH); EI-MS m/z : 490.3 [M⁺]. Anal. calcd for C₂₉H₃₄N₂O₅: C 71.00, H 6.99, N 5.71; found C 71.14, H 6.96, N 5.74.

(2R)-5-[(2'''-亚己基胍基)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2'-基)-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3k**): 反应 0.5 h, 收率 34%. m.p. 74~78 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 0.99~1.09 (m, 1H, 1'a-H), 1.25~1.87 (m, 12H, 3'''-CH₂, 4'''-CH₂, 5'''-CH₂, 6'''-CH₃, 3''-CH₃), 2.10~2.14 (m, 1H, 1'-H), 2.19~2.27 (m, 3H, 1'''-CH₃), 2.32~2.36 (m, 1H, 1'-H), 3.03~3.10 (m, 1H, 3-CH₂), 3.36~3.45 (m, 1H, 3-CH₂), 3.59, 3.60, 3.62, 3.63, 3.68, 3.69, 3.73, 3.73 (s, 3H, OCH₃), 3.80, 3.82 (s, 3H, OCH₃), 4.07 (d, $J=10.5$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.35 (d, $J=10.0$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.91~4.95 (m, 1H, =CH₂), 5.06~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.26~5.33 (m, 1H, 2-H), 6.25~6.52 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.66~7.69 (m, 1H, 苯环 CH), 13.24 (brs, 1H, OH); EI-MS m/z : 504.4 [M⁺]. Anal. calcd for C₃₀H₃₆N₂O₅: C 71.40, H 7.19, N 5.55; found C 71.53, H 7.15, N 5.52.

(2R)-5-[(2'''-亚基-4'''-甲基戊基胍基)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2'-基)-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3l**): 反应 0.5 h, 收率 75%. m.p. 90~92 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 0.59~0.89 (m, 6H, 5'''-CH₃, 6'''-CH₃), 0.97~1.09 (m, 1H,

1'a-H), 1.25~1.38 (m, 1H, 1'-H), 1.44~1.50 (m, 1H, 1'-H), 1.60~1.65 (m, 3H, 1'''-CH₃), 1.83 (s, 3H, 3''-CH₃), 2.01~2.10 (m, 2H, 3'''-CH₂), 2.12~2.29 (m, 1H, 4'''-CH), 3.00~3.12 (m, 1H, 3-CH₂), 3.36~3.45 (m, 1H, 3-CH₂), 3.59, 3.60, 3.66 (s, 3H, OCH₃), 3.80, 3.81 (s, 3H, OCH₃), 4.10~4.21 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.33~4.37 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.92~4.96 (m, 1H, =CH₂), 5.08~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.27~5.34 (m, 1H, 2-H), 6.29~6.49 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.67~7.72 (m, 1H, 苯环 CH), 12.68, 12.71, 13.50, 13.54, 13.73, 13.92, 14.18 (s, 1H, OH); ESI-MS m/z : 505.2 [M+H]⁺. Anal. calcd for C₃₀H₃₆N₂O₅: C 71.40, H 7.19, N 5.55; found C 71.27, H 7.22, N 5.57.

(2R)-5-[(2'''-亚苯基乙基胍基)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2'-基)-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3m**): 反应 17 h, 收率 65%. m.p. 85~89 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 0.92~1.10 (m, 1H, 1'a-H), 1.23~1.26 (m, 1H, 1'-H), 1.57~1.68 (m, 3H, 3''-CH₃), 1.76~1.81 (m, 1H, 1'-H), 2.24~2.51 (m, 3H, 1'''-CH₃), 2.95~3.13 (m, 1H, 3-CH₂), 3.36~3.48 (m, 1H, 3-CH₂), 3.62, 3.63, 3.64, 3.65 (s, 3H, OCH₃), 3.78, 3.80, 3.82, 3.82 (s, 3H, OCH₃), 3.92 (d, $J=10.4$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.25 (d, $J=10.3$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.87~4.97 (m, 1H, =CH₂), 5.05~5.15 (m, 1H, =CH₂), 5.27~5.36 (m, 1H, 2-H), 6.25~6.59 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.34~7.50 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.63~7.89 (m, 3H, 苯环 3×CH), 11.07, 11.12, 12.68, 12.70, 12.78, 13.57, 13.61, 14.02 (s, 1H, OH); EI-MS m/z : 524.3 [M⁺]. Anal. calcd for C₃₂H₃₂N₂O₅: C 73.26, H 6.15, N 5.34; found C 73.38, H 6.11, N 5.31.

(2R)-5-[(3'''-亚戊基胍基)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2'-基)-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3n**): 反应 17.5 h, 收率 55%. m.p. 60~68 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 0.94~1.33 (m, 6H, 1'''-CH₃, 5'''-CH₃), 1.44~1.53 (m, 1H, 1'a-H), 1.57~1.64 (m, 1H, 1'-H), 1.77~1.83 (m, 3H, 3''-CH₃), 1.88~1.98 (m, 1H, 1'-H), 2.08~2.59 (m, 4H, 2'''-CH₂, 4'''-CH₂), 2.99~3.11 (m, 1H, 3-CH₂), 3.33~3.46 (m, 1H, 3-CH₂), 3.59, 3.60, 3.67, 3.67 (s, 3H, OCH₃), 3.80, 3.81, 3.82 (s, 3H, OCH₃), 4.12 (d, $J=10.3$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.34 (d, $J=10.7$ Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.91~4.95 (m, 1H, =CH₂), 5.08~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.24~5.34 (m, 1H, 2-H), 6.25~6.53 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.64~7.70 (m, 1H, 苯环 CH), 13.59, 13.64, 14.05, 14.07 (s, 1H, OH); EI-MS m/z : 490.3 [M⁺]. Anal. calcd for C₂₉H₃₄N₂O₅: C 71.00, H 6.99, N 5.71; found C 70.88, H 7.02, N 5.73.

(2R)-5-[(亚环戊基肼)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2"-基)-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3o**): 反应 7.0 h, 收率 72%. m.p. 82~89 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ: 0.97~1.08 (m, 1H, 1'a-H), 1.43~2.56 (m, 13H, 2"-CH₂, 3"-CH₂, 4"-CH₂, 5"-CH₂, 3"-CH₃), 3.04~3.12 (m, 1H, 3-CH₂), 3.34~3.47 (m, 1H, 3-CH₂), 3.59, 3.60, 3.68, 3.68 (s, 3H, OCH₃), 3.81 (s, 3H, OCH₃), 4.14~4.21 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.33~4.39 (m, 1H, 2'-CH₂), 4.92~4.95 (m, 1H, =CH₂), 5.08~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.25~5.34 (m, 1H, 2-H), 6.29~6.52 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.70~7.75 (m, 1H, 苯环 CH), 12.80, 12.81, 13.89, 14.30 (s, 1H, OH); EI-MS *m/z*: 488.3 [M⁺]. Anal. calcd for C₂₉H₃₂N₂O₅: C 71.29, H 6.60, N 5.73; found C 71.15, H 6.63, N 5.75.

(2R)-5-[(亚环己基肼)(5',6'-二甲氧基-1',1'a,2',7'b-四氢环丙并[c]苯并吡喃-7'b-基)甲基]-2-(丙烯-2"-基)-2,3-二氢苯并呋喃-4-酚(**3p**): 反应 5.0 h, 收率 65%. m.p. 76~85 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ: 0.96~1.08 (m, 3H, 1'-H, 1'a-H), 1.36~2.27 (m, 13H, 2"-CH₂, 3"-CH₂, 4"-CH₂, 5"-CH₂, 6"-CH₂, 3"-CH₃), 2.93~3.10 (m, 1H, 3-CH₂), 3.19~3.45 (m, 1H, 3-CH₂), 3.58, 3.59, 3.59, 3.60 (s, 3H, OCH₃), 3.81 (s, 3H, OCH₃), 4.07 (d, *J*=10.2 Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.35 (d, *J*=10.4 Hz, 1H, 2'-CH₂), 4.91~4.95 (m, 1H, =CH₂), 5.08~5.13 (m, 1H, =CH₂), 5.26~5.33 (m, 1H, 2-H), 6.35~6.52 (m, 3H, 苯环 3×CH), 7.63~7.69 (m, 1H, 苯环 CH), 13.30 (brs, 1H, OH); EI-MS *m/z*: 502.3 [M⁺]. Anal. calcd for C₃₀H₃₄N₂O₅: C 71.69, H 6.82, N 5.57; found C 71.82, H 6.79, N 5.54.

3.3 杀菌活性测试

测试菌种: 小麦赤霉病菌(*Gibberella zeae*)、辣椒疫霉病菌(*Phytophthora capsici*)、烟草赤星病菌(*Alternaria alternata*)、黄瓜灰霉病菌(*Botrytis cinerea*)、稻纹枯病菌(*Rhizoctonia solani*)、油菜菌核病菌(*Sclerotinia sclerotiorum*)和小麦白粉病菌(*Blumeria graminis*)。测试方法和抑制率计算方法见文献[27]。

辅助材料(Supporting Information) 目标化合物和中间体的 ¹H NMR 和 MS 数据。这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载。

References

- [1] Zhou, Z. Z.; You, W. W. *Chin. J. Org. Chem.* **2008**, 28, 1849 (in Chinese). (周中振, 游文玮, 有机化学, **2008**, 28, 1849.)
- [2] Franz, S.; John, E. C. *Pest Manage. Sci.* **2001**, 57, 932.
- [3] Vera, G. G.; Alexander, B. K.; Joel, S. K.; Gary, C.; Andrei, D. V. *Biochemistry* **2007**, 46, 10971.
- [4] Chul, H. P.; Byung, Y. C.; Seung, S. L.; Hyoung, W. B.; Jae, Y. C.; Cheorun, J.; Tae, H. K. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2013**, 23, 1099.
- [5] Dong, J. C.; Hongchan, A.; Kyoungsuk, K.; Hyun, H. K.; Jinkyung, J.; Jung, M. L.; Nam, J. K.; Young, T. H.; Hwaayoung, Y.; Sujin, L.; Geumwoo, L.; Seungbeom, L.; Ju, S. L.; Jong, H. C.; Ji, W. P.; Su, C. L.; Sang, G. K.; Jeong, H. K.; Ho, Y. L.; Kyu, W. K.; Yong, G. S. *J. Med. Chem.* **2012**, 55, 10863.
- [6] Supranee, S.; Kuakarun, K.; Nattaya, N.; Tirayut, V.; Songchan, P.; Supajittra, C.; Nongnuj, M. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, 21, 4813.
- [7] Ying, Q. L.; Emika, O.; Lin, H. L.; Liu, Y.; Kuo, H. L. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2012**, 22, 920.
- [8] Gao, C.; Zhen, Z.; Ying, W. *Bull. Chem. Soc. Ethiop.* **2012**, 26, 421.
- [9] (a) Hu, A. X.; Chen, X. D.; Ye, J. *CN 102399230*, **2012** [*Chem. Abstr.* **2012**, 156, 505499]. (b) Hu, A. X.; Chen, X. D.; Ye, J. *CN 102702212*, **2012** [*Chem. Abstr.* **2012**, 157, 605961]. (c) Hu, A. X.; Chen, X. D.; Ye, J.; *CN 102399229*, **2012** [*Chem. Abstr.* **2012**, 156, 505498].
- [10] Cheng, H. M.; Yamamoto, I.; Casida, J. E. *J. Agric. Food Chem.* **1972**, 20, 850.
- [11] Ueno, H.; Miyoshi, H.; Inoue, M.; Niidome, Y.; Iwamura, H. *Biochim. Biophys. Acta* **1996**, 1276, 195.
- [12] Jose, G.; Sofia, B.; Katarzyna, G.; Florenz, S.; Nicolas, W. *Bioorg. Med. Chem.* **2012**, 20, 672.
- [13] Jiang, D. X.; Zhang, X. W.; Liu, Z. C.; Xu, H. H. *Chin. J. Pestic.* **2006**, 45, 810 (in Chinese). (江定心, 张信旺, 刘志诚, 徐汉虹, 农药, **2006**, 45, 810.)
- [14] Singhal, A. K.; Sharma, R. P.; Baruah, J. N.; Herz, W. *Chem. Ind.-London* **1982**, 15, 549.
- [15] Nianbai, F.; John, E. C. *J. Org. Chem.* **1997**, 62, 350.
- [16] Shinichi, N.; Satoshi, T.; Taisei, U.; Kanako, M. *J. Heterocycl. Chem.* **2001**, 38, 1097.
- [17] Carson, D.; Cass, M. W.; Crombie, L.; Holden, I.; Whiting, D. A. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1982**, 773.
- [18] Chen, X. D.; Ye, J.; Hu, A. X. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, 32, 520 (in Chinese). (陈晓东, 叶姣, 胡艾希, 有机化学, **2012**, 32, 520.)
- [19] Hu, A. X.; Ye, J.; Chen, X. D.; Xuan, W. J. *CN 101805333*, **2010** [*Chem. Abstr.* **2010**, 153, 358765].
- [20] Ivanka, K.; Svetla, S. *Monatsh. Chem.* **1989**, 120, 1107.
- [21] (a) Hu, A. X.; Dai, M. C.; Chen, X. D.; Li, G. X.; Li, B. B.; Ding, N. *CN 103588760*, **2014** [*Chem. Abstr.* **2014**, 160, 370068]. (b) Hu, A. X.; Chen, A. Y.; Chen, X. D.; Ye, J.; Yan, X. W. *CN 103588761*, **2014** [*Chem. Abstr.* **2014**, 160, 356314]. (c) Hu, A. X.; Chen, X. D.; Dai, M. C.; Fang, Y. L.; Ye, J. *CN 103626747*, **2014** [*Chem. Abstr.* **2014**, 160, 427696]. (d) Hu, A. X.; Chen, X. D.; Peng, J. M.; Ye, J.; Li, W.; Xia, S. *CN 102351848*, **2012** [*Chem. Abstr.* **2012**, 156, 310737].
- [22] Wang, F.; Cao, J.; Yuan, L. P.; Guo, Q. M.; Ni, C. C.; Shen, Z.; Zhang, Y. B. *Chin. J. Pestic. Sci.* **2006**, 8, 176 (in Chinese). (汪飞, 曹瑾, 袁莉萍, 郭庆铭, 倪长春, 沈宙, 张一宾, 农药学报, **2006**, 8, 176.)
- [23] Seitzberg, J. G.; Knapp, A. E.; Lund, B. W.; Bertozzi, S. M.; Currier, E. A.; Ma, J. N.; Sherbukhin, V.; Burstein, E. S.; Olsson, R. J. *Med. Chem.* **2008**, 51, 5490.
- [24] Morgan, L. R.; Thangaraj, K.; Blanc, L. B.; Rodgers, A.; Wolford, L. T.; Hooper, C. L.; Fan, D.; Jursic, B. S. *J. Med. Chem.* **2003**, 46, 4552.
- [25] Xia, X. J.; Wang, S. Y.; Wei, Y. C.; Chai, W. G.; Fu, R. X.; Yu, F. *CN 1390829*, **2003** [*Chem. Abstr.* **2003**, 141, 225156].

- [26] An, R.; Xiong, Q. Z.; Gao, Y. L.; Han F. F.; Bao, X. P. *Chin. J. Synth. Chem.* **2011**, *19*, 699 (in Chinese).
(安锐, 熊启中, 高元磊, 韩菲菲, 鲍小平, 合成化学, **2011**, *19*, 699.)
- [27] Shen, F.; Hu, A. X.; Luo, X. F.; Ye, J.; Ou, X. M. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, *32*, 388 (in Chinese).
(沈芳, 胡艾希, 罗先福, 叶姣, 欧晓明, 有机化学, **2012**, *32*, 388.)

(Li, L.; Fan, Y.)