对甲苯磺酰肼的偶联反应研究进展

许 恺 沈 冲 单 尚*

(浙江工业大学化学工程学院 杭州 310014)

摘要 综述了近几年来对甲苯磺酰肼在有机合成中的应用新进展. 主要介绍了对甲苯磺酰肼参与的过渡金属催化的交叉偶联反应和不含金属的反应.

关键词 对甲苯磺酰肼; 金属卡宾; 交叉偶联反应; 不含金属的反应.

Progress of Cross-Coupling Reaction with *N*-Tosylhydrazones

Xu, Kai Shen, Chong Shan, Shang*

(College of Chemical Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014)

Abstract The recent progress in the development of the application of *N*-tosylhydrazones in the organic synthesis is summarized. Mainly, the advances in the areas of both metal-catalyzed cross-coupling and metal-free reactions with *N*-tosylhydrazones are introduced.

Keywords *N*-tosylhydrazones; metal carbene; cross-coupling reactions; metal-free reactions

稳定的重氮化合物在过渡金属催化下可以发生交叉偶联反应^[1~13], 不含吸电子基团的重氮化合物通常是不稳定的, 因此这类反应的适用范围窄. 对甲苯磺酰肼在有机合成中的应用已经有 60 多年的历史. 它在碱的作用下通过 Bamford-Stevens 反应可以原位制备重氮化合物^[14,15], 应用于过渡金属催化的偶联反应中^[16,17]. 对甲苯磺酰肼很容易由醛或酮制备, 因此它成为一种新型的多样化的偶联底物应用于过渡金属催化的交叉偶联反应和不含金属的反应中. 这类交叉偶联反应主要涉及金属卡宾的形成和卡宾的迁移插入两个步骤. 本文主要对对甲苯磺酰肼参与的过渡金属催化的交叉偶联反应和不含金属的反应研究进展进行总结.

合物, 包括芳环上含有吸电子和供电子基团的化合物. 同时, 富电子或缺电子的溴代杂环化合物也适用于此类反应, 含氰基和羰基的溴代化合物在反应中氰基和羰基不受反应条件的影响. 立体选择性是在合成多取代烯烃时一个重要的问题. 实验结果表明, 交叉偶联得到的构型与取代基的大小有关. 在大多数例子中, 交叉偶联的最终产物是反式构型.

1 金属催化的对甲苯磺酰肼的偶联反应

1.1 Pd 催化的对甲苯磺酰肼的偶联反应

1.1.1 芳基和烯基的迁移插入

2007 年, Barluenga 等^[18]报道了首例 Pd 催化的对甲苯磺酰肼与芳基卤化物的交叉偶联反应. 在催化剂 $[\text{Pd}_2(\text{dba})_3]$, 配体 XPhos 和碱 LiOt-Bu 的作用下, 反应在温和的条件下可以得到较高产率的二取代和三取代烯烃(Eq. 1). 这种方法适用于多数芳基溴代和芳基氯化化

合物. Barluenga 等认为交叉偶联反应是通过 Scheme 1 中的机理进行的. 首先, 对甲苯磺酰肼在碱 LiOt-Bu 的作用下经过 Bamford-Stevens 反应分解生成重氮化合物 **I**^[14,15]. 芳基卤化物与 **I** 氧化加成得到有机金属中间体 **III**, 有机金属中间体 **III** 与原位制备的重氮化合物 **I** 反应生成 Pd 卡宾 **IV**. Pd 卡宾 **IV** 经过芳基基团对卡宾

* E-mail: shanshang2001@163.com

Received August 28, 2014; revised October 8, 2014; published online November 18, 2014.

的转移插入形成烷基钯中间体 **V**。最后, 烷基钯中间体 **V** 经过 β -H 消除得到最终产物并释放出 Pd(0) 催化剂, 继而形成催化循环。

图式 1 Pd 催化对甲苯磺酰肼与芳基卤化物反应可能机理
Scheme 1 Proposed mechanism for the Pd-catalyzed cross-coupling of *N*-tosylhydrazones with aryl halides

近期, Sekar 等^[19]将稳定的 Pd 纳米催化剂应用于对甲苯磺酰肼与芳基碘化物的交叉偶联反应, 为多取代烯烃的合成提供了一种高效的方法(Eq. 2)。值得一提的是, 该反应条件中不需要添加膦配体。同时, 反应成功应用于抗癌药物 isocombretastatins A4 和 tamoxifen 的合成。

2008 年, Barluenga 等^[20]报道了由醛、酮和对甲苯磺酰肼现场生成的对甲苯磺酰肼与芳基卤化物的交叉偶联反应(Eq. 3)。反应中醛、酮可以直接作为偶联组分参与反应, 得到较高产率的二取代、三取代烯烃。反应底物 N—H 键不保护也不会影响反应发生。由于反应过程中有对甲苯磺酰肼的形成, 因此与制备好的对甲苯磺酰肼

的反应一样也存在立体选择性^[18]。同时, 反应中没有酮的 α -芳基化、对甲苯磺酰肼 *N*-芳基化副产物生成。

2010 年, Alami 等^[21]报道了 Pd 催化的有较大空间位阻的对甲苯磺酰肼与芳基卤化物的反应, 为合成一系列含有亚环基的四取代烯烃提供了一种高效的方法, 并且得到较高的产率。在催化剂 $\text{PdCl}_2(\text{MeCN})_2$, 配体 dppp, 碱 Cs_2CO_3 的作用下, 反应可以顺利进行(Eq. 4)。同时, 反应条件也适用于没有位阻效应的对甲苯磺酰肼得到二芳基烯烃化合物。

在 Pd 催化的对甲苯磺酰肼参与的交叉偶联反应中, 亲电试剂用芳基三氟甲磺酸酯的反应是近期发展起来的。2009 年, Alami 等^[22]报道了 Pd 催化的对甲苯磺酰肼与芳基三氟甲磺酸酯的交叉偶联反应。反应在碱 *t*-BuOLi, 催化剂 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ /配体 XPhos 的作用下得到产率高达 97% 的二芳基烯烃化合物。该反应的局限性在于芳环上没有含氧取代基的底物不会发生反应(Eq. 5)。

2011 年, Barluenga 等^[23]将与对甲苯磺酰肼发生交叉偶联反应的亲电试剂拓展到芳基九氟丁磺酸酯。与芳基三氟甲磺酸酯相比, 芳基九氟丁磺酸酯有易于购买、制备和便于使用的优点^[24]。实验证明加入 5 equiv. 的水和 1 equiv. 的 LiCl 可以促使反应顺利完成。在优化好的反应条件下, 由醛、环状或非环状的二烷基酮以及芳基烷基酮制备的对甲苯磺酰肼都可以与邻、间、对取代的芳基九氟丁磺酸酯反应得到产率高达 99% 的二、三和四取代的烯烃(Eq. 6)。

最近几年, 金属催化的由官能团化的羰基化合物制备的对甲苯磺酰肼的交叉偶联反应有所发展。2009 年, Barluenga 等^[25]报道了 Pd 催化的 α -官能化的羰基化合物

制备的对甲苯磺酰肼与芳基卤化物的交叉偶联反应。这种方法适用于一系列芳基溴化物和芳基氯化物,得到较高产率的烯醚化合物(Scheme 2)。同时,他们发现烯醚化合物在盐酸水溶液与甲苯混合物的作用下水解,可以得到相应的 α,α -二芳基乙醛,它是合成生物活性杂环体系的重要的中间体^[26]。除此之外,这种偶联反应还可以用于由 α -吗啉取代的对甲苯磺酰肼合成相应的胺类化合物。

图式 2 Pd 催化对甲苯磺酰肼与芳基卤化物偶联合成 α,α -二芳基乙醛的反应

Scheme 2 Pd-catalyzed cross-coupling of *N*-tosylhydrazones with aryl halides leading to α,α -diaryl acetaldehydes

2013 年, Valdés 等^[27]报道了 Pd 催化的 α -烷氧基对甲苯磺酰肼与邻羟基或氰基芳基九氟丁磺酸酯合成异喹啉的反应,邻羟基或氰基芳基九氟丁磺酸酯很容易通过水杨醛或邻氰基苯酚得到。上述反应可以分别得到邻位烯醚取代的苯甲醛化合物 **1a** (Scheme 3)和邻位烯醚取代的苯甲腈化合物 **1b** (Scheme 4)两种中间体,它们可以经过进一步转化得到各种含有取代基的异喹啉。

图式 3 Pd 催化 α -烷氧基对甲苯磺酰肼与芳基九氟丁磺酸酯偶联合成多取代基的异喹啉的反应

Scheme 3 Pd-catalyzed coupling of α -alkoxytosylhydrazones with sulfonates leading to polysubstituted isoquinolines

2010 年, Barluenga 等^[28]报道了 Pd 催化的丙酮酸乙酯制备的对甲苯磺酰肼与芳基溴化物的交叉偶联反应。为制备在有机合成和药物合成中重要中间体 2-芳基丙烯酸酯提供了一种新的方法。此外,此反应也适用于其它 2-酮酸酯,得到相应的较高产率的 2-芳基- α,β -不饱和

酮酸酯(Scheme 5)。

图式 4 Pd 催化对甲苯磺酰肼与 α -烷氧基对甲苯磺酰肼偶联合成多取代基的异喹啉的反应

Scheme 4 Pd-catalyzed coupling of α -alkoxytosylhydrazones with sulfonates leading to polysubstituted isoquinolines

图式 5 Pd 催化对甲苯磺酰肼与芳基溴化物交叉偶联合成 2-芳基丙烯酸酯的反应

Scheme 5 Pd-catalyzed cross-coupling of *N*-tosylhydrazones with aryl halides leading to 2-arylacrylates.

2010 年, Barluenga 等^[29]报道了 Pd 催化的 α,β -不饱和酮制备的对甲苯磺酰肼与芳基卤化物的交叉偶联反应,得到产率高达 99% 的共轭二烯类化合物(Scheme 6)。反应中芳基卤化物可以含吸电子基或供电子基。

图式 6 Pd 催化对甲苯磺酰肼与芳基卤化物交叉偶联合成共轭二烯类化合物的反应

Scheme 6 Pd-catalyzed cross-coupling of *N*-tosylhydrazones with aryl halides leading to linear-conjugated dienes

他们认为反应可能经由 Scheme 7 过程: 首先, 芳基卤化物对 Pd(0)氧化加成得到 **I**; **I** 与原位生成的重氮化

合物 **II** 反应得到金属卡宾 **III**; **III** 中与 Pd 相连的芳基会迁移到卡宾碳上, 形成 η^1 -烯丙基钯中间体 **IV**; **IV** 经过 **V** 异构化为 η^3 -烯丙基钯中间体 **VI**; **VI** 发生 β -H 消除得到终产物, 生成的 HPd(II)X 在碱性条件下释放出 Pd(0) , 实现催化循环。

图式 7 形成共轭二烯类化合物的可能机理

Scheme 7 Mechanisms proposed for the formation of dienes

2011 年, Alami 等^[30]小组报道了 Pd 催化的由炔原位制备对甲苯磺酰肼的交叉偶联反应。这种方法主要得到 Z-型三取代烯烃, 它们是合成 4-芳基苯并吡喃和有关杂环化合物的前体化合物(Scheme 8)。主要提供了一种新的由非羰基化合物合成对甲苯磺酰肼的方法。

图式 8 炔原位制备对甲苯磺酰肼的反应

Scheme 8 *N*-Tosylhydrazones generated *in situ* from alkynes

2012 年, Prabhu 等^[31]报道了 Pd 催化的不需要配体的对甲苯磺酰肼与芳基和杂芳基卤化物偶联合成取代烯烃的反应(Eq. 7)。反应可以兼容羟基和氨基基团。为通过传统方法或类似的偶联反应不能合成的多种杂环化合物的制备提供了一种新的方法。反应也可以实现“一锅法”直接将酮转化为烯烃。

2013 年, Valdés 等^[32]报道了 Pd 催化的对甲苯磺酰肼与 α -N-唑酮交叉偶联合成(Z)-N-烯基唑类和吡咯异噻啉化合物的反应(Eq. 8)。反应中底物邻位导向基团发挥着关键的作用, 任何唑环类底物都能适应该反应, 为制备新的杂环结构的化合物提供了一种新的方法。

2011 年, Liang 等^[33]报道了一种新颖的 Pd 催化的对甲苯磺酰肼与炔基碳酸酯的偶联反应。实验表明, 反应选择不同的催化体系, 得到的偶联产物不同。在催化体系 $[\text{PdCl}_2(\text{CH}_3\text{CN})_2]$ 和 **dppp** 的作用下, 主要得到产物 **1e**; 在催化体系 $[\text{Pd}_2(\text{dba})_3]$ 和 BnEt_3NCl 的作用下则得到产物 **1f** (Scheme 9)。

图式 9 Pd 催化对甲苯磺酰肼与炔基碳酸酯的偶联反应
Scheme 9 Pd-catalyzed cross-coupling of propargylic carboxonates with hydrazones

在对已有反应机理的理解上, Barluenga 等^[34]发展

了一种新的由芳醛和非烯醇互变的酮制备的对甲苯磺酰肼与烯基溴化物合成线性二烯的方法(Eq. 9). 值得关注的是, 反应得到的产物都是单一的反式构型的化合物.

1.1.2 异氰基和氨基的迁移插入

2011年, Cai等^[35]报道了Pd催化的对甲苯磺酰肼与异腈的酰胺化反应(Eq. 10). 反应过程经过乙烯亚胺中间体, 避免了等物质的量的有机金属试剂的使用. 这代表一类通过现场生成的Pd卡宾与异腈氨基羰基化将羰基化合物转化为酰胺的反应. 研究发现芳基比烷基更容易获得金属卡宾.

他们对反应机理做以下解释(Scheme 10): 首先, 异氰与Pd催化剂I; 然后, I与原位制备的重氮化合物II结合形成钯卡宾III, 钯卡宾进一步转化为乙烯胺V; 最后, V水解得到终产物烯胺.

图式 10 Pd 催化对甲苯磺酰肼与异氰偶联反应可能机理
Scheme 10 Proposed mechanism for Pd-catalyzed amidation of *N*-tosylhydrazones with isocyanides

2013年, Wang等^[36]报道了Pd/C催化的以对甲苯磺酰肼为中介对醛酮的间接还原加氢反应(Eq. 11). 发展了一种通过“一锅法”、两步反应将羰基化合物还原为甲基或亚甲基化合物的方法. 反应在10% Pd/C的催化下用清洁的H₂作为还原剂. 反应可以兼容氨基、羧基等多种官能团. 含杂原子的酮或醛也适应于该反应. 通过

这种温和的还原反应可以将羰基转化为有机合成转化中一种重要的亚甲基官能团中间体.

1.1.3 吡啶和含氮杂环化合物的迁移插入

2013年, Cui等^[37]报道了Pd催化的对甲苯磺酰肼与吡啶通过交叉偶联合成*N*-烯基吡啶的反应(Eq. 12). 反应适用于多种吡啶和对甲苯磺酰肼, 并且可以在温和的条件下进行, 得到较高产率的*N*-乙烯基吡啶. 反应可以同时构建C—N键和C=C双键, 具有良好的官能团兼容性和广泛的适应性, 为合成*N*-烯基吡啶提供了一种简便、经济的方法.

他们认为反应机理如 Scheme 11: 首先, 原位制备的重氮化合物I与Pd形成钯卡宾II; 然后, 碱协助吡啶锂与钯卡宾发生配体交换; 接着, 吡啶钯中间体III发生迁移插入得到IV; 最后, IV经过β-H消除得到烯胺产物并释放出Pd(0), Pd(0)在氧气存在的条件下生成Pd(II)进入反应循环中.

图式 11 Pd 催化对甲苯磺酰肼与吡啶偶联反应可能机理
Scheme 11 Proposed mechanism for Pd-catalyzed coupling of *N*-tosylhydrazones with isocyanides

同年, Alami等^[38]报道了Pd催化的无配体参与的对

甲苯磺酰肼与唑类衍生物构建 $C(sp^2)-N$ 键的氧化偶联反应(Eq. 13). 这是一种新的合成 N -乙烯基唑的反应, 反应在 Pd 的催化下不需要配体的参与就可以顺利地构建 $C(sp^2)-N$ 键. 反应可以兼容各种官能团, 得到较高产率的二、三和四取代 N -唑类化合物. 在反应条件下, 反应的对映选择性取决于偶联底物的性质.

他们认为反应可能经由以下过程(Scheme 12): 首先, 芳基卤化物对 Pd(0)氧化加成得到 II; II 与原位生成的重氮化合物 I 反应得到金属卡宾 III; III 与咪唑配体交换得到 IV, IV 中咪唑对 Pd 卡宾迁移插入得到 V; 最后, V 发生 β -H 消除得到终产物和 VI, VI 还原消除释放出 Pd(0), 实现催化循环.

图式 12 Pd 催化对甲苯磺酰肼与唑类衍生物偶联反应机理
Scheme 12 Proposed mechanism for Pd-catalyzed cross-coupling of N -tosylhydrazones with N -H azoles

1.1.4 三组分反应

2013 年, Liang 等^[39]报道了 Pd 催化的碘乙烯、对甲苯磺酰肼和碳亲核试剂参与的三组分反应, 反应体系中的对甲苯磺酰肼也可以直接由醛和对甲苯磺酰肼制备(Eq. 14). 交叉偶联反应主要通过 Pd 卡宾的转移插入和 β -H 消除. 此外, 该反应可以在温和的条件下进行得到高产率和高区域选择性的产物. 证明了 Pd 催化的对重

氮化合物的插入反应和串联反应是可行的, 为 Pd 催化的反应提供了一种新的类型.

他们对反应机理解释如 Scheme 13: 首先, Pd 对烯基碘化合物插入得到 I, II 与原位制备的重氮化合物 II 结合形成 Pd 卡宾中间体 III; 随后, 乙烯基对卡宾碳迁移插入得到中间体 IV, IV 互变异构得到 V; 最后, V 接受亲核试剂进攻, 得到最终产物.

图式 13 Pd 催化三组分偶联反应可能机理
Scheme 13 Proposed mechanism Pd-catalyzed three-component coupling reactions

2013 年, Alami 等^[40]发展了一种新的 Pd 催化的对甲苯磺酰肼、多卤代芳基化合物和芳基胺的三组分反应(Eq. 15). 反应可以高效地一次性构建 $C=C$ 键和 $C-N$ 键, 得到多样的芳基上含有氮取代基的 1,1-二芳基化合物, 伯胺、仲胺以及脂肪胺都适应于该反应体系. 同时, 反应也可以不分离出对甲苯磺酰肼, 由酮和对甲苯磺酰肼直接参与反应.

2014 年, Wang 等^[41]发展了 Pd 催化的对甲苯磺酰肼、降冰片烯和芳基卤化物的三组分反应(Eq. 16), 反应主要经过降冰片烯与芳基卤化物的分子间 Heck 反应和烷基 Pd 卡宾迁移插入两个过程, 为双官能化降冰片烯的合成提供了一种高效、简便的方法。

他们认为的反应机理如 Scheme 14: 首先, 芳基卤化物对 Pd(0)氧化加成得到 **I**, 降冰片烯插入到 C—Pd 键得到中间体 **II** 或 **III**; 中间体 **II** 中, 芳基与 Pd 在 *exo*-位置, 中间体 **III** 中, 芳基与 Pd 在 *endo*-位置, 由于 **II** 的空间位阻较 **III** 小, 因此, 主要得到中间体 **II**; 随后, **II** 与 **IV** 结合脱去一分子氮气得到 **V**, **V** 经过烷基对 Pd 卡宾的转移插入得到 **VI**, 最后, β -H 消除得到最终产物, 并在碱性条件下释放出 Pd(0), 实现反应循环。

图式 14 Pd 催化对甲苯磺酰肼、降冰片烯和芳基卤化物三组分偶联反应可能机理

Scheme 14 Proposed mechanism for Pd-catalyzed coupling reactions of *N*-tosylhydrazone, norbornene and aryl halide

2014 年, Liang 等^[42]实现了 Pd 催化的将降冰片烯介导的芳基碘化物的邻氨基化与对甲苯磺酰肼插入反应相结合来合成邻氨基芳基烯烃化合物的反应(Eq. 17). 反应以缺电子的 *N*-苯甲酰基羟基胺为有效的亲电氮源, 以对甲苯磺酰肼为亲核试剂终止反应, 成功地构建了 C—N 键和 C—C 键. 该反应的重要性在于证明了对甲

苯磺酰肼可以作为偶联组分参与到 Catellani-Lautens 反应中, 为实现 Pd 催化的对甲苯磺酰肼与 C—H 活化的偶联反应提供依据, 这将进一步拓宽对甲苯磺酰肼的应用范围。

他们认为的反应机理如 Scheme 15: 首先, 芳基卤化物对 Pd(0)氧化加成得到 **I**, 降冰片烯插入到 C—Pd 键得到中间体 **II**; **II** 在碱的作用下脱掉 1 分子 HI 得到 **III**, *N*-苯甲酰基羟基胺对 **III** 氧化加成得到 Pd(IV) 中间体 **IV**; 随后, **IV** 还原消除得到 Pd(II) 中间体 **V**. **V** 也可以直接由 **III** 的亲电胺化反应获得. **V** 释放出降冰片烯得到 **VI**; 最后, **VI** 与原位制备的重氮化合物形成 Pd 卡宾

图式 15 分子内 C—H 活化与对甲苯磺酰肼插入结合反应机理

Scheme 15 Proposed mechanism for intramolecular C—H activation/*N*-tosylhydrazones insertion reaction

VII, VII 中芳基对卡宾碳迁移插入得到 VIII, VIII 经过 β -H 消除得到最终产物, 并在碱性条件下释放出 Pd(0), 实现反应循环。

1.1.5 串联反应

用一种催化剂在同一反应器中催化两种不同反应类型的自动串联反应已经得到化学家较多的关注, 并且发展了大量的基于这种概念的反应^[43,44]。

2011 年, Barluenga 等^[45]报道了 Pd 催化的串联反应。反应过程是: 首先, β -氨基酮制备的对甲苯磺酰脲与 1-溴-2-氯苯衍生物反应; 随后, 形成分子内 C—N 键(Eq. 18)。反应中, 同一种 Pd 催化剂可以同时催化两种独立的反应。

2013 年, Wang 等^[46]报道了 Pd 催化的通过环化和卡宾转移插入过程合成 3-烯基吡啶和 3-烯基苯并咪唑化合物的反应(Scheme 16)。反应将 Pd 催化的炔参与的活化与 Pd 卡宾转移插入合并到一个催化循环中, 同时得到一个 C—C 单键和 C=C 双键。

图式 16 Pd 催化环化和卡宾转移插入串联反应

Scheme 16 Pd-catalyzed cascade reactions of cyclization and carbene migratory insertion

他们认为的反应机理如 Scheme 17: 首先, 芳基卤化物经过氧化加成得到 Pd(II) 中间体 I, 后经过

5-*exo-dig* 环化得到中间体 II; 然后, II 与原位制备的重氮化合物反应经过转移插入得到中间体 IV; 由于 IV 不能发生 β -H 消除, 而经过烯丙基钯 η^1 - η^3 转化 1,3-迁移形成中间体 V; 最后, V 经过 β -H 消除得到终产物。

图式 17 Pd 催化环化和卡宾转移插入串联反应机理

Scheme 17 Proposed mechanism for Pd-catalyzed cascade reactions of cyclization and carbene migratory insertion

2013, Liang 等^[47]报道了 Pd 催化的对对甲苯磺酰脲插入合成异二氢吡啶的方法(Eq. 19)。这是一种新的、高效的、直接合成异二氢吡啶的方法。反应中用到的对甲苯磺酰脲很容易由相应的 α,β -不饱和醛制备, 底物中官能团的兼容性很好, 并且得到对应的产物的产率较高; 反应操作简单易于控制, 反应条件温和; 改变 N 上的取代基可以得到各种不同的异二氢吡啶, 丰富了异二氢吡啶类化合物。

他们认为反应机理如 Scheme 18。首先, Pd 对 C—I 键插入得到 I, I 与原位制备的重氮化合物 II 形成卡宾络合物 III; 然后, 芳基对卡宾迁移插入得到 IV, IV 与 V 可以互变异构; 最后, 烯丙基钯接受亲核试剂进攻得到异二氢吡啶。

图式 18 Pd 催化卡宾转移插入和环化串联反应机理

Scheme 18 Proposed mechanism for Pd-catalyzed cascade reactions of carbene migratory insertion and cyclization

同年, Liang 等^[48]报道了 Pd 催化的 α,β -不饱和腈与碳亲核试剂的偶联反应(Eq. 20). 反应经过转移插入和环化两个过程, 得到较高产率的二氢茚类化合物. 同时, 三组分反应也可以发生. 反应具有易控制、反应条件温和和可以与多种官能团兼容的特点.

(20)

他们认为反应可能经由以下过程(Scheme 19): 首先, 芳基卤化物对 Pd(0)氧化加成得到 **I**; **I** 与原位生成的重氮化合物 **II** 反应得到金属卡宾 **III**; **III** 中与 Pd 相连的芳基会迁移到卡宾碳上, 形成 η^1 -烯丙基钯中间体 **IV**; **IV** 异构化为 η^3 -烯丙基钯中间体 **V**; **V** 发生 β -H 消除得到终产物, 生成的 HPd(II)I 在碱性条件下释放出 Pd(0), 实现催化循环.

2013 年, Gu 等^[49]报道了 Pd 催化的芳基卤化物分子内 Heck 反应与对甲苯磺酰腈偶联的串联反应(Scheme 20). 通过分子内 Heck 反应得到的烷基钯中间体可以很好的与卡宾结合生成多种官能团化的烯烃. 反应可以应用到一些螺环化合物的合成. 为合成官能化的烯烃提供了一种新的方法, 同时, 拓宽了对甲苯磺酰腈的应用范围.

图式 19 Pd 催化卡宾转移插入和环化串联反应机理

Scheme 19 Proposed mechanism for Pd-catalyzed cascade reactions of carbene migratory insertion and cyclization

图式 20 Pd 催化环化和卡宾转移插入串联反应

Scheme 20 Pd-catalyzed cascade reactions of cyclization and carbene migratory insertion

2014 年, Valdés 等^[50]实现了 Pd 催化的串联形成 C—C/C—C 键的反应, 反应主要经过对甲苯磺酰腈参与的交叉偶联反应和分子内 Heck 反应两个步骤(Eq. 21). 值得一提的是, 反应在同一个碳原子上形成了两个 C—C_{Ar} 键. 更为重要的是, 反应可以从简单稳定的原料经过一步合成具有环外 π -共轭结构的刚性螺环化合物, 这种骨架的化合物可以用于光电材料的开发、配体设计以及多样性导向合成.

2014 年, Liang 等^[51]实现了芳基卤化物邻位烷基化与卡宾插入串联合成环取代芳基烯烃的反应, 反应用 Pd 作催化剂, 降冰片烯为介导(Eq. 22). 这种方法可以用于合成各种有用的二环和三环芳基烯烃类化合物. 反应具有产率高、优异的官能团兼容性和底物适用范围广的特点.

1.2 Cu 催化的对甲苯磺酰肼的偶联反应

2010 年, Yu 等^[52]报道了 Cu 催化的对甲苯磺酰肼脱氮气合成砜类化合物的反应(Eq. 23). 由羰基化合物制备的酰肼在简单铜盐和碱的作用下, 得到一系列较高产率的芳基和烷基砜类化合物.

他们认为的反应机理是(Scheme 21): 首先, 酰肼分解为重氮化合物 **III** 和亚磺酸盐 **IV**; 随后, 在铜盐的存在下, **III** 释放出氮气得到重氮卡宾 **V**; 然后, 硫负离子作为亲核试剂进攻 **V** 得到 **VI**; 最后, 质子化得到砜.

2012 年, Tang 等^[53]报道了铜催化的对甲苯磺酰肼与亚磷酸酯反应合成烷基磷酸化合物的反应(Eq. 24). 反应发展了一种新的不需要配体的铜催化的 C—P 键的

图式 21 Cu 催化的对甲苯磺酰肼脱氮反应机理

Scheme 21 Proposed mechanism for copper-catalyzed nitrogen loss of hydrazones

构建, 并且得到较高的产率. 同时, 反应也可以通过“一锅法”直接由羰基化合物得到目标产物.

2013 年, Wang 等^[54]报道了 Cu 催化的用对甲苯磺酰肼对 *N*-氨基吡啶叶立德直接邻位烷基化的反应(Eq. 25). 反应在廉价的催化剂 CuI 并且不需要任何配体的作用下可以直接对 C—H 键实现烷基化. 反应在温和的条件下进行, 得到相应的较高产率的烷基吡啶产物. 反应主要通过 Cu 卡宾转移插入过程.

2013 年, Wang 等^[55]报道了 CuI 催化的对甲苯磺酰肼与端炔经过交叉偶联得到 1,3-二取代联烯化合物的反应(Eq. 26). 反应所需的原料方便易得, 可以得到一系列较高产率的 1,3-二取代联烯化合物. 同时, 反应可以兼容各种官能团.

2013 年, Alamia 等^[56]报道了首例以 [Cu(acac)₂]/BINAP 为体系催化的对甲苯磺酰肼与苯胺还原偶联得

到 $C(sp^3)-N$ 键的反应(Eq. 27). 反应适用于大量的底物且可以与多数官能团兼容, 是一种新的通过对甲苯磺酰肼对羰基化合物进行氨基化得到 α -氨基化合物的反应.

1.3 其他金属催化的对甲苯磺酰肼的偶联反应

2011 年, Miura 等^[57]报道了 Ni 和 Co 催化的用含有不活泼烷基的对甲苯磺酰肼对唑类化合物直接烷基化的反应(Scheme 22). Ni 和 Co 都可以高效地催化反应, 为苯并唑类化合物引入仲烷基, 在 Co 催化剂的存在下 5-芳基噻唑和苯并噻唑的烷基化也可以实现. 这种策略可以很容易地得到含有不活泼仲烷基的唑类化合物, 这种化合物用已有的 C-H 活化的方法是很难得到的.

图式 22 Ni 和 Co 催化对甲苯磺酰肼与唑类化合物偶联反应
Scheme 22 Proposed mechanism for Ni and Co-catalyzed cross-coupling of *N*-tosylhydrazones with azoles

2012 年, Barluenga 等^[58]报道了 Fe 催化的酰肼分解合成酮类化合物的反应(Eq. 28). 反应过程中主要涉及铁卡宾的形成(Scheme 23). 反应具有普遍适用性, 可以由芳基、烷基和 α,β -不饱和醛、酮直接合成酮类化合物. 无论是富电子还是缺电子的芳香体系都可以发生反应. 在反应条件下, 脂基和氰基不受影响. 重要的是卤代基团也不受影响.

多环芳烃化合物(PACS), 其中包括多环芳香烃(PAHs)和杂环类似物, 在有机化学、药物化学和材料科

图式 23 Fe 催化的对甲苯磺酰肼脱氮反应机理
Scheme 23 Proposed mechanism for Fe-catalyzed nitrogen loss of *N*-Tosylhydrazones

学等领域扮演着重要的角色. 因此, 合成此类化合物十分重要. 过去几十年里, 化学家在发展高效合成 PACs 方面做了大量的工作. 在各种方法中, 通过结合偶联反应和分子内 $C=C$ 双键的形成来合成 PACs 最为引人注目. 这种方法可以由简单的芳香化合物快速得到 PACs. McMurry 反应是将二羰基官能团转化为 $C=C$ 的有效手段^[59]. 然而, 在 McMurry 反应中通常要使用当量的金属还原试剂, 并且会出现官能团不能兼容的现象.

2012 年, 王剑波等^[60]报道了一种高效合成多环芳烃化合物的方法: Rh(II)催化的双酰肼的环化反应(Scheme 24).

图式 24 Rh-催化对甲苯磺酰肼环化反应
Scheme 24 Rh-catalyzed cyclization reactions of hydrazones

2 不含金属的对甲苯磺酰肼的反应

对甲苯磺酰肼与有机金属试剂发生的还原偶联反应是众所周知的有机转换^[61]. 然而, 常用的有机金属试剂是活性很高的有机金属化合物, 如有机锂. 它们因在反应中不能与一些敏感的官能团兼容而使得适用范围比较窄.

2009 年, Valdés 等^[62]报道了不含过渡金属的对甲苯

磺酰肼与硼酸的还原偶联反应, 反应中硼酸作为有机金属试剂(Scheme 25). 反应的底物适用范围很广, 由芳香族、杂芳族或者脂肪族取代的醛酮制备的对甲苯磺酰肼, 在 K_2CO_3 的存在下反应可以顺利地进行. 关于硼酸, 不论是吸电子或者缺电子的芳香族、杂芳族硼酸还是烯基、脂肪族硼酸, 都可以发生还原偶联反应. 反应过程中官能团的耐受性是显而易见的. 常见的敏感基团如: 醛类、酮类、酯类和腈类都能在反应条件下不发生改变. 此外, 是否分离出对甲苯磺酰肼不影响反应的发生, 因此, 反应可以由羰基化合物通过“一锅法”实现.

图式 25 对甲苯磺酰肼与芳基硼酸还原偶联反应

Scheme 25 Reductive-coupling of *N*-tosylhydrazones with arylboronic acid

他们认为还原偶联的机理如 Scheme 26 所示: 首先, 肼盐 **I** 分解为重氮化合物 **III**; 随后, 通过中间体 **IV** 得到苄基硼酸 **VII**, 或者通过双性离子 **VI** 得到苄基硼酸 **VII**; 最后, **VII** 在碱性条件下原位脱硼得到最终的产物 **VIII**.

图式 26 对甲苯磺酰肼与芳基硼酸还原偶联反应机理

Scheme 26 Proposed mechanism for reductive-coupling of *N*-tosylhydrazones with arylboronic acid

2010 年, Valdés 等^[63]报道了不含金属的对甲苯磺酰肼与酚和醇的还原偶联反应(Eq. 29). 反应可以在加热或者微波条件下进行. 在碱 K_2CO_3 的存在下得到一系列的醚. 这为合成醚提供了一种新的方法.

2011 年, Peng 等^[64]报道了类似的工作, 不含金属的对甲苯磺酰肼与硫酚的还原偶联反应(Eq. 30), 反应条件与 Valdés 等^[58]报道的条件主要不同之处在于用硫酚做亲核试剂. 该反应实现了卡宾对 S—H 键的插入, 可以得到较高产率的苄基硫醚.

2013 年, Wang 等^[65]报道了一种新的合成菲酚和萘酚的方法, 通过分子内卡宾对 δ -C—C 键插入获得(Eq. 31). 反应不需要金属催化, 在温和的条件下就可以进行, 为合成各种羟基取代的 PACs 提供了一种有效的方法, PACs 包括菲酚、萘酚衍生物以及与其相似的杂环体系. 由于反应原料易得以及完美的官能团兼容性, 这种方法将会在有机合成中广泛应用.

他们对反应机理的阐述如 Scheme 27: 首先, 底物 **I** 与酰肼反应得到单对甲苯磺酰肼 **II**, **II** 去质子化得到 **III**. **III**~**VIII** 可能经过两种途径: (a) 首先得到相应的重氮化合物 **IV**, 然后, 重氮碳负离子进攻酮羰基形成 **V**, 随后, 发生 1,2-迁移同时释放出 N_2 形成 **VIII**; (b) **III** 经过分子内卡宾环化得到理论结构 **VI**, **VI** 发生 1,2-迁移得到 **VII**. 通过实验现象分析可知路径 b 更有可能. 因为, (1) 反应过程中没有出现重氮化合物中间体特征颜色红色; (2) 反应可以在室温下发生, 但是由对甲苯磺酰肼得到重氮中间体至少需要 60 °C.

2012 年, Valdés 等^[66]报道了一种新的酯化方法, 通过羧酸的 O—H 键对对甲苯磺酰肼原位制备的重氮化合物插入达到酯化的目的. 反应适用肼的底物范围较广, 包括发生烯醇互变的酮制备的肼. 此外, 反应不需要金属催化, 且操作简单、安全、反应迅速(Eq. 32).

2012 年, Valdés 等^[67]报道了通过烯基硼酸与对甲苯磺酰肼的还原偶联对羰基化合物进行烯基化的反应(Scheme 28). 这是一种新的对羰基化合物烯基化的方法, 反应不需要金属催化和惰性环境, 可以与多种官能

图式 27 分子内卡宾对 δ -C—C 键插入反应机理

Scheme 27 Proposed mechanism for intramolecular carbene migratory insertion of δ -C—C bond

图式 28 对甲苯磺酰肼与烯基硼酸还原偶联反应

Scheme 28 Reductive-coupling of *N*-tosylhydrazones with alkenylboronic acid

2012 年, Barluenga 等^[68]报道了不含过渡金属的对甲苯磺酰肼与叠氮化钠的反应, 反应中叠氮负离子作为

亲核试剂与一系列由羰基化合物制备的肼反应, 通过还原叠氮化得到含伯碳和仲碳的叠氮化合物。值得注意的是, 反应不需要金属催化、干燥的溶剂和试剂。此外, 反应可以通过“一锅法”直接由羰基化合物得到叠氮化合物; 也可以与 Cu 催化的[3+2]环合反应相结合与端炔反应直接由羰基化合物得到三唑化合物(Scheme 29)。

图式 29 对甲苯磺酰肼与叠氮化钠偶联反应

Scheme 29 Coupling of *N*-tosylhydrazones with sodium azide

2013 年, Yadav 等^[69]报道了通过对甲苯磺酰肼对羰基化合物的脱氧氟化反应(Eq. 33)。该反应不需要金属催化, 同时, 反应可以由羰基化合物通过“一锅法”直接得到对应的产物。反应适用范围较广, 最终得到一系列氟化物。

依据实验结果和文献报道, 他们认为的反应机理如 Scheme 30 所示。首先, 对甲苯磺酰肼在碱的作用下分解得到重氮化合物 III; 随后, 形成卡宾中间体 IV; 最后, 卡宾对 H-F 键插入得到氟烷化合物 V。

图式 30 对甲苯磺酰肼与氟化氢偶联反应

Scheme 30 Coupling of *N*-tosylhydrazones with HF

2013 年, Wei 等^[70]报道了不含金属催化的对甲苯磺酰肼、二硫化碳和胺“一锅法”合成 *S*-烷基二硫代胺的方法(Eq. 34)。对甲苯磺酰肼由不同种类的芳香和脂肪类醛酮制备, 得到较高产率的 *S*-烷基二硫代胺。

芳基化合物与饱和杂环化合物的偶联反应是应用于现代医药工业的一个重要领域。2014 年, Allwood 等^[71]报道了由 4-, 5-, 6-元杂环酮制备的对甲苯磺酰肼与

芳基或杂芳基硼酸的偶联反应(Scheme 31), 经过简单的两个步骤, 实现了官能化 sp^2 - sp^3 相连的双环结构的化合物合成, 其中包括含氧杂环丁烷、哌啶和氮杂环丁烷结构的化合物。

图式 31 对甲苯磺酰肼与芳基硼酸还原偶联反应机理

Scheme 31 Reductive-coupling of *N*-tosylhydrazones with arylboronic acid

2014 年, Wang 等^[72]实现了对甲苯磺酰肼与缺电子 B_2pin_2 或 $Me_2PhSiBpin$ 的偶联反应(Scheme 32), 为 1,1-二硼酸酯和 1-甲硅烷基-1-硼酸酯化合物的合成提供了一种新的方法. 反应具有原料易于制备、操作简单、反应适用范围广和不需要金属催化等特点. 此外, 1,1-二硼酸酯可以经过两步 Pd 催化的交叉偶联反应进一步转化为芳烃类化合物(Scheme 33), 证明了 1,1-二硼酸酯类化合物具有的独特反应特征。

图式 32 对甲苯磺酰肼与 B_2pin_2 和 $Me_2PhSiBpin$ 偶联反应

Scheme 32 Coupling of *N*-tosylhydrazones with B_2pin_2 and $Me_2PhSiBpin$

3 结束语

从以上综述中看出, 过去的几年里, 对甲苯磺酰肼作为偶联组分参与的金属催化的和不含金属的偶联反应有所发展. 将传统偶联反应与通过对甲苯磺酰肼现场生成的金属卡宾有机的结合, 发展了一种新型的偶联反应. 为通过其他偶联反应不能合成的化合物, 提供了一种新的合成方法. 在金属催化的偶联反应的基础上, 进

图式 33 1,1-二硼酸酯转化为芳烃类化合物方法

Scheme 33 Stepwise coupling reactions of 1,1-diboronate with aryl bromides and aryl iodides

一步实现了不含金属的反应, 成功构建 C—C 键、C—O 键、C—N 键等, 进一步拓展了该类反应的适用范围. 由于反应起步较晚, 有关反应的机理还不是很明确, 需要进一步研究. 本文综述了近几年对甲苯磺酰肼作为偶联组分的交叉偶联反应的研究进展及应用, 以便洞察对甲苯磺酰肼在未来的一些发展动态. 相信随着时间的推移, 随着对对甲苯磺酰肼的偶联反应的反应机理研究的深入, 新的有关对甲苯磺酰肼的反应将不断涌现。

References

- [1] Greenman, K. L.; Carter, D. S.; Van Vranken, D. L. *Tetrahedron* **2001**, *57*, 5219.
- [2] Greenman, K. L.; Van Vranken, D. L. *Tetrahedron* **2005**, *61*, 6438.
- [3] Devine, S. K. J.; Van Vranken, D. L. *Org. Lett.* **2007**, *9*, 2047.
- [4] Peng, C.; Cheng, J.; Wang, J. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 8708.
- [5] Devine, S. K. J.; Van Vranken, D. L. *Org. Lett.* **2008**, *10*, 1909.
- [6] Chen, S.; Wang, J. *Chem. Commun.* **2008**, *35*, 4198.
- [7] Peng, C.; Wang, Y.; Wang, J. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 1566.
- [8] Kudirka, R.; Devine, S. K. J.; Adams, C. S.; Van Vranken, D. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 3677.
- [9] Yu, W. Y.; Tsoi, Y. T.; Zhou, Z.; Chan, A. S. C. *Org. Lett.* **2009**, *11*, 469.
- [10] Tsoi, Y. T.; Zhou, Z.; Chan, A. S. C.; Yu, W. Y. *Org. Lett.* **2010**, *12*, 4506.
- [11] Zhang, Y.; Wang, J. *Eur. J. Org. Chem.* **2011**, 1015.
- [12] Tang, M.; Xing, D.; Cai, M. Q.; Hu, W. H. *Chin. J. Org. Chem.* **2014**, *34*, 1268 (in Chinese). (唐敏, 邢栋, 蔡茂强, 胡文浩, 有机化学, **2014**, *34*, 1268.)
- [13] Wei, S. H.; Wang, C.; Wang, J. W.; Cheng, K. *Chin. J. Org. Chem.* **2013**, *33*, 2402 (in Chinese). (韦珊红, 王晨, 王建伟, 程凯, 有机化学, **2013**, *33*, 2402.)
- [14] Bamford, W. R.; Stevens, T. S. *J. Chem. Soc.* **1952**, 4735.
- [15] Fulton, J. R.; Aggarwal, V. K. *Eur. J. Org. Chem.* **2005**, 1479.
- [16] Barluenga, J.; Carlos, V. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 7486.
- [17] Liu, Z. X.; Zhang, Y.; Wang, J. B. *Chin. J. Org. Chem.* **2013**, *33*, 687 (in Chinese). (刘振兴, 张艳, 王剑波, 有机化学, **2013**, *33*, 687.)
- [18] Barluenga, J.; Moriel, P.; Valdés C.; Aznar, F. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2007**, *46*, 5587.
- [19] Ganapathy, G.; Sekar, G. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 3856.
- [20] Barluenga, J.; Tomás-Gamasa, M.; Moriel, P.; Aznar, F.; Valdés, C. *Chem. Eur. J.* **2008**, *14*, 4792.
- [21] Brachet, E.; Hamze, A.; Peyrat, J. F.; Brion, J. D.; Alami, M. *Org. Lett.* **2010**, *12*, 4042.

- [22] Tréguier, B.; Hamze, A.; Provot, O.; Brion, J. D.; Alami, M. *Tetrahedron Lett.* **2009**, *50*, 6549.
- [23] Barluenga, J.; Florentino, L.; Aznar, F.; Valdés, C. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 510.
- [24] Högermeier, J.; Reissig, H. U. *Adv. Synth. Catal.* **2009**, *14*, 2323.
- [25] Barluenga, J.; Escribano, M.; Moriel, P.; Aznar, F.; Valdés, C. *Chem. Eur. J.* **2009**, *15*, 13291.
- [26] Ojha, D. P.; Prabhu, K. R. *J. Org. Chem.* **2012**, *77*, 11027.
- [27] Florentino, L.; Aznar, F.; Valdés, C. *Chem. Eur. J.* **2013**, *19*, 10506.
- [28] Barluenga, J.; Gamasa, M. T.; Aznar, F.; Valdés, C. *Chem. Eur. J.* **2010**, *16*, 12801.
- [29] Barluenga, J.; Gamasa, M. T.; Aznar, F.; Valdés, C. *Adv. Synth. Catal.* **2010**, *352*, 3235.
- [30] Rasolofonjatovo, E.; Hamze, A.; Morvan, E.; Brion, J. D.; Alami, M. *Tetrahedron Lett.* **2011**, *52*, 1036.
- [31] Ojha, D. P.; Prabhu, K. R. *J. Org. Chem.* **2012**, *77*, 11027.
- [32] Florentino, L.; Aznar, F.; Valdés, C. *Chem. Eur. J.* **2013**, *19*, 10506.
- [33] Chen, Z.; Duan, X.; Wu, L.; Ali, S.; Ji, K.; Zhou, P.; Liu, X.; Liang, Y. *Chem. Eur. J.* **2011**, *17*, 6918.
- [34] Barluenga, J.; Gamasa, M. T.; Aznar, F.; Valdés, C. *Adv. Synth. Catal.* **2010**, *352*, 3235.
- [35] Zhou, F. T.; Ding, K.; Cai, Q. *Chem. Eur. J.* **2011**, *17*, 12268.
- [36] Zhou, L.; Liu, Z. X.; Liu, Y. Z.; Zhang, Y.; Wang, J. B. *Tetrahedron* **2013**, *69*, 6083.
- [37] Zeng, X. B.; Cheng, G. L.; Shen, J. H.; Cui, X. L. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 3022.
- [38] Roche, M.; Frison, G.; Brion, J. D.; Provot, O.; Hamze, A.; Alami, M. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 8485.
- [39] Zhou, P. X.; Ye, Y. Y.; Liang, Y. M. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 5080.
- [40] Roche, M.; Hamze, A.; Brion, J. D.; Alami, M. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 1.
- [41] Hu, F. G.; Xia, Y.; Liu, Z. X.; Ma, C.; Zhang, Y.; Wang, J. *Org. Biomol. Chem.* **2014**, *12*, 3590.
- [42] Zhou, P. X.; Ye, Y. Y.; Ma, J. W.; Liang, Y. M. *J. Org. Chem.* **2014**, *79*, 6627.
- [43] Shindoh, N.; Takemoto, Y.; Takasu, K. *Chem. Eur. J.* **2009**, *15*, 12168.
- [44] Muller, T. J. J. *Metal Catalyzed Cascade Reactions*, Springer, Berlin, **2006**.
- [45] Barluenga, J.; Cabal, M. P.; Aznar, F.; Valdés, C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 2350.
- [46] Liu, Z. X.; Xia, Y.; Zhou, S. Y.; Wang, L.; Zhang, Y.; Wang, J. B. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 5032.
- [47] Zhou, P. X.; Luo, J. Y.; Zhao, L. B.; Yea, Y. Y.; Liang, Y. M. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 3254.
- [48] Ye, Y. Y.; Zhou, P. X.; Luo, J. Y.; Zhong, M. J.; Liang, Y. M. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 10190.
- [49] Liu, X. L.; Ma, X. N.; Huang, X. Z.; Gu, Z. H. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 4814.
- [50] Barroso, R.; Valencia, R. A.; Valdés, C. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 2264.
- [51] Wu, X.-X.; Zhou, P. X.; Wang, L. J.; Liang, Y. M. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 3882.
- [52] Feng, X. W.; Wang, J.; Zhang, J.; Yang, J.; Wang, N.; Yu, X. Q. *Org. Lett.* **2010**, *12*, 4408.
- [53] Miao, W. J.; Gao, Y. Z.; Li, X. Q.; Gao, Y. X.; Tang, G.; Zhao, Y. F. *Adv. Synth. Catal.* **2012**, *354*, 2659.
- [54] Xiao, Q.; Ling, L.; Ye, F.; Tan, R. C.; Tian, L. M.; Zhang, Y.; Li, Y. X.; Wang, J. B. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 3879.
- [55] Hossain, M. L.; Ye, F.; Zhang, Y.; Wang, J. B. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 1236.
- [56] Aziz, J.; Brion, J. D.; Hamze, A.; Alami, M. *Adv. Synth. Catal.* **2013**, *355*, 2417.
- [57] Yao, T.; Hirano, K.; Satoh, T.; Miura, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 775.
- [58] Barluenga, J.; Tomás-Gamasa, M.; Aznar, F.; Valdés, C. *Eur. J. Org. Chem.* **2011**, 1520.
- [59] (a) McMurry, J. E. *Acc. Chem. Res.* **1983**, *16*, 405.
(b) Kahn, B. E.; Rieke, R. D.; *Chem. Rev.* **1988**, *88*, 733.
(c) McMurry, J. E. *Chem. Rev.* **1989**, *89*, 1513.
- [60] Xia, Y.; Liu, Z. X.; Xiao, Q.; Qu, P. Y.; Ge, R.; Zhang, Y.; Wang, J. B. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 5714.
- [61] Vedejs, E.; Stolle, W. T. *Tetrahedron Lett.* **1977**, *18*, 135.
- [62] Barluenga, J.; Gamasa, M. T.; Aznar, F.; Valdés, C. *Nat. Chem.* **2009**, *1*, 494.
- [63] Barluenga, J.; Gamasa, M. T.; Aznar, F.; Valdés, C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, *49*, 4993.
- [64] Ding, Q.; Cao, B.; Yuan, J.; Liu, X.; Peng, Y. *Org. Biomol. Chem.* **2011**, *9*, 748.
- [65] Xia, Y.; Qu, P. Y.; Liu, Z. X.; Ge, R.; Xiao, Q.; Zhang, Y.; Wang, J. B. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 2543.
- [66] García-Muñoz, A. H.; Tomás-Gamasa, M.; Pérez-Aguilar, M. C.; Cuevas-Yañez, E.; Valdés, C. *Eur. J. Org. Chem.* **2012**, 3925.
- [67] Carmen, M.; Aguilar, P.; Valdés, C. *Angew. Chem.* **2012**, *124*, 6055.
- [68] Barluenga, J.; Gamasa, M. T.; Valdés, C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 5950.
- [69] Yadav, A. K.; Srivastava, V. P.; Yadav, L. D. S. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 2154.
- [70] Sha, Q.; Wei, Y.-Y. *Org. Biomol. Chem.* **2013**, *11*, 5615.
- [71] Allwood, D. M.; Blakemore, D. C.; Brown, A. D.; Ley, S. V. *J. Org. Chem.* **2014**, *79*, 328.
- [72] Li, H.; Zhang, Y.; Wang, J. B. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 448.

(Qin, X.)