铜催化的芳基酮及其衍生物氧化酰胺化合成 α -酮酰胺的反应研究

龚久涵 朱正 卢林 郭生梅* 蔡琥*

(南昌大学化学学院 南昌 330031)

摘要 研究了在水相体系下芳基酮类化合物与胺类化合物的氧化酰胺化合成 α -酮酰胺的反应. 室温条件下, 以过氧叔丁醇(TBHP)为氧化剂, 芳基酮与胺类化合物在铜盐与分子碘的协同作用下高效地得到了目标产物. 同时研究了在以氧气为氧化剂的条件下, 铜催化的酰基乙酸酯及其衍生物的 C—C 键断裂实现 α -酮酰胺的合成.

关键词 水; 氧气; 芳基酮; 酰基乙酸酯; α -酮酰胺

Copper-Catalyzed Oxidative Amidation of Aryl Ketone and Its Derivatives to Form α -Keto Amides

Gong, Jiuhan Zhu, Zheng Lu, Lin Guo, Shengmei* Cai, Hu*

(College of chemistry, Nanchang University, Nanchang 330031)

Abstract The oxidative amidation between aryl ketone and amine to form keto amide in water was studied. A variety of amides co-catalyzed by copper and iodine were efficiently synthesized using TBHP as an oxidant under room temperature. On the other hand, a copper-catalyzed C—C bond cleavage of β -keto ester and its derivatives to prepare α -keto amides under O_2 atmosphere was also studied.

Keywords H_2O ; O_2 ; aryl ketone; β -keto esters; α -keto amides

α -酮酰胺及其衍生物是一类重要的胺类化合物, 广泛存在于天然产物和药物中间体中, 具有广泛的应用前景^[1]. 这类化合物的传统合成方法是采用 α -酮酸的胺解. 这类反应需要大量的脱水剂且反应条件较为苛刻, 效率较低, 且反应的原子经济性不高, 同时反应底物具有较大的局限性^[2]. 因此, 采用价廉易得原料, 发展绿色高效的合成路线具有重要的意义. 近年来, 采用催化条件实现 α -酮酰胺合成得到了广泛的发展. 例如, 卤代芳烃通过过渡金属催化的羰基胺化反应实现了这类酰胺的合成^[3]. 而后, 芳基炔类化合物在氧化条件下也实现了 α -酮酰胺的合成^[4]. 随着研究的深入, α -酮酸通过催化的氧化缩合实现了 α -酮醛的合成, 在这些反应中, 三级胺或者酰胺如 DMF 等通过 C—H 键的活化为反应提供了胺源^[5]. α -酮醛通过氧化脱氢偶联反应与胺类化合物实现这类酰胺的高效合成. 这类反应具有副产物为水, 反应的原子经济性高, 副产物清洁等特点^[6]. 此外, 通过

酰胺的直接氧化也可以获得这类 α -酮酰胺化合物^[7]. 芳基酮是一类价廉易得的有机物质. 通过芳基酮来实现 α -酮酰胺具有成本低, 底物广泛以及反应原子经济性高的特点. 近年来, 大量的有关研究工作被报道^[8]. 例如, 无溶剂条件下, 铜催化的芳基酮与二级胺的反应. 碘催化的胺化反应, 特别是 Zha 和 Wang 课题组报道的阳极氧化实现了伯酰胺和仲酰胺的合成. 这里, 我们报道了芳基酮在水相条件下的氧化偶联反应实现 α -酮酰胺以及氧气条件下酰基乙酸酯的 C—C 键断裂实现了 α -酮酰胺的合成.

1 结果与讨论

首先, 我们以 0.5 mmol 苯乙酮和 1.0 mmol 吗啉为反应模板, 在室温条件下, 考察水相体系、催化剂、氧化剂及反应底物配比等反应条件对反应的影响. 当以水为溶剂, 以 50 mol% 的单质碘为催化剂, 以 4 equiv. 过氧

* E-mail: smguo@ncu.edu.cn, caihu@ncu.edu.cn

Received February 7, 2015; revised May 12, 2015; published online May 26, 2015.

Project supported by the National Key Basic Research Program of Ministry of Science and Technology of China (No. 2012CBA01204) and the National Natural Science Foundation of China (No. 21302084).

科技部 973 计划(No. 2012CBA01204)和国家自然科学基金(No. 21302084)资助项目.

叔丁醇为氧化剂时, 反应液搅拌 12 h 后, 反应几乎没有发生(表 1, Entry 1). 可能的原因是由于底物的在水相中的溶解问题. 因此, 体系中加入 1 equiv. 四丁基溴化铵后, 反应可获得中等收率的产物(表 1, Entry 2). 在该溶剂体系下, 一系列的碘催化剂进行了考察. 当催化剂为 NaI 时, 反应可得到 43% 的收率, 而以 KI 为催化剂时, 产物的收率为 38%. 因此, 我们认为不同的碘催化剂对反应影响不大(表 1, Entries 3~4). 对不同相转移试剂的研究发现: TBAF, 乙醇, PEG600, PEG2000, PEG6000 对反应没有促进作用; 而缩二乙二醇为相转移试剂时反应产率有所提高(表 1, Entries 6~9). 当反应体系中加入共催化剂 CuI (10 mol%) 时, 反应的产率大大提高, 达到 75% (表 1, Entry 10). 在共催化剂的比例考察中发现, 降低碘或铜的用量都使反应的产率下降, 而不加碘时, 反应的收率 33% (表 1, Entries 11~13). 对氧化剂的考察发现: 过氧叔丁醚(DTBP)、双氧水、过硫酸钾以及氧气等氧化剂对反应没有提高(表 1, Entries 14~17). 对氧化剂, 缩二乙二醇及胺的用量考察发现: 氧化剂的用量增加到 6 equiv. 时, 反应的产率提高到 86%, 而降低缩二乙二醇的用量及胺的用量都会使反应的收率降低(表 1, Entries 18~20).

在最优条件下, 我们考察了芳基酮的适应范围. 当苯环的对位具有吸电子取代基时, 如 NO₂, Br, Cl 以及 F 等基团反应的产率达到优秀(图 1, 2b~2e). 而当苯环对位含有供电子基团时, 产物的收率明显下降, 如取代基为 4-Me, 4-OMe 时, 反应的收率为 76% 和 73% (图 1, 2h, 2i). 而当基团更强供电子基时, 如二氧杂环基及吗啉基时, 反应的收率很低甚至不能发生(图 1, 2j~2l). 而当苯环间位具有取代基时, 如 3-Br 及 3-NO₂, 反应相对于对位取代的底物的活性高, 反应的收率分别为 92% 和 86% (图 1, 2m, 2n). 当取代基取代苯环的邻位时, 反应的活性略有降低, 说明苯环上的位阻对反应的影响不大(图 1, 2o). 对胺的适用性考察我们发现, 直链二级胺, 如二甲胺和二异丙胺在反应体系下也能发生反应, 分别得到中等到优秀的收率(图 1, 2q, 2r).

最近, Wang 课题组和 Chen 课题组^[9]分别报道了 α -酮酰胺的另外一种合成方法, 通过 β -二酮或 β -酰基乙酸酯在催化氧化的条件下经历 C—C 键的断裂及 C—N 键的构建(Eq. 1). 这类反应被认为是 β -二酮或 β -酰基乙酸酯在胺的作用下通过形成类似烯醇中间体, 进而在亚甲基位实现胺化. 氧化剂的作用下中间体脱去羰基或甲酸酯而实现这类化合物构建. 这类合成方法目前主要是通过当量的碘或在过氧化物条件下铜催化的条件下实现. 反应底物主要局限于 β -二酮类化合物, 而对于更富电子的底物如酰基乙酸酯的研究则较少. 因此, 我们在这里

表 1 水相中合成 α -酮酰胺的条件优化^a

Table 1 Optimization of the reaction conditions

Entry	Cat.	Solvent	Yield ^b /%
1	I ₂	H ₂ O	Trace
2 ^c	I ₂	H ₂ O + TBAB	53
3	NaI	H ₂ O + TBAB	43
4	KI	H ₂ O + TBAB	38
5	KBr	H ₂ O + TBAB	Trace
6 ^d	I ₂	H ₂ O + PEG ₆₀₀	24
7 ^e	I ₂	H ₂ O + PEG ₂₀₀₀	21
8 ^f	I ₂	H ₂ O + PEG ₆₀₀₀	17
9 ^g	I ₂	H ₂ O + DG	59
10	I ₂ + CuI	H ₂ O + DG	75
11 ^h	I ₂ + CuI	H ₂ O + DG	60
12 ⁱ	I ₂ + CuI	H ₂ O + DG	67
13	CuI	H ₂ O + DG	33
14 ^j	I ₂ + CuI	H ₂ O + DG	58
15 ^k	I ₂ + CuI	H ₂ O + DG	49
16 ^l	I ₂ + CuI	H ₂ O + DG	50
17 ^m	I ₂ + CuI	H ₂ O + DG	32
18 ⁿ	I ₂ + CuI	H ₂ O + DG	86
19 ^o	I ₂ + CuI	H ₂ O + DG	74
20 ^p	I ₂ + CuI	H ₂ O + DG	56

^a Reaction conditions: [Cu] (10 mol%), [I] (50 mol%), water (2 mL), r.t. for 12 h; ^b Isolated yield; ^c TBAB (1 equiv); ^d PEG₆₀₀ (300 mg); ^e PEG₂₀₀₀ (300 mg); ^f PEG₆₀₀₀ (300 mg); ^g DG = Diethylene glycol (300 mg); ^h I₂ (20 mol%); ⁱ CuI (5 mol%); ^j DTBP (4 equiv.); ^k H₂O₂ (4 equiv.); ^l K₂S₂O₈ (2 equiv.); ^m O₂ (101 kPa); ⁿ TBHP (6 equiv.); ^o DG (200 mg); ^p morpholine (1 equiv.).

报道了利用氧气为氧化剂, 铜催化下的酰基乙酸酯的氧化胺化反应实现 α -酮酰胺的合成.

首先, 对一系列的铜催化剂的筛选发现, 一价铜和二价铜都能催化反应的进行. 其中 Cu₂O 的催化效果比较好, 但反应的产率只达到 34%, 而其他金属如 Fe, Pd, Ag 等都不能催化反应的进行. 考察溶剂对反应的影响时, 我们发现二甲苯对反应的促进较大, 产率可达到 51%. 通过加入 *N*-甲基吡啶后, 反应的收率有较大的提升. 经过一系列的条件优化后, 反应的最优条件为: 反应的底物配比为 1 : 2, 20 mol% 的 Cu₂O 为催化剂, 以二甲苯为溶剂, 在氧气条件下 140 °C 反应 24 h. 我们对反应的底物进行了拓展, 发现苯甲酰乙酸甲酯为反应底物时, 可获得中等收率的产物(表 2, Entry 2). 考察苯甲酰

图1 反应底物适应性考察
Figure 1 Scope of the reaction

基取代基对反应的影响发现: 当苯甲酰基的对位取代基为供电子基团时, 反应的收率较高, 如苯环 4-位为 Me 或 OMe 时, 反应的收率可达 51%和 60%(表 2, Entries 3, 5). 而为含吸电子基团时反应产率稍低, 如 4-位为 NO₂ 或 Br 时, 反应的收率只有 39%和 42%(表 2, Entries 6, 9). 对于前人已报道的二酮化合物, 在本反应体系下以中等收率实现反应(表 2, Entry 12). 对于前人未报道的更富电子的酰基乙酰胺, 如苯甲酰乙酰吗啉的反应活性更强, 可以获得 73%的收率(表 2, Entry 13). 对不同的胺基化合物的研究发现, 一系列的链状胺类化合物如二乙胺、二甲胺等都可以得到中等收率的产物(表 3, Entries 1, 2). 直链一级胺和环状胺, 如正丁胺和环己基胺也能较好地参与反应, 分别获得 56%和 72%的产率(表 3, En-

tries 5, 6).

尽管确切的反应的机理不是很清楚. 但在总结前人的工作基础上, 我们假设了一个可能的反应历程. 首先, 胺与酮羰基缩合形成烯胺中间体 **A**, 同时 O₂ 在铜的作用下形成氧负自由基. 氧负自由基对 **A** 加成生成中间体 **B**, 在 Cu(II) 的作用下 **B** 分子内环化形成中间体 **C**; 在高温的条件下, **C** 不稳定易脱去一分子的胺得到 **D**. 胺对 **D** 分子的加成生成 **E**; 在脱水剂的作用下, **E** 失去一分子的甲酸酯得到目标产物(Scheme 1).

图式1 可能的反应机理
Scheme 1 Possible reaction mechanism

2 结论

我们发展了两类铜催化的 α -酮酰胺绿色合成方法. 在室温条件下, 水作溶剂, 缩二乙二醇为相转移试剂, 芳基酮与胺类化合物高效的得到 α -酮酰胺及其衍生物; 另一方面, 我们以酰基乙酰胺为反应底物, 在氧气为氧化剂条件下, 通过铜催化的氧化反应实现 C—C 键的断裂, 进而发生酰胺化反应, 实现了 α -酮酰胺的合成. 这类反应对于酰基乙酰胺及二酮类化合物具有较好的适应性.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

实验所用溶剂使用前均按照处理溶剂的标准方法进行, 催化剂, 胺类化合物及苯甲酰乙酸乙酯均为市售, 其他反应底物为根据文献合成^[10]. 板层析使用 GF254 硅胶, 柱层析使用 200~300 目硅胶, 吸附样品使用 60~100 目粗硅胶, 展开剂为石油醚(60~90 °C)和乙酸

表 2 芳基甲酰乙酸酯的适应范围^aTable 2 Scope of the β -keto esters

Entry	Compd.	Yield ^b /%	Entry	Compd.	Yield ^b /%	Entry	Compd.	Yield ^b /%
1		61	6		42	10		40
2		66	7		47	11		55
3		51	8		43	12		52
4		59	9		39	13		73
5		60						

^a Reaction conditions: Cu₂O (20 mol%), DMAP (50 mol%), β -keto esters (0.5 mmol), morpholine (2 equiv.), xylene (2 mL), O₂ (101 kPa.) at 140 °C for 24 h;^b Isolated yields.

乙酯($V:V=10:1$). ¹H NMR 及 ¹³C NMR 检测仪器为 Bruker DRX-600 及 Agilent 400 核磁共振仪. TMS 作为内标, CDCl₃ 作溶剂.

3.2 水相条件下 α -酮酰胺的合成

将 CuI (9.6 mg, 10 mol%), I₂ (64 mg, 50 mol%), 芳基酮(0.5 mmol, 1 equiv.), 胺(1.0 mmol, 2 equiv.), 缩二乙二醇(300 mg)及 H₂O (2 mL)加入到一 10 mL 的圆底烧瓶中, 加入 TBHP (0.4 mL, 6 equiv., 70% aq.), 密封后室温搅拌 12 h. TLC 跟踪, 当反应结束后, 反应混合液倒入 50 mL 水中, 乙酸乙酯(20 mL)萃取 3 次, 收集有机相, 无水硫酸钠干燥, 母液减压浓缩, 残留物用石油醚与乙酸乙酯($V:V=5:1\sim20:1$)为洗脱液柱层析分离纯化得到目标产物.

苯甲酰甲酰吗啉(**2a**)^[3a]: 得到黄色液体 94 mg, 产率 86%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.97 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.66 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.53 (t, $J=7.2$ Hz, 2H),

3.80 (s, 4H), 3.69~3.63 (m, 2H), 3.42~3.35 (m, 2H).

4-溴苯甲酰甲酰吗啉(**2b**)^[3a]: 得到黄色液体 129 mg, 产率 87%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.83 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.67 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 3.79 (s, 4H), 3.70~3.63 (m, 2H), 3.41~3.34 (m, 2H).

4-硝基苯甲酰甲酰吗啉(**2c**)^[3a]: 得到黄色固体 111 mg, 产率 84%. m.p. 140~143 °C (lit. 141~146 °C); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.36 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 8.16 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 3.82 (s, 4H), 3.72~3.68 (m, 2H), 3.46~3.41 (m, 2H).

4-氯苯甲酰甲酰吗啉(**2d**)^[3a]: 得到黄色液体 113 mg, 产率 89%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.91 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.50 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 3.79 (s, 4H), 3.69~3.64 (m, 2H), 3.41~3.36 (m, 2H).

4-氟苯甲酰甲酰吗啉(**2e**)^[8b]: 得到黄色液体 96 mg, 产率 81%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.04~7.97 (m, 2H), 7.20 (t, $J=8.4$ Hz, 2H), 3.80 (s, 4H), 3.70~3.65 (m,

表3 胺类化合物的适应范围

Table 3 Scope of the amines

Entry	Compd.	Yield ^b /%	Entry	Compd.	Yield ^b /%
1		48	4		53
2		66	5		56
3		51	6		72

^a Reaction conditions: Cu₂O (20 mol%), DMAP (50 mol%), β -keto esters (0.5 mmol), morpholine (2 equiv.), xylene (2 mL), O₂ (101 kPa) at 140 °C for 24 h; ^b Isolated yields.

2H), 3.42~3.37 (m, 2H).

2-萘甲酰甲酰吗啉(**2f**)^[5c]: 得到黄色液体 125 mg, 产率 93%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.47 (s, 1H), 7.96 (ddd, J =28.4, 18.0, 8.4 Hz, 4H), 7.62 (dt, J =28.4, 7.2 Hz, 2H), 3.84 (s, 4H), 3.69~3.63 (m, 2H), 3.44~3.40 (m, 2H).

1-萘甲酰甲酰吗啉(**2g**)^[8b]: 得到黄色液体 110 mg, 产率 82%. ¹H NMR (600 MHz, CDCl₃) δ : 9.24 (d, J =8.4 Hz, 1H), 8.12 (d, J =8.4 Hz, 1H), 8.03 (d, J =7.8 Hz, 1H), 7.92 (d, J =7.8 Hz, 1H), 7.70 (t, J =7.8 Hz, 1H), 7.58 (dt, J =25.2, 7.8 Hz, 2H), 3.82 (s, 4H), 3.68~3.64 (m, 2H), 3.45~3.41 (m, 2H).

4-甲基苯甲酰甲酰吗啉(**2h**)^[3a]: 得到黄色液体 89 mg, 产率 76%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.85 (d, J =8.0 Hz, 2H), 7.32 (d, J =8.0 Hz, 2H), 3.79 (s, 4H), 3.68~3.62 (m, 2H), 3.41~3.35 (m, 2H), 2.44 (s, 3H).

4-甲氧基苯甲酰甲酰吗啉(**2i**)^[3a]: 得到黄色液体 90 mg, 产率 73%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.93 (d, J =8.8 Hz, 2H), 7.26 (s, 1H), 6.99 (d, J =8.8 Hz, 2H), 3.90 (s, 3H), 3.79 (s, 4H), 3.68~3.62 (m, 2H), 3.42~3.36 (m, 2H).

3,4-二氧杂苯甲酰甲酰吗啉(**2j**): 得到黄色固体 54 mg, 产率 41%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.53 (d, J =8.0 Hz, 1H), 7.43 (s, 1H), 6.90 (d, J =8.0 Hz, 1H), 6.09 (s, 2H), 3.78 (s, 4H), 3.66 (t, J =3.6 Hz, 2H), 3.40~3.34 (m, 2H).

3-溴苯甲酰甲酰吗啉(**2m**)^[9a]: 得到黄色液体 137 mg, 产率 92%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.10 (s, 1H), 7.89 (d, J =7.2 Hz, 1H), 7.78 (d, J =8.8 Hz, 1H), 7.41 (t, J =8.0 Hz, 1H), 3.80 (s, 4H), 3.68 (d, J =4.4 Hz, 2H), 3.41~3.38 (m, 2H).

3-硝基苯甲酰甲酰吗啉(**2n**)^[8b]: 得到黄色固体 113 mg, 产率 86%. m.p. 86~88 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.80 (s, 1H), 8.51 (d, J =7.2 Hz, 1H), 8.32 (d, J =7.6 Hz, 1H), 7.75 (t, J =8.0 Hz, 1H), 3.83 (s, 4H), 3.74~3.69 (m, 2H), 3.48~3.44 (m, 2H).

2-溴苯甲酰甲酰吗啉(**2o**)^[5d]: 得到黄色液体 120 mg, 产率 81%. ¹H NMR (600 MHz, CDCl₃) δ : 7.81 (dd, J =7.8, 1.9 Hz, 1H), 7.64 (dd, J =7.8, 1.2 Hz, 1H), 7.44 (dtd, J =17.4, 7.2, 1.2 Hz, 2H), 3.82~3.77 (m, 4H), 3.75~3.72 (m, 2H), 3.59~3.56 (m, 2H).

3,4-二氯苯甲酰甲酰吗啉(**2p**): 得到黄色固体 115 mg, 产率 80%. m.p. 114~116 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.06 (s, 1H), 7.81 (d, J =8.4 Hz, 1H), 7.61 (d, J =8.4 Hz, 1H), 3.80 (s, 4H), 3.71~3.65 (m, 2H), 3.42~3.37 (m, 2H); ¹³C NMR (101 MHz, CDCl₃) δ : 188.52, 164.35, 139.82, 134.05, 132.85, 131.51, 131.33, 128.70, 66.83, 66.72, 46.42, 44.95; HRMS (ESI) calcd for C₁₂H₁₁Cl₂NNaO₃ [M+Na⁺]: 310.0019, found 310.0032.

N,N-二甲基苯甲酰甲酰胺(**2q**)^[8b]: 得到黄色液体 59 mg, 产率 67%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.95 (d, J =7.8 Hz, 2H), 7.65 (t, J =7.2 Hz, 1H), 7.52 (t, J =7.6 Hz, 2H), 3.13 (s, 3H), 2.97 (s, 3H).

N,N-二异丙基苯甲酰甲酰胺(**2r**)^[8c]: 得到黄色固体 92 mg, 产率 79%. m.p. 118~122 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.94 (d, J =8.0 Hz, 2H), 7.63 (t, J =6.8 Hz, 1H), 7.51 (t, J =7.6 Hz, 2H), 3.65 (ddt, J =27.2, 13.2, 6.8 Hz, 2H), 1.58 (s, 6H), 1.18 (d, J =6.8 Hz, 6H).

3.3 铜催化苯基酰乙酸酯的 C—C 断裂实现 α -酮酰胺合成

将 Cu₂O (14 mg, 20 mol%), DMAP (30 mg, 50 mol%), 苯甲酰乙酸酯(0.5 mmol, 1 equiv.), 胺(1.0 mmol, 2 equiv.), 二甲苯(2 mL)加入到一 50 mL 的 Schlenk 管中, 冲入氧气(101 kPa), 密封后 140 °C 下搅拌 24 h. TLC 跟踪, 当反应结束后, 反应混合液倒入 50 mL 水中, 乙酸乙酯萃取(20 mL×3)次, 收集有机相, 无水硫酸钠干燥, 母液减压浓缩, 残留物用石油醚与乙酸乙酯($V:V=5:1\sim20:1$)为洗脱液柱层析分离纯化得到目标产物.

2,4-二甲基苯甲酰甲酰吗啉(**2s**): 得到黄色液体 68 mg, 产率 55%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.62 (d, J =8.4 Hz, 1H), 7.13 (s, 2H), 3.79 (d, J =3.2 Hz, 4H),

3.69~3.63 (m, 2H), 3.42~3.35 (m, 2H), 2.64 (s, 3H), 2.39 (s, 3H).

N,N-二乙基苯甲酰甲酰胺(**2t**)^[8c]: 得到黄色液体 49 mg, 产率 48%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.94 (d, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.64 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.51 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 3.57 (q, $J=7.2$ Hz, 2H), 3.24 (q, $J=7.2$ Hz, 2H), 1.29 (t, $J=7.2$ Hz, 3H), 1.16 (t, $J=7.2$ Hz, 3H).

苯甲酰甲酰哌啶(**2u**)^[8c]: 得到黄色液体 57 mg, 产率 53%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.94 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.63 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.51 (t, $J=7.8$ Hz, 2H), 3.70 (s, 2H), 3.31~3.25 (m, 2H), 1.69 (s, 4H), 1.25 (s, 2H).

苯甲酰甲酰丁胺(**2v**)^[8d]: 得到黄色液体 57 mg, 产率 56%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.33 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.61 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.46 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.08 (s, 1H), 3.39 (q, $J=6.4$ Hz, 2H), 1.62~1.56 (m, 2H), 1.40 (dd, $J=14.8, 7.6$ Hz, 2H), 0.95 (t, $J=6.8$ Hz, 3H).

苯甲酰甲酰环己基胺(**2w**)^[8b]: 得到黄色液体 83 mg, 产率 72%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.34 (d, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.62 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.48 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 6.95 (s, 1H), 3.91~3.80 (m, 1H), 1.99 (dd, $J=12.0, 2.8$ Hz, 2H), 1.82~1.72 (m, 2H), 1.70~1.63 (m, 1H), 1.41 (dt, $J=12.4, 6.0$ Hz, 2H), 1.28 (ddd, $J=23.6, 12.0, 3.2$ Hz, 3H).

辅助材料(Supporting Information) 化合物的 ¹H NMR 谱图. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] (a) Humphrey, J. M.; Chamberlin, A. R. *Chem. Rev.*, **1997**, 97, 2243.
(b) J. W. Bode, *Curr. Opin. Drug Discovery Dev.* **2006**, 9, 765.
(c) Tanaka, H.; Kuroda, A.; Marusawa, H.; Hatanaka, H.; Kino, T.; Goto, T.; Hashimoto, M.; Taga, T. *J. Am. Chem. Soc.* **1987**, 109, 5031.
(d) Maryanoff, B. E.; Greco, M. N.; Zhang, H.-C.; Andrade-Gordon, P.; Kauffman, J. A.; Nicolaou, K. C.; Liu, A.; Brungs, P. H. *J. Am. Chem. Soc.* **1995**, 117, 1225.
(e) Sheha, M. M.; Mahfouz, N. M.; Hassan, H. Y.; Youssef, A. F.; Mimoto, T.; Kiso, Y. *Eur. J. Med. Chem.*, **2000**, 35, 887.
(f) Ozawa, F.; Soyama, H.; Yamamoto, T.; Yamamoto, A. *Tetrahedron Lett.* **1982**, 23, 3383.
(g) Álvarez, S.; Álvarez, R.; Khanwalkar, H.; Germain, P.; Lemaire, G.; Rodriguez-Barrios, F.; Gronemeyer, H.; de Lera, A. R. *Bioorg. Med. Chem.* **2009**, 17, 4345.
(h) Patel, D. V.; Gless, R. D. J.; Webb, H.; Heather, K.; Anandan, S. K.; Aavula, B. R. *WO 2008073623*, **2008** [*Chem. Abstr.* **2008**, 149, 79227].
(i) Crowley, C. A.; Delaet, N. G. J.; Ernst, J.; Grove, C. G.; Hepburn, B.; King, B.; Larson, C. J.; Miller, S.; Pryor, K.; Shuster, L. J. *WO 2007146712*, **2007** [*Chem. Abstr.* **2007**, 148, 70192].
(j) Knust, H.; Nettekoven, M.; Pinard, E.; Roche, O.; Rogers-Evans, M. *WO 2009016087*, **2009** [*Chem. Abstr.* **2009**, 150, 213994].
- [2] (a) Dubowchik, G. M.; Ditta, J. L.; Herbst, J. J.; Bollini, S.; Vinitsky, A. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2000**, 10, 559.
(b) Singh, R. P.; Shreeve, J. M. *J. Org. Chem.* **2003**, 68, 6063.
(c) Allais, C.; Constantieux, T.; Rodriguez, J. *Synthesis* **2009**, 2523.
(d) Mossetti, R.; Pirali, T.; Tron, G. C.; Zhu, J. *Org. Lett.* **2010**, 12, 820.
(e) El Kaim, L.; Gamez-Montano, R.; Grimaud, L.; Ibarra-Rivera, T. *Chem. Commun.* **2008**, 11, 1350.
- [3] (a) Liu, J.; Zhang, R.; Wang, S.; Sun, W.; Xia, C. *Org. Lett.* **2009**, 11, 1321.
(b) Murphy, E. R.; Martinelli, J. R.; Zaborenko, N.; Buchwald, S. L.; Jensen, K. F. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2007**, 46, 1734.
(c) Iizuka, M.; Kondo, Y. *Chem. Commun.* **2006**, 42, 1739.
- [4] (a) Zhang, C.; Jiao, N. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, 132, 28.
(b) Deshidi, R.; Kumar, M.; Devari, S.; Shah, B. A. *Chem. Commun.* **2014**, 50, 9533.
(c) Al-Rashid, Z. F.; Johnson, W. L.; Hsung, R. P.; Wei, Y.; Yao, P.-Y.; Liu, R.; Zhao, K. J. *Org. Chem.* **2008**, 73, 8780.
- [5] (a) Zhang, X.; Yang, W.; Wang, L. *Org. Biomol. Chem.* **2013**, 11, 3649.
(b) Wang, H.; Guo, L.-N.; Duan, X.-H. *Org. Biomol. Chem.* **2013**, 11, 4573.
(c) Chiba, S.; Zhang, L.; Lee, J.-Y. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, 132, 7266.
(d) Du, B.; Jin, B.; Sun, P. *Org. Biomol. Chem.* **2014**, 12, 4586.
- [6] (a) Zhang, C.; Zong, X.; Zhang, L.; Jiao, N. *Org. Lett.* **2012**, 14, 3280.
(b) Mupparapu, N.; Khan, S.; Battula, S.; Kushwaha, M.; Gupta, A. P.; Ahmed, Q. N.; Vishwakarma, R. A. *Org. Lett.* **2014**, 16, 1152.
- [7] Song, B.; Wang, S.; Sun, C.; Deng, H.; Xu, B. *Tetrahedron Lett.* **2007**, 48, 8982.
- [8] (a) Zhang, X.; Wang, L. *Green Chem.* **2012**, 14, 2141.
(b) Wei, W.; Shao, Y.; Hu, H.; Zhang, F.; Zhang, C.; Xu, Y.; Wan, X. *J. Org. Chem.* **2012**, 77, 7157.
(c) Lamani, M.; Prabhu, K. R. *Chem. Eur. J.* **2012**, 18, 14638.
(d) Zhang, Z.; Su, J.; Zha, Z.; Wang, Z. *Chem. Commun.*, **2013**, 49, 8982.
(e) Zhao, Q.; Miao, T.; Zhang, X.; Zhou, W.; Wang, L. *Org. Biomol. Chem.* **2013**, 11, 1867.
(f) Duan, F.-T.; Ji, J.-X. *Chem. Sci.* **2012**, 3, 460.
(g) Zhang, J.; Wei, Y.; Lin, S.; Liang, F.; Liu, P. *Org. Biomol. Chem.* **2012**, 10, 9237.
- [9] (a) Zhang, X.; Wang, M.; Zhang, Y.; Wang, L. *RSC Adv.* **2013**, 3, 1311.
(b) Chen, W.; Li, J.; Meng, X.; Tang, D.; Guo, S.; Chen, B. *Tetrahedron Lett.* **2013**, 54, 295.
- [10] Lu, L.; Guo, S.; Xiong, Q.; Liu, S.; Li, X.; Cai, H. *Synthesis* **2014**, 46, 2445.
(b) Guo, S.; Lu, L.; Gong, J.; Zhu, Z.; Xu, F.; Wei, Z.; Cai, H. *Org. Biomol. Chem.* **2015**, 13, 4426.
(c) Guo, S.; Zhu, Z.; Lu, L.; Zhang, W.; Gong, J.; Cai, H. *Synlett* **2015**, 26, 543.

(Li, L.; Fan, Y.)