氯化铜促进的吲哚的傅-克羟烷基化反应

展 震 张国尧 程 旭 吕光辉
郑 阳 海 俐* 吴 勇*

(四川大学华西药学院 成都 610041)

摘要 探索了氯化铜促进下,以 1,4-二氧六环为溶剂,在室温条件下,通过芳基乙二醛和吲哚的傅-克羟烷基化反应,合成吲哚基- α -酮醇的方法.该方法具有高效、环保、成本低、操作简便等特点.

关键词 路易斯酸;傅-克羟烷基化;芳基乙二醛;吲哚

CuCl₂-Promoted Friedel-Crafts Hydroxyalkylations of IndolesZhan, Zhen Zhang, Guoyao Cheng, Xu Lü, Guanghui
Zheng, Yang Hai, Li* Wu, Yong*

(West China School of Pharmacy, Sichuan University, Chengdu 610041)

Abstract An Friedel-Crafts hydroxyalkylations reaction was explored for the synthesis of indolyl α -acyloins by treating arylglyoxals, indoles and copper chloride at room temperature in 1,4-dioxane. The method is highly efficient, environmental, low cost and concise manipulation.

Keywords Lewis acid; Friedel-Crafts hydroxyalkylations; arylglyoxals; indoles

吲哚及其衍生物在有机合成及药物化学领域是应用最为广泛的中间体之一^[1],它们能够表现出多种不同的生理特性和药理活性^[2].吲哚基- α -酮醇是一类十分重要的吲哚类衍生物,广泛存在于各种生物活性物质的基本骨架中,比如溶瘤细胞类药物^[3]、前列腺素内过氧化物合酶 2(PTGS2)抑制剂^[4]、减肥药^[5]以及逆转录酶抑制剂^[6]等(图 1).因此,关于这类化合物的合成探索一直是有机合成领域的热点.目前为止,已有的合成方法主要包括:3-草酰基吲哚的还原反应^[7]、吲哚与 2-(二甲基亚胍基)丙醛的偶联反应^[8]、吲哚与丁二酮衍生物的加成反应^[9]、吲哚与乙醛酸酯类化合物的加成反应^[10].然而,这些已有方法仍存在一些问題,比如剧烈的反应条件、昂贵的反应试剂、难以制备的原料、有限的底物适用性等.所以,寻找一种能够更加温和、简便、高效的合成吲哚基- α -酮醇类化合物的方法具有很大的研究价值和意义.

傅-克羟烷基化反应已经成为有机合成中生成碳-碳键最基本的方法之一^[11].与其他的能进行傅-克羟烷基化反应的芳香体系相比,吲哚凭借其在材料科学^[12]、农用

图 1 包含有吲哚基- α -酮醇结构的生物活性分子

Figure 1 Biologically active molecules containing an indolyl α -acyloin moiety

化学品^[13]以及药品^[14]中的广泛应用获得了科学家们更多的关注.另一方面,同其他缺电子的羰基化合物相比,

* E-mail: smile@scu.edu.cn; wyong@scu.edu.cn

Received July 4, 2015; revised August 22, 2015; published online August 26, 2015.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 81373259, 81573286).

国家自然科学基金(Nos. 81373259, 81573286)资助项目.

苯甲酰甲醛的研究相对较少. 目前为止, 仅有两篇文献报道了用苯甲酰甲醛与吲哚反应可以得到吲哚基- α -酮醇类化合物^[15]. 并且, 这两篇文献用的是相同的反应条件, 均采用了剧毒的苯作为反应溶剂, 都存在收率不高、官能团适用性差等问题. 本文报道了一种全新的以苯甲酰甲醛和吲哚为原料, 通过酸催化的傅-克烷基化反应高效的合成吲哚基- α -酮醇的方法(Scheme 1).

图式 1 合成吲哚基- α -酮醇的已有途径和我们的方法

Scheme 1 Existed routes and our strategy to indolyl α -acyloins

1 结果与讨论

1.1 反应条件的优化

我们以路易斯酸催化的苯甲酰甲醛(**1a**)和吲哚(**2a**)的反应为模型反应, 对反应的物料比、路易斯酸种类、溶剂和反应温度等条件进行了优化, 结果列于表 1.

首先考察了不同路易斯酸对反应收率的影响. 由表 1 数据可知, 当选用酸性较强的路易斯酸(比如 AlCl_3 、 FeCl_3 、 SnCl_4 、 $\text{In}(\text{OTf})_3$)为催化剂时, 反应产物是混合物, 且双吲哚化合物 **4** 为主产物(表 1, Entries 1~4). 尤其是选用 TiCl_4 为催化剂时, 只能得到双吲哚产物(表 1, Entry 5). 与之相反, 相对较弱的路易斯酸($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、 CuI 、 CuCl_2)作催化剂, 反应只会得到单吲哚化合物 **3aa**(表 1, Entries 6~10). 其中 CuCl_2 的催化效果最好, 单吲哚产物的收率达 79%(表 1, Entry 10). 且增加 CuCl_2 的用量, 目标产物的收率并没有显著增加(表 1, Entry 11). 在此基础上, 我们又探索了温度对反应的影响, 研究表明, 升高温度对反应不利(表 1, Entries 12, 13).

之后, 我们考察了反应的物料比对反应产率的影响. 由表 1 可以看出, 随着 **1a** 和 **2a** 的物质的量比减小,

表 1 反应条件优化^a

Table 1 Optimization of the reaction conditions^a

Entry	1a : 2a	Lewis acid	Solvent	Temp./°C	Yield ^b /%	
					3aa	4
1	1 : 1	AlCl_3	Dioxane	25	30	62
2	1 : 1	FeCl_3	Dioxane	25	36	59
3	1 : 1	SnCl_4	Dioxane	25	11	71
4	1 : 1	$\text{In}(\text{OTf})_3$	Dioxane	25	16	70
5	1 : 1	TiCl_4	Dioxane	25	0	77
6	1 : 1	$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	Dioxane	25	43	0
7	1 : 1	$\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Dioxane	25	51	0
8	1 : 1	$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Dioxane	25	59	0
9	1 : 1	CuI	Dioxane	25	73	0
10	1 : 1	CuCl_2	Dioxane	25	79	0
11 ^c	1 : 1	CuCl_2	Dioxane	25	80	0
12	1 : 1	CuCl_2	Dioxane	50	41	43
13	1 : 1	CuCl_2	Dioxane	80	17	69
14	1 : 2	CuCl_2	Dioxane	25	82	0
15	1 : 3	CuCl_2	Dioxane	25	88	0
16	1 : 5	CuCl_2	Dioxane	25	86	0
17	1 : 3	CuCl_2	EA	25	77	0
18	1 : 3	CuCl_2	THF	25	81	0
19	1 : 3	CuCl_2	CH_3CN	25	73	0
20	1 : 3	CuCl_2	DMSO	25	47	39
21	1 : 3	CuCl_2	DCM	25	69	0
22 ^d	1 : 1	—	Benzene	25	64	7

^a Reaction condition: **1a** (1 mmol), **2a** (1 mmol) and Lewis acid (0.1 mmol) in 2 mL solvent at corresponding temperature, 15 min; ^b isolated yield; ^c CuCl_2 (0.5 mmol); ^d reaction conducted under method A (Ref. 15): **1a** (5 mmol), **2a** (5 mmol) in benzene (8 mL), r.t., 12 h.

化合物 **3aa** 的产率逐渐升高. 当 **1a** 和 **2a** 的物质的量比变为 1 : 3 时, 化合物 **3aa** 的产率可达到 88%, 继续减小 **1a** 的量, 化合物 **3aa** 的产率反而有所下降(表 1, Entries 14~16). 溶剂对反应的发生也有显著的影响. 由表 1 可以看出, 在 *N,N*-二甲基甲酰胺(DMSO)、 CH_2Cl_2 (DCM)、 CH_3CN 、 $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ (EA)中目标化合物收率不高; 在四氢呋喃(THF)中以 81%的产率生成 **3aa**; 以 1,4-二氧六环为溶剂时, 化合物 **3aa** 的产率最高, 达到 88%(表 1, Entries 15~21). 与此同时, 我们尝试了用已报道^[15]的方法(Scheme 1, Method A)来合成化合物 **3aa**, 即便反应时间延长至 12 h, 收率也仅有 64%, 同时还得到 7%收率的双吲哚产物(表 1, Entry 22).

我们最终确定生成 **3aa** 的最佳反应条件为: **1a** (1 mmol)、**2a** (3 mmol)和 CuCl_2 (0.1 mmol)在 1,4-二氧六环 (2 mL)中室温条件下反应 15 min.

1.2 反应底物拓展

在上述最佳反应条件下, 我们对该反应的底物适用范围进行了拓展, 得到了一系列的吲哚基- α -酮醇类化合物.

首先, 探究了氯化铜促进下各种芳基乙二醛与吲哚的反应, 反应结果见表 2. 结果表明, 芳香乙二醛无论在苯环上连有吸电子基团还是供电子基团, 在最佳反应条件下都能以很高的产率得到相应的吲哚基- α -酮醇类化合物, 说明苯环上的电子效应对该反应影响不大. 此外, 其他的化学合成中经常用到的萘环、杂环(如 2-噻吩甲酰甲醛)也表现出较高活性, 仅需 15 min 原料即可反应完全, 收率达 80%以上. 同时, 我们也用已报道^[15]的方法(Scheme 1, Method A)尝试合成化合物 **3ba**~**3ka**, 结果表明所有化合物的收率均低于 50%. 最重要的是, 采用已有方法无法得到化合物 **3ba**、**3ia**、**3ja**, 而在我们的最佳条件下这三个化合物的收率均为 80%以上.

然后, 又探索了氯化铜促进下不同芳基乙二醛与各类吲哚的反应, 反应结果见表 3. 结果表明, 无论吲哚环上连有吸电子基团还是供电子基团, 在最佳反应条件下目标化合物的收率都很高, 说明吲哚上的电子效应对该转化的影响也不大. 与单纯的吲哚 **2a** 相比 N-甲基保护吲哚的反应活性并无明显提高, 相应的反应产物 **3ad** 的收率为 92%. 研究结果还表明, 我们的反应条件能以较

高收率(>80%)适用于大部分常见的官能团, 比如硝基、羟基、卤素、醚等. 需要注意的是, 虽然已报道^[15]的方法(Scheme 1, Method A)也能得到这些化合物, 但收率比较低, 尤其以化合物 **3gb** 收率最低, 仅有 17%.

综上所述, 吲哚基- α -酮醇类化合物是一类十分重要的杂环化合物的合成中间体. 例如, 化合物 **3aa** 可以与苯甲醛反应得到咪唑类化合物 **5**, 收率为 63% (Eq. 1).

2 结论

总之, 本文提供了一种全新、高效的通过吲哚 3 位的傅-克羟烷基化反应合成吲哚基- α -酮醇类化合物的方法. 本条件适用于多种芳香族乙二醛和吲哚类化合物, 并具有很广泛的官能团适用性. 同时, 该方法条件温和、操作简便、反应迅速、价格低廉且绿色环保, 为吲哚基- α -酮醇类化合物的合成提供了全新的思路, 为以后吲哚类化合物的研究提供了重要借鉴.

表 2 吲哚和各种芳基乙二醛的傅-克羟烷基化反应^a

Table 2 The Friedel-Crafts hydroxyalkylation of indole with various arylglyoxals

^a Reaction condition: **1** (1 mmol), **2a** (3 mmol) and CuCl_2 (0.1 mmol) in 2 mL solvent at 25 °C, 15 min. ^b Isolated yield. ^c Isolated yield of method A (Ref. [15]): **1** (5 mmol), **2a** (5 mmol) in benzene (8 mL), r.t., 12 h.

表 3 不同吲哚和芳乙二醛间的傅-克羟烷基化反应^a

Table 3 The Friedel-Crafts hydroxyalkylation of indoles with arylglyoxals

^a Reaction condition: **1** (1 mmol), **2** (3 mmol) and CuCl₂ (0.1 mmol) in 2 mL solvent at 25 °C, 15 min. ^b Isolated yield. ^c Isolated yield of method A (Ref. [15]): **1** (5 mmol), **2a** (5 mmol) in benzene (8 mL), r.t., 12 h.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

核磁共振图谱用 Bruker Avance 400 MHz 型或 600 MHz 型核磁共振仪测定, 以氘代氯仿或氘代二甲基亚砜作为溶剂, 四甲基硅烷(TMS)为内标; 高分辨质谱用 Bruker APEX II 傅里叶变换离子回旋共振质谱仪测定, ESI 源; 熔点用显微熔点测定仪测定, 温度未校正; CLJBQ-3 型恒温磁力搅拌器(郑州长城科工贸有限公司); EYELA 型旋转蒸发仪(东京理化器械独资工厂); FA2104 型电子天平(上海恒平科学仪器有限公司)。化合物 **1** 按照文献[16]方法制备, 其它试剂均为国产分析纯。

3.2 实验方法

3.2.1 化合物 **3** 的合成

在 10 mL 圆底烧瓶中依次加入氯化铜(0.1 mmol)、芳基乙二醛 **1** (1.0 mmol)、吲哚 **2** (3.0 mmol)和溶剂 1,4-二氧六环(2.0 mL), 室温搅拌。TLC 检测醛反应完全后, 向反应液中加入 10 mL 水, 然后用乙酸乙酯萃取(10 mL×3), 收集有机相, 无水硫酸钠干燥, 减压蒸馏除去溶剂得粗品。最后经柱层析分离纯化得纯品 **3**。

2-羟基-2-(1*H*-吲哚-3-基)-1-苯乙酮(**3aa**): 白色固体, 产率 90%。m.p. 169~171 °C; ¹H NMR (600 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 11.05 (s, 1H), 7.99 (d, *J*=7.8 Hz, 2H), 7.62

(d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.51 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.40 (t, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.33 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.31 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.05 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.97 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.35 (d, $J=6.0$ Hz, 1H), 5.22 (d, $J=5.4$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 199.2, 136.5, 135.1, 133.1, 128.7, 128.7, 128.6, 125.8, 121.5, 119.5, 119.2, 113.5, 111.8, 69.6. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{13}\text{NNaO}_2$ [$\text{M} + \text{Na}^+$] 274.0838, found 274.0841.

2-羟基-2-(5-溴-1*H*-吡啶-3-基)-1-苯乙酮(**3ab**): 白色固体, 产率 86%. m.p. 128~132 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.27 (s, 1H), 8.02 (d, $J=7.2$ Hz, 2H), 7.81 (s, 1H), 7.53 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.42 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.29 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.16 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 6.38 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 6.65 (d, $J=5.6$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 199.0, 135.2, 135.0, 133.3, 128.7, 128.7, 127.6, 126.7, 124.0, 121.9, 113.8, 113.2, 111.8, 69.3. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{BrNNaO}_2$ [$\text{M} + \text{Na}^+$] 351.9944, found 351.9946.

2-羟基-2-(5-羟基-1*H*-吡啶-3-基)-1-苯乙酮(**3ac**): 白色固体, 产率 86%. m.p. 190~194 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.74 (s, 1H), 9.00 (s, 1H), 8.39 (d, $J=3.2$ Hz, 1H), 7.57 (d, $J=2.0$ Hz, 1H), 7.50 (d, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.30 (t, $J=7.2$ Hz, 2H), 7.24~7.20 (m, 2H), 6.67 (dd, $J=2.0, 8.4$ Hz, 1H), 5.81 (d, $J=6.0$ Hz, 1H), 5.73 (d, $J=5.6$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 198.6, 155.1, 135.6, 133.2, 130.1, 129.0, 128.8, 128.7, 123.8, 113.3, 113.0, 112.3, 105.4, 69.7. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{13}\text{NNaO}_3$ [$\text{M} + \text{Na}^+$] 290.0788, found 290.0789.

2-羟基-2-(1-甲基-1*H*-吡啶-3-基)-1-苯乙酮(**3ad**): 黄色固体, 产率 92%. m.p. 128~130 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 8.00 (d, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.67 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.51 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.40 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.38~7.32 (m, 2H), 6.36 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 5.56 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 3.70 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 198.8, 137.8, 136.9, 133.2, 128.9, 128.7, 127.6, 126.8, 123.0, 120.1, 119.2, 113.5, 111.3, 69.1, 32.6. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{NNaO}_2$ [$\text{M} + \text{Na}^+$] 288.0995, found 288.0998.

2-羟基-2-(2-甲基-1*H*-吡啶-3-基)-1-苯乙酮(**3ae**): 黄色固体, 产率 90%. m.p. 158~160 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 10.95 (s, 1H), 7.86 (d, $J=7.2$ Hz, 2H), 7.47 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.37 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.18 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.98~6.89 (m, 2H), 6.34 (d, $J=4.8$ Hz, 1H), 5.30 (d, $J=4.8$ Hz, 1H), 2.41 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 198.7, 135.8, 135.2, 133.2, 131.8,

128.7, 128.6, 127.4, 122.0, 119.8, 119.1, 113.2, 111.4, 69.1, 11.9. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{NNaO}_2$ [$\text{M} + \text{Na}^+$] 288.0995, found 288.1000.

2-羟基-2-(1*H*-吡啶-3-基)-1-(4-硝基苯基)乙酮(**3ba**): 黄色固体, 产率 84%. m.p. 162~166 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.10 (s, 1H), 8.20 (s, 4H), 7.59 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.36 (d, $J=1.6$ Hz, 1H), 7.31 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.06 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.00 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.38 (d, $J=5.2$ Hz, 1H), 5.78 (d, $J=5.2$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 198.6, 149.3, 141.2, 135.9, 129.1, 126.8, 123.8, 122.9, 122.0, 120.7, 119.1, 111.8, 110.2, 69.5. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{NaO}_4$ [$\text{M} + \text{Na}^+$] 319.0689, found 319.0691.

2-羟基-2-(5-溴-1*H*-吡啶-3-基)-1-(4-硝基苯基)乙酮(**3bb**): 黄色固体, 产率 85%. m.p. 117~119 °C; ^1H NMR (600 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.31 (s, 1H), 8.22 (s, 4H), 7.78 (s, 1H), 7.44 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.29 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.18 (dd, $J=1.6, 8.8$ Hz, 1H), 6.40 (d, $J=5.2$ Hz, 1H), 5.89 (d, $J=5.2$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 198.8, 150.1, 141.7, 135.8, 129.1, 129.0, 126.5, 123.9, 122.8, 120.6, 118.0, 112.7, 111.9, 69.5. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{11}\text{BrN}_2\text{NaO}_4$ [$\text{M} + \text{Na}^+$] 396.9794, found 396.9801.

2-羟基-2-(2-甲基-1*H*-吡啶-3-基)-1-(4-硝基苯基)乙酮(**3bc**): 黄色固体, 产率 91%. m.p. 145~147 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 10.99 (s, 1H), 8.18 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 8.05 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.45 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.17 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.97~6.89 (m, 2H), 6.40 (d, $J=4.4$ Hz, 1H), 5.52 (d, $J=4.8$ Hz, 1H), 2.41 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 198.7, 149.6, 141.1, 135.3, 134.9, 129.2, 126.6, 123.7, 120.6, 119.1, 118.2, 110.8, 107.7, 69.3, 11.8. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{NaO}_4$ [$\text{M} + \text{Na}^+$] 333.0846, found 333.0848.

2-羟基-2-(1*H*-吡啶-3-基)-1-(4-甲氧基苯基)乙酮(**3ca**): 白色固体, 产率 85%. m.p. 119~121 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.04 (s, 1H), 8.00 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 7.61 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.33 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.30 (s, 1H), 7.05 (t, $J=6.8$ Hz, 1H), 6.97 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.92 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 6.29 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 5.42 (d, $J=6.0$ Hz, 1H), 3.76 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 119.6, 163.1, 136.5, 131.1, 131.0, 127.7, 125.0, 121.5, 119.5, 119.1, 114.0, 113.8, 111.8, 69.4, 55.6; ESI HRMS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{NNaO}_3$ [$\text{M} + \text{Na}^+$] 304.0944, found 304.0949.

2-羟基-2-(6-氯-1*H*-吡啶-3-基)-1-(4-甲氧基苯基)乙

酮(**3cb**): 白色固体, 产率 87%. m.p. 160~162 °C; ^1H NMR (600 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.17 (s, 1H), 7.99 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 7.61 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.39~7.36 (m, 2H), 6.99 (dd, $J=1.8, 9.0$ Hz, 1H), 6.92 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 6.28 (d, $J=6.0$ Hz, 1H), 5.51 (d, $J=5.4$ Hz, 1H), 3.76 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 197.5, 163.1, 136.9, 131.1, 129.1, 128.4, 126.0, 124.6, 120.9, 119.4, 114.3, 113.9, 111.4, 69.2, 55.6. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{ClNNaO}_3$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 338.0554, found 338.0560.

2-羟基-1-(4-甲氧基苯基)-2-(2-甲基-1*H*-吡啶-3-基)乙酮(**3cc**): 粉色固体, 产率 88%. m.p. 176~180 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.94 (s, 1H), 7.85 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 7.46 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.19 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.97~6.93 (m, 1H), 6.90~6.87 (m, 3H), 6.26 (d, $J=4.8$ Hz, 1H), 5.18 (d, $J=4.8$ Hz, 1H), 3.73 (s, 3H), 2.08 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 198.0, 163.0, 136.2, 131.0, 130.2, 127.6, 122.6, 119.6, 119.1, 114.7, 113.0, 111.9, 69.2, 55.7, 11.9. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{NNaO}_3$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 318.1101, found 318.1103.

2-羟基-2-(1*H*-吡啶-3-基)-1-(3-甲氧基苯基)乙酮(**3da**): 白色固体, 产率 84%. m.p. 134~136 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.05 (s, 1H), 7.63 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.58 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.47 (s, 1H), 7.33~7.29 (m, 3H), 7.09~7.04 (m, 2H), 6.98 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.35 (d, $J=6.0$ Hz, 1H), 5.51 (d, $J=6.0$ Hz, 1H), 3.72 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 198.9, 159.3, 136.5, 129.8, 125.8, 121.2, 121.5, 121.1, 121.0, 119.4, 119.3, 119.2, 118.9, 113.5, 111.8, 69.6, 55.4. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{NNaO}_3$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 304.0944, found 304.0950.

2-羟基-2-(5-溴-1*H*-吡啶-3-基)-1-(3-甲氧基苯基)乙酮(**3db**): 白色固体, 产率 85%. m.p. 152~154 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.07 (s, 1H), 7.70 (s, 1H), 7.64 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.45 (s, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.30~7.28 (m, 3H), 7.19 (dd, $J=1.6$ Hz, 8.8 Hz, 1H), 6.67 (d, $J=6.0$ Hz, 1H), 5.59 (d, $J=6.0$ Hz, 1H), 3.72 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 199.3, 160.9, 136.2, 135.8, 130.1, 129.7, 125.8, 124.0, 122.9, 120.1, 121.6, 120.8, 119.8, 114.5, 112.8, 69.9, 56.0. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{BrNNaO}_3$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 382.0049, found 382.0051.

2-羟基-2-(6-氯-1*H*-吡啶-3-基)-1-(3-甲氧基苯基)乙酮(**3dc**): 白色固体, 产率 81%. m.p. 139~141 °C; ^1H NMR (600 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.06 (s, 1H), 7.64 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.60 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.39 (d, $J=1.8$ Hz, 1H), 7.37 (d, $J=1.2$ Hz, 1H), 7.31~7.29 (m, 2H), 7.09 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 6.99 (dd, $J=1.8, 9.0$ Hz, 1H), 6.60 (d, $J=$

6.0 Hz, 1H), 5.58 (d, $J=6.0$ Hz, 1H), 3.72 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 199.1, 161.1, 136.7, 129.9, 129.0, 126.1, 124.0, 122.6, 122.0, 121.8, 121.3, 120.6, 119.5, 113.7, 112.0, 69.9, 56.8. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{ClNNaO}_3$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 338.0554, found 338.0558.

2-羟基-2-(1*H*-吡啶-3-基)-1-(4-甲氧基苯基)乙酮(**3ea**): 白色固体, 产率 81%. m.p. 144~146 °C; ^1H NMR (600 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.03 (s, 1H), 7.90 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.60 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.32~7.30 (m, 2H), 7.19 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 7.04 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.97 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.32 (d, $J=5.4$ Hz, 1H), 5.46 (d, $J=5.4$ Hz, 1H), 2.27 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 198.8, 143.5, 136.5, 132.5, 129.2, 128.8, 125.5, 125.0, 121.5, 119.4, 119.1, 113.7, 111.7, 69.5, 21.3. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{NNaO}_2$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 288.0995, found 288.0999.

2-羟基-2-(5-溴-1*H*-吡啶-3-基)-1-(4-甲氧基苯基)乙酮(**3eb**): 黄色固体, 产率 87%. m.p. 150~152 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.24 (s, 1H), 7.92 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.79 (d, $J=2.0$ Hz, 1H), 7.42 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.28 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.21 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.16 (dd, $J=2.0, 8.8$ Hz, 1H), 6.34 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 5.58 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 2.29 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 198.6, 143.7, 135.2, 132.4, 129.3, 128.8, 129.3, 128.9, 128.8, 126.8, 123.9, 122.0, 121.9, 113.8, 111.8, 69.2, 21.3. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{BrNNaO}_2$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 366.0100, found 366.0102.

2-羟基-2-(6-氯-1*H*-吡啶-3-基)-1-(4-甲氧基苯基)乙酮(**3ec**): 白色固体, 产率 85%. m.p. 158~162 °C; ^1H NMR (600 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.16 (s, 1H), 7.89 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 7.60 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.39~7.35 (m, 2H), 7.20 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 7.00 (dd, $J=1.2, 8.4$ Hz, 1H), 6.32 (d, $J=5.4$ Hz, 1H), 5.55 (d, $J=6.0$ Hz, 1H), 2.28 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 198.4, 143.1, 135.9, 132.6, 128.9, 128.8, 128.6, 126.1, 123.8, 121.9, 121.7, 113.1, 112.0, 69.1, 21.2. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{ClNNaO}_2$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 322.0605, found 322.0608.

2-羟基-2-(2-甲基-1*H*-吡啶-3-基)-1-(4-甲氧基苯基)乙酮(**3ed**): 白色固体, 产率 89%. m.p. 182~184 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.93 (s, 1H), 7.76 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.46 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.18~7.15 (m, 2H), 6.96~6.87 (m, 2H), 6.29 (d, $J=4.8$ Hz, 1H), 5.22 (d, $J=4.8$ Hz, 1H), 2.40 (s, 3H), 2.25 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 198.7, 143.2, 136.4, 133.9, 132.3, 129.2, 128.9, 126.5, 121.6, 120.0, 119.2, 112.9, 111.9, 69.4, 21.3, 11.9. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{NNaO}_2$ [$\text{M}+$

Na^+] 302.1151, found 302.1153.

1-(4-氯苯基)-2-羟基-2-(1*H*-吡啶-3-基)乙酮(**3fa**): 白色固体, 产率 87%. m.p. 134~138 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.07 (s, 1H), 8.01 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.59 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.47 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.33 (d, $J=2.8$ Hz, 1H), 7.30 (s, 1H), 7.06 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.97 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.31 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 5.62 (d, $J=5.6$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 197.9, 138.0, 135.3, 133.9, 131.0, 129.1, 128.1, 123.8, 121.9, 119.0, 113.0, 112.1, 111.2, 69.1. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{ClNNaO}_2$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 308.0449, found 308.0453.

2-(5-溴-1*H*-吡啶-3-基)-1-(4-氯苯基)-2-羟基乙酮(**3fb**): 粉红色固体, 产率 84%. m.p. 106~108 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.28 (s, 1H), 8.03 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 7.78 (s, 1H), 7.49 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.42 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.29 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.17 (dd, $J=1.6$, 8.4 Hz, 1H), 6.33 (d, $J=4.4$ Hz, 1H), 5.73 (d, $J=5.2$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 198.0, 138.1, 135.2, 133.7, 130.7, 129.1, 128.8, 126.7, 124.0, 121.9, 113.8, 112.9, 111.8, 69.6. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{11}\text{BrClNNaO}_2$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 385.9554, found 385.9556.

2-(6-氯-1*H*-吡啶-3-基)-1-(4-氯苯基)-2-羟基乙酮(**3fc**): 白色固体, 产率 87%. m.p. 137~140 °C; ^1H NMR (600 MHz, CDCl_3) δ : 8.22 (br s, 1H), 7.87 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 7.55 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.33 (s, 1H), 7.31 (d, $J=4.8$ Hz, 1H), 7.11 (dd, $J=1.8$, 9.0 Hz, 1H), 7.08 (d, $J=1.8$ Hz, 1H), 6.20 (s, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 198.1, 138.2, 137.8, 135.0, 130.8, 128.7, 128.0, 126.5, 124.1, 122.3, 121.0, 113.2, 111.7, 68.9. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{11}\text{Cl}_2\text{NNaO}_2$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 342.0059, found 342.0062.

1-(3-氯苯基)-2-羟基-2-(1*H*-吡啶-3-基)乙酮(**3ga**): 白色固体, 产率 88%. m.p. 148~150 °C; ^1H NMR (600 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.09 (s, 1H), 7.98 (s, 1H), 7.95 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.60 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.58 (dd, $J=1.8$, 8.4 Hz, 1H), 7.43 (t, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.35 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.32 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.06 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.98 (t, $J=7.8$ Hz, 1H), 6.34 (d, $J=6.0$ Hz, 1H), 5.66 (d, $J=5.4$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 194.1, 141.9, 137.1, 135.9, 133.0, 130.0, 127.8, 127.4, 126.2, 124.0, 122.0, 121.5, 119.2, 112.8, 111.9, 75.7. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{ClNNaO}_2$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 308.0449, found 308.0453.

2-(6-氯-1*H*-吡啶-3-基)-1-(3-氯苯基)-2-羟基乙酮(**3gb**): 白色固体, 产率 87%. m.p. 132~134 °C; ^1H NMR (600 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.29 (s, 1H), 8.01 (d, $J=1.8$ Hz, 1H), 7.96 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.80 (d, $J=1.8$ Hz, 1H), 7.60

(dd, $J=1.2$, 8.4 Hz, 1H), 7.47~7.43 (m, 2H), 7.30 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.17 (dd, $J=1.8$, 8.4 Hz, 1H), 6.37 (d, $J=5.4$ Hz, 1H), 5.77 (d, $J=5.4$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 194.2, 143.9, 137.0, 136.1, 133.1, 130.3, 127.8, 127.5, 126.7, 125.6, 124.9, 122.8, 122.5, 113.3, 112.2, 75.8. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{11}\text{Cl}_2\text{NNaO}_2$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 342.0059, found 342.0061.

2-羟基-1-(4-羟基苯基)-2-(1*H*-吡啶-3-基)乙酮(**3ha**): 白色固体, 产率 80%. m.p. 200~202 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 10.94 (s, 1H), 10.26 (s, 1H), 7.77 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.60 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.30~7.29 (m, 2H), 7.02 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.96 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.70 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 6.22 (d, $J=5.2$ Hz, 1H), 5.14 (d, $J=5.2$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 197.8, 162.3, 135.9, 130.9, 129.8, 128.2, 125.0, 120.8, 118.9, 118.0, 115.5, 113.9, 112.1, 68.3. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{13}\text{NNaO}_3$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 290.0788, found 290.0793.

2-羟基-1-(4-羟基苯基)-2-(2-甲基-1*H*-吡啶-3-基)乙酮(**3hb**): 红色固体, 产率 83%. m.p. 214~216 °C; ^1H NMR (600 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 10.93 (s, 1H), 10.26 (s, 1H), 7.76 (d, $J=9.0$ Hz, 1H), 7.44 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.18 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 6.94 (t, $J=7.8$ Hz, 1H), 6.88 (t, $J=7.8$ Hz, 1H), 6.70 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 6.20 (d, $J=5.4$ Hz, 1H), 5.11 (d, $J=5.4$ Hz, 1H), 2.42 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 197.7, 162.0, 135.3, 134.1, 130.8, 130.7, 126.8, 120.4, 119.0, 118.5, 115.3, 110.7, 109.6, 68.2, 11.9; ESI HRMS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{NNaO}_3$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 304.0944, found 304.0947.

1-(4-羟基苯基)-2-羟基-2-(1*H*-吡啶-3-基)乙酮(**3ia**): 白色固体, 产率 86%. m.p. 148~150 °C; ^1H NMR (600 MHz, CDCl_3) δ : 11.09 (br s, 1H), 8.42 (d, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.63 (d, $J=3.0$ Hz, 1H), 7.44~7.39 (m, 3H), 7.36~7.30 (m, 2H), 7.03 (t, $J=9.0$ Hz, 2H), 5.69 (s, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 198.3, 165.7, 135.4, 132.2, 131.0, 126.9, 124.6, 120.9, 120.1, 118.9, 115.8, 112.9, 109.2, 68.9. ESI HRMS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{FNNaO}_2$ [$\text{M}+\text{Na}^+$] 292.0744, found 292.2644.

2-(5-溴-1*H*-吡啶-3-基)-1-(4-氟苯基)-2-羟基乙酮(**3ib**): 黄色固体, 产率 87%. m.p. 76~78 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.27 (s, 1H), 8.11 (q, $J=6.8$ Hz, 2H), 7.90 (d, $J=1.6$ Hz, 1H), 7.43 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.30~7.23 (m, 3H), 7.17 (dd, $J=2.0$, 8.8 Hz, 1H), 6.33 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 5.70 (d, $J=5.2$ Hz, 1H), 2.41 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 198.5, 165.9, 135.4, 132.4, 131.1, 130.0, 126.1, 124.0, 121.2, 120.1, 115.7, 113.3,

112.8, 68.8. ESI HRMS calcd for $C_{16}H_{11}BrFNNaO_2$ $[M+Na^+]$ 369.9849, found 369.9865.

1-(4-氟苯基)-2-羟基-2-(2-甲基-1*H*-吡啶-3-基)乙酮(**3ic**): 黄色固体, 产率 91%. m.p. 146~148 °C; 1H NMR (600 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.96 (s, 1H), 7.94~7.92 (m, 2H), 7.21~7.18 (m, 3H), 6.95 (m, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.90 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.31 (d, $J=4.8$ Hz, 1H), 5.32 (d, $J=5.4$ Hz, 1H), 2.41 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 198.2, 165.6, 135.3, 132.3, 131.1, 126.8, 120.5, 119.0, 118.4, 115.8, 115.6, 110.8, 108.7, 68.8, 11.8. ESI HRMS calcd for $C_{17}H_{14}FNNaO_2$ $[M+Na^+]$ 306.0901, found 306.0903.

2-羟基-2-(1*H*-吡啶-3-基)-1-萘基乙酮(**3ja**): 白色固体, 产率 82%. m.p. 152~156 °C; 1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.05 (s, 1H), 8.75 (s, 1H), 8.03~8.00 (m, 2H), 7.90 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.71 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.62~7.54 (m, 2H), 7.43 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.30 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.06~6.97 (m, 2H), 6.55 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 5.59 (d, $J=5.2$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 199.1, 136.4, 135.0, 132.4, 130.3, 129.7, 128.8, 128.2, 127.8, 127.0, 125.8, 125.1, 124.4, 121.5, 119.5, 119.1, 113.6, 111.8, 69.7. ESI HRMS calcd for $C_{20}H_{15}NNaO_2$ $[M+Na^+]$ 324.0995, found 324.0998.

2-羟基-2-(2-甲基-1*H*-吡啶-3-基)-1-萘基乙酮(**3jb**): 黄色固体, 产率 86%. m.p. 155~158 °C; 1H NMR (600 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.94 (s, 1H), 8.56 (s, 1H), 7.96 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.89~7.96 (m, 3H), 7.60~7.57 (m, 2H), 7.54 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.16~7.14 (m, 1H), 6.93~6.92 (m, 2H), 6.52 (d, $J=4.2$ Hz, 1H), 5.38 (d, $J=4.2$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 199.2, 136.5, 135.1, 132.1, 131.4, 129.8, 128.6, 128.2, 127.9, 127.0, 125.8, 125.3, 124.2, 121.0, 119.7, 119.1, 113.4, 111.9, 69.6, 11.7; ESI HRMS calcd for $C_{21}H_{17}NNaO_2$ $[M+Na^+]$ 338.1151, found 338.1147.

2-羟基-2-(1*H*-吡啶-3-基)-1-噻吩乙酮(**3ka**): 黄色固体, 产率 91%. m.p. 178~180 °C; 1H NMR (600 MHz, DMSO- d_6) δ : 8.53 (s, 1H), 8.00 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.90 (d, $J=4.8$ Hz, 1H), 7.64 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.41 (d, $J=1.8$ Hz, 1H), 7.33 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.14 (t, $J=4.8$ Hz, 1H), 7.06 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.98 (t, $J=7.8$ Hz, 1H), 6.09 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 5.81 (d, $J=4.8$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 192.5, 141.0, 136.5, 134.8, 133.8, 128.6, 125.7, 125.0, 121.5, 119.6, 119.1, 113.8, 111.8, 71.0. ESI HRMS calcd for $C_{14}H_{11}NNaO_2S$ $[M+Na^+]$ 280.0403, found 280.0401.

3.2.2 化合物 5 的合成

在 50 mL 的圆底烧瓶中加入亚硫酸氢钠(0.104 g, 1 mmol)、乙酸铵(2.8 g, 40 mmol)、**3aa** (10 mmol)以及苯甲醛(12 mmol), 之后加入 20 mL 乙醇和水的混合液($V:V=1:1$), 混合物在 80 °C 进行反应. TLC 检测原料反应完全后, 反应液冷却至室温, 之后倒入 50 mL 冰水中搅拌 5 min, 有大量固体析出. 抽滤, 滤饼用水洗涤, 干燥得纯品 3-(2,4-二苯基-1*H*-咪唑-5-基)-1*H*-吡啶(**5**), 黄色固体, 产率 63%. m.p. 64~66 °C; 1H NMR (600 MHz, DMSO- d_6) δ : 12.55 (s, 1H), 11.48 (s, 1H), 8.08 (d, $J=7.2$ Hz, 2H), 7.63 (d, $J=7.2$ Hz, 3H), 7.50~7.45 (m, 3H), 7.39~7.33 (m, 2H), 7.19 (t, $J=7.2$ Hz, 2H), 7.15~7.07 (m, 3H); 6.95~6.92 (m, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, DMSO- d_6) δ : 180.1, 144.8, 136.3, 134.5, 129.0, 128.9, 128.3, 126.8, 126.7, 126.1, 125.7, 121.8, 119.9, 119.5, 112.1, 111.0. ESI HRMS calcd for $C_{23}H_{17}N_3Na$ $[M+Na^+]$ 358.1320, found 358.1322.

辅助材料(Supporting Information) 所合成产物的 1H NMR、 ^{13}C NMR 以及 HRMS 图谱. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] For example: Pedras, M. S. C.; Sarwar, M. G.; Suchy, M.; Adio, A. *M. Phytochemistry* **2006**, *67*, 1503.
- [2] (a) Mueller, R.; Mulani, I.; Basson, A. E.; Pribut, N.; Hassam, M.; Morris, L.; van Otterlo, W. A.; Pelly, S. C. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2014**, *24*, 4376.
(b) Sallam, A. A.; Ayoub, N. M.; Foudah, A. I.; Gissendanner, C. R.; Meyer, S. A.; El Sayed, K. A. *Eur. J. Med. Chem.* **2013**, *70*, 594.
(c) Yao, C.-H.; Song, J.-S.; Chen, C.-T. *Eur. J. Med. Chem.* **2012**, *55*, 32.
(d) Kashyap, M.; Kandekar, S.; Baviskar, A. T. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2013**, *23*, 934.
(e) Kimura, T.; Kanagaki, S.; Matsui, Y.; Imoto, M.; Watanabe, T.; Shibasaki, M. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 4418.
(f) Amir, M.; Javed, S. A.; Kumar, H. *Med. Chem. Res.* **2010**, *19*, 299.
- [3] Prathima, P. S.; Rajesh, P.; Rao, J. V.; Kailash, U. S.; Sridhar, B.; Rao, M. M. *Eur. J. Med. Chem.* **2014**, *84*, 155.
- [4] Singh, P.; Mittal, A.; Bhardwaj, A.; Kaur, S.; Kumar, S. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2008**, *18*, 85.
- [5] Rudnitskaya, A.; Huynh, K.; Toeroek, B.; Stieglitz, K. *J. Med. Chem.* **2009**, *52*, 878.
- [6] Han, X.; Ouyang, W.; Liu, B.; Wang, W.; Tien, P.; Wu, S.; Zhou, H. B. *Org. Biomol. Chem.* **2013**, *11*, 8463.
- [7] Collot, V.; Schmitt, M.; Marwah, P.; Bourguignon, J.-J. *Heterocycles* **1999**, *51*, 2823.
- [8] Mayring, L.; Severin, T. *Chem. Ber.* **1981**, *114*, 3863.
- [9] Ryang, H.-S.; Sakurai, H. *Chem. Commun.* **1972**, *2*, 77.
- [10] (a) Moran, W. J.; MacRory, K. L.; Rodriguez, A. *RSC Adv.* **2012**, *2*, 8962.

- (b) Lv, J.; Zhang, L.; Zhou, Y. M.; Nie, Z. X.; Luo, S. Z.; Cheng, J. P. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 6610.
- (c) Kashikura, W.; Itoh, J. J.; Mori, K. J.; Akiyama, T. *Chem. - Asian J.* **2010**, *5*, 470.
- (d) Hui, Y. H.; Zhang, Q.; Jiang, J.; Lin, L. L.; Liu, X. H.; Feng, X. M. *J. Org. Chem.* **2009**, *74*, 6878.
- (e) Dong, H.-M.; Lu, H.-H.; Lu, L.-Q.; Chen, C.-B.; Xiao, W.-J. *Adv. Synth. Catal.* **2007**, *349*, 1597.
- (f) Zhao, J. L.; Liu, L.; Zhang, H. B.; Wu, Y. C.; Wang, D.; Chen, Y. J. *Tetrahedron Lett.* **2006**, *47*, 2511.
- (g) Li, H. M.; Wang, Y. Q.; Deng, L. *Org. Lett.* **2006**, *8*, 4063.
- (h) Toeroek, B.; Abid, M.; London, G.; Esquibel, J.; Toeroek, M.; Mhadgut, S. C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2005**, *44*, 3086.
- [11] (a) Smith, M. B. *Organic Synthesis*, McGraw-Hill, New York, **1994**, 1313.
- (b) Heaney, H. In *Comprehensive Organic Synthesis*, Eds.: Trost, B. M.; Fleming, I., Pergamon, New York, **1991**, p. 733.
- (c) Roberts, R. M.; Khala, A. A. *Friedel-Crafts Alkylation Chemistry. A Century of Discovery*, Marcel Dekker, New York, **1984**.
- (d) Olah, G. A. *Friedel-Crafts Chemistry*, Wiley-Interscience, New York, **1973**.
- [12] Lo, K. K.-W.; Tsang, K. H.-K.; Hui, W.-K.; Zhu, N. *Chem. Commun.* **2003**, 2704.
- [13] Plimmer, J. R.; Gammon, D. W.; Ragsdale, N. N. *Encyclopedia of Agrochemicals*, Vol. 3, John Wiley & Sons, New York, **2003**.
- [14] Ramirez, A.; Garcia-Rubio, S. *Curr. Med. Chem.* **2003**, *10*, 1891.
- [15] (a) Ivonin, S. P.; Lapandin, A. V.; Anishchenko, A. A.; Shtamburg, V. G. *Synth. Commun.* **2004**, *34*, 451.
- (b) Ivonin, S. P.; Lapandin, A. V.; Shtamburg, V. G. *Chem. Heterocycl. Compd.* **2004**, *40*, 154.
- [16] Batchu, H.; Batra, S. *Eur. J. Org. Chem.* **2012**, *2012*, 2935.

(Cheng, F.)