碱促进的不饱和烯基磺酸六氟异丙酯的成环反应

边庆龙^a 许胜^{*,a} 段伟良^{*,b}^(a) 华东理工大学化学与分子工程学院 上海 200237^(b) 中国科学院上海有机化学研究所 金属有机化学国家重点实验室 上海 200032

摘要 研究了不饱和烯基磺酸六氟异丙酯的分子内成环反应,发现在催化量弱碱醋酸钠的存在下,六氟异丙氧基的 α 碳可进攻烯基磺酸的 β 位形成分子内关环产物,以中等的收率得到双三氟甲基取代五元磺酸内酯化合物。

关键词 磺酸内酯; 三氟甲基; 分子内关环

Base-Promoted Intramolecular Cyclization Reactions of Hexafluoro-isopropyl α,β -Alkenyl SulfonatesBian, Qinglong^a Xu, Sheng^{*,a} Duan, Weiliang^{*,b}^(a) School of Chemistry & Molecular Engineering, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237^(b) State Key Laboratory of Organometallic Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032

Abstract An intramolecular cyclization reaction of hexafluoro-isopropyl α,β -alkenyl sulfonates was investigated. Catalytic amount of NaOAc was found to accelerate the addition of α -carbon of hexafluoroisopropyl moiety to β -position of unsaturated sulfonates, generating a series of trifluoromethylated five-membering of sulfonates in moderate yields.

Keywords sultones; trifluoromethyl; intramolecular cyclization

由于氟原子所具有的独特效应,含氟有机化合物常具有特定的物理化学性质,在农药、医药、材料等行业有广泛的用途^[1]. 长期以来,含氟化合物的合成方法一直是一个很重要的研究方向. 特别是近十年来,氟化学再度引起众多合成化学家的关注,大量新颖的合成方法不断被发展用来构建各种含氟分子^[2].

三氟甲基的引入是氟化学研究课题的一个重要分支^[3]. 使用含三氟甲基分子的砌块进行衍生转化是一种很有效的途径^[4]. 含 β -三氟甲基分子的砌块也被使用与各种烯烃发生加成反应,得到相应三氟甲基化合物^[5]. 在已报道反应中,底物通常带有氧基或酯基来稳定所涉及的 α 碳负中间体,同时提高 α 位碳氢键的酸性^[5h-1]. 而文献中尚未有利用含 β -三氟甲基烷氧基做为亲核试剂反应的例子. 六氟异丙醇在有机反应常常作为溶剂使用,六氟异丙氧基参与的反应很少见到报导. 本研究工作介绍一例碱促进的不饱和烯基磺酸六氟异丙酯^[6]的分

子内成环反应,可得到一类双三氟甲基取代的季碳磺酸内酯化合物(Eq. 1)^[7].

1 结果与讨论

1.1 分子内成环反应条件的优化

在我们研究三氟甲基亲核试剂对不饱和烯基磺酸六氟异丙酯化合物的 1,4-加成反应过程中,意外分离得到氟谱中的含两个不同三氟甲基的化合物(Eq. 2),通过单晶衍射分析最终确定化合物的结构为双三氟甲基取代五元磺酸内酯(图 1)^[8]. 基于产物的结构,我们推测可能是体系中的弱碱醋酸钾协助攫取了六氟异丙氧基 α 位

* E-mail: wlduan@mail.sioc.ac.cn; Tel.: 021-54925203; Fax: 021-64166128

Received May 9, 2015; revised July 23, 2015; published online September 25, 2015.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 20902099, 21172238, 21472218).

国家自然科学基金(Nos. 20902099, 21172238, 21472218)资助项目.

上的氢, 所形成的碳负离子中间体进攻烯烃的 β 位, 分子内环化得到磺酸内酯化合物. 基于这一实验结果, 对这一关环反应的碱和溶剂作了进一步筛选(Table 1). 发现较弱的碱, 如醋酸钠可以得到 75% 的收率(Entry 3). 使用叔丁醇类的强碱时, 得到较低收率的产物(Table 1, Entries 5, 6), 这可能是由于存在 β -脱氟副反应途径的缘故. 有机碱如 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯(DBU) 和三乙胺等也可以得到一定收率的产物(Entries 8, 9). 随后, 以醋酸钠为碱, 对有机溶剂进行筛选(Entries 10~16). 结果表明, 反应仅在酰胺类溶剂, 以及二甲基亚砜强极性溶剂中进行(Entries 15, 16). 增大碱的用量并不能进一步提高产率, 空白试验表明不使用碱的情况下反应不能进行(Entry 17). 最终优化条件确定为 10 mol% 醋酸钠, *N,N*-二甲基甲酰胺为溶剂, 室温 24 h 反应.

图 1 双三氟甲基取代五元磺酸内酯(2a)的单晶结构图

Figure 1 X-ray crystal structure of the sulfonate 2a

1.2 烷基化反应的底物拓展

在优化的反应条件下, 考察了芳环上带有各种基团的底物. 结果表明含氟、溴、甲氧基、萘环的底物都能适用, 得到中等收率的磺酸内酯(Table 2, 2a~2h)^[9]. 相对具有较大位阻的底物, 如双键 β 位上芳基为邻位甲氧基苯和 1-萘基时, 反应也能发生, 分别得到 55% 和 44% 收率的成环产物 2i~2j. 对比考察了三氟甲基取代不饱和磺酸酯 3 和肉桂酸六氟异丙酯 4 这两种底物的反应都不能进行生成相应的成环产物. 这些试验表明磺酸取代

的六氟异丙氧基 α 位上氢的酸性相对较强, 在碱存在下较易被攫取, 顺利完成了随后的关环反应. 基于筛选条件过程中发现使用 DBU 等有机碱可以得到一定量的产物, 我们也尝试使用奎宁和辛可宁作为手性小分子催化剂催化这一反应, 但遗憾反应并未得到相应的产物.

表 1 不饱和烯基磺酸六氟异丙酯分子内成环反应的条件优化

Table 1 Optimization of reaction conditions for the intramolecular cyclization of hexafluoro-isopropyl α,β -alkenyl sulfonates

Entry	Base (equiv.)	Solvent	Yield ^a /%
1	KOAc (0.1)	DMF	60
2	LiOAc (0.1)	DMF	54
3	NaOAc (0.1)	DMF	75
4	CsOAc (0.1)	DMF	46
5	<i>t</i> -BuONa (0.1)	DMF	37
6	<i>t</i> -BuOK (0.1)	DMF	15
7	MgO (0.1)	DMF	0
8	Et ₃ N (0.1)	DMF	7
9	DBU (0.1)	DMF	48
10	NaOAc (0.1)	THF	0
11	NaOAc (0.1)	Et ₂ O	0
12	NaOAc (0.1)	MeCN	0
13	NaOAc (0.1)	1,4-Dioxane	0
14	NaOAc (0.1)	<i>t</i> -AmOH	0
15	NaOAc (0.1)	DMA	30
16	NaOAc (0.1)	DMSO	31
17	NaOAc (0)	DMF	0

^a Isolated yields.

2 结论

本文作者发现在催化量的弱碱存在下, 不饱和烯基磺酸六氟异丙酯可以发生分子内关环反应, 以中等的收率得到双三氟甲基取代的含季碳原子的五元磺酸内酯化合物. 这是文献中少见的利用带有 β 位三氟甲基烷氧基 α 位碳作为亲核位点参与的反应.

3 实验部分

3.1 仪器和试剂

¹H NMR (300, 400 MHz), ¹³C NMR (100 MHz) 和 ¹⁹F NMR (282 MHz) 检测采用 Varian 核磁共振仪, 以 TMS 为内标, 氘代氯仿(CDCl₃)为溶剂; 六氟磺酸异丙酯参照文献方法制备^[6b]. 所有试剂均为市场所售分析纯或化学纯商品, 未进一步纯化.

表 2 底物拓展^a

Table 2 Extension of the substrate scope

^a Isolated yields.

3.2 实验方法

不饱和烯基磺酸六氟异丙酯 **1** (0.10 mmol)和碱 (0.01 mmol, 10 mol%)在溶剂中在室温下搅拌 12 至 24 h, TLC 点板跟踪至反应结束. 减压下浓缩溶剂, 所得残余物用制备薄层硅胶板纯化分离[V(乙酸乙酯)/V(石油醚)=1/20]得到产物 **2**.

4-苯基-5,5-双三氟甲基-1,2-氧硫杂戊环-2,2-双氧化物(**2a**): 产率 75%, 白色固体. m.p. 122~123.5 °C; ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ: 7.47~7.41 (m, 3H), 7.38~7.32 (m, 2H), 4.67 (dd, *J*=14.4, 6.9 Hz, 1H), 4.02 (t, *J*=13.5 Hz, 1H), 3.77 (dd, *J*=13.2, 7.5 Hz, 1H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 130.3, 129.43, 129.42, 129.35, 121.1 (q, *J*_{CF}=288.0 Hz), 84.9 (m), 48.9, 44.5; ¹⁹F NMR (282 MHz, CDCl₃) δ: -70.5 (q, *J*_{CF}=9.3 Hz), -73.9 (q, *J*_{CF}=9.3 Hz).

4-(4-溴苯基)-5,5-双三氟甲基-1,2-氧硫杂戊环-2,2-双氧化物(**2b**): 产率 51%, 白色固体. m.p. 122~124.5 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.57 (d, *J*=8.8 Hz, 2H), 7.23 (d, *J*=8.4 Hz, 2H), 4.63 (dd, *J*=14.0, 6.8 Hz, 1H), 3.96 (t, *J*=13.6 Hz, 1H), 3.78 (dd, *J*=13.2, 6.8 Hz, 1H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 132.6, 131.0, 127.1, 124.7, 121.0 (q, *J*_{CF}=287.7 Hz), 83.8 (m), 48.8 (q, *J*_{CF}=1.4 Hz), 43.9 (q, *J*_{CF}=1.1 Hz); ¹⁹F NMR (282 MHz, CDCl₃) δ: -69.4 (q, *J*_{CF}=9.6 Hz), -73.9 (q, *J*_{CF}=9.6 Hz). HRMS (EI) calcd for C₁₁H₇O₃F₆SBr: 411.9203, found 411.9199.

4-(3-溴苯基)-5,5-双三氟甲基-1,2-氧硫杂戊环-2,2-双氧化物(**2c**): 产率 60%, 白色固体. m.p. 98.5~100 °C; ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ: 7.62~7.55 (m, 1H), 7.50 (s, 1H), 7.35~7.28 (m, 2H), 4.62 (dd, *J*=13.5, 7.5 Hz, 1H), 3.97 (t, *J*=13.5 Hz, 1H), 3.78 (dd, *J*=12.9, 6.9 Hz, 1H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 133.5, 132.5, 130.8, 130.3, 128.1, 123.3, 121.0 (q, *J*_{CF}=287.7 Hz), 83.9 (m), 48.8 (q, *J*_{CF}=1.6 Hz), 44.0; ¹⁹F NMR (282 MHz, CDCl₃) δ: -71.0 (q, *J*_{CF}=10.2 Hz), -73.9 (q, *J*_{CF}=10.2 Hz). HRMS (EI) calcd for C₁₁H₇O₃F₆SBr: 411.9203, found 411.9198.

4-(4-氟苯基)-5,5-双三氟甲基-1,2-氧硫杂戊环-2,2-双氧化物(**2d**): 产率 67%, 白色固体. m.p. 90~92.5 °C; ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ: 7.40~7.30 (m, 2H), 7.13 (t, *J*=8.4 Hz, 2H), 4.66 (dd, *J*=13.8, 6.6 Hz, 1H), 3.96 (t, *J*=13.6 Hz, 1H), 3.78 (dd, *J*=12.9, 6.9 Hz, 1H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 163.5 (d, *J*_{CF}=251.0 Hz), 131.3 (d, *J*_{CF}=8.4 Hz), 123.8 (d, *J*_{CF}=3.0 Hz), 121.1 (q, *J*_{CF}=287.7 Hz), 116.7 (d, *J*_{CF}=12.1 Hz), 83.9 (m), 49.0 (q, *J*_{CF}=2.5 Hz), 43.8; ¹⁹F NMR (282 MHz, CDCl₃) δ: -69.4 (q, *J*_{CF}=8.5 Hz), -73.9 (q, *J*_{CF}=8.5 Hz). HRMS (EI) calcd for C₁₁H₇O₃F₇S: 352.0004, found 352.0005.

4-(3-甲苯基)-5,5-双三氟甲基-1,2-氧硫杂戊环-2,2-双氧化物(**2e**): 产率 51%, 白色固体. m.p. 126.5~128 °C; ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃) δ: 7.31 (t, *J*=7.8 Hz, 1H), 7.28~7.23 (m, 1H), 7.16~7.13 (m, 2H), 4.63 (dd,

$J=14.1, 7.2$ Hz, 1H), 4.00 (t, $J=13.5$ Hz, 1H), 3.76 (dd, $J=12.9, 6.9$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 139.2, 131.0, 130.2, 129.2, 127.9, 126.4, 121.1 (q, $J_{\text{CF}}=287.7$ Hz), 84.1 (m), 49.0 (q, $J_{\text{CF}}=1.9$ Hz), 44.4 (q, $J_{\text{CF}}=0.7$ Hz); ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : -69.4 (q, $J_{\text{CF}}=9.6$ Hz), -73.9 (q, $J_{\text{CF}}=9.6$ Hz). HRMS (EI) calcd for $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_3\text{F}_6\text{S}$: 348.0245, found 348.0249.

4-(4-叔丁苯基)-5,5-双三氟甲基-1,2-氧硫杂戊环-2,2-双氧化物(**2f**): 产率 42%, 白色固体. m.p. 102~104 °C; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 7.43 (d, $J=8.1$ Hz, 2H), 7.26 (d, $J=8.1$ Hz, 2H), 4.64 (dd, $J=14.4, 6.9$ Hz, 1H), 3.99 (t, $J=13.5$ Hz, 1H), 3.74 (dd, $J=12.3, 6.9$ Hz, 1H), 1.32 (s, 9H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 153.6, 129.1, 126.3, 124.8, 127.9, 126.4, 121.1 (q, $J_{\text{CF}}=287.7$ Hz), 84.1 (m), 49.0 (q, $J_{\text{CF}}=1.5$ Hz), 44.1, 34.9, 31.2; ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : -71.1 (q, $J_{\text{CF}}=9.3$ Hz), -73.9 (q, $J_{\text{CF}}=9.3$ Hz). HRMS (EI) calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{16}\text{O}_3\text{F}_6\text{S}$: 390.0724, found 390.0721.

4-(4-甲氧苯基)-5,5-双三氟甲基-1,2-氧硫杂戊环-2,2-双氧化物(**2g**): 产率 58%, 白色固体. m.p. 92.5~94 °C; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 7.27 (d, $J=8.7$ Hz, 2H), 6.94 (d, $J=8.7$ Hz, 2H), 4.63 (dd, $J=13.5, 7.5$ Hz, 1H), 3.96 (t, $J=13.5$ Hz, 1H), 3.84 (s, 3H), 3.75 (dd, $J=13.2, 7.5$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 160.8, 130.7, 121.2 (q, $J_{\text{CF}}=287.7$ Hz), 119.5, 114.7, 84.0 (m), 55.6, 49.0 (q, $J_{\text{CF}}=1.5$ Hz), 44.1 (q, $J_{\text{CF}}=1.1$ Hz); ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : -69.5 (q, $J_{\text{CF}}=9.3$ Hz), -72.3 (q, $J_{\text{CF}}=9.3$ Hz). HRMS (EI) calcd for $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{F}_6\text{S}$: 364.0204, found 364.0210.

4-(2-萘苯基)-5,5-双三氟甲基-1,2-氧硫杂戊环-2,2-双氧化物(**2h**): 产率 53%, 白色固体. m.p. 124~126.5 °C; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 7.92~7.84 (m, 4H), 7.60~7.55 (m, 2H), 7.41 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 4.85 (dd, $J=14.1, 6.6$ Hz, 1H), 4.15 (t, $J=13.5$ Hz, 1H), 3.85 (dd, $J=12.6, 7.2$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 133.7, 133.0, 129.7, 129.2, 128.3, 127.84, 127.76, 127.3, 125.7, 125.3, 121.2 (q, $J_{\text{CF}}=287.6$ Hz), 84.1 (m), 49.0, 44.6; ^{19}F NMR (282 MHz, CDCl_3) δ : -69.5 (q, $J_{\text{CF}}=9.6$ Hz), -72.3 (q, $J_{\text{CF}}=9.6$ Hz). HRMS (EI) calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_3\text{F}_6\text{S}$: 384.0255, found 384.0250.

4-(2-甲氧苯基)-5,5-双三氟甲基-1,2-氧硫杂戊环-2,2-双氧化物(**2i**): 产率 55%, 白色固体. m.p. 102~105 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.40 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.34 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.01 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.97 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 5.39 (dd, $J=14.0, 7.2$ Hz, 1H), 3.98 (t,

$J=13.6$ Hz, 1H), 3.67 (dd, $J=12.8, 7.2$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 157.7, 131.3, 129.0 (q, $J_{\text{CF}}=3.0$ Hz), 121.4 (q, $J_{\text{CF}}=288.0$ Hz), 120.94, 120.92 (q, $J_{\text{CF}}=286.5$ Hz), 116.8, 111.4, 84.3 (m), 55.6, 49.3, 36.3; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -70.5 (q, $J_{\text{CF}}=10.2$ Hz), -74.6 (q, $J_{\text{CF}}=10.2$ Hz). HRMS (EI) calcd for $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{F}_6\text{S}$: 364.0204, found 364.0203.

4-(1-萘基)-5,5-双三氟甲基-1,2-氧硫杂戊环-2,2-双氧化物(**2j**): 产率 44%, 白色固体. m.p. 158~160 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.03 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.95 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, 2H), 7.71 (d, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.66 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.60~7.50 (m, 2H), 5.61 (dd, $J=12.8, 6.8$ Hz, 1H), 4.14 (t, $J=12.8$ Hz, 1H), 3.86 (dd, $J=12.6, 6.8$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 134.4, 131.9, 131.2, 129.7, 127.7, 127.2 (q, $J_{\text{CF}}=3.7$ Hz), 126.6, 125.0, 124.5, 122.0 (q, $J_{\text{CF}}=2.2$), 121.3 (q, $J_{\text{CF}}=288.0$ Hz), 121.1 (q, $J_{\text{CF}}=287.3$ Hz), 84.7 (m), 50.7, 38.6. ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -69.7 (q, $J_{\text{CF}}=10.1$ Hz), -73.2 (q, $J_{\text{CF}}=10.1$ Hz). HRMS (EI) calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_3\text{F}_6\text{S}$: 384.0255, found 384.0258.

辅助材料(Supporting Information) 所合成目标化合物的 NMR 图谱. 这些材料可以免费从本刊网站 (<http://sioc-journal.cn/>) 上下载.

References and notes

- [1] For recent reviews, see: (a) Smart, B. E. *J. Fluorine Chem.* **2001**, *109*, 3.
(b) Maienfisch, P.; Hall, R. G. *Chimia* **2004**, *58*, 93.
(c) Müller, K.; Faeh, C.; Diederich, F. *Science* **2007**, *317*, 1881.
(d) Purser, S.; Moore, P. R.; Swallow, S.; Gouverneur, V. *Chem. Soc. Rev.* **2008**, *37*, 320.
(e) Zhang J.; Jin C.; Zhang Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2014**, *34*, 662 (in Chinese).
(张雾, 金传飞, 张英俊, 有机化学, **2014**, *34*, 662.)
- [2] For selected recent reviews of fluorination, see: (a) Grushin, V. V. *Acc. Chem. Res.* **2010**, *43*, 160.
(b) Furuya, T.; Klein, J. E. M. N.; Ritter, T. *Synthesis* **2010**, 1804.
(c) Furuya, T.; Kamlet, A. S.; Ritter, T. *Nature* **2011**, *473*, 470.
(d) Campbell, M. G.; Ritter, T. *Org. Process Res. Dev.* **2014**, *18*, 474.
(e) Li, Y.; Wu, Y.; Li, G.-S.; Wang, X.-S. *Adv. Synth. Catal.* **2014**, *356*, 1412.
(f) Yang, X.; Wu, T.; Phipps, R. J.; Toste, F. D. *Chem. Rev.* **2015**, *115*, 826.
- [3] For selected reviews of trifluoromethylation, see: (a) Ma, J.-A.; Cahard, D. *Chem. Rev.* **2004**, *104*, 6119.
(b) Schlosser, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2006**, *45*, 5432.
(c) Ma, J.-A.; Cahard, D. *J. Fluorine Chem.* **2007**, *128*, 975.
(d) Furuya, T.; Kamlet, A. S.; Ritter, T. *Nature* **2011**, *473*, 470.
(e) Prakash, G. K. S.; Mandal, M. *J. Fluorine Chem.* **2011**, *112*, 123.

- (f) Roy, S.; Gregg, B. T.; Gribble, G. W.; Le, V.-D.; Roy, S. *Tetrahedron* **2011**, 67, 2161.
- (g) Tomashenko, O. A.; Grushin, V. V. *Chem. Rev.* **2011**, 111, 4475.
- (h) Jin, Z.; Hammond, G. B.; Xu, B. *Aldrichim. Acta* **2012**, 45, 67.
- (i) He, H.; Huang, Y.; Verpoort, F. *Acta Chim. Sinica* **2013**, 71, 700 (in Chinese).
- (何展荣, 黄毅勇, Verpoort Francis, 化学学报, **2013**, 71, 700.)
- (j) Wang, G.; He, X.; Dai, J.; Xu, H. *Chin. J. Org. Chem.* **2014**, 34, 837 (in Chinese).
- (王光祖, 赫侠平, 戴建军, 许华建, 有机化学, **2014**, 34, 837.)
- (k) Zhang, K.; Xu, X.; Qing, F. *Chin. J. Org. Chem.* **2015**, 35, 556 (in Chinese).
- (张柯, 徐修华, 卿凤翎, 有机化学, **2015**, 35, 556.)
- (l) Liu, X.; Xu, C.; Wang, M.; Liu, Q. *Chem. Rev.* **2015**, 115, 683.
- [4] For a review on α -trifluoromethylated carbanion synthons, see: Uneyama, K.; Katagiri, T.; Amii, H. *Acc. Chem. Res.* **2008**, 41, 817, and references therein.
- [5] (a) Ishikawa, N.; Yokozawa, T. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **1983**, 56, 724.
- (b) Beck, D.; Seebach, D. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1986**, 25, 98.
- (c) Fuchigami, T.; Nakagawa, Y. *J. Org. Chem.* **1987**, 52, 5276.
- (d) Qian, C.-P.; Nakai, T. *J. Am. Chem. Soc.* **1990**, 112, 4602.
- (e) Beck, A. K.; Seebach, D. *Chem. Ber.* **1991**, 124, 2897.
- (f) Yamaguchi, Y.; Kawate, T.; Itahashi, H.; Katagiri, T.; Uneyama, K. *Tetrahedron Lett.* **2003**, 44, 6319.
- (g) Sato, K.; Takiguchi, Y.; Yoshizawa, Y.; Iwase, K.; Shimizu, Y.; Tarui, A.; Omote, M.; Kumadaki, I.; Ando, A. *Chem. Pharm. Bull.* **2007**, 55, 1593.
- (h) Guo, Y.; Zhao, X.; Zhang, D.; Murahashi, S.-I. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, 48, 2047.
- (i) Shibata, N.; Suzuki, S.; Furukawa, T.; Kawai, H.; Tokunaga, E.; Yuan, Z.; Cahard, D. *Adv. Synth. Catal.* **2011**, 353, 2037.
- (j) Li, L.; Huang, D.; Chen, Q.-Y.; Guo, Y. *Synlett* **2013**, 611.
- (k) Li, L.; Chen, Q.-Y.; Guo, Y. *Chem. Commun.* **2013**, 49, 8764.
- (l) Wang, Q.; Huan, F.; Shen, H.; Xiao, J.-C.; Gao, M.; Yang, X.; Murahashi, S.-I.; Chen, Q.-Y.; Guo, Y. *J. Org. Chem.* **2013**, 78, 12525.
- [6] For examples on asymmetric addition reactions of sulfonates, see: (a) Nishimura, T.; Takiguchi, Y.; Hayashi, T. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, 134, 9086.
- (b) Lu, J.; Ye, J.; Duan, W.-L. *Org. Lett.* **2013**, 15, 5016.
- (c) Lu, J.; Ye, J.; Duan, W.-L. *Chem. Commun.* **2014**, 50, 698.
- [7] For a review on the synthesis and application of sultones, see: Mondal, S. *Chem. Rev.* **2012**, 112, 5339.
- [8] CCDC 1427062 contain the supplementary crystallographic data for this paper
- [9] Preparation of hexafluoro-isopropyl α,β -alkenyl sulfonates bearing the β -alkyl moiety was unsuccessful.

(Cheng, F.)