基于 C—H 键官能团化/环化串联策略构建吲哚酮分子骨架的研究进展

阿布力米提·阿布都卡德尔^a 张永红^a 张增鹏^a 刘晨江^{*,a,b}^(a) 新疆大学化学化工学院 乌鲁木齐 830046)^(b) 新疆大学理化测试中心 乌鲁木齐 830046)

摘要 吲哚酮尤其是 3,3-二取代吲哚酮化合物具有重要的生物活性作用, 其合成方法的研究已成为有机化学的热点领域. 近年来, 以 *N*-芳基丙烯酰胺为起始原料, 通过与自由基的加成、环化反应构建吲哚酮骨架的研究受到广泛关注. 综述了基于 C—H 键官能团化/环化串联策略构建 3,3-二取代吲哚酮骨架分子的研究进展, 并对反应的机理进行了概括总结.

关键词 C—H 活化; 吲哚酮; 串联反应

Recent Advances of the Access to Indolinones via C—H Bond Functionalization/Cyclization Cascade Strategy

Abdukader, Ablimit^a Zhang, Yonghong^a Zhang, Zengpeng^a Liu, Chenjiang^{*,a,b}^(a) School of Chemistry and Chemical Engineering, Xinjiang University, Urumqi 830046)^(b) Physics and Chemistry Detecting Center, Xinjiang University, Urumqi 830046)

Abstract Due to the diverse biological activities of indolinones, especially 3,3-disubstituted indolinones, their researches of synthesis have been attracting considerable interest in the areas of organic chemistry. Recently, the radical addition and cyclization reaction of *N*-arylacrylamides with different radical precursors for the efficient construction of indolinones motifs have attracted much attention. This review summarizes the recent advances of the access to 3,3-disubstituted indolinones based on C—H bond functionalization/cyclization cascade strategy. These reaction mechanisms have also been introduced.

Keywords C—H functionalization; oxindoles; cascade reaction

吲哚酮骨架结构广泛存在于天然产物、药物和农药分子结构中, 其中 C(3)双取代的吲哚酮化合物具有抗肿瘤、抗心血管疾病等重要的生物活性作用(图 1)^[1]. 因此, 有关该类化合物的构建方法研究引起有机和药物化学工作者的极大关注^[2]. 例如光学纯的 C(3)双取代吲哚酮衍生物的制备可以通过靛红与亲核试剂的不对称催化反应得以实现^[3]. 目前, 如何从简单的原料出发来构建 C(3)双取代的吲哚酮化合物具有一定的挑战性, 其中最简单快捷的路径是以 *N*-芳基丙烯酰胺为原料来构建吲哚酮骨架分子结构.

早在 1987 年, 著名有机化学家 Overman 等^[4]利用 Heck 反应在吲哚的 3 位构建了相应的螺环化合物(Eq. 1). 近几年, 通过多个研究小组的共同努力, 该领域取得了重大进展, 可以实现通过 Heck 反应来构建吲哚酮

的衍生物. Zhu 等^[5]报道了 Heck/氰化反应串联生成了 3-烷基-3-氰甲基吲哚酮. 该反应历程为: 碘苯 **1** 和零价钯氧化加成得中间体 **2**, 然后碳碳双键加成环化得中间体 **3**, 再与氰基进行配体交换得到中间体 **4**, 最后还原消除得产物 3-烷基-3-氰甲基吲哚酮(Scheme 1).

从上面反应可以看出, 该反应底物的苯环或者烯烃上都必须引入可以与过渡金属发生氧化加成的卤素或者类卤素^[6].

2009 年, Kündig 研究小组^[7]发展了通过交叉脱氢偶联构建吲哚酮骨架的策略, 相对于上一代的方法更加绿色(Eq. 2). 但是反应条件仍然十分苛刻, 必须在无水无氧且有强氧化剂的条件下才能顺利完成反应, 而且底物的范围比较窄.

* E-mail: pxylcj@126.com

Received January 12, 2016; revised March 28, 2016; published online April 5, 2016.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21572195, 21562039, 21502162).

国家自然科学基金(Nos. 21572195, 21562039, 21502162)资助项目.

图1 代表性的含双取代吲哚酮骨架的生物活性化合物

Figure 1 Representative bioactive compounds with the disubstituted indolinone framework

图式1 钯催化 Heck-氰化反应合成吲哚酮

Scheme 1 Palladium-catalyzed Heck-cyanation reaction for the synthesis of indolinones

图式2 钯催化氧化生成 C—C, C—O 和 C—N 键

Scheme 2 Palladium-catalyzed oxidative C—C, C—O and C—N bond-forming processes

通过自由基对 *N*-芳基丙烯酰胺的碳碳双键加成形成中间体 6, 然后再环化得到中间体 7, 最后脱氢得到吲哚酮衍生物(Scheme 3). 下面重点介绍各种自由基参与实现的不同 C(3)取代的吲哚酮分子骨架的构建.

一般而言, 该类反应都需要加入较大量的催化剂, 而且反应温度较高, 无法在较广的范围内对吲哚酮的结构多样性进行扩展.

2010~2012 年, 过渡金属催化的 *N*-芳基丙烯酰胺衍生物 C—H 键官能团化构建吲哚酮的方法得到进一步发展. Pd 催化的 sp^2 -C—H 键官能团化形成的 C—Pd 活性中间体可以进一步转换形成新的 C—C, C—O, C—N 键 (Scheme 2). 其中, C—Pd 活性中间体 5 可以发生 β -氢还原消除得到 Heck 反应类型的产物, 可以在醋酸碘苯氧化下可以构建 C—O 键, 还可以和亲核试剂作用^[8]. Liu 等^[9]利用乙腈的亲核性对 *N*-芳基丙烯酰胺的碳碳双键进行加成构建了 C(3)双取代的吲哚酮(Eq. 3). 同年, 该课题组^[10]利用三氟甲基负离子与碳碳双键的亲核加成反应, 也得到了 C(3)双取代的吲哚酮(Eq. 4).

尽管已发展的利用 *N*-芳基丙烯酰胺为起始物经过过渡金属催化能够成功地构建吲哚酮的衍生物, 但是往往需要过量较多的金属盐或者强碱, 这样一方面导致在底物的兼容性方面有诸多缺陷, 另一方面也降低了这类方法的实用性. 在自由基化学的启发下, 化学工作者试图

图式 3 钯催化烯烃官能团化

Scheme 3 Palladium-catalyzed functionalization of alkenes

1 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-烷基/芳基化构建 C(3)烷基双取代吡咯酮

Li 等^[11]发展了铁催化 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-烷基/芳基化构建 C(3)-烷基双取代吡咯酮的方法。他们将四氢呋喃、二氧六环和乙醚等常见的醚类溶剂在氧化剂和铁催化剂的共同作用下产生自由基，接着与双键发生加成反应，最后环化得到 C(3)-烷基双取代吡咯酮。在反应过程中涉及了两种 C—H 键的活化，一是醚中的 sp^3 -C—H 键的活化，二是芳基的 sp^2 -C—H 键的活化(Scheme 4)。

Duan 等^[12]将氧化剂作用于 1,3-二羰基化合物产生的自由基与碳碳双键加成再环化，得到了吡咯酮化合物。此方法也适用于丙酮等酮类底物(Scheme 5)。

此后，Liu 等^[13]将铜和过氧化二异丙苯共同作用于环己烷、环戊烷等简单烷烃中更为惰性的 C—H 键，产生的自由基与 *N*-芳基丙烯酰胺中的碳碳双键先加成，

图式 4 铁催化氧化丙烯酰胺的 1,2-烷基芳基化

Scheme 4 Iron-catalyzed oxidative 1,2-alkylarylation of acrylamides

继而环化合成了 C(3)烷基双取代的吡咯酮(Scheme 6)。

二叔丁基过氧化物在加热情况会发生分解得到甲基自由基。Cheng 等^[14]利用此甲基自由基对双键加成再环化，得到吡咯酮化合物(Scheme 7)。

2013 年，Duan 等^[15]报道了醇的 α 位 sp^3 -C—H 键在叔丁基过氧化氢的氧化下断裂得到 α -羟基烷基自由基，接着与 *N*-芳基丙烯酰胺的碳碳双键加成再环化得到吡咯酮的反应(Scheme 8)。

Loh 等^[16]发现在铁的催化下高价碘 Ph_2IOTf 会产生苯基自由基，继而和二氯甲烷或者四氯化碳作用得到二氯甲基或三氯甲基自由基，然后与碳碳双键加成再环化得到相应的吡咯酮衍生物(Scheme 9)。

Zhu 等^[17]发现在可见光存在的条件下脂肪酸脱羧产生烷基自由基，继而与碳碳双键加成再环化构建 C(3)双取代吡咯酮衍生物的方法(Scheme 10)。带有各种取代基的伯、仲、叔脂肪酸都可以在最优反应条件下发生室温脱羧/自由基 C—H 官能化串联反应，扩展了吡咯酮合成的产物结构多样性。反应中，首先是光敏配合物 $Ir^{III}(ppy)_3$ 在可见光照射下，发生金属到配体的电子转移，形成激发态的 $*Ir^{III}(ppy)_3$ (8)，随后与二乙酸碘苯通过单电子转移过程形成较强的氧化剂 $Ir^{IV}(ppy)_3$ (9) 和乙酸碘苯自由基 10。底物酰胺 11 与 10 的碘原子发生配位之后立即与甲酸发生脱羧/C—C 偶联/自由基 C—H 官能化，形成环己二烯自由基 12，同时生成碘苯与 CO_2 。自

图式 5 银催化丙烯酰胺与 1,3-二羰基化合物的氧化偶联/环化反应

Scheme 5 Silver-catalyzed oxidative coupling/cyclization reaction of acrylamides with 1,3-dicarbonyl compounds

图式 6 丙烯酰胺和简单烷烃的烷基芳基化反应

Scheme 6 Alkylarylation reaction of acrylamides with simple alkanes

图式 7 甲基自由基和丙烯酰胺加成环化合成吲哚酮化合物

Scheme 7 Methyl radical addition to the acrylamides and cyclization to give indolinones

图式 8 无金属条件下活泼烯烃和醇的串联氧化环化反应

Scheme 8 Metal-free tandem oxidative cyclization reaction of activated alkenes with alcohols

图式 9 铁催化活泼烯烃的氯甲基化/环化串联反应

Scheme 9 Iron-catalyzed cascade chloromethylation/cyclization of activated alkenes

图式 10 可见光催化的脱羧/碳氢官能团化串联反应

Scheme 10 Decarboxylation/C—H functionalization cascade reaction by visible-light photoredox catalysis

由基 **12** 在氧化剂 **9** 的作用下, 失去一个电子得到环己二烯阳离子 **13**, 完成光氧化还原催化循环. 在乙酸根阴离子的作用下, 阳离子 **13** 进一步失去质子芳构化得到目标产物 **14**.

Liu 等^[9]报道了钯催化的 *N*-芳基丙烯酰胺与乙腈的 1,2-腈甲基化/芳基化反应. 该反应需要大量的氧化剂 $\text{PhI}(\text{OPiv})_2$ 和氟化银. 如果能够通过自由基途径实现此反应的话, 就可以避免银盐的使用. Zhu 和 You 课题组^[18]分别成功实现了铁和铜促进的乙腈自由基对 *N*-芳

基丙烯酰胺中碳碳双键的加成再环化反应, 得到 C(3) 氰甲基/烷基双取代吡啶酮 (Scheme 11). 研究表明, 在该类转化中, 乙腈在二叔丁基过氧化物氧化下产生了氰甲基自由基参与了反应.

2 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-三氟甲基化/芳基化构建 C(3)三氟甲基/烷基双取代吡啶酮

三氟甲基是强亲酯性基团. 在许多情况下, 三氟甲基化可以大幅增强化合物的极性、稳定性和亲油性等,

且更易被生物体吸收和传递,从而增加化合物的生物活性,因此含三氟甲基的化合物在医药、农药和材料等领域已得到广泛应用^[19]。基于三氟甲基的特殊性质,Zhu课题组^[20]在完成可见光催化的C(3)烷基双取代吡咯酮后,致力于将三氟甲基引入吡咯酮骨架。他们利用Togni试剂在光敏催化剂作用下发生电子转移产生的三氟甲基自由基,对双键进行加成再环化得到了C(3)三氟

甲基/烷基双取代吡咯酮产物(Scheme 12)。

随后,Lipshutz等^[21]利用廉价易得的三氟甲基亚磺酸钠在叔丁基过氧化氢氧化下产生的三氟甲基自由基,实现了对碳碳双键的加成再环化反应。值得指出的是,该催化体系能够循环5次,产率没有明显降低(Scheme 13)。

图式 11 活泼烯烃和腈的自由基氰甲基化/芳基化反应

Scheme 11 Radical cyanomethylation/arylation reaction of activated alkenes with nitriles

图式 12 钌催化烯烃的三氟甲基化/芳基化串联反应。

Scheme 12 Ruthenium-catalyzed tandem trifluoromethylation/arylation reaction of alkenes

图式 13 铜催化烯烃的三氟甲基化/芳基化串联反应.

Scheme 13 Copper-catalyzed trifluoromethylation/arylation cascade reaction of alkenes

Tan 和 Fu 等^[22]几乎同时报道了无金属催化下 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-三氟甲基化/芳基化合成 C(3)三氟甲基/烷基双取代吡咯酮的反应, 反应中的三氟甲基自由基是 TMSCF₃ 在醋酸碘苯的作用下而得(Scheme 14).

最近, Dolbier 等^[23]报道了可见光催化下氟代碘酰氯为自由基源的 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-氟代烷基化/芳基化反应(Eq. 5).

在 1,2-三氟甲基化/芳基化反应取得良好效果的同时, Wang 等^[24]利用三氟甲磺化银在过硫酸钾的作用下产生的三氟甲磺自由基, 实现了 C(3)三氟甲磺基/烷基双取代吡咯酮的合成(Eq. 6).

随后, 他们^[25]又报道了二氟甲基自由基参与构建 C(3)二氟甲基/烷基双取代吡咯酮的反应(Scheme 15).

图式 14 无金属下烯烃的分子内三氟甲基化/芳基化串联反应

Scheme 14 Metal-free intramolecular trifluoromethylation/arylation cascade reaction of alkenes

图式 15 金属催化的活泼烯烃的氟甲基化/烷基化和三氟甲硫基化/烷基化

Scheme 15 Metal-catalyzed fluoromethylation/alkylation and trifluoromethylthiolation/alkylation of activated alkenes

3 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-苄基化/芳基化构建 C(3)苄基/烷基双取代吡咯酮

甲苯在一定条件下能够产生苄基自由基^[26]。Duan 等^[27]报道了铜催化下 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-苄基/芳基化反应(Scheme 16)。该反应中甲苯在过氧化苯甲酸叔丁酯氧化下产生的苄基自由基与碳碳双键加成后再环化,得到了 C(3)苄基/烷基双取代吡咯酮。几乎同时, Li 课题组^[28]以路易斯酸 IrCl_3 为促进剂,二叔丁基过氧化

4 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-芳基化/芳基化构建 C(3)芳基/烷基双取代吡咯酮

芳基自由基被广泛的用于构建碳碳键和碳杂键^[29]。芳基重氮盐在可见光/光敏剂催化下能够直接产生芳基自由基,该策略被广泛用于有机合成中^[30]。基于这样的思路, Fu 和 Zou 等^[31]实现了可见光催化的 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-芳基/芳基化反应,合成了 C(3)芳基/烷基双取代吡咯酮化合物(Scheme 18)。

图式 16 铜催化丙烯酰胺的氧化苄基芳基化

Scheme 16 Copper-catalyzed oxidative benzylarylation of acrylamides

图式 17 Lewis 酸催化活泼烯烃与甲苯的氧化 1,2-苄基芳基化

Scheme 17 Lewis acid-catalyzed oxidative 1,2-benzylarylation of activated alkenes with toluene

图式 18 光催化合成 3,3-双取代吲哚酮

Scheme 18 Photocatalytic synthesis of 3,3-disubstituted indolinones

5 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-甲酰化/芳基化构建 C(3)甲酰基/烷基双取代吲哚酮

2013 年, Li 课题组^[32]报道了醛在叔丁基过氧化氢氧化下产生的甲酰基自由基与碳碳双键进行加成再环化得到 C(3)甲酰基/烷基双取代吲哚酮的反应(Scheme 19). 随后, Duan 等^[33]发现芳基甲酰甲酸在硝酸银和过硫酸钾作用下可以产生芳基甲酰基自由基, 继而发生类似的反应(Scheme 20).

6 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-叠氮化/芳基化构建 C(3)叠氮/烷基双取代吲哚酮

有机叠氮化合物不仅具有显著的生物活性, 而且是非常重要的中间体, 因而受到化学工作者的广泛关

注^[34]. 利用叠氮化合物产生的叠氮自由基, 从而将叠氮结构导入有机化合物中成为近年来合成叠氮化合物的一种重要策略^[35]. Antonchick 等^[36]利用 TMSN₃ 在三氟醋酸碘苯作用下产生的叠氮自由基, 实现了 C(3)叠氮/烷基双取代吲哚酮的制备. 随后, Jiao 和 Yang 课题组^[37]分别报道了银催化下 TMSN₃ 与 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-叠氮化/芳基化反应. 最近, Zhang 等^[38]发现叠氮化钠在过硫酸钾的作用下可以产生叠氮自由基, 同样合成了 C(3)叠氮/烷基双取代吲哚酮化合物(Scheme 21).

7 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-硝化/芳基化构建 C(3)硝基/烷基双取代吲哚酮

硝基广泛存在于众多药物中, 同时它还能被还原转

图式 19 无金属条件下活泼烯烃的氧化加成/环化串联反应

Scheme 19 Metal-free oxidative tandem addition/cyclization reaction of activated alkenes

图式 20 银催化合成吲哚酮化合物

Scheme 20 Synthesis of indolinones catalyzed by silver

图式 21 丙烯酰胺的 1,2-碳叠氮化/芳基化合成吲哚酮化合物

Scheme 21 1,2-Carboazidation/arylation of acrylamides for the synthesis of indolinones

化成胺, 因此在有机化合物中方便的导入硝基是化学工作者致力研究的工作之一^[39]. Yang 等^[40]发现亚硝酸钠在过硫酸钾的作用下产生的硝基自由基, 可以实现 C(3)硝基/烷基双取代吲哚酮的制备(Scheme 22). 与此同时, Jiao 课题组^[41]报道了亚硝酸叔丁酯在加热情况下生成的亚硝基自由基, 经微量氧气氧化得到硝基自由基, 然后与碳碳双键加成再环化也可以得到 C(3)硝基/烷基双取代吲哚酮化合物(Scheme 23).

8 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-磷酰化/芳基化构建 C(3)磷酰基/烷基双取代吲哚酮

有机磷化合物广泛存在于核苷酸和药物分子中, 此外也常用作有机磷配体^[42]. 因此, 通过简便的方法合成

含磷有机化合物具有重要的意义^[43]. Yang 等^[44]利用二苯氧磷在硝酸银作用下产生的自由基, 对 *N*-芳基丙烯酰胺的碳碳双键进行加成再环化得到了 C(3)磷酰基/烷基双取代吲哚酮(Scheme 24). 根据检测到的中间体, 作者提出了两种可能的机理: 一种是二苯氧磷自由基对 **11** 加成得到自由基中间体 **15**, 再环化的过程; 另一种是二苯氧磷银 **16** 对 **11** 加成得到 **17**, 然后产生自由基中间体 **15** 和单质银, 再环化的历程.

9 *N*-芳基丙烯酰胺的 1,2-磺酰化/芳基化构建 C(3)磺酰基/烷基双取代吲哚酮

砜类有机分子在功能材料、医药领域中占有重要的地位^[45]. 利用自由基与不饱和双键的加成策略是一种

图式 22 无金属条件下烯烃的硝基/芳基化

Scheme 22 Nitration/arylation of alkenes under metal-free conditions

图式 23 无金属条件下活泼烯烃的硝基化合成吲哚酮化合物

Scheme 23 Nitrification of activated alkenes for the synthesis of indolinones under metal-free conditions

图式 24 银催化合成膦酰基/烷基双取代吲哚酮化合物

Scheme 24 Synthesis of phosphorylated/alkylated disubstituted indolinones catalyzed by silver

合成该类分子重要策略^[46]. Li 和 Xu 等^[47]将磺酰肼经氧化剂作用产生的磺酰自由基, 与 *N*-芳基丙烯酰胺反应, 合成了 C(3)磺酰基/烷基双取代吲哚酮(Scheme 25). 随后, Jiao 课题组^[48]发现芳基亚磺酸在微量氧气存在下产生磺酰自由基, 可以与 *N*-芳基丙烯酰胺的碳碳双键加成再环化得到同样的目标分子(Scheme 26).

10 无氧化剂条件下 *N*-苯基丙烯酰胺 1,2-烷基化/三氟甲基化构建 C(3)烷基/三氟甲基基双取代吲哚酮

在之前的工作中产生自由基大多需要在光催化下或氧化剂的条件下产生, 尤其是氧化剂的加入使得反应条件不够绿色. 基于此, Yang 等^[49]提出一个在无氧化剂

条件下, 铈(II)催化 *N*-苯基丙烯酰胺双官能团化合成吲哚衍生物(Scheme 27)反应. 此反应成功地避免了使用氧化剂, 并得到各种取代的氧化吲哚.

三氟甲基由于具有很强的电负性和稳定的代谢性等独特的理化性质而被广泛的用于农药、医药和分子材料等领域^[50]. 过渡金属催化三氟甲基化反应由于其反应条件温和而受到广泛关注. Kong 和 Nevado 等^[51]实现了无氧化剂条件下铜催化一锅法由 *N*-苯磺酰基丙烯酰胺经过三氟甲基化, 芳基转移, 脱磺过程和 sp^2 -C—N 形成, 成了 C(3)芳基基/烷基双取代吲哚酮化合物(Scheme 28). 而当酰胺N上的取代基为芳基的时, 反应不能进行环化, 能得到 α -芳基- β -三氟甲基酰胺.

图式 25 活泼烯烃的芳基磺化合成吲哚酮化合物

Scheme 25 Arylsulfonylation of activated alkenes for the synthesis of indolinones

图式 26 活泼烯烃和苯磺酸的双官能化合成吲哚酮化合物

Scheme 26 Difunctionalization of activated alkenes with benzenesulfinic acids for the synthesis of indolinones

图式 27 无氧化剂条件下铈催化丙烯酰胺的双官能团化合成吲哚酮化合物

Scheme 27 Rhodium-catalyzed difunctionalization of acrylamide for the synthesis of indolinones under oxidant-free conditions

图式 28 铜催化一锅法三氟甲基化合成双取代吲哚酮化合物

Scheme 28 Copper-catalyzed one-pot trifluoromethylation for the synthesis of disubstituted indolinones

同年, Kong 和 Nevado 等^[52]利用催化量的四丁基碘化铵作为催化剂, 成功实现了无金属和无氧化剂条件下 *N*-苯磺酰基丙烯酰胺和 Togni 试剂的烯烃双官能团选择性芳基化/三氟甲基化反应(Scheme 29). 通过底物 *N* 上的取代基的调控, 分别得到 α -芳基- β -三氟甲基酰胺和 C(3)芳基基/烷基双取代吲哚酮化合物.

Conditions A: The hypervalent iodine- CF_3 reagent (2 equiv.), CH_3CN (0.5 mol/L), 80 °C, 12 h

Condition B: The hypervalent iodine- CF_3 reagent (1.5 equiv.), NaHCO_3 (1 equiv.), CH_3CN (0.5 mol/L), 80 °C, 12 h

图式 29 无金属条件下丙烯酰胺的双官能团化合成吲哚酮化合物

Scheme 27 Metal-free difunctionalization of acrylamide for the synthesis of indolinones

11 总结与展望

综上所述, 以 *N*-芳基丙烯酰胺为起始原料, 经自由基加成再环化的途径是有效构建吲哚酮骨架分子的方法. 在此过程中, 涌现了不少 $\text{sp}^3\text{-C-H}$ 键断裂产生自由基以及可见光催化产生自由基的研究工作. 此外, 还包括三氟甲基自由基、酰基自由基、芳基自由基、叠氮自

由基、硝基自由基、膦自由基、磺酰基自由基等进行环化构建 C(3)位功能化的吲哚酮骨架. 该类反应具有条件简单、反应快捷的特点, 为合成复杂药物分子提供了一种可能的方法. 然而目前这些反应的适用范围还不够广泛, 尤其是针对活性较低的烷烃参与的反应较少; 此外, 在大多数的反应中, 需要加入贵金属催化剂, 有些反应中还需要加入氧化剂. 因此, 该类反应在经济性和环境友好方面还有待进一步提高. 近年来, 随着绿色化学理念的不断深入, 光化学也被应用于催化此类反应, 这也是绿色化学发展的一个趋势. 迄今为止, 尚未见不对称合成在该反应的研究报道, 这将是该反应的一个巨大机遇和挑战.

References

- [1] (a) Galliford, C. V.; Scheidt, K. A. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2007**, 46, 8748.
(b) Millemaggi, A.; Taylor, R. J. K. *Eur. J. Org. Chem.* **2010**, 4527.
(c) Leptosin, D.; Takahashi, C.; Numata, A.; Ito, Y.; Matsumura, E.; Araki, H.; Iwaki, H.; Kushida, K. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1994**, 1859.
(d) Ma, J.; Hecht, S. M. *Chem. Commun.* **2004**, 1190.
- [2] Zhou, F.; Liu, Y.-L.; Zhou, J. *Adv. Synth. Catal.* **2010**, 352, 1381.
- [3] (a) Shen, K.; Liu, X.-H.; Lin, L.-L.; Feng, X.-M. *Chem. Sci.* **2012**, 3, 327.
(b) Trost, B. M.; Xie, J.; Sieber, J. D. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, 133, 20611.
- [4] Abelman, M.; Oh, T.; Overman, L. *J. Org. Chem.* **1987**, 52, 4130.
- [5] Pinto, A.; Jia, Y.; Neuville, L.; Zhu, J. *Chem. Eur. J.* **2007**, 13, 961.
- [6] Klein, J.; Taylor, R. *Eur. J. Org. Chem.* **2011**, 6821.
- [7] Jia, Y.-X.; Kündig, E. P. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, 48, 1636.
- [8] (a) Jaegli, S.; Dufour, J.; Wei, H.-L.; Piou, T.; Duan, X.-H.; Vors, J.-P.; Neuville, L.; Zhu, J. *Org. Lett.* **2010**, 12, 4498.
(b) Piou, T.; Neuville, L.; Zhu, J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, 51, 11561.
(c) Trost, B. M.; Brennan, M., K. *Synthesis* **2009**, 3003.
- [9] Wu, T.; Mu, X.; Liu, G.-S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, 50, 12578.
- [10] Mu, X.; Wu, T.; Wang, H.-Y.; Guo, Y.-L.; Liu, G.-S. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, 134, 878.
- [11] Wei, W.-T.; Zhou, M.-B.; Fan, J.-H.; Liu, W.; Song, R.-J.; Liu, Y.;

- Hu, M.; Xie, P.; Li, J.-H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 3638.
- [12] Wang, H.; Guo, L.-N.; Duan, X.-H. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 10370.
- [13] Li, Z.; Zhang, Y.; Zhang, L.; Liu, Z.-Q. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 382.
- [14] Dai, Q.; Yu, J.; Jiang, Y.; Guo, S.; Yang, H.; Cheng, J. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 3865.
- [15] Meng, Y.; Guo, L.-N.; Wang, H.; Duan, X.-H. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 7540.
- [16] Lu, M.-Z.; Loh, T.-P. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 4698.
- [17] Xie, J.; Xu, P.; Li, H.-M.; Xue, Q.-C.; Jin, H.-M.; Cheng, Y.-X.; Zhu, C.-J. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 5672.
- [18] (a) Pan, C.-D.; Zhang, H.-L.; Zhu, C.-J. *Org. Biomol. Chem.* **2015**, *13*, 361.
(b) Li, J.; Wang, Z.-G.; Wu, N.-J.; Gao, G.; You, J.-S. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 15049.
- [19] Shimizu, M.; Hiyama, T. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2005**, *44*, 214.
- [20] Xu, P.; Xie, J.; Xue, Q.-C.; Pan, C.-D.; Cheng, Y.-X.; Zhu, C.-J. *Chem. Eur. J.* **2013**, *19*, 14039.
- [21] Yang, F.; Klumpp, P.; Liang, Y.-M.; Lipshutz, B. H. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 936.
- [22] (a) Fu, W.-J.; Xu, F.-J.; Fu, Y.-Q.; Xu, C.; Li, S.-H.; Zou, D.-P. *Eur. J. Org. Chem.* **2014**, 709.
(b) Li, L.; Deng, M.; Zheng, S.-C.; Xiong, Y.-P.; Tan, B.; Liu, X.-Y. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 504.
- [23] Tang, X.-J.; Thomason, C. S.; Dolbier, Jr. W. R. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 4594.
- [24] Yin, F.; Wang, X.-S. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 1128.
- [25] Wang, J.-Y.; Su, Y.-M.; Yin, F.; Bao, Y.; Zhang, X.; Xu, Y.-M.; Wang, X.-S. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 4108.
- [26] (a) Li, Z.; Cao, L.; Li, C.-J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2007**, *46*, 6505.
(b) Kim, H. J.; Kim, J.; Cho, S. H.; Chang, S. J. *Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 16382.
(c) Xue, Q.-X.; Xie, J.; Li, H.-M.; Cheng, Y.-X.; Zhu, C.-J. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 3700.
- [27] Zhou, S.-L.; Guo, L.-N.; Wang, H.; Duan, X.-H. *Chem. Eur. J.* **2013**, *19*, 12970.
- [28] Zhou, M.-B.; Wang, C.-Y.; Song, R.-J.; Liu, Y.; Wei, W.-T.; Li, J.-H. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 10817.
- [29] (a) Galli, C. *Chem. Rev.* **1988**, *88*, 765.
(b) Heinrich, M. R. *Chem. Eur. J.* **2009**, *15*, 820.
- [30] Prier, C. K.; Rankic, D. A.; MacMillan, D. W. C. *Chem. Rev.* **2013**, *113*, 5322.
- [31] Fu, W.-J.; Xu, F.-J.; Fu, Y.-Q.; Zhu, M.; Yu, J.-Q.; Xu, C.; Zou, D.-P. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 12202.
- [32] Zhou, M.-B.; Song, R.-J.; Ouyang, X.-H.; Liu, Y.; Wei, W.-T.; Deng, G.-B.; Li, J.-H. *Chem. Sci.* **2013**, *4*, 2690.
- [33] Wang, H.; Guo, L.-N.; Duan, X.-H. *Adv. Synth. Catal.* **2013**, *355*, 2222.
- [34] (a) Pinhoe Melo, T. M. V. D. In *Organic Azides: Syntheses and Applications*, Eds.: Bräse, S.; Banert, K., Wiley-VCH, Weinheim, **2010**, Vol. 53.
(b) Bräse, S.; Banert, K. In *Organic Azides*, Wiley-VCH, Weinheim, **2010**.
(c) Jung, N.; Bräse, S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 12169.
- [35] Jimeno, C.; Renaud, P. *Radical Chemistry with Azides*, in *Organic Azides: Syntheses and Applications*, Eds.: Bräse, S.; Banert, K., Wiley, Chichester, **2010**.
- [36] Matcha, K.; Narayan, R.; Antonchick, A. P. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 7985.
- [37] (a) Yuan, Y.-Z.; Shen, T.; Wang, K.; Jiao, N. *Chem. Asian J.* **2013**, *8*, 2932.
(b) Wei, X.-H.; Li, Y.-M.; Zhou, A.-X.; Yang, T.-T.; Yang, S.-D. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 4158.
- [38] Qiu, J.; Zhang, R.-H. *Org. Biomol. Chem.* **2014**, *12*, 4329.
- [39] Ono, N. *The Nitro Group in Organic Synthesis*, Wiley-VCH, New York, **2001**.
- [40] Li, Y.-M.; Wei, X.-H.; Li, X.-A.; Yang, S.-D. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 11701.
- [41] Shen, T.; Yuan, Y.-Z.; Jiao, N. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 554.
- [42] (a) Van der Jeught, S.; Stevens, C. V. *Chem. Rev.* **2009**, *109*, 2672.
(b) George, A.; Veis, A. *Chem. Rev.* **2008**, *108*, 4670.
- [43] Allen, D. W. *Organophosphorus Chem.* **2010**, *39*, 1.
- [44] (a) Li, Y.-M.; Sun, M.; Wang, H.-L.; Tian, Q.-P.; Yang, S.-D. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 3972.
(b) Li, Y.-M.; Shen, Y.; Chang, K.-J.; Yang, S.-D. *Tetrahedron* **2014**, *70*, 1991.
- [45] Fontcave, M.; Ollagnier-de-Choudens, S.; Mulliez, E. *Chem. Rev.* **2003**, *103*, 2149.
- [46] Bertrand, M. P.; Ferreri, C. In *Radicals in Organic Synthesis*, Eds.: Renaud, P.; Sibi, M., Wiley-VCH, Weinheim, **2001**, Vol. 2, pp 485~504.
- [47] Li, X.; Xu, X.-S.; Hu, P.-Z.; Xiao, X.-Q.; Zhou, C. J. *Org. Chem.* **2013**, *78*, 7343.
- [48] Shen, T.; Yuan, Y.-Z.; Song, S.; Jiao, N. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 4115.
- [49] Li, C.-C.; Yang, S.-D. *Org. Lett.* **2015**, *17*, 2142.
- [50] (a) Purser, S.; Moore, P. R.; Swallow, S.; Gouverneur, V. *Chem. Soc. Rev.* **2008**, *37*, 320.
(b) Studer, A. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 8950.
(c) Tomashenko, O. A.; Grushin, V. V. *Chem. Rev.* **2011**, *111*, 4475.
- [51] Kong, W.-Q.; Casimiro, M.; Merino, E.; Nevado, C. J. *Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 14480.
- [52] Kong, W.-Q.; Casimiro, M.; Fuentes, N.; Merino, E.; Nevado, C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 13086.

(Lu, Y.)