高效手性膦配体的研究进展

赵文献^{*,a,b} 杨代月^b 张玉华^c^(a) 商丘师范学院化学化工学院 商丘 476000)^(b) 郑州大学化学与分子工程学院 郑州 450000)^(c) 商丘市环境监测站 商丘 476000)

摘要 手性膦配体的合成及应用是不对称有机反应中的重要研究领域。按照手性膦配体的手性中心以及配体结构的不同,对近二十年来在不对称合成中所报道的高效手性膦配体的研究进展进行了综述,并对该类配体的发展前景进行了展望。

关键词 手性; 膦配体; 不对称合成

Progress in Efficient Chiral Phosphine Ligand

Zhao, Wenxian^{*,a,b} Yang, Daiyue^b Zhang, Yuhua^c^(a) College of Chemistry and Chemical Engineering, Shangqiu Normal University, Shangqiu 476000)^(b) College of Chemistry and Molecular Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450000)^(c) Shangqiu Environmental Monitoring Station, Shangqiu 476000)

Abstract Synthesis and application of chiral phosphine ligand is an important research area in the field of asymmetric synthesis. According to the chiral center and the structural characteristics, the recent development of efficient chiral phosphine ligand in asymmetric synthesis is reviewed, and the prospects of chiral phosphine ligand are also discussed.

Keywords chiral; phosphine ligand; asymmetric synthesis

历史上第一个手性膦配体是由 Knowles^[1]及 Horne 等^[2]报道合成的。迄今为止,已相继合成出数千个手性膦配体,但只有少数手性膦配体得到广泛应用,实现了在香料、药物、食品添加剂等方面的工业化生产^[3~7]。手性膦配体在不对称合成中起着重要的作用。Kagan^[8]认为一个好的手性膦配体应该具有以下条件:(1)原料廉价易得;(2)具有较大的刚性骨架;(3)合成步骤简单;(4)合成过程中不经过拆分;(5)可以同时得到一对对映体。本文对近二十年来在不对称合成中报道的手性膦配体进行了归纳、总结,并就其自身的优缺点和今后的发展趋势进行了全面的讨论。

1 膦配体

一般认为,手性催化剂的不对称单元应尽可能的靠近化合物中心的金属原子^[1],因此早期的膦配体的手性

中心大多数位于磷原子上。手性膦配体包括手性单膦配体、手性双膦配体、碳中心膦配体等几种类型。

1.1 单膦配体

手性单膦配体主要是手性碳骨架的单膦配体。早在 1968 年 Knowles^[1]和 Horner 等^[2]将手性单齿膦配体应用到不对称催化反应,但是单齿膦配体很快被双齿膦配体替代。直到 1991 年 Hayashi 等^[9]成功地将单齿 MOP 配体应用于 Pd 催化的烯丙基取代反应,人们又重新关注单齿膦配体的研究。

单膦配体根据磷原子的成键不同分为膦配体、亚膦酸酯配体、亚膦酸酯配体、亚膦酰胺酯配体以及其他类型的单膦配体(图 1)。

最早人们对膦配体的合成限于用各种取代基取代 Wilkinson 催化剂的苯基,合成膦手性膦化合物并用于

* E-mail: zhwx2595126@163.com

Received March 4, 2016; revised May 30, 2016; published online June 20, 2016.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 20972091, 21172139), and the Key Science Research of Education Committee in Henan Province (No. 16A150020).

国家自然科学基金(Nos. 20972091, 21172139)、河南省高等学校重点科研(No. 16A150020)资助项目。

图1 不同类型的单膦配体

Figure 1 Different types of single phosphorus ligand

手性催化, 最有效的是 Knowles 合成的手性配体 PAMP 和 CAMP, 但也只有 60% 的对映选择性. 在最近几年, 研究者运用不同的合成方法合成了各种类型的手性单膦配体(图 2). 如手性单膦配体 R-MOP-phen (**4**) 在不对称氢硅烷化反应中 *ee* 值可达到 80% 以上^[10].

2011 年 Bakos 等^[11]也报道膦配体 **6**, 并将其用于衣康酸二甲酯的不对称氢化反应中, *ee* 值可以达到 94.1%. 同时, Kündig 课题组^[12]将手性亚磷酸酯配体 **14** 应用于催化前手性的双芳香烃类三羰基铬络合物的不对称反应中, *ee* 值可以达到 98%. 在 2000 年张绪穆课题组^[13]合成报道了配体 **16**~**18**, 用于催化 Baylis-Hillman 反应, 得到的产物的 *ee* 值只有 19%; 该课题组^[14]在 2006 年合成的配体 **13** 应用在脱氢氨基酸的不对称氢化反应中, 得到的产品 *ee* 值可大于 92.6%. 游书力课题组^[15]在 2007 年合成并报道了手型单齿亚磷酸酯配体 **14**, 并将其应用到烯丙基亚磷酸盐的异构化和吡啶的分子内不对称烯丙基烷基化反应中, 分别得到 95% 和 92% 的 *ee* 值. 以后他们又相继发展出配体 **19**~**22**^[16], 并将其应用在吡啶、喹啉、异喹啉等杂环化合物的分子内不对称烯丙基烷基化和吡啶衍生物的分子内不对称烯丙基烷基化反应中, 得到产物的 *ee* 值达到 99% 和 93%. 2013 年以后汤文军课题组^[17]相继合成了配体 **23**~**25**, 将配体 **23** 和 **24** 与钌的配合物应用在催化芳香醛和芳基硼酸的加成反应中, 得到 *ee* 值大于 81% 的产物, 用在通过 Suzuki-Miyaura 交叉偶合合成手性芳基三氟甲磺酸酯的反应中, 可以得到 *ee* 值大于 87% 的产物^[18]; 汤文军课题组^[19]在 2016 年又报道了将配体 **25** 与钯的配合物, 催化合成二氧六环木脂衍生物, 得到的产物的 *ee* 值为 77%.

单膦配体能够以一配位、二配位或者多配位的形式与中心金属离子配位并催化反应. 当中心金属离子只能提供一个配位轨道时, 单膦配体就能够以一个配体同中心金属离子配位, 进行催化不对称反应. 在多配位的金属配合物催化的反应中, 单齿膦配体同样能够以多个配体同时与中心金属离子配位, 这是由于配体没有螯合作用, 催化剂的柔性较大, 在催化反应时能够适应不同底物的要求, 获得更好的选择性. 因此, 可以得到更好的

对映选择性^[20].

1.2 手性膦双膦配体

大量研究表明, 由单膦配体制成的过渡金属络合物催化剂其构型易变, 所以其立体选择性一般不高. 因此继单膦配体之后, 人们开始将视线转向双膦配体. Knowles 课题组将 PAMP 偶联制备了双齿的 DIPAMP, 这个配体在不对称氢化过程中得到了 95% *ee* 值. 在这个过程中双齿配体与金属离子发生了螯合作用, 不仅增加了催化剂结构的刚性, 而且提高了催化剂的稳定性. 但是以后关于磷做中心的手性双膦配体很少有报道, 直到 1995 年配体 **26**(图 3)的合成, 才进一步开始了对双膦手性配体的研究, 虽然它的手性中心并不在磷原子上.

配体 **26** 是由 Burk 小组^[21]合成的, 并将其与 Ru(II) 进行配合用于 β -羰基酯的不对称催化氢化中, 因其构型稳定, 取得了 >95% 的 *ee* 值. 配体 **27** 是由 Imamoto 课题组^[22]于 1998 年设计合成的, 并在 1999 年将 **27**-RuBr₂ 用于活性羰基化合物的催化氢化. 2011 年, Gridnev 小组和 Imamoto 小组^[23]共同报道了手性中心在磷原子上的双膦配体 **29a**~**29c**, 考察了其用在 α 、 β -脱氢氨基酸以及 α -取代的烯胺的不对称氢化反应, 取得了 99.9%, 99.8%, 95.1% 的对映选择性. 随后 Imamoto 小组^[24]在此基础上对手性配体进行了修饰得到配体 **30a**, **30b**, 在脱氢氨基酸的不对称氢化反应中表现出很好的催化效果. 在此期间张绪穆课题组^[13]报道了配体 **31** 和 **32**, 并将其应用在催化 Baylis-Hillman 反应和脱氢氨基酸的不对称氢化反应中, 得到的产物 *ee* 值为 20% 和 99%. 然后张绪穆课题组^[25]又合成报道了配体 **33** 和 **34**, 将配体 **33** 分别用在 α 、 β -脱氢氨基酸以及 α -取代的烯胺的不对称氢化反应中, 分别得到了 *ee* 大于 95% 和 96% 的产物. 将配体 **34** 用在 β -氨基酮的加氢反应中, 根据不同的氢压力、不同的溶剂、不同的反应时间, 可得到不同的 *ee* 值的产物, 使其产物的最小的 *ee* 值达到 91% 以上. 汤文军课题组^[26]在 2009 年合成了配体 **35**, 并将其应用在芳基烯烃的不对称加成上, 得到 *ee* 值大于 96% 的产物. 2013 年汤文军课题组^[27]又报道了将这个配体用在 β -芳基胺的加成反应和芳基硼酸与含氟芳基酮的加成反应中, 分别得到 93% 和 85% 的 *ee* 值. 在此基础上, 该课题组^[28]又对这一类配体进行了修饰, 合成了配体 **36**, 将与钌的配合物用在催化芳基酮的加成反应中, 得到大于 95% *ee* 值的产物.

这类配体的主要特点是每个 P 上都连有一个体积大的烃基(比如叔丁基), 这类配体可以与过渡金属形成一个具有 C₂ 不对称轴的五元配合物 **28**. 该配合物可以在反应过程中提供不对称环境, 从而使得反应具有高度的立体选择性.

图2 配体1~25的结构
 Figure 2 Structures of ligands 1~25

图3 配体 DIPAMP 及 26~36 的结构

Figure 3 Structures of ligands DIPAMP and 26~36

2 C-手性膦配体

在膦配体发展的基础上, Morrison 认识到: 作为手性配体, 膦配体碳骨架上的手性也能有效地进行不对称传递. 这一论点随后被 Kagan 的研究所证实, 他从天然的酒石酸出发合成得到 C-手性的双膦配体 DIOP, 该配体在不对称催化氢化中取得了比较好的对映选择性. C-手性的膦配体比 P-手性的膦配体的制备相对更容易, 结构的变化性更大.

2.1 手性碳单膦配体

1971 年, Morrison 等^[29,30]第一次合成了手性碳原子单膦配体 **37**. 1993 年 Dawson 等^[31]从手性 α -氨基酸合成了一种新型膦配体 **38**, 该配体与过渡金属的络合物在许多反应中表现出很好的催化性能. 后来 Helmchen G^[32,33]在此基础上对磷的取代进行了改进, 得到了类似的配体 **39**, 常见的此类配体还有配体 **40**^[34]. 带有两个噁唑环的配体 **41** 也用这样的方法制得^[35], 但是也因为单膦配体制成的过渡金属络合物手性催化剂构型易变、立体选择性不高, 单膦配体的发展一直很慢. 直到 Hamada^[36]与 Chen 等^[37,38]先后报道了两种相关的手性稠合双环单膦配体 **42** 及 **43**, 这样的配体由于具有刚性稠合双环结构, 构型不易变化. 将其应用在不对称催化反应中, 均得到大于 96% 的 *ee* 值.

以具有旋光活性的天然产物为原料, 是合成手性膦的重要途径, 这类工作已经得到相关综述^[39]. 近年来 Lugan 等^[40]以薄荷醇为原料合成了配体 **44**. 另外手性 β -

氨基烷基单膦配体在不对称合成中的应用中也得到了很大的进展^[41~43].

图4 配体 37~44 的结构

Figure 4 Structures of ligands 37~44

2.2 手性碳双膦配体

许多低氧化态的金属配合物因为双膦配体的应用而得以稳定和分离, 与单齿膦相比, 螯合双膦配体易于控制配位数和立体构型, 增加中心金属原子的碱性, 降低配合物分子间或者分子内的交换过程^[44]. 他们在不

对称合成中具有重大应用,同时也具有巨大的经济效益.

早在 1972 年, Kagan 课题组^[45,46]以酒石酸为原料合成了第一个手性双膦配体 DIOP (**45**). 配体 **45** 与过渡金属铑组成的 DIOP-Rh⁺ 和 DIOP-Rh^N 催化剂对各种不饱和底物的还原都是一种有效的均相催化剂, 且对具有活性的手性羰基化合物的催化氢化可以在温和的条件下进行. 实验证明, 随着 DIOP 中的 R 基团体积的增大, 催化剂的催化活性也有很大的增强. 此后一系列 DIOP 的类似物均被制得^[47,48], 在这些 DIOP 的衍生物中, 以萘基取代苯基效果较好, 而五元环上的改变对选择性的影响不大^[49]. 如 Achiwa 等^[50]运用酒石酸衍生物出发合成了配合物 **46** 用于烯烃的氢化, 对映选择性高达 95%. 由张兆国等^[51]开发的手性双膦配体 **47**, 在催化 β -酮磷酸酯的不对称反应中 *ee* 值高达 99.9%.

以光学活性的二醇为原料可以合成一系列高选择性的双膦配体, 如 1993 年 Burk 等^[52~58]从二醇出发合成了 Duphos 型的手性配体 1,2-二膦基苯配体 **48** 和 1,2-膦基乙烷配体 **49**, 将其用于 α -N-酰胺基丙烯酸酯催化中达到 100% 的 *ee* 值. 这两种配体具有下面的特点: 磷原子上带有富电子的烷基; 依靠 P 杂环上 2,5 位置的取代基方向来控制反应物的配位方向, 可以在不对称反应中获得较高的对映选择性.

根据运用具有光学活性的原料来制备手性配体的思想, 手性膦的研究取得了很大的进展. 以 L-4-羟基脯氨酸合成了 **50**^[59,60], 在用于烯烃的氢化反应中 *ee* 值可以达到 65%; 通过对磷、氮上取代基的改变合成了类似

物 **51~53**^[61], 在催化酮的氢化还原过程中 *ee* 值分别达到了 66.3%, 72.8%, 92.0%; 类似的含有氮杂环的配体 AMPP **54**^[37] 也已经被合成出来, 被用在 α -官能团的酮的氢化还原中, 且取得了 *ee* 值达到 90% 以上的立体选择性; Rajanbabu 等^[62]合成了系列配体 **55**, 用于催化氢化反应中, 得到产物的 *ee* 值均可以达到 91% 以上; 同样由木糖得到了配体 **56**^[63], 催化反应的 *ee* 值达到了 90% 等.

3 含 C₂ 对称轴的膦配体

在 DIOP 的启发下, 人们开始着手合成具有 C₂ 对称轴的手性配体. 早在 20 世纪 70 年代 Kagan 和 Dang 就已经提出, 如果一个具有 C₂ 对称轴的配体络合到中心金属离子, 则无论反应物从哪一个方向靠近金属离子, 它处在的手性环境都是一样的, 这样就减少了反应的可能途径^[34]. 这样的配体可以和过渡金属形成五元(如 **57**)^[64]、六元(如 **58**)^[65]及七元(如 **59**)^[66~69]的螯合环. 在这些膦配体中, 配体 **48**, **49**, **60**^[70~72]是较突出的代表, 他们都含有膦五元环, 也都具有 C₂ 手性对称轴, 就像配体 **45** 和 **60** 一样, 他们拥有全 sp² 杂化成键的芳香环骨架, 可以在催化过程中表现出卓越的空间效应, 同时还可以增加催化剂的极性和 Lewis 酸性.

2005 年, 丁奎岭课题组^[73]报道了配体 **61** 的合成, 并将其应用在芳基脂的加氢反应中, 可以得到 *ee* 值大于 99% 的产物. Schmid 等^[74]报道了 **62** 的合成及其在烯烃的不对称反应中的应用. 用同样的方法, Rossen 等^[75]合成了配体 **63**, 该配体在烯胺的氧化反应中, 其立体选

图 5 配体 **45~56** 的结构
Figure 5 Structures of ligands **45~56**

图6 配体 57~63 的结构
Figure 6 Structures of ligands 57~63

择性高达 99% *ee*. Burk 等^[55,57]利用配体 48, 49 和铑、钯的螯合物在促进烯胺和酮的不对称催化氢化和立体选择性方面发挥了优良的催化性能, 对脱氢氨基酸及其衍生物的不对称氢化, 都可以得到很高的 *ee* 值(接近 100% *ee*). 在手性配体中, 大多数都是能与中心金属配位成螯合物, 尤其是拥有 C_2 对称轴的手性双齿膦配体, 它们的分子有较强的刚性和稳定的构象, 使这一类型的手性配体所催化的不对称反应其光学活性表现优良.

4 手性中心在两个原子上的膦配体

尽管人们已经发现了多种优秀的双膦配体, 但是真正用于工业化的手性膦配体还是很少的, 主要原因在于手性膦配体合成的难度比较大. 随着手性配体的发展, 人们逐渐发现氮膦、氧膦、双氧膦配体更容易合成且结构变化更大, 所以这类配体继 *C*-手性膦配体之后成为了该领域新的研究热点.

4.1 手性中心在碳、磷原子上的配体

手性中心同时在碳、磷原子上的配体主要有 64, 65, 66^[76], 67^[77] (图 7). Wills 等在 1994 年报道从光学活性的胺出发制得配体 64, 65, 66, 并将其用于催化对不饱和底物的烷基化. 在这些配体中包含了一个重要的结构单元, 即由一个芳香环并一个 P—N 键构成的五元环, 这保证了在结构中高度的刚性. 在催化反应中发现, 采用晶体状态的配体的催化效果较非晶体状态的配体的要好, 如配体 68, 这说明了配体的纯度在反应中起到重要的作用. 但是由于膦配位上的磷原子对氧敏感, 所以会采用硼烷对其保护的衍生物.

4.2 新型螺环骨架膦配体

根据具有 C_2 轴对称性和适当的刚性的双膦配体可以提高反应的对映面识别能力^[78]. Kumar 等^[79]于 1992 年首次报道了用光学活性的 *cis*-螺[4, 4]壬烷-1,6 二醇 69 修饰四氢化铝锂后用于还原芳香酮, 得到了 98% 的 *ee* 值. 1996 年陈新滋和蒋耀忠课题组以螺[4, 4]壬烷为母体合成了 (1*R*, 2*R*, 6*R*)-1,6-双(二苯基膦氧)-螺[4, 4]壬烷[简称 (*R*)-spirOP, 70] 和 (1*S*, 2*S*, 6*S*)-1,6-双(二苯基膦氧)-螺

图7 配体 64~68 的结构
Figure 7 Structures of ligands 64~68

[4,4]壬烷[简称 (*S*)-spirOP, 71]. 将配体 70 制得相应的铑催化剂, 在室温、常压下对 2-乙酰氨基丙烯酸进行氢化可以得到 96.8% 的 *ee* 值, 并且这个配体的高对映选择性对不同结构的脱氢氨基酸底物具有普遍适应性, 如对一系列 (*Z*)-2-乙酰氨基-3-芳基丙烯酸甲酯的还原, 其对映选择性高达 90%~99.9% *ee*^[80,81]. 丁奎岭课题组^[82]在此基础上于 2009 年报道合成了新型螺环骨架的手性膦氮配体 72, 73, 其在前手性亚胺, 尤其是烷基亚胺的催化氢化中显示了十分优异的对映选择性 (*ee* > 91%). 丁奎岭课题组^[83]又在 2012 年合成报道了手性芳香螺缩酮骨架双膦配体 74 (SKP), 手性 SKP 配体已经在一些金属催化的不对称反应中取得了成功的应用^[84], 特别是在钯催化的 Morita-Baylis-Hillman 加和物的不对称烯丙基胺化反应中, 表现出优异的区域和对映选择性 (87%~90% *ee*), 以及极高的催化活性 [$Pd_2(dba)_3$ 用量可降低至万分之一]. 还将这种方法应用到手性药物依折麦布中间体的不对称合成中, 为发展绿色环保的药物生产提供了基础.

5 氮膦、氧膦配体

这类配体一般是从手性氨基醇和酰胺醇、手性氨基酸、糖类合成过来的. 手性氨基醇化合物 75 通常以氯作

图 8 配体 69~74 的结构

Figure 8 Structures of ligands 69~74

辅助配体, 用甲苯作溶剂对 **A**, **B** 进行了手性催化氢化. 实验表明这类配体可以催化还原 **A** 达到 80%~89% *ee*, 而对 **B** 只能达到 71%~77% *ee*. 手性酰胺醇是从手性氨基醇衍生出来的, 含有卤素辅助配体的 **76a**, **76b** 所需的反应温度低时间短, 对 **A** 的催化氢化的 *ee* 值可达 86%~90%, 对 **B** 催化氢化的 *ee* 值最高也只有 70%^[85]. 而配体 **76c**, **76d** 以苯作溶剂对 **A**, **B** 的催化氢化时间长且效果差.

图 9 配体 75~76 的结构

Figure 9 Structures of ligands 75~76

Mortreux 课题组在 1988 年通过手性氨基酸设计合成了新配体 **77**, 并将其与 Ru(II) 的配合物用于手性催化. 根据研究, 虽然 Ru(II)-**77** 催化氢化酮的效果一样, 但是随着取代基的不同, 与 Ru(I), Ru(II) 生成的配体对 **A**, **B** 的 *ee* 值只在 40%~85%, 并且通过对比 **77a**~**77b** 的催化活性可以得到: N—P 连接的基团部分可以控制反应速度和立体选择, 还可以显著的增强催化剂的反应活性

和立体选择性. 同样来源的手性配体 **78**, 与 Ru 结合用于 **A** 的手性催化氢化, *ee* 值可以达到 95%~98%, 但是这个过程需要辅助配体. 考虑到电子效应的影响, 该小组进一步合成了配体 **79**, 实验证明 Ru-**79b** 对 **A** 的催化可以得到 >90% 的 *ee* 值. 这说明了电子效应对配体构型的影响很大^[86].

图 10 配体 77~79 的结构

Figure 10 Structures of ligands 77~79

从糖类合成的配体, 因糖具有多个手性中心, 变化繁多, 所以得到了化学家们的广泛关注. 自 1976 年 Kauabata 利用聚糖-纤维素为手性原料合成配体之后, 人们合成了大批单糖和双糖的手性膦配体如 **80**, **81**(图 11), 在不对称催化反应中起到重要的作用. 到 1993 年 Bendayan 课题组再次合成了 4 个手性配体 **82**~**85** 用于 **A** 的催化氢化上, 但是得到的转化率和 *ee* 值都不是很好, *ee* 值最大只能达到 20%. 直到 2000 年 Mortreux 课题组^[87]运用甘露糖醇的衍生物合成手性配体 **86**, 并将其与 Rh 的配合物用于手性催化氢化, 当其辅助配体为 CF_3CO_2^- 时, 可以得到 80%~90% 的 *ee* 值. 证实了这类配体具有一定的局限性, 不是需要辅助配体, 就是立体选择性不好.

6 联芳环类手性膦配体

具有阻转异构现象的手性联芳环类化合物在不对称选择性反应中是一类非常重要的手性配体, 是在过渡金属催化的不对称反应中最好的配体之一.

最早的联芳环类手性膦配体 **87** 是由 Tamao 课题组^[88]合成报道的, 但是其不对称催化诱导性能很差. 直到 1986 年 Noyori 等^[89]成功的合成了著名的 BINAP 双膦配体 **59**, 此配体依赖连接两个萘环的 C—C 单键旋转

图 11 配体 80~86 的结构
Figure 11 Structures of ligands 80~86

受阻而使整个分子具有旋光性。

在联萘类手性膦配体的研究中,一般是在萘环上引入一些基团或者引入空间位阻很大的基团,进而改变膦配体的立体和电子效应。如陈新滋课题组^[90]利用联萘

酚的氧膦配体 **88**(图 12)研究了不对称氢氰化的催化性能,其立体选择性可以达到 92% 的 *ee* 值。在联萘类膦配体中,与氮原子相连的二苯基膦配体(如 **89**^[91], **90**^[92]),还有引入配位能力的吡啶或噁唑啉的配体(如 **91**^[93], **92**^[94,95])在不同的反应中得到很好的选择性。在 2000 年,张绪穆课题组^[96]合成了配体 **93**,并将其应用在 α,β 不饱和酮的加氢反应中,得到 *ee* 为 99% 的产物。根据其方法,2006 年,Chan 小组^[97]开发了手性桥键连接的联萘类配体 **94**,在催化 α -酮酯的不对称氢化反应中也表现出很高的对映选择性,*ee* 值高达 97%。2010 年,张俊良课题组^[98]以 **94**, **95** 为手性配体,实现了金催化的共轭烯炔酮与硝酮的不对称加成反应,获得了优良的产率和立体选择性,但对于环加成反应只能获得很低的对映选择性,直到 2014 年该课题^[99]组成功合成了配体 **96**,才成功地解决了催化环加成反应这类底物的问题。Lemaire 小组^[100]运用五步合成了光学纯的联萘骨架手性膦配体 **97a** 和 **97b**,在 Pd 催化的苯乙烯的不对称硅氢化反应中取得了较高的产率和对映选择性。2005 年,张绪穆课题组^[101]根据配体 **98** 合成了配体 **99**,将其用在催化甲酰基化反应中,可以得到 99% 的 *ee* 值。

联萘类双膦配体与联萘类膦配体结构相似,也具有优异的不对称催化诱导性能,而且比联萘类膦配体更加

图 12 配体 87~99 的结构
Figure 12 Structures of ligands 87~99

图 13 配体 100~108 的结构
Figure 13 Structures of ligands 100~108

易于修饰,可引入位阻较大或者具有电子效应的基团.这类化合物主要是通过乌尔曼偶联反应制得^[102],含有不同吸电子基团和给电子基团的联苯膦配体得到广泛的应用(如配体 100~102)^[103~109].联苯类氧膦配体 103, 104^[103,104]可以用于不对称氢甲酰化反应,并且具有一定的立体选择性,该反应可以得到 30%~35%的 *ee* 值,实验表明,当联苯类配体的磷原子上仅含有吸电子取代基时,反应活性则表现很差^[106].2008 年,张绪穆课题组^[110]合成了配体 105,在钌催化下的酮的加氢反应中,配体 105 给出了 92% *ee* 的对映选择性.在此基础上,王春江课题组^[111]在 2013 年报道合成了配体 106,在铱催化下的芳香酮的加氢反应中,配体 105 给出了 99% *ee* 的对映选择性.该课题组还在 2008 年合成了配体 107, 108^[112],并在以后的七年中将其分别用在甲亚胺叶立德和亚烷基丙二酸的不对称加成反应中^[113]、甲亚胺叶立德和三氟烯烃的反应中^[114]、甲亚胺叶立德和丁内脂的反应^[115]和用甲亚胺叶立德合成吡咯衍生物的反应中^[116],分别得到 65%, 93%, 98%, 97%的 *ee* 值.

随着联苯和联苯类膦配体的成功应用,人们认识到具有 C_2 对称轴的阻转异构膦配体很有研究价值,开始将研究转移到联杂环膦配体的合成上.联杂环类配体包括对称的即同一杂环偶联而成的膦配体及一分子杂环和苯环或萘环偶联而成的手性膦配体.1995 年 Benincori 等^[117,118]最早报道了带取代基的联苯并噻吩手性配体 109,这种配体中磷原子的电子密度有所增强,这样就增强了与过渡金属的配位能力,对 β -酮酸酯催化还原时,可以得到 99%的 *ee* 值.通过这样的方式,该课题组^[119]又合成了 N—N 键连的联苯吡啶膦配体和其他杂环

类的手性配体 110~112.将配体 111、112 用于 Heck 反应中可以得到 *ee* 值(86%~96%)和产率(76%~93%)均高于 BINAP 催化诱导的结果^[120].Brown 等^[121]较早报道了联吡啶双膦配体 113 的合成,但是却没有应用于不对称催化的研究报道.1999 年 Hiemstra 等^[119]报道了二苯并呋喃及其衍生物的手性配体 114~116,但是其在不对称催化氢化过程中相比 BINAP 需要的反应时间较长.与此同时,Guiry 等^[122]合成了含吡嗪环的萘单膦配体 117,但是因吡嗪环太小,长时间难以避免分子的消旋化.同时合成了含有喹啉环和萘环的新配体 118,在不对称烷基化反应中具有很高的转化率,但只有中等的 *ee* 值,且在不对称硼氢化反应过程中的立体选择性也不是很好^[122].

在这些配体中,由于 N, O, S 等杂原子的参与,可以调节其电子性能,并能较方便地控制配位数和立体构型,提高配合物的刚性,因而在不对称催化中具有较高的光学选择性.

7 含二茂铁基的手性膦配体

在不对称催化研究中,具有面手性的二茂铁类配体越来越受到重视.自 1970 年 Ugi 等^[123]成功地将 α -N,N-二甲基二茂铁乙胺拆分以来,已合成了数以百计的 α -手性二茂铁衍生物^[124],这些配体已经成功的运用到各种不对称反应中.戴立信团队^[125]也设计合成了一系列二茂铁膦配体,取得了令人瞩目的成果.Mathey 课题组^[126]研究合成了一种二茂铁类似物的膦配体 119,并将其运用到不对称催化过程中,得到了很好的结果.早期, Hayashi 等^[127]利用磷杂茂合成了一系列手性二茂铁膦配

图 14 配体 109~118 的结构
Figure 14 Structures of ligands 109~118

图 15 配体 119~130 的结构
Figure 15 Structures of ligands 119~130

体 **120~123**, 并考查了它们在不对称烯丙基化反应的催化诱导性能, 均表现出很好的立体选择性, *ee* 值高达 99%^[128]. 2005 年, 王敏灿课题组^[129]合成了手性二茂铁基配体 **124**, 将其用于铜催化的二乙基锌和亚胺的不对称加成反应中, 可以得到高于 88% *ee* 值. 2012 年, 我们课题组李高伟^[130]合成了具有平面手性和中心手性的二茂铁基亚砷膦配体 **125**, 将其用于催化 1,3-二苯基-2-丙烯基乙酸酯和丙二酸二甲酯/氢化钠的模板反应, 只能得到 20%的 *ee* 值. 2013, 我们课题组^[131]又报道了通过“一锅煮”的方法合成了一种新型的二茂铁基手性双膦配体 **126**, 该配体在不对称催化中的应用还在进一步研究中.

在二茂铁的茂环上引入含氮杂环(如配体 **127**^[132])或者引入较强刚性的环己烷(如配体 **128**^[133])也可以在不同的不对称氢化反应中取得很好的结果. 2003 年, 张绪穆

课题组^[134]合成了具有联萘的二茂铁配体 **129**, 在铱催化下, 在酮的催化加氢反应和烯胺的还原反应中, 配体 **128** 分别给出了 95% *ee* 和 94% *ee* 的对映选择性. 在同一年, 该课题组^[135]还合成报道了含有二茂铁的手性膦硫脲配体 **130**, 并将其应用在催化 β,β -取代硝基烯烃的选择性加氢反应中最高可以达到 99%的产率和 99%的对映选择性; 在铑催化下, 合成了手性 β 氨基硝基烷烃产物及其衍生物, 得到的产物 *ee* 高达 96%, 产率为 97%^[136]. 有关二茂铁膦配体的综述已经有报道^[137]. 这里不再过多描述.

8 其他手性膦配体

除上述的各种膦配体外, 同样还有许多其他膦配体在不对称催化反应中表现出非常好的催化性能, 如合成的一些特殊的配体 **131~135**^[138~143], 其中有些是由多元

图 16 配体 131~139 的结构
Figure 16 Structures of ligands 131~139

稠环或刚性很强的环得到的。科学家一般致力于三价磷配体的研究,而 Buono 课题组^[144]合成了五价磷的配体 **136**, **137**, 运用在苯甲醛与二乙基锌加成反应中,分别得到了 73%和 98%的 *ee* 值。Inanaga 等^[145]合成的联萘氧磷(V)金属复合物也可以看作是由一种五价磷配体 **138** 得到的催化剂,该催化剂用在烯酮的甲氧氢氨的 1, 4 加成反应中,得到很好的诱导性能,其铈(Sc)复合物的不对称催化可达 84% *ee* 值。2000 年,范青华课题组首次报道了以手性磷配体为核心的树状大分子磷配体 **139**,目前已经将其发展成为系列手性树状分子,并将其与铈、钕和铈形成配合物,成功地应用到烯炔、酮和亚胺(喹啉)等底物的不对称氢化反应中。虽然反应中可以看到树状分子的效应,但是树状分子如何影响催化剂的活性以及选择性,目前还不是很清楚^[146]。

9 手性磷配体的发展趋势

合成手性磷配体的目的就是要把它制备成催化剂用于不对称催化合成反应中^[147],纵观近年来的手性磷配体的合成研究,主要是配体的改进和创新。具体的研究有以下几个方面。

9.1 手性磷配体的改进

Hayashi 等^[148]对 BPPFA 配体进行改进合成了一种新的配体 **140**,用在取代烯烃的不对称加氢上,因其

起修饰作用的基团参与了金属的配位,所以取得了 92%~98% *ee* 值。Sayo 等^[149]根据联萘型双磷配体 BINAP 合成了联苯型双磷配体 BIPHEN **100**,其在各种溶剂中的溶解性均优于 BINAP,在一些不对称氢化反应中更是优于 BINAP 的立体选择性。

9.2 水溶性手性磷配体的合成

水溶性手性配体的合成,主要是为了分离催化剂和产物,从而使手性配体和金属有可能得到重复循环使用。磷的水溶性化合物的获得是通过一个强极性官能团的引入,例如配体 **141**, **142**^[150,151]。Ishizaki 等^[152]利用磺酸基制备成水溶性磷配体 **141**,由配体形成的络合物可以在水溶液中进行,反应条件温和,从而使该体系的应用范围得到进一步扩大。

9.3 负载型手性磷配体的合成

负载型手性磷配体的出现,是为了解决催化剂和产物的分离。主要是将催化剂负载与载体上,而载体可以是有机高分子,也可以是无机物。负载型手性配体的合成主要有以下两条途径:一是在高聚物的载体中引入活泼的基团,使可以与手性配体反应,得到含有手性磷支链的聚合物^[153~155],如 **143**;二是制得含有双键的手性磷配体作为单体,然后再进行聚合或者与其他单体共聚,得到负载型手性配体。如 Stille^[156]合成的聚合物固载手性双磷配体 **144**,在不对称氢甲酰化反应中得到

73%的 *ee* 值. 易兵等^[157]合成了咪唑型负载手性双膦配体 **145**, 并用于 α -乙酰氨基肉桂酸的不对称氢化反应, 产物的转化率为 100%, 对映选择性为 97%.

图 17 配体 140~146 的结构

Figure 17 Structures of ligands 140~146

9.4 负载型的水溶性配体的合成

1994 年, Wan 和 Davis^[158]根据水溶性手性膦配体和负载型手性膦配体的不同特点合成了一种新型负载型的水溶性催化剂体系. 这种催化剂含有一个水溶性的有机金属络合物, 这种有机金属络合物包含在一个负载在一种高表面的亲水性固体的水膜里, 而反应物和产物则在一个疏水性的有机相中. 它的催化剂组成为 **146**, 用于不对称加氢反应中 *ee* 值达到 96%.

9.5 手性环状胺膦配体的合成

手性胺膦配体因同时含有“软”的磷原子和“硬”的氮原子而具有丰富的配位化学性能和优秀的不对称诱导能力. 该配体中磷原子具有 π 受体的特性, 可以增加金属中心离子的碱性和提高配合物的稳定性. 而氮原

子因为具有 σ 电子给予性能可以与中心金属原子生成较弱的配位键. 李岩云课题组^[159~163]自行设计合成了一系列手性环状胺膦配体 **147~152**, 这些配体具有丰富的配位化学性能, 分别与不同的过渡金属生成的催化体系在多种类型的不对称催化反应中显示了独特的对映选择性. 将这些膦配体用在酮的不对称还原中都可以得到大于 90%的 *ee* 值. 2008 年, Trost 课题组^[164]合成报道了配体 **152**, 并将其用在不对称烯丙基烷基化反应中, 得到很好的对映选择性.

图 18 配体 147~152 的结构

Figure 18 Structures of ligands 147~152

9.6 具有螺环骨架的手性膦配体

从 20 世纪 90 年代, 特别是进入 21 世纪以来, 具有螺环骨架的手性膦(磷)配体受到了广泛的关注, 并逐渐发展成为特色鲜明的手性配体类别. 由陈新滋、蒋耀忠、张绪穆、周其林、丁奎岭等著名有机化学家, 将手性螺

环配体的骨架由多手性的螺[4.4]壬烷骨架发展到只具有单一手性的螺二氢茚和螺[4.4]壬二烯等螺环骨架类型,形成了包括手性螺环单磷配体、双磷配体、磷氮配体等丰富的手性配体库^[165~168]。如 **153~164**。这些手性螺环磷配体及其催化剂不仅在不对称催化氢化、不对称碳-碳键形成、不对称碳-杂原子键形成等多种类型的不对称催化反应中均表现出优异的催化活性和对映选择性,而且使得许多原先难以控制对映选择性的不对称催化反应变得可能。而今,手性螺环结构已成为“优势结构”,相应的手性螺环磷配体及其催化剂已被国内外同行广泛采用。手性螺环磷配体的兴起为手性催化剂研究增加了活力,极大地促进了不对称合成化学的发展。今后,手性螺环磷配体的研究除了将向新型、高效、高选择性手性配体及催化剂方向发展外,将其应用于新的不

对称催化反应的对映选择性控制、以及应用于手性天然产物和药物的高效不对称合成将成为新的研究热点。

10 结论与展望

手性磷配体在不对称催化反应中已经得到了非常广泛的应用,但是在不对称催化氢化等领域仍然存在很多问题和挑战。(1)对于不含附属功能基底的氢化,大多数催化剂都不能获得较高的对映选择性,有时甚至难以使反应进行。(2)新型的手性催化剂的合成还应该是在改变催化剂体系的结构和组成上,以达到提高对映选择性和催化效率的目的。(3)多数的手性磷配体催化的反应中都不可避免地使用了贵金属,如钯、铑、铱、金、钌等作为催化剂,如何开发廉价低毒的金属催化体系以及非金属催化体系,提高反应的原子转化数(TON)等方面也将是其面临的挑战之一。(4)在未来的不对称催化反应研究中,寻找和发现新颖配体骨架并开展新型高效的手性磷配体及催化剂的设计合成,仍是不对称催化反应研究的核心内容之一,并将继续是人们关注的热点。(5)目前,手性磷配体参与的不对称催化反应还缺乏成体系的理论指导,相关的动力学研究以及对反应历程的理解方面还有待进一步的深入研究。(6)绝大多数优秀高效的手性磷配体的合成都比较困难,如何解决手性配体的回收和循环使用这一科学问题,仍将是化学家面临的挑战之一。

References

- [1] Knowles, W. S.; Sabacky, M. J. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1968**, 20, 1445.
- [2] Horner, L.; Sieged, H.; Buthe, H. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1968**, 7, 942.
- [3] Knowles, W. S.; Sabacky, M. J. *US 3849480*, **1968** [*Chem. Abstr.* **1971**, 82, 86086].
- [4] William, H. P.; Minn, C. C. *J. Org. Chem.* **1987**, 52, 3176.
- [5] Noyori, R. *Science* **1990**, 248, 1194.
- [6] Parshall, G. W.; Nugent, W. A. *CHEMTECH* **1988**, 18, 376.
- [7] Hayashi, T.; Katsumura, A.; Konishi, M.; Kumada, M. *Tetrahedron Lett.* **1979**, 20, 425.
- [8] Kagan, H. B. *Adv. Catal.* **1986**, 25, 88.
- [9] Uozumi, Y.; Hayashi, T. *J. Am. Chem. Soc.* **1991**, 113, 9887.
- [10] Kitayama, K.; Tsuji, H.; Uozumi, Y.; Hayashi, T. *Tetrahedron Lett.* **1996**, 37, 4169.
- [11] Farkas, G.; Balogh, S.; Szollosy, A.; Uerge, L.; Darvas, F.; Bakos, J. *Tetrahedron: Asymmetry* **2011**, 22, 2104.
- [12] Urbaneja, X.; Mercier, A.; Besnard, C.; Kündig, E. P. *Chem. Commun.* **2011**, 47, 3739.
- [13] Li, W. G.; Zhang, Z. G.; Xiao, D. M.; Zhang, X. M. *J. Org. Chem.* **2000**, 65, 3489.
- [14] Zhang, W. C.; Zhang, X. M. *J. Org. Chem.* **2007**, 72, 1020.
- [15] (a) He, H.; Zheng, X. J.; You, S. L. *Org. Lett.* **2007**, 9, 4339.
(b) Liu, W. B.; He, H.; You, S. L. *Org. Lett.* **2008**, 10, 1815.
(c) Xu, Q. L.; Dai, L. X.; You, S. L. *Org. Lett.* **2009**, 12, 800.
(d) Xu, Q. L.; Dai, L. X.; You, S. L. *Org. Lett.* **2012**, 14, 2579.

图 19 配体 **153~164** 的结构
Figure 19 Structures of ligands **153~164**

- [16] (a) Xu, Q. L.; Liu, Q. L.; Dai, L. X.; You, S. L. *J. Org. Chem.* **2010**, 75, 4615.
(b) Wu, Q. F.; He, H.; You, S. L.; Liu, W. B. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, 132, 11418.
(c) Zhou, C. X.; Zheng, C.; You, S. L. *Acc. Chem. Res.* **2014**, 47, 2558.
(d) Yang, Z. P.; Wu, Q. F.; You, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2015**, 135, 15899.
- [17] Li, K.; Hu, N.; Luo, R. S.; Yuan, W. C.; Tang, W. J. *J. Org. Chem.* **2013**, 78, 6350.
- [18] (a) Yang, X. T.; Xu, G. Q.; Tang, W. J. *Tetrahedron* **2016**, 72, 5178.
(b) Du, K.; Guo, P.; Chen, Y.; Tang, W. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, 54, 3033.
- [19] Hu, N. F.; Li, K.; Wang, Z.; Tang, W. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2016**, 55, 1.
- [20] Li, Y. M.; Fan, Q. H.; Chen, X. Z. *Asymmetric Organic Reaction*, Chemical Industry Press, Beijing, **2005** (in Chinese).
(李月明, 范青华, 陈新滋, 不对称有机反应, 化学工业出版社, 北京, **2005**.)
- [21] Burk, M. J.; Tharper, G. P.; Christopher, S. *J. Am. Chem. Soc.* **1995**, 117, 4423.
- [22] Imamoto, T.; Watanabe, T.; Wada, Y.; Masuda, H.; Yamada, H.; Tsuruta, H.; Matsukawa, S.; Yamaguchi, K. *J. Am. Chem. Soc.* **1998**, 120, 1635.
- [23] Imamoto, T.; Tamura, K.; Zhang, Z. F.; Horiuchi, Y.; Sugiya, M.; Yoshida, K.; Yanagisawa, A.; Gridnev, L. D. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, 133, 1754.
- [24] Zhang, Z.; Tamura, K.; Mayama, D.; Sugiya, M.; Imamoto, T. *J. Org. Chem.* **2012**, 77, 4184.
- [25] (a) Geng, H. L.; Huang, K. X.; Sun, T.; Li, W.; Zhang, X. W.; Wu, W. J.; Zhang, X. M. *J. Org. Chem.* **2011**, 76, 332.
(b) Huang, K. X.; Zhang, X. W.; Geng, H. L.; Li, S. K.; Zhang, X. M. *ACS Catal.* **2012**, 2, 1343.
(c) Jiang, J.; Liu, W. X.; Lv, H.; Zhang, X. M. *Org. Lett.* **2015**, 17, 1154.
- [26] Tang, W. J.; Qu, B.; Andrew, G.; Chris, H.; Rodriguez, S.; Wei, X. D.; Haddad, N.; Narayanan, B.; Ma, S. L. *Org. Lett.* **2010**, 12, 176.
- [27] (a) Liu, G. D.; Liu, X. Q.; Cai, Z. H.; Tang, W. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, 52, 4235.
(b) Luo, R. S.; Li, K.; Hu, Y. L.; Jiao, G. J.; Xu, G. P.; Tang, W. J. *Adv. Synth. Catal.* **2013**, 355, 1297.
- [28] Huang, L. W.; Zhu, J. B.; Jiao, G. J.; Wang, Z.; Yu, X. X.; Deng, W. P.; Tang, W. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2016**, 55, 4527.
- [29] Morrison, J. D.; Masler, W. F. *J. Org. Chem.* **1974**, 39, 270.
- [30] Morison, J. D.; Burnett, R. E.; Aguiar, A. M.; Morrow, C. J.; Phillips, C. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1971**, 93, 1301.
- [31] Dawson, G. J.; Frost, C. G.; Williams, J. M. J.; Coote, S. J. *Tetrahedron Lett.* **1993**, 34, 3149.
- [32] Sprinz, J.; Helmechen, G. *Tetrahedron Lett.* **1993**, 34, 1769.
- [33] Janssen, J. P.; Helmechen, G. *Tetrahedron Lett.* **1997**, 38, 8025.
- [34] Yang, S. X.; Chen, R. R.; Li, R. G. *Chin. J. Org. Chem.* **1980**, (4), 1 (in Chinese).
(杨石先, 陈茹玉, 李玉桂, 有机化学, **1980**, (4), 1.)
- [35] Pasquier, C.; Naili, S.; Pelinski, L.; Brocard, J.; Mortreux, A.; Agbossou, F. *Tetrahedron: Asymmetry* **1998**, 9, 193.
- [36] Hamada, Y.; Seto, N.; Ohmori, H.; Hatano, K. *Tetrahedron Lett.* **1996**, 37, 7565.
- [37] Chen, Z. G.; Jiang, Q. Z.; Zhu, G. X.; Xiao, D. M.; Cao, P.; Guo, C.; Zhang, X. M. *J. Org. Chem.* **1997**, 62, 4521.
- [38] Zhu, G. X.; Chen, Z. G.; Jiang, Q. Z. *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, 119, 3836.
- [39] Miyashita, A.; Yasuda, A.; Takaya, H.; Toriumi, K.; Ito, T.; Noyori, R. *J. Am. Chem. Soc.* **1980**, 102, 7932.
- [40] Yang, H.; Alvarez-Gressier, M.; Lugan, N.; Mathieu, R. *Organometallics* **1997**, 16, 1401.
- [41] Okda, T.; Morito, T.; Achiwa, K. *Chem. Lett.* **1990**, 16, 999.
- [42] Zhao, J.; Gu, R. J. *Chem. Res.* **1997**, 8, 35 (in Chinese).
(赵瑾, 谷如驹, 化学研究, **1997**, 8, 35.)
- [43] Hayashi, T.; Konishi, M.; Fukushima, M. *Bull. Soc. Chim. Belg.* **1979**, 11, 923.
- [44] Meek, D. W. In *Homogeneous Catalysis with Metal Phosphine Complexes*, Plenum Press, New York, **1983**, Chapter 8.
- [45] Dang, T. P.; Kagan, H. B. *J. Chem. Soc.* **1971**, 93, 484.
- [46] Henri, B. K. *J. Am. Chem. Soc.* **1972**, 94, 6429.
- [47] Brown, J. M.; Murrer, B. A. *Tetrahedron Lett.* **1980**, 21, 581.
- [48] Townsend, J. M.; Blount, J. F.; Sun, R. C.; Zawoiski, S.; Valentine Jr, D. *J. Org. Chem.* **1980**, 45, 2995.
- [49] Yamagishi, T.; Yatagai, M.; Hatakeyama, H.; Hida, M. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **1984**, 57, 1897.
- [50] Morimoto, T.; Chiba, M.; Achiwa, K. *Tetrahedron* **1993**, 49, 1793.
- [51] Tao, X. M.; Li, W. F.; Ma, X.; Li, X. M.; Zhu, L. F.; Xie, X. M.; Zhang, Z. G. *J. Org. Chem.* **2012**, 77, 8401.
- [52] Burk, M. J.; Feaster, J. E.; Nugent, W. A.; Harlow, R. L. *J. Am. Chem. Soc.* **1993**, 115, 10125.
- [53] Pye, P. J.; Rossen, K.; Reamer, R. A.; Tsou, N. N.; Volante, R. P.; Reider, P. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, 119, 6207.
- [54] Burk, M. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1991**, 113, 8518.
- [55] Burk, M. J.; Feaster, J. E.; Harlow, R. L. *Organometallics* **1990**, 9, 2653.
- [56] Burk, M. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1991**, 113, 8518.
- [57] Burk, M. J.; Feaster, J. E.; Nugent, W. A. *J. Am. Chem. Soc.* **1993**, 115, 10125.
- [58] Burk, M. J.; Lee, J. R.; Martinez, J. P. *J. Am. Chem. Soc.* **1994**, 116, 10847.
- [59] (a) Achiwa, K. *J. Am. Chem. Soc.* **1976**, 98, 8265.
(b) Stille, J. K. *Chem. Ind.* **1985**, 22, 23.
- [60] Baker, G. L.; Fritschel, S. J.; Stille, J. R.; Stille, J. K. *J. Org. Chem.* **1981**, 46, 2954.
- [61] Takahashi, H.; Hattori, M.; Chiba, M.; Chiwa, A.; Morimoto, T. *Tetrahedron Lett.* **1986**, 27, 4477.
- [62] RajanBabu, T. V.; Ayers, T. A.; Halliday, G. A.; You, K. K.; Calabrese, J. C. *J. Org. Chem.* **1997**, 62, 6012.
- [63] Habus, I.; Raza, Z.; Sunjic, V. *J. Mol. Catal.* **1987**, 42, 173.
- [64] Fryzuk, M. D.; Bosnich, B. *J. Am. Chem. Soc.* **1977**, 99, 6262.
- [65] Behar, D.; Neta, P. *J. Am. Chem. Soc.* **1981**, 103, 2280.
- [66] Miyashita, A.; Yasuda, A.; Takaya, H.; Toriumi, K.; Ito, T.; Noyori, R. *J. Am. Chem. Soc.* **1980**, 102, 7932.
- [67] Miyashita, A.; Takaya, H.; Souchi, T.; Noyori, R. *Tetrahedron* **1984**, 40, 1245.
- [68] Takaya, H.; Mashima, K.; Koyano, K.; Yagi, M.; Kumobayashi, H.; Taketomi, T.; Akutagawa, S.; Noyori, R. *J. Org. Chem.* **1986**, 51, 629.
- [69] Takaya, H.; Akutagawa, S.; Noyori, R. *Org. Synth.* **1988**, 67, 20.
- [70] Burk, M. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1991**, 113, 8518.
- [71] Jiang, Q.; Jiang, Y.; Xiao, D. M.; Zhang, X. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1998**, 37, 1100.
- [72] Kyba, E. P.; Sandoval, C. A.; Yamaguchi, Y.; Zhang, X.; Wang, Z.; Kato, K.; Liu, S. T.; Harris, R. L. *Organometallics* **1983**, 2, 1877.
- [73] (a) Liu, Y.; Ding, K. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, 127, 10488.
(b) Yan Liu, Christian, A.; Ding, K. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, 128, 14212.
- [74] Schmid, R.; Broger, E. A.; Cereghetti, M.; Cramer, Y.; Foricher, J. *Pure Appl. Chem.* **1996**, 68, 131.
- [75] Philip, J. P.; Rossen, K.; Robert, A. R.; Tsou, N. N.; Volante, R. P.;

- Reider, P. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, *119*, 6207.
- [76] Brenchley, G.; Erifield, E.; Wills, M.; Fedouloff, M. *Tetrahedron Lett.* **1994**, *35*, 2791.
- [77] Sennlenn, P.; Gabler, B.; Helmchen, W. *Tetrahedron Lett.* **1994**, *35*, 8595.
- [78] Whitesell, J. K. *Chem. Rev.* **1989**, *89*, 1581.
- [79] Kumar, A.; Srivastava, N.; Mital, A. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1992**, *32*, 493.
- [80] Jing, Y. Z.; Mi, A.; Yan, M.; Sun, J.; Lou, R. L.; Deng, L. G. *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, *119*, 9570.
- [81] Chan, A.; Jiang, S. C.; Mi, A. Q. *US 005756799*, **1998** [*Chem. Abstr.* **1998**, *129*, 54456].
- [82] Han, Z. B.; Wang, Z.; Zhang, X. M.; Ding, K. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 5345.
- [83] (a) Wang, X. M.; Han, Z. B.; Wang, Z.; Ding, K. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 936.
(b) Wang, X. B.; Guo, P. H.; Wang, X. M.; Wang, Z.; Ding, K. L. *Adv. Synth. Catal.* **2013**, *355*, 2900.
- [84] (a) Wang, X. M.; Meng, F. Y.; Wang, Y.; Han, Z. B.; Chen, Y. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 9276.
(b) Cao, Z. Y.; Wang, X.; Tan, C.; Zhao, X. L.; Ding, K. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 8197.
(c) Wang, X. M.; Guo, P. H.; Han, Z. B.; Wang, X. B.; Wang, Z.; Ding, K. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 405.
(d) Liu, J. W.; Han, Z. B.; Wang, X. M.; Ding, K. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2015**, *137*, 15346.
- [85] Alain, R.; Francin, A.; Mortreux, A.; Petit, F. *Tetrahedron: Asymmetry* **1993**, *4*, 2279.
- [86] Alain, R.; Isabelle, S.; Marc, D.; Carpentier, L. F.; Agbossou, F.; Mortreux, A. *Tetrahedron: Asymmetry* **1996**, *7*, 379.
- [87] Said, N.; Isabell, S.; Mortreux, A.; Agbossou, F.; Mustapha, A. A.; Karim, A. *Tetrahedron Lett.* **2001**, *41*, 2867.
- [88] Tamao, K.; Yamamoto, H.; Matsumoto, H.; Miyake, N.; Hayashi, T.; Kumda, M. *Tetrahedron Lett.* **1977**, *18*, 1389.
- [89] Noyori, R.; Ohta, M.; Hsiao, Y.; Kitamura, M.; Ohta, T.; Takaya, H. *J. Am. Chem. Soc.* **1986**, *108*, 7117.
- [90] Stille, J. K.; Su, H.; Brechot, P.; Parrinello, G. *Organometallics* **1991**, *10*, 1123.
- [91] Rosini, C.; Franzini, L.; Raffacelli, A. *Synthesis* **1992**, 503.
- [92] Zhang, F. Y.; Pai, C. C.; Chan, A. S. *J. Am. Chem. Soc.* **1998**, *120*, 5808.
- [93] Hu, X. Q.; Chen, H. L.; Zhang, X. M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1999**, *38*, 3518.
- [94] Ogasawara, M.; Yoshida, K.; Kamei, H.; Kato, K.; Uozumi, Y.; Hayashi, T. *Tetrahedron: Asymmetry* **1998**, *9*, 1779.
- [95] Imai, Y.; Zhang, W. B.; Kida, T.; Nakatsujii, Y.; Ikeda, I. *Tetrahedron Lett.* **1998**, *39*, 4343.
- [96] Zhang, Z. G.; Qian, H.; Zhang, X. M. *J. Org. Chem.* **2000**, *65*, 6223.
- [97] Schmid, R.; Gereghetti, M.; Heiser, B. *Helv. Chim. Acta* **1988**, *71*, 897.
- [98] Liu, F.; Qian, D. Y.; Li, L.; Zhao, X. L.; Zhang, J. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, *49*, 6669.
- [99] Zhang, Z. M.; Chen, P.; Li, W. B.; Niu, Y. F.; Zhao, X. L.; Zhang, J. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, *53*, 4350.
- [100] Duclos, M. C.; Singjunla, Y.; Petit, C.; Favre, R. A.; Jeanneau, E.; Popowycz, F.; Lemaire, M. *Tetrahedron Lett.* **2012**, *53*, 5984.
- [101] Yan, Y. J.; Zhang, X. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 7198.
- [102] Desponds, O.; Schlosser, M. *J. Organomet. Chem.* **1996**, *507*, 257.
- [103] Jendralla, H.; Li, C. H.; Paulaus, E. *Tetrahedron: Asymmetry* **1994**, *5*, 1297.
- [104] Schmid, R.; Broger, E. A.; Cereghetti, M. *Pure Appl. Chem.* **1996**, *68*, 131.
- [105] Murata, M.; Morimoto, T.; Achiwa, K. *Synlett* **1991**, 827.
- [106] Svensson, G.; Albertsson, J.; Frejd, T. *Acta Crystallogr.* **1986**, 5324.
- [107] Schmid, R.; Foricher, J.; Cereghetti, M.; Schonholzer, P. *Helv. Chim. Acta* **1991**, *74*, 370.
- [108] Yamamoto, W.; Murata, M.; Morimoto, S.; Achiwa, K. *Chem. Pharm. Bull.* **1991**, *39*, 1085.
- [109] Schmid, R.; Cereghetti, M.; Heiser, B.; Schonholzer, P.; Hansan, H. *J. Helv. Chim. Acta* **1988**, *71*, 897.
- [110] Sun, X. F.; Zhou, L.; Li, W.; Zhang, X. M. *J. Org. Chem.* **2008**, *73*, 1143.
- [111] Liu, T. L.; Li, W.; Wang, C. J.; Zhang, X. M. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 1740.
- [112] (a) Wang, C. J.; Gao, F.; Liang, G. *Org. Lett.* **2008**, *10*, 4711.
(b) Wang, C. J.; Liang, G.; Xue, Z. Y.; Gao, F. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 17250.
- [113] Xue, Z. Y.; Liu, T. L.; Lu, Z.; Wang, C. J. *Chem. Commun.* **2010**, *46*, 1727.
- [114] Li, Q. H.; Tong, M. C.; Li, J.; Wang, C. J. *Chem. Commun.* **2011**, *47*, 11110.
- [115] Li, Q. H.; Liu, T. L.; Zhou, X.; Wang, C. J. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 9642.
- [116] Liu, H. C.; Tao, H. Y.; Cong, H. J.; Wang, C. J. *J. Org. Chem.* **2016**, *81*, 3751.
- [117] Benincori, T.; Brenna, E.; Sanniccolo, F. *J. Org. Chem.* **1997**, *62*, 444.
- [118] Benincori, T.; Brenna, E.; Sanniccolo, F.; Trimarco, L.; Antognazza, P.; Cesarotti, E.; Demartin, F.; Pilati, T. *J. Org. Chem.* **1996**, *61*, 6244.
- [119] Gelpke, A. E. S.; Kooijman, H.; Spek, A. L.; Hiemstra, H. *Chem. Eur. J.* **1999**, *5*, 2472.
- [120] Tietze, L. F.; Thede, K.; Sanniccolo, F. *Chem. Commun.* **1999**, 1811.
- [121] Berens, U.; Brown, J. M.; Long, J.; Selke, R. *Tetrahedron: Asymmetry* **1996**, *7*, 285.
- [122] McCarthy, M.; Guiry, P. J. *Tetrahedron* **1999**, *55*, 3061.
- [123] Marquarding, D.; Klusaak, H.; Gokel, G.; Hoffmann, P.; Ugi, I. *J. Am. Chem. Soc.* **1970**, *92*, 5389.
- [124] Richards, C. J.; Locke, A. J. *Tetrahedron: Asymmetry* **1998**, *9*, 2377.
- [125] You, S. L.; Hou, X. L.; Dai, L. X.; Yu, Y. H.; Xia, W. *J. Org. Chem.* **2002**, *67*, 4684.
- [126] Mathey, F.; Mercier, F.; Robin, F.; Ricard, L. *J. Organomet. Chem.* **1998**, *557*, 117.
- [127] Hayashi, T.; Yamamoto, A.; Hojo, M. *J. Am. Chem. Soc.* **1982**, *104*, 180.
- [128] (a) Ogasawara, M.; Yoshida, K.; Hayashi, T. *Organometallics* **2001**, *20*, 1014.
(b) Ogasawara, M.; Yoshida, K.; Hayashi, T. *Organometallics* **2001**, *20*, 3913.
- [129] (a) Wang, M. C.; Xu, C. L.; Zou, Y. X.; Liu, H. M.; Wang, D. K. *Tetrahedron Lett.* **2005**, *46*, 5413.
(b) Wang, M. C.; Liu, L. T.; Hua, Y. Z.; Zhang, J. S.; Shi, Y. Y.; Wang, D. K. *Tetrahedron: Asymmetry* **2005**, *16*, 2531.
- [130] Li, G. W.; Tang, B.; Wang, M. C.; Kong, P. P.; Zhao, W. X. *Chin. J. Synth. Chem.* **2012**, *20*, 462 (in Chinese).
(李高伟, 唐贝, 王敏灿, 孔培培, 赵文献, 合成化学, **2012**, *20*, 462.)
- [131] Zhang, A. A.; Zhao, R. J.; Chen, R. X.; Kong, W. G.; Zhang, P. F.; Zhao, W. X. *Shangqiu Normal College J.* **2013**, *29*, 50 (in Chinese).
(张安安, 赵瑞娟, 陈荣祥, 孔伟光, 张朋飞, 赵文献, 商丘师范学院学报, **2013**, *29*, 50.)
- [132] Pfaltz, A. *Acta Chem. Scand B* **1996**, *50*, 189.
- [133] Reetz, M. T.; Gosberg, A.; Goddard, R.; Kyung, S. H. *Chem. Commun.* **1998**, 2077.

- [134] (a) Chi, Y. X.; Zhou, Y. G.; Zhang, X. M. *J. Org. Chem.* **2003**, *68*, 4120.
(b) Hou, G. H.; Li, W.; Ma, M. F.; Zhang, X. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 12844.
- [135] Zhao, Q. Y.; Li, S. K.; Huang, K. X.; Zhang, X. M. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 4014.
- [136] Li, P.; Zhou, M.; Zhao, Q. Y.; Wu, W. L.; Zhang, X. M. *Org. Lett.* **2016**, *18*, 40.
- [137] Reetz, M. T.; Gosberg, A.; Goddard, R.; Kyung, S. H. *Chem. Commun.* **1998**, 2077.
- [138] Kless, A.; Lefber, C.; Spannenberg, A.; Kempe, R.; Baumann, W.; Hola, J.; Armin, B. *Tetrahedron* **1996**, *52*, 14599.
- [139] Mayer, H. A.; Otto, H.; Kuhbauch, H. *J. Organomet. Chem.* **1994**, *472*, 347.
- [140] Delapierre, G.; Brurel, J. M.; Constantieux, T.; Buono, G. *Tetrahedron: Asymmetry* **2001**, *12*, 1345.
- [141] Reeta, M. T.; Beuttenmuller, E. W.; Goddard, R. *Tetrahedron Lett.* **1997**, *38*, 3211.
- [142] Zhu, G. X.; Cao, P.; Jiang, Q. Z.; Zhang, X. M. *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, *119*, 1799.
- [143] Alexakis, A.; Burton, J.; Vastra, J.; Mangeney, P. *Tetrahedron: Asymmetry* **1997**, *8*, 3987.
- [144] Brunel, J. M.; Constantieux, T.; Legrand, O.; Buono, G. *Tetrahedron Lett.* **1998**, *39*, 2961.
- [145] Sugihara, H.; Daikai, K.; Jin, X. L.; Furuno, H.; Inanaga, J. *Tetrahedron Lett.* **2002**, *43*, 2735.
- [146] (a) Fan, Q. H.; Chen, Y. M.; Chen, X. M. *Chem. Commun.* **2000**, 789.
(b) Yi, B.; Chem, X. M.; Deng, G. J. *Org. Lett.* **2004**, *6*, 1361.
(c) Ma, B. D.; Deng, G. J.; Fan, Q. H. *Acta Chim. Sinica* **2013**, *71*, 528 (in Chinese).
(马保德, 邓国军, 范青华, 化学学报, **2013**, *71*, 528.)
- [147] Cheng, K. J. *M.S. Thesis*, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, **1994** (in Chinese).
(成克军, 硕士论文, 中国科学院兰州化学物理研究所, 兰州, **1994**.)
- [148] Hayashi, T.; Kawamara, N.; Ito, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **1987**, *109*, 7876.
- [149] Sayo, N.; Taketomi, T.; Kumobayashi, H. *EP 271311*, **1988** [*Chem. Abstr.* **1989**, *110*, 39189].
- [150] Zheng, X. L.; Wang, Y. H.; Zuo, H. P.; He, H. P. *J. Mol. Catal.* **1996**, *10*, 70 (in Chinese).
(郑晓来, 王艳华, 左焕培, 何华平, 分子催化, **1996**, *10*, 70.)
- [151] Parrinello, G.; Stille, J. K. *J. Am. Chem. Soc.* **1987**, *109*, 7122.
- [152] Ishizaki, T. *EP 544455* **1993** [*Chem. Abstr.* **1993**, *119*, 181016].
- [153] Dumont, W.; Poalin, J. C.; Dang, T. P.; Kagan, H. B. *J. Am. Chem. Soc.* **1973**, *95*, 8295.
- [154] Takaishi, N.; Jmai, H.; Bertelo, C. A.; Stille, J. K. *J. Am. Chem. Soc.* **1978**, *100*, 264.
- [155] Poulin, J. C.; Dumont, W.; Dang, T. P.; Kagan, H. B. *Compt. Rend. Acad. Sci. Paris* **1973**, *227C*, 41.
- [156] Stille, J. K. *React. Polym.* **1989**, *10*, 165.
- [157] Yi, B.; Wu, G. F.; Zhou, W. *Chin. J. Org. Chem.* **2013**, *33*, 2143 (in Chinese).
(易兵, 武高峰, 周威, 有机化学, **2013**, *33*, 2143.)
- [158] Wan, K. T.; Davis, M. E. *Nature* **1994**, *370*, 449.
- [159] Cheng, Z. B.; Yu, S. L.; Li, Y. Y. *Chem. Res. Chin. Univ.* **2011**, *27*, 170.
- [160] Yu, S. L.; Li, Y. Y.; Dong, Z. R.; Zhang, J. N.; Li, Q.; Gao, J. X. *Chin. Chem. Lett.* **2011**, *22*, 1269.
- [161] Zhang, J. N.; Yang, X. R.; Zhou, H.; Li, Y. Y.; Dong, Z. R.; Gao, J. X. *Green Chem.* **2012**, *14*, 1289.
- [162] Xu, Y. Q.; Yu, S. L.; Li, Y. Y.; Dong, Z. R.; Gao, J. X. *Chin. Chem. Lett.* **2013**, *24*, 527.
- [163] Zeng, L.; Wu, F.; Li, Y. Y. *J. Org. Chem.* **2014**, *762*, 34.
- [164] Trost, B. M.; Brendan, M. *Org. Lett.* **2008**, *10*, 1369.
- [165] Xie, J. H.; Zhou, Q. L. *Acta Chim. Sinica* **2014**, *72*, 778 (in Chinese).
(谢建华, 周其林, 化学学报, **2014**, *72*, 778.)
- [166] (a) Hu, A. G.; Fu, Y.; Xie, J. H.; Zhou, Q. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2002**, *41*, 2348.
(b) Fu, Y.; Xie, J. H.; Hu, A. G.; Zhou, H.; Wang, L. X.; Zhou, Q. L. *Chem. Commun.* **2002**, 480.
- [167] (a) Xie, J. H.; Wang, L. X.; Fu, Y.; Zhu, S. F.; Fan, B. M.; Duan, H. F.; Zhou, Q. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 4404.
(b) Zhu, G. X.; Cao, P.; Jiang, Q. Z.; Zhang, X. M. *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, *119*, 1799.
- [168] Han, Z. B.; Wang, Z.; Zhang, X. M.; Ding, K. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 5345.

(Lu, Y.)