过渡金属催化偶氮基导向的 C(sp²)—H 键官能团化研究进展黄房生^{a,b} 陈训^a 谢应^a 曾伟^{*,a}^(a) 华南理工大学化学与化工学院 广州 510640)^(b) 英德市良仕工业材料有限公司 清远 513059)

摘要 芳香偶氮化合物在有机染料、医药、蛋白探针和功能材料等领域应用广泛, 高效构建偶氮功能化的芳烃衍生物是有机合成化学的研究热点领域之一。过渡金属催化偶氮基导向 C(sp²)—H 键官能团化策略因可高区域选择性和高原子经济性构建多样性芳基偶氮化合物而备受关注。对近年来过渡金属催化偶氮功能基导向的 C—H 键官能团化反应类型及相关反应机理予以论述, 为后续研究提供参考。

关键词 芳香偶氮化合物; 过渡金属催化; C(sp²)—H 键官能团化反应; 导向功能基

Progress in the Transition Metal-Catalyzed C(sp²)—H Bond Functionalization of AzoarenesHuang, Fangsheng^{a,b} Chen, Xun^a Xie, Ying^a Zeng, Wei^{*,a}^(a) School of Chemistry and Chemical Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640)^(b) Yingde Liangshi Industrial Material Co. Ltd, Qingyuan 513059)

Abstract Developing simple and concise methods to construct azoarene derivatives has aroused wide concerns due to that these compounds are widely used in the fields of organic dyes, medicines, protein probe and functional materials. As a highly atom- and step-economical approach to making these compounds, transition metal-catalyzed azo group-directed C(sp²)—H bond functionalization provides an efficient synthetic method to regioselectively assemble azoarenes. The reaction types about diverse C(sp²)—H bond functionalization of azoarenes were summarized in this paper.

Keywords azoarenes; transition metal catalysis; C(sp²)—H bond functionalization; directing groups

通过 C—H 键的直接官能团化反应可构建多样性 C—X (X=C, N, O, S 等) 键^[1-6], 但 C—H 键因键能高、相对稳定、反应活性低等特点, 在温和条件下难以实现高区域选择性的 C—H 键功能化反应, 因此多年来 C—H 键的直接选择性官能团化反应一直是有机合成化学中极具挑战性的研究方向之一。不过, 近年来发展起来的过渡金属催化功能基导向的 C—H 键活化策略因其高原子和步骤经济性特点而成为 C—H 键直接官能团化的重要手段^[7-11]。从过渡金属催化的 C—H 键活化的过程来看, 可以分为非导向基团的反应和导向基团的反应, 非导向基团诱导的反应由于其 C—H 键的反应位点比较多, 经常会伴随着众多副产物的生成, 反应选择性差, 不符合绿色化学的原则, 因此对该类型反应的研究比较少。相

反, 利用在目标分子中引入导向基团的策略, 含杂原子功能基与过渡金属可通过环金属化作用来活化 C—H 键, 可望高区域选择性地实现 C—H 键官能团化反应^[3]。

芳香偶氮化合物因具有独特的结构和化学性质而被广泛地应用于有机染料^[4]、医药^[5]、蛋白探针^[6]等领域, 同时近年来材料器件研究人员也发现该类骨架在光电性能方面展示了良好的光电性质^[7]。因此发展有效制备多样性芳香族偶氮衍生物的合成方法引起了有机化学家越来越多的兴趣。在众多偶氮芳烃的合成方法中, 利用过渡金属催化偶氮基导向的 C—H 键官能团化反应来合成各种芳香族偶氮衍生物是最具潜力和最简便的方法之一。这类反应通常涉及偶氮 N 原子与金属催化剂通过螯合作用形成活泼的环金属中间体, 随后被各种偶联试

* Corresponding author. E-mail: zengwei@scut.edu.cn

Received July 2, 2016; revised August 19, 2016; published online September 6, 2016.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21372085), the Science and Technology Program of Guangzhou City (No. 156300075) and the Science and Technology Program of Qingyuan (No. 2014D006).

国家自然科学基金(No. 21372085)、广州市科技计划项目(No. 156300075)和清远市科技计划(No. 2014D006)资助项目。

剂捕捉, 并进一步通过迁移插入、还原消除或者亲核反应等历程形成目标产物(Scheme 1). 以下我们拟从偶氮芳烃 C—H 键官能化反应的不同类型来综述其研究进展.

图式 1 过渡金属催化偶氮基导向的 C—H 官能化反应

Scheme 1 Transition metal-catalyzed azo group-directed C—H functionalization

1 过渡金属催化偶氮芳烃的酰化反应

鉴于酰基化偶氮芳烃可转化成为许多具有潜在生物活性的吡唑类化合物, 故偶氮芳烃的酰基化反应得到了广泛的研究. 而酰基源种类众多, 其中芳醛是比较易得且有效的酰基化试剂, 2013 年王磊小组^[8]报道了以苯甲醛和偶氮苯为底物, 在 $\text{Pd}(\text{OAc})_2/\text{TBHP}$ 的催化反应条件下, 可有效实现偶氮苯邻位的酰基化反应, 产率中等

至良好. 他们还发现醛类底物芳环上取代基的电子效应对此酰化反应的影响不大, 各种吸电子和供电子基团取代的苯甲醛都能有效地转化为酰基化偶氮化合物. 此外, 该反应体系对杂环芳香醛和脂肪醛也具有很好的容忍性. 其反应机理涉及 $\text{Pd}(\text{II})/\text{Pd}(\text{IV})$ 的转变过程见 Scheme 2. 首先, $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ 与 2-苯基吡啶形成环钯(II)中间体 **A**. 与此同时, 苯甲醛被 TBHP 氧化成苯甲酰自由基, 并与中间体 **A** 反应得到 $\text{Pd}(\text{IV})$ 中间体 **B**, 进一步通过还原消除得到酰基化的偶氮苯产物, 四价钯被还原为二价钯进入下一步催化循环.

同年, 王磊课题组和王官武课题组^[9,10]先后将酰基源拓展为 α -羰基羧酸衍生物. 他们以 10 mol% $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ 为催化剂, 在 80 °C 下也可高产率地得到相应的酰化产物(Eq. 1). 该反应与苯甲醛作为酰基源的区别在于不需要在高温下诱导自由基引发剂均裂, 而是芳基酮酸与 $\text{Pd}(\text{II})$ 在 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 下反应, 然后脱去一分子 CO_2 形成 $\text{Pd}(\text{IV})$ 螯合物, 最后还原消除得到目标化合物. 不过考虑到该类反应需要当量的氧化剂才能有效实现偶氮芳烃的邻位酰基化反应, 王磊课题组最近发现利用催化剂量(2 mol%)的 10-甲基-9-均三甲苯基吡啶高氯酸盐(9-mesityl-10-methylacridinium perchlorate, PC-A)作为光催化剂, 在可见光/ $\text{Pd}(\text{II})$ 绿色体系下也可高产率地实现上述反应^[11]. 不过以这种 α -羰基羧酸作为酰基源时, 只局限于芳基酮酸, 而对于烷基酮酸却并不适用.

图式 2 $\text{Pd}(\text{II})$ -催化醛与偶氮苯的酰化反应

Scheme 2 $\text{Pd}(\text{II})$ -catalyzed acylation of aldehydes with azoarenes

另一方面,在偶氮基导向的过渡金属催化活化邻位C—H键的过程中,催化剂往往会对偶氮苯的两个邻位C—H键进行活化,得到的是单取代和多取代产物的混合物.为了解决这个问题,王磊^[12]和孙萌^[13]课题组设计合成了一类新型的氧化偶氮苯底物分子,发现仍以醛或 α -羰基羧酸为酰基源,在钯的催化作用下,通过氧化偶氮苯偶极离子的作用调控,可高区域选择性实现芳环上特定位点的酰基化反应(Scheme 3).

相对而言,醇比醛更易得,而廉价的醇类物质也可作为有机合成化学中羰基源.2013年,孙萌^[14]和我们小

组探索了钯催化的偶氮苯与醇的酰基化反应的可能性.结果表明,当在反应体系中加入4 equiv. TBHP时,醇可原位形成酰基自由基,被五元环钯金属中间体捕获形成高价钯中间体,然后通过还原消除得到目标产物^[15].该方法底物容忍性广,不仅适用于芳基醇,对于烷基醇也能以中等产率得到邻位酰基化的产物.有趣的是,若利用 $\text{PhI}(\text{OAc})_2$ 代替TBHP时,同样在Pd(II)的催化条件下,偶氮芳烃的邻位C—H键将进行烷氧功能化而非酰基化反应(Scheme 4)^[16].

图式3 Pd(II)-催化芳基酮酸与氧化偶氮苯的酰化反应

Scheme 3 Pd(II)-catalyzed acylation of α -ketocarboxylic acids with azoxyarenes

图式4 Pd(II)-催化醇与偶氮苯的酰化反应

Scheme 4 Pd(II)-catalyzed acylation of alcohols with azoxyarenes

鉴于甲苯有可能在自由基引发剂的条件下被氧化成苯甲酰基自由基中间体, 随后我们小组进一步将酰基源拓展为芳基甲烷类化合物, 并探索了其可能的酰化反应性能^[17]. 令人高兴的是, 在 Pd(II)/TBHP 体系下, 我们发现芳基甲烷可直接与偶氮芳烃发生分子间的酰化反应, 产率良好(Scheme 5), 该方法避免了较为昂贵的醛和羧酸等酰基源试剂的使用; 几乎在同一时间, 吴养洁课题组^[18]也报道了类似的工作.

2 过渡金属催化偶氮芳烃的胺化反应

过渡金属催化偶氮芳烃的高区域选择性胺化反应, 为进一步将芳烃衍生为多用途的含氮化合物提供了强有力的合成方法, 其中, 胺化“氮源”和催化剂的选择尤为关键. 2014 年, Jia^[19]和 Xu^[20]课题组相继以磺酰叠氮作为氮源, Rh(III)盐为催化剂, 成功实现了在偶氮苯的邻位引入酰胺功能基. 该反应底物适用性广, 反应体系不需要添加额外的氧化剂, 反应条件温和, 且 N₂ 作为唯一的副产物, 具有绿色有机合成的特点. 其反应机理涉及 [Cp*RhCl₂]₂ 与 AgNTf₂ 通过配体交换和解聚过程得到活性 [Cp*Rh(NTf₂)₂]⁺, 然后与偶氮苯中的“N”原子配位后活化邻位 C(sp²)-H 键生成环铑中间体 A, A 再与磺酰叠氮作用形成中间体 B. 随后 B 经过释放 N₂ 而形成铑氮烯, 进一步发生芳基 1,1-迁移和金属质解得到目标产物, 同时实现催化剂 [Cp*Rh(NTf₂)₂]⁺ 再生 (Scheme 6).

苯并三唑不仅是天然产物和药物分子的重要骨架结构, 也是有机合成化学中重要的中间体, 如何通过简

便的方法来快速、高效地合成多取代的苯并三唑衍生物一直是合成领域关注的研究热点. 在这方面, Lee 课题组^[21]利用偶氮苯和磺酰叠氮作为底物, 以醋酸碘苯作为氧化剂, 一锅法实现 Rh(III)催化偶氮苯与叠氮化合物的胺环反应, 并为苯并三唑衍生物的快速合成提供了非常简捷的方法(Scheme 7). 利用该方法可以合成各种药物分子或者材料分子单体, 如苯三唑甲酚、血清素等.

除了酰基叠氮可作为“氮”源实现与偶氮芳烃的胺环化反应外, 最近 Ellman 小组^[22]发现芳基叠氮也可作为“氮”源, 并能通过“一锅法”实现与偶氮苯类化合物的直接胺环化反应来构建吩噻衍生物(Eq. 2). 该反应直接采用醋酸作为溶剂, 醋酸起 Brønsted 酸的促进作用, 有利于 C-H 胺化后进一步环化, 同时也与反应中释放的芳胺形成氨盐而利于后续反应的进行. 遗憾的是, 若从绿色有机合成的角度来看, 这种合成方法要脱去一分子芳胺, 原子经济性比较差.

3 过渡金属催化偶氮苯的芳基化反应

偶氮苯类光电材料分子具有大 π 共轭结构的特点, 倘若通过芳基化策略能增加该类化合物的 π 共轭程度, 其应用范围将得以扩大. 为此, 早在 1978 年 Murahashi 小组^[23]报道了在 PdCl₂ 的催化作用下, 芳基锂可为芳基源与偶氮苯通过邻位芳基化反应形成 2-芳基偶氮苯(Eq. 3). 但是该反应需要化学量的金属催化剂, 同时芳基锂化合物是一类化学性质比较活泼, 操作程序复杂等缺点限制了该方法的应用.

为克服因芳基锂对水和空气等敏感而不易操作等

图式 5 钯催化芳基甲烷与偶氮苯的酰化反应

Scheme 5 Pd(II)-catalyzed acylation of azoarenes with aryl methanes

图式 6 铑催化磺酰叠氮与偶氮苯的胺化反应

Scheme 6 Rh(III)-catalyzed amidation of sulfonyl azides with azoarenes

图式 7 铑催化磺酰叠氮和偶氮苯胺环化反应

Scheme 7 Rh(III)-catalyzed amination/cyclization of azoarenes with sulfonyl azides

问题, 2008 年, Miura 等^[24]尝试利用芳基硼酸作为芳基源, 发现在铑(I)催化作用下芳基功能基也可以中等产率引入到偶氮芳烃邻位, 但是该反应具有一定的局限性, 主要是铑催化剂用量较大和反应产率低(Eq. 4).

相对于芳基硼酸而言, 芳基卤属于一类更易得的芳基源试剂. 2015 年 Ackermann 小组^[25]同样利用偶氮芳烃为原料, 以芳基溴为芳基源, 发展了 Ru(II)催化偶氮的芳基化反应(Eq. 5). 该反应具有较高的化学选择性以及官能团耐受性, 尤其对于芳杂环取代的芳基卤化合物仍然能以较高的产率得到目标产物.

此外, 芳酰基过氧化物也可以作为芳基源, 最近我们小组^[26]利用廉价的芳酰基过氧化物经加热条件下, 经过均裂产生芳基自由基或者酯基自由基, 在 Pd(OAc)₂ 催化下与偶氮苯反应可以选择性的实现邻位的芳基化或者酯化反应(Eq. 6). 该反应对温度和溶剂非常敏感, 当选择 CH₃CN 作为溶剂在 60 °C 反应时往往得到的是羰氧化产物; 当选择氯苯作为溶剂, 提高温度至

130 °C 时, 过氧化物均裂产生芳酯基自由基会进一步脱去一分子 CO₂ 形成芳基自由基, 再与偶氮苯反应得到芳基化产物.

4 过渡金属催化偶氮苯的卤化反应

有机卤化物是有机化学中的重要中间体, 这类化合物可通过与烯、炔、胺等试剂偶联有效构建新的 C—X 键(X=C, N, O, S 等), 因此发展高区域选择性的 C—H 键卤代反应在有机合成化学中颇受青睐. 早在 1971 年, Fahey^[27]报道了以 Cl₂ 气体为卤素源, PdCl₂ 为催化剂, 无需添加任何额外的添加剂和氧化剂, 就可实现偶氮苯邻位的氯代反应. 反应机理被认为涉及偶氮苯与 PdCl₂ 形成二聚的环钯中间体, 然后通过亲电反应生成氯代产物(Scheme 8). 但是该反应区域选择性比较差, 往往会伴随着间位氯代副产物的产生, 并且反应产率比较低, 仅得到 20% 的邻氯取代的产物; 同时, 氯气的使用也为实

图式 8 钯催化偶氮芳烃的卤化反应
Scheme 8 Pd(II)-catalyzed halogenation of azoarenes

验操作带来诸多安全隐患。

为避免使用氯气,最近 Tian 小组^[28]探索了以 *N*-卤代丁二酰亚胺(NXS)为卤源, Pd(OAc)₂ 催化偶氮高区域选择性 C(sp²)—H 键卤化反应性能。结果发现,在该体系下, *N*-溴代琥珀酰亚胺(NBS)和 *N*-碘代琥珀酰亚胺(NIS)都可与偶氮芳烃通过 C(sp²)—H 活化过程实现富电子芳环邻位的溴或者碘代反应,产率良好(Eq. 7)。

5 过渡金属催化偶氮苯的烯基化反应

利用过渡金属催化偶氮功能基导向的 C—H 活化策略,除了可以在芳环上定点选择性地偶氮基邻位引入酰基、芳基、胺基和卤素等功能基外,还可通过相关环金属中间体与炔烃和烯烃等经迁移插入、环化或者脱水等过程在偶氮基邻位引入环状或者开链烯基功能基,为多样性复杂含氮有机分子的合成提供步骤经济性方法。如 2013 年, Cheng^[29]和 You^[30]课题组相继利用铑为催化剂,炔烃为偶联试剂,利用铑活化偶氮基邻位芳基 C—H 键的反应机理,反应过程中只需脱去一份子氢气就可实现偶氮芳烃与炔烃的烯基化/环化反应串联反应。该方法可快速构建各种多取代的苯并吡啶类季胺盐衍生物,这类化合物属于众多天然产物、药物分子和生物碱的核心骨架(Eq. 8)。

值得注意的是,由于偶氮苯含有两个芳环,故过渡金属可以同时活化两个苯环上 C—H 键,由此生成很多副产物。Wang 课题组利用氧化偶氮芳烃为底物,通过非氧化偶氮原子对钌催化剂([Cp*RuCl₂]_n)的专一性配位作用活化芳基 C—H 键并形成五元环钌中间体。该方案可高区域选择性地引入丙烯酸酯引入邻近含氮氧功能基芳环上,产率良好至优秀,同时克服了双芳环烯基化的可

能性(Eq. 9)^[31]。

6 过渡金属催化偶氮苯与醛的环化反应

已有工作表明芳醛类化合物在强氧化体系下极易形成自由基,从而在偶氮苯邻位实现酰化反应。但后续研究进一步证实:若反应体系没有强氧化剂参与,醛则易于与 σ-C(sp²)—M(金属)键通过迁移插入后质子化形成碳正离子,随后再通过环化反应构建各种氮杂环化合物。

2013 年 Ellman 小组^[32]报道了偶氮苯与苯甲醛在铑催化的 C—H 活化下高效地合成了多取代的 *N*-芳基-2*H*-异吡啶类化合物(Eq. 10)。这类吡啶类化合物是重要的医药中间体,其高效简洁的合成方法受到了广大化学工作者的关注,但是由于反应中加入了贵金属铑,这类反应的工业化成本很高。随后, Ellman 小组^[33]就该反应进一步深入研究,发现采用廉价易得的 Co(III)催化剂替代昂贵的 Rh(III)催化剂,也能以较高的收率合成得到 *N*-芳基-2*H*-异吡啶产物(Eq. 11)。Wang 课题组^[34]也报道了 Re 催化的偶氮苯与苯甲醛通过[4+1]环化反应来合成了异吡啶类衍生物(Eq. 12)。与之前 Co(III)或者 Rh(III)催化的体系相比较,Re 催化体系中醋酸盐起到了决定性作用。机理研究表明,醛基迁移插入是不可逆的过程,

这与之前的研究结果相反. 同时发现该五元环铼金属中间体是 Re(I) 状态, 且通过单晶结构确认了该中间体.

除了芳醛可在 Rh(III) , Co(III) 和 Re(0) 催化条件下与偶氮芳烃进行环化反应外, Kim 小组^[35]发现乙酐酯类化合物也可以在 Rh(III) 的催化作用下通过环化反应制备异吲唑化合物, 同时通过偶氮和醛化合物两种原料的比例调控, 在异吲唑环上的 3 位或者 7 位上引入不同类型的酯功能基(Scheme 9).

图式 9 过渡金属催化偶氮芳烃与醛的环化反应

Scheme 9 Transition metal-catalyzed cyclization of azoarenes with aldehydes

图式 10 过渡金属催化偶氮芳烃与其他偶联试剂的 $\text{C(sp}^2\text{)}-\text{H}$ 键官能化反应

Scheme 10 Transition metal-catalyzed $\text{C(sp}^2\text{)}-\text{H}$ bond functionalization of azoarenes with other coupling reagents

7 过渡金属催化偶氮苯与其它偶联试剂的 $\text{C(sp}^2\text{)}-\text{H}$ 官能化反应

偶氮化合物在有机化学中作为合成子应用颇为广泛, 其中的偶氮功能基在过渡金属的催化作用下通过环金属化作用活化邻位碳氢键, 从而实现芳基碳氢键不同类型的官能化反应. 除了上述常见邻位偶氮芳烃的 $\text{C}-\text{H}$ 官能化反应之外, 有关 Rh(III) 或者钯催化偶氮芳烃邻位 $\text{C(sp}^2\text{)}-\text{H}$ 键的氰基化反应^[36]、亚磷酰化反应^[37]、硝化反应^[38]、磺酰化反应^[39]、烷基化反应^[40]及乙氧羰化反应^[41]等为高区域选择性地实现偶氮芳烃多样性功能化反应提供了有效途径(Scheme 10). 相信随着对不同偶联试剂的深入研究, 将有更多种类的功能基通过碳氢活化策略定点选择性地引入到偶氮芳烃之中.

8 结论与展望

综上所述, 过渡金属催化偶氮基导向的 $C(sp^2)-H$ 键的官能化反应已经取得了重要的进展. 该类反应为高原子经济性和步骤经济性制备多样性偶氮芳烃衍生物提供了简捷的合成方法. 然而, 该类反应目前仍然存在一些不足: (1) 对于非对称的偶氮芳烃存在区域选择性较差的问题还需进一步完善; (2) 偶氮基导向的 $C-H$ 键活化类型仍然局限于芳基 $C(sp^2)-H$ 键, 而涉及过渡金属催化偶氮基导向的烷基 $C(sp^3)-H$ 键官能化反应则目前还未取得突破. 上述问题可通过偶氮底物分子的巧妙构建和催化条件的探索来解决和突破.

References

- [1] (a) Song, G.; Wang, F.; Li, X. *Chem. Soc. Rev.* **2012**, *41*, 3651.
(b) Cho, S. H.; Kim, J. Y.; Kwak, J. *Chem. Soc. Rev.* **2011**, *40*, 5068.
(c) Wang, M.; Wang, Z.; Shang, M.; Dai, H. *Chin. J. Org. Chem.* **2015**, *35*, 570 (in Chinese).
(王明明, 王子潇, 商明, 戴辉熊, 有机化学, **2015**, *35*, 570.)
(d) Luo, H.; Zhang, Z.; Liu, H.; Liu, H. *Chin. J. Org. Chem.* **2015**, *35*, 802 (in Chinese).
(罗海清, 张志鹏, 刘海东, 柳辉金, 有机化学, **2015**, *35*, 802.)
(e) Lu, B.; Li, X.; Lin, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2015**, *35*, 2275 (in Chinese).
(卢贝丽, 李现艳, 林咏梅, 有机化学, **2015**, *35*, 2275.)
(f) Wang, L.; Li, Z.; Wan, K.; Qu, X.; Hu, S.; Wang, F. *Chin. J. Org. Chem.* **2016**, *36*, 889 (in Chinese).
(王亮, 李站, 万康, 瞿星, 胡思前, 王锋, 有机化学, **2016**, *36*, 889.)
(g) He, J.; Lou, S.; Xu, D.; *Chin. J. Org. Chem.* **2016**, *36*, 1218 (in Chinese).
(何将旗, 娄绍杰, 许丹倩, 有机化学, **2016**, *36*, 1218.)
- [2] (a) Shi, Z.; Zhang, C.; Tang, C. *Chem. Soc. Rev.* **2012**, *41*, 3381.
(b) Neufeldt, S.; Sanford, M. *Acc. Chem. Res.* **2012**, *45*, 936.
(c) Tang, M.; Gu, Y.; Luo, X.; Zhang, P. *Chin. J. Org. Chem.* **2015**, *35*, 781 (in Chinese).
(谭明雄, 顾运琼, 罗旭健, 张培, 有机化学, **2015**, *35*, 781.)
(d) Yu, J.; Ding, K. *Acta Chim. Sinica* **2015**, *73*, 1223 (in Chinese).
(余金权, 丁奎岭, 化学学报, **2015**, *73*, 1223.)
(e) Yuan, Y.; Song, S.; Jiao, N. *Acta Chim. Sinica* **2015**, *73*, 1231 (in Chinese).
(袁逸之, 宋颂, 焦宁, 化学学报, **2015**, *73*, 1231.)
(f) Liao, G.; Shi, B. *Acta Chim. Sinica* **2015**, *73*, 1283 (in Chinese).
(廖港, 史炳峰, 化学学报, **2015**, *73*, 1283.)
- [3] (a) Lyons, T. W.; Sanford, M. S. *Chem. Rev.* **2010**, *110*, 1147;
(b) Shen, C.; Zhang, P.; Sun, Q. *Chem. Soc. Rev.* **2015**, *44*, 291.
- [4] Bafana, A.; Devi, S. S.; Chakrabarti, T. *Environ. Rev.* **2011**, *19*, 350.
- [5] (a) Hoult, J. R. S. *Drugs* **1986**, *32*, 18.
(b) Sandborn, W. J. *J. Gastroenterol.* **2002**, *97*, 2939.
- [6] Kim, Y.; Phillips, J. A.; Liu, H. P.; Kang, H. Z.; Tan, W. H. *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A.* **2009**, *106*, 6489.
- [7] Harvey, A. J. D.; Abell, A. D. *Chem. Rev.* **1989**, *89*, 1915.
- [8] Li, H. J.; Li, P. H.; Wang, L. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 620.
- [9] Li, H. P.; Tan, H.; Wang, L. *Chem.-Eur. J.* **2013**, *19*, 14432.
- [10] Yuan, Z.; Li, D. D.; Wang, G. W. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 10414.
- [11] Xu, N.; Li, P.; Xie, Z.; Wang, L. *Chem.-Eur. J.* **2016**, *22*, 2236.
- [12] Li, H.; Li, P.; Zhao, Q.; Wang, L. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 9170.
- [13] Sun, M.; Hou, L.; Chen, X.; Yang, X.; Sun, W.; Xang, Y. *Adv. Synth. Catal.* **2014**, *356*, 3789.
- [14] Hou, L.; Chen, X.; Li, S.; Cai, S.; Zhao, Y.; Sun, M.; Yang, X. *Org. Biomol. Chem.* **2015**, *13*, 4160.
- [15] Tang, H.; Qian, C.; Lin, D. E.; Jiang, H. F.; Zeng, W. *Adv. Synth. Catal.* **2014**, *356*, 519.
- [16] Yin, Z.; Jiang, X.; Sun, P. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 10002.
- [17] Xiong, F.; Qian, C.; Lin, D.; Zeng, W.; Lu, X. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 5444.
- [18] Song, H.; Chen, D.; Pi, C.; Cui, X.; Wu, Y. *J. Org. Chem.* **2014**, *79*, 2955.
- [19] Jia, X.; Han, J. *J. Org. Chem.* **2014**, *79*, 4180.
- [20] Wang, H.; Yu, Y.; Hong, X.; Tan, Q.; Xu, B. *J. Org. Chem.* **2014**, *79*, 3279.
- [21] Ryu, T.; Min, J.; Choi, W.; Jeon, W. H.; Lee, P. H. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 2810.
- [22] Lian, Y.; Hummel, J. R.; Bergman, R. G.; Ellman, J. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 12548.
- [23] Murahashi, S. C.; Tamba, Y.; Yamamura, M.; Yoshimura, N. *J. Org. Chem.* **1978**, *43*, 4099.
- [24] Miyamura, S.; Tsurugi, H.; Satoh, T.; Miura, M. *J. Organomet. Chem.* **2008**, *693*, 2438.
- [25] Hubrich, J.; Himmler, T.; Rodefeld, L.; Ackermann, L. *ACS Catal.* **2015**, *5*, 4089.
- [26] Qian, C.; Lin, D. E.; Deng, Y. F.; Zhang, X. Q.; Jiang, H. F.; Miao, G.; Zeng, W. *Org. Biomol. Chem.* **2014**, *12*, 5866.
- [27] Fahey, D. *J. Organomet. Chem.* **1971**, *27*, 283.
- [28] Ma, X. T.; Tian, S. K. *Adv. Synth. Catal.* **2013**, *355*, 337.
- [29] Muralirajan, K.; Cheng, C.-H. *Chem.-Eur. J.* **2013**, *19*, 6198.
- [30] Zhao, D.; Wu, Q.; Huang, X.; Song, F.; Lv, T.; You, J. *Chem.-Eur. J.* **2013**, *19*, 6239.
- [31] Li, H.; Xie, X.; Wang, L. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 4218.
- [32] Lian, Y. J.; Bergman, R. G.; Lavis, L. D.; Ellman, J. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 7122.
- [33] Hummel, J. R.; Ellman, J. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *137*, 490.
- [34] Geng, X.; Wang, C. *Org. Lett.* **2015**, *17*, 2434.
- [35] Jeong, T.; Han, S. H.; Han, S.; Sharma, S.; Park, J.; Lee, J. S.; Kwak, J. H.; Jun, Y. H.; Kim, I. S. *Org. Lett.* **2016**, *18*, 232.
- [36] Han, J.; Pan, C.; Jia, X.; Zhu, C. *Org. Biomol. Chem.* **2014**, *12*, 8603.
- [37] Hong, G.; Mao, D.; Wu, S.; Wang, L. *J. Org. Chem.* **2014**, *79*, 10629.
- [38] Dong, J.; Jin, B.; Sun, P. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 4540.
- [39] Zhang, D.; Cui, X.; Zhang, Q.; Wu, Y. *J. Org. Chem.* **2015**, *80*, 1517.
- [40] Deng, H.; Li, H.; Wang, L. *Org. Lett.* **2015**, *17*, 2450.
- [41] Xu, N.; Li, D.; Zhang, Y.; Wang, L. *Org. Biomol. Chem.* **2015**, *13*, 9083.

(Lu, Y.)