胃蛋白酶催化合成 2,3-二氢喹唑啉-4(1*H*)-酮衍生物谢宗波^{a,b} 张士国^b 姜国芳^{*,b} 梁萌^b 乐长高^{*,a,b}^(a) 东华理工大学 江西省质谱科学与仪器 2011 协同创新中心 南昌 330013^(b) 东华理工大学应用化学系 南昌 330013

摘要 在乙醇溶剂中,考察了不同的酶对 2-氨基苯甲酰胺与醛类物质环缩合反应的催化性能,确定胃蛋白酶为最佳的催化剂。然后对反应温度、酶用量、底物的物质的量比、反应时间等影响因素进行优化,确定了最佳的反应条件:在 65 °C 温度下,10 mg 胃蛋白酶可以高效催化 2-氨基苯甲酰胺与芳香醛及脂肪醛的反应,合成了一系列 2,3-二氢喹唑啉-4(1*H*)-酮衍生物。

关键词 2-氨基苯甲酰胺; 醛; 环缩合反应; 2,3-二氢喹唑啉-4(1*H*)-酮衍生物; 胃蛋白酶

Pepsin-Catalyzed Synthesis of 2,3-Dihydroquinazolin-4(1*H*)-one DerivativesXie, Zongbo^{a,b} Zhang, Shiguo^b Jiang, Guofang^{*,b} Liang, Meng^b Le, Zhanggao^{*,a,b}^(a) Jiangxi 2011 Joint Center for the Innovative Mass Spectrometry and Instrumentation, East China University of Technology, Nanchang 330013^(b) Department of Applied Chemistry, East China University of Technology, Nanchang 330013

Abstract The catalytic property of some hydrolases for the cyclocondensation of aldehydes with 2-aminobenzamide was researched in alcohol solvent, and pepsin was selected as the best catalyst. The reaction conditions were optimized through investigating the temperature, the enzyme loading, the ratio of substrates and the reaction time. Under the optimal conditions, 5 mg of pepsin could catalyze the cyclizing reaction of aldehydes with 2-aminobenzamide, and the corresponding 2,3-dihydroquinazolin-4(1*H*)-ones were successfully obtained in high yields.

Keywords 2-aminobenzamide; aldehyde; cyclocondensation; 2,3-dihydroquinazolin-4(1*H*)-ones; pepsin

2,3-二氢喹唑啉-4(1*H*)-酮衍生物广泛分布在天然产物及药物分子中,具有多种生物及药理活性。因此,探究其合成方法具有重要的意义。所报道的合成方法中,多数是通过酸性催化剂催化邻氨基苯甲酰胺与醛的环缩合反应来实现的,如 ZrCl_4 ^[1]、 CuCl_2 ^[2]、 TiCl_4/Zn ^[3]、 NH_4Cl ^[4]、杂多酸^[5]、琥珀亚酰胺-*N*-磺酸^[6]、对甲苯磺酸^[7]、三氯乙酸^[8]、2-吗啉乙磺酸^[9]等。近些年,离子液体^[10]、十二水合硫酸铝钾^[11]、硅胶硫酸^[12]、纳米硫酸氧化锆^[13]、 β -环糊精- SO_3H ^[14]、PEG-400^[15]等一些较为绿色的催化剂也被报道。但这些合成方法与绿色有机合成目标相比还有不足之处,如催化剂的制作过程较为复杂,催化剂回收率低且活性损失较大,实验条件要求较高、

操作复杂、反应时间长等。

随着绿色化学这一概念在有机合成中的不断深入和强化,探究绿色化的有机合成方法成了研究人员的首选方向。近年来,生物催化剂在化学合成中的应用不断增多,酶往往以其高度的底物专一性和极高的催化效率受到研究者的青睐,但很大程度上忽略了酶的非专一性,也就是酶的非天然催化剂能力。据文献报道,水解酶已经被用于催化多种非传统的有机反应,如 2003 年 Berglund 等^[16]以南极假丝酵母脂肪酶为催化剂催化 aldol 反应,随后 *D*-氨基酰化酶^[17]和猪胰脂肪酶^[18]也分别被报道用于催化芳香醛与酮之间的 aldol 反应。2006 年, Purkarthofer 等^[19]用醇腈酶催化 Henry 反应, Cai 课题

* Corresponding author. E-mail: zhgle@ecit.cn; gffjiang@ecit.cn

Received June 20, 2016; revised September 17, 2016; published online October 18, 2016.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21462001, 21465002), the Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University (No. IRT13054), the Natural Science Foundation of Jiangxi Province (No. 20142BAB203008).

国家自然科学基金(Nos. 21462001, 21465002)、长江学者和创新团队发展计划(No. IRT13054)、江西省自然科学基金(No. 20142BAB203008)资助项目。

组^[20]在 2011 年报道了脂肪酶催化的 Michael 加成反应. 2015 年, 莫婷等^[21]报道了 4-香豆酰辅酶 A 连接酶(4-Coumarate coenzyme A ligase, 4 CL)和查尔酮合成酶(Chalcone synthase, CHS)组合催化合成黄酮及 4-羟基- δ -内酯类化合物. Lin^[12]、Berglund^[13]和 Gupta^[14]等先后对酶的非专一性及其应用进行了综述. 为了进一步研究酶的非专一性, 以及拓展生物催化剂在有机合成中的应用范围, 本文研究了胃蛋白酶催化邻氨基苯甲酰胺与醛的环缩合反应(Eq. 1). 通过对酶源、酶量、温度、底物适应范围等反应条件的优化, 最终确定在乙醇溶剂中和 65 °C 的温度条件下, 以 10 mg 胃蛋白酶为催化剂催化邻氨基苯甲酰胺与芳香醛(或脂肪醛)的环化反应, 合成了一系列喹唑啉酮衍生物.

1 结果与讨论

选择 4-甲基苯甲醛与邻氨基苯甲酰胺的环缩合反应为模板反应, 对酶、反应温度、酶量、底物的物质的量比等影响因素进行了优化, 以确定最佳的反应条件.

1.1 不同酶的催化效果

首先探索了不同种类的水解酶对模板反应的催化性能, 11 种酶被用于实验研究, 结果见表 1. 从表 1 可以看出, 胃蛋白酶(Pepsin)显示出较强的催化能力, 获得了 33%的产物收率(表 1, Entry 4), 胰蛋白酶(Trypsin from bovine pancreas)获得了 25%的收率(表 1, Entry 2); 而其他的水解酶, 如碱性蛋白酶(Alkaline protease)、木瓜蛋白酶(Papain)、佐氏曲霉蛋白酶(Protease from *Aspergillus saitoi*)、洋葱假单胞菌脂肪酶(Amano lipase PS from *Burkholderia cepacia*)、猪胰腺脂肪酶(Lipase from porcine pancreas)、蜂蜜曲霉酰化酶(Acylase 1, from *Aspergillus melleus*)、纤维素酶(Cellulase)、木聚糖酶(Xylanase)、果胶酶(Pectinase)均未能表现出明显的催化效果(表 1, Entries 1, 3, 5~11). 为了进一步验证胃蛋白酶的催化能力, 我们用牛血清蛋白(BSA)、失活的胃蛋白酶(Denatured Pepsin)催化模板反应(表 1, Entries 12~13), 所得结果均与空白试验(表 1, Entry 14)相近. 通过这两组对照试验, 排除了氨基酸催化反应的可能性, 确定胃蛋白酶独特的构象及活性中心对催化模板反应是必需的. 因此, 选择胃蛋白酶为最佳催化剂进行下一步的研究.

1.2 温度对反应的影响

对于酶促反应来说, 温度是一个极其重要的影响因

表 1 不同酶的催化活性^a

Table 1 Catalytic activities of different enzymes

Entry	Enzyme	Yield ^b /%
1	Alkaline protease	20
2	Trypsin from bovine pancreas	25
3	Papain	19
4	Pepsin from porcine gastric mucosa	36
5	Protease from <i>Aspergillus saitoi</i>	22
6	Amano lipase PS from <i>Burkholderia cepacia</i>	21
7	Lipase from porcine pancreas	20
8	Acylase 1, from <i>Aspergillus melleus</i>	24
9	Cellulase	19
10	Xylanase	17
11	Pectinase	21
12	BSA	21
13	Denatured Pepsin ^c	22
14	No enzyme	21

^a Reaction conditions: 2-aminobenzamide (1 mmol), 4-methylbenzaldehyde (1 mmol), enzyme (20 mg) and ethanol (10 mL), stirred at 40 °C for 2 h; ^b isolated yield; ^c pretreated with urea solution.

素, 它不仅影响酶的构象及活性, 也会影响反应的速率. 接下来探索了温度对反应的影响, 结果如表 2 所示. 从表 2 可以看出, 从 30 °C 至 65 °C, 随着温度的升高产率从 18%增加至 71%(表 2, Entries 1~6), 但在 70 °C 时, 产率降至 63%(表 2, Entry 7), 这可能是因为酶长时间处于 70 °C 的温度下, 其蛋白质结构发生变化而导致酶活性损失, 催化能力降低. 所以选择 65 °C 为最佳反应温度.

表 2 温度对模板反应的影响^a

Table 2 Effect of temperature on the model reaction

Entry	Temperature/°C	Yield ^b /%
1	30	18
2	40	34
3	50	49
4	55	58
5	60	64
6	65	71
7	70	63

^a Reaction conditions: 2-aminobenzamide (1 mmol), 4-methylbenzaldehyde (1 mmol), pepsin (20 mg) and ethanol (10 mL), 2 h; ^b isolated yield.

1.3 底物物质的量比对反应的影响

底物物质的量比也是影响反应的一个重要因素. 胃蛋白酶在 65 °C 的条件下, 不同物质的量比的 2-氨基苯甲酰胺与 4-甲基苯甲醛反应 2 h, 结果如表 3 所示. 2-氨基苯甲酰胺与 4-甲基苯甲醛的物质的量比为 1:1 时产率为 71%(表 3, Entry 1), 物质的量比为 1:1.2 时产率增加至 84%(表 3, Entry 2); 而 4-甲基苯甲醛的量继续增加至物质的量比为 1:1.4 时产率高达 95%(表 3, Entry 3), 当物质的量比分别为 1:1.6 和 1:1.8 时产率差别已不

太明显(表 3, Entries 4~5), 因此选择底物物质的量比为 1 : 1.6 进行反应条件的进一步优化.

表 3 底物物质的量比对模板反应的影响^a
Table 3 Effect of molar ratio on the model reaction

Entry	Molar ratio ^b	Yield ^c /%
1	1 : 1.0	71
2	1 : 1.2	84
3	1 : 1.4	95
4	1 : 1.6	97
5	1 : 1.8	97

^a Reaction conditions: pepsin (20 mg) and ethanol (10 mL), stirred at 65 °C for 2 h; ^b 2-aminobenzamide (1 mmol), 2-aminobenzamide: 4-methylbenzaldehyde (mmol : mmol); ^c isolated yield.

1.4 酶用量对反应的影响

接下来探索了酶用量对反应的影响, 结果如表 4 所示. 无催化剂条件下仅得到了 69% 的收率(表 4, Entry 1), 当加入 5 mg 胃蛋白酶作催化剂时, 产物的收率显著增加至 94% (表 4, Entry 2). 从这一数据可以看出, 胃蛋白酶对反应具有很好的催化能力. 继续增加胃蛋白酶用量至 10 mg, 收率提高到 98%(表 4, Entry 3). 当酶用量为 15 和 20 mg 时, 产物的收率分别为 98%和 97%. 所以, 最终选择 10 mg 的胃蛋白酶作催化剂进行下一步实验.

表 4 酶用量对模板反应的影响^a
Table 4 The effect of enzyme loading on the model reaction

Entry	Enzyme loading/mg	Yield ^b /%
1	0	69
2	5	94
3	10	98
4	15	98
5	20	97

^a Reaction conditions: 2-aminobenzamide (1 mmol), 4-methylbenzaldehyde (1.6 mmol) and ethanol (10 mL), stirred at 65 °C for 2 h; ^b isolated yield.

1.5 底物拓展

通过以上实验, 确立了模板反应的最佳实验条件. 接下来研究了胃蛋白酶对底物的适用范围, 结果如表 5 所示. 从表中可以看到, 芳香醛苯环上的取代基对反应并无太大影响, 无论是吸电子基团还是供电子基团均获得了较好的收率, 如含有 4-Cl、2-Cl、3-Br、2-Br 取代基的芳香醛的产率分别为 91%、85%、89%、91%(表 5, Entries 4~7), 苯环上含有供电子基团的芳香醛作为反应底物所获得的产物收率分别为 98%、96%、94%、95%、92%、98%(表 5, Entries 2~3, 8~10, 12). 另外, 在胃蛋白酶的催化下, 脂肪醛也能与 2-氨基苯甲酰胺反应, 如正己醛与 2-氨基苯甲酰胺反应 3 h, 得到了 89% 的产物收率(表 5, Entry 14); 而以辛醛为反应底物时, 反应 2 h 即可获得 95% 的产率(表 5, Entry 15). 总之, 胃蛋白酶不仅能催化芳香醛与邻氨基苯甲酰胺的环缩合反应, 而且

对脂肪醛也具有较好的催化活性, 均获得了较高的产物收率.

表 5 酶促环缩合反应合成 2,3-二氢喹啉-4(1H)-酮衍生物^a
Table 5 Reactant scope of the cyclocondensation reaction for the synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one derivatives

Entry	R	Time/h	Compd.	Yield ^b /%
1	C ₆ H ₅	2	a	91
2	4-CH ₃ C ₆ H ₄	2	b	98
3	3-CH ₃ C ₆ H ₄	2	c	96
4	4-ClC ₆ H ₄	2	d	91
5	2-ClC ₆ H ₄	2	e	85
6	3-BrC ₆ H ₄	2	f	89
7	2-BrC ₆ H ₄	2	g	91
8	4-CH ₃ OC ₆ H ₄	2	h	94
9	3-HOC ₆ H ₄	2	i	95
10	2-HOC ₆ H ₄	2	j	92
11	4-(CH ₃) ₂ NC ₆ H ₄	2	k	85
12	4-HO-3-CH ₃ OC ₆ H ₃	2	l	98
13	CH=CHC ₆ H ₄	3	m	84
14	<i>n</i> -C ₅ H ₁₁	3	n	89
15	<i>n</i> -C ₇ H ₁₅	2	o	95

^a Reaction conditions: 2-aminobenzamide (1 mmol), aldehyde (1.6 mmol), pepsin (10 mg), ethanol (10 mL), at 65 °C; ^b isolated yield.

2 结论

本文发展了一种通过胃蛋白酶催化 2-氨基苯甲酰胺与芳香醛(或脂肪醛)的环缩合反应来合成 2,3-二氢喹啉-4-(1H)-酮衍生物的绿色方法, 这一合成方法操作简便、产物收率高、反应条件温和, 且胃蛋白酶与化学催化剂相比具有无毒无害、可生物降解等优点.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

德国 Bruker 公司的 AV-400 核磁共振仪; 上海精密科学仪器有限公司的 WRS-1B 型数字熔点仪. 所有试剂均为化学纯或分析纯, 其中 2-氨基苯甲酰胺使用前经过了重结晶处理. Alkaline protease(酶活 200 U/mg, 批号: 52014), Papain(酶活 800 U/mg), Cellulase(酶活 50 U/mg), Xylanase(酶活 50 U/mg)和 Pectinase (100 U/mg)购买于江苏锐阳生物科技有限公司. Trypsin from bovine pancreas(酶活 ≥ 2500 U/mg, 批号: 29915), Lipase from porcine pancreas(酶活 100 U/mg)和 Albumin from bovine serum (BSA, 批号: 46769)购买于阿拉丁试剂(上海)有限公司. Protease from *Aspergillus saitoi*(酶活 ≥ 0.6 U/mg), Pepsin from porcine gastric mucosa(酶活 601 U/mg), Amano lipase PS from *Burkholderia cepacia*(酶活 30 U/mg)和 Acylase I from *Aspergillus melleus*(酶活 0.72 U/mg)购买于 Sigma Aldrich Co. LLC.

3.2 实验方法

在 25 mL 的圆底烧瓶中, 加入 1 mmol 的 2-氨基苯甲酰胺、1.6 mmol 的醛、10 mg 胃蛋白酶和 10 mL 乙醇, 磁力搅拌下于油浴中加热, 薄层色谱(TLC)跟踪反应进程[展开剂 $V(\text{氯仿}):V(\text{乙酸乙酯})=4:1$]. 反应结束后向反应瓶中加入 15 mL 蒸馏水, 待反应液冷却后, 过滤所得不溶性固体即为目标产物. 所得的粗产品可通过重结晶(80%乙醇水溶液)进行进一步纯化.

2-苯基-2,3-二氢喹啉-4(1*H*)-酮(**a**): 白色固体. m.p. 226 °C(文献值^[9]: 224~226 °C); ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 8.33 (s, 1H), 7.62 (t, $J=8.5$ Hz, 1H), 7.55~7.45 (m, 2H), 7.36 (ddd, $J=10.7, 9.9, 5.3$ Hz, 3H), 7.30~7.20 (m, 1H), 7.14 (s, 1H), 6.76 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.69 (t, $J=7.5$ Hz, 1H), 5.76 (d, $J=6.9$ Hz, 1H); ¹³C NMR (101 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 164.15, 148.30, 142.09, 133.86, 128.93, 128.81, 127.84, 127.28, 117.64, 115.36, 114.89, 66.97.

2-(4-甲基苯基)-2,3-二氢喹啉-4(1*H*)-酮(**b**): 白色固体. m.p. 227~228 °C(文献值^[25]: 225~227 °C); ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 8.24 (s, 1H), 7.61 (d, $J=7.7$ Hz, 1H), 7.37 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.28~7.14 (m, 3H), 7.06 (s, 1H), 6.74 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.66 (t, $J=7.5$ Hz, 1H), 5.71 (s, 1H), 2.29 (s, 3H); ¹³C NMR (101 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 164.12, 148.38, 139.13, 138.19, 133.73, 129.28, 127.81, 127.26, 117.54, 115.47, 114.88, 66.85, 21.19.

2-(3-甲基苯基)-2,3-二氢喹啉-4(1*H*)-酮(**c**): 白色固体. m.p. 204 °C; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 8.24 (s, 1H), 7.61 (d, $J=7.7$ Hz, 1H), 7.32 (s, 1H), 7.30~7.20 (m, 3H), 7.15 (t, $J=9.4$ Hz, 1H), 7.08 (s, 1H), 6.74 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.67 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 5.71 (s, 1H), 2.31 (s, 3H); ¹³C NMR (101 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 164.08, 148.37, 141.99, 137.89, 133.75, 129.55, 128.71, 127.97, 127.82, 124.49, 117.55, 115.39, 114.85, 67.10, 21.54.

2-(4-氯苯基)-2,3-二氢喹啉-4(1*H*)-酮(**d**): 白色固体. m.p. 202 °C(文献值^[10d]: 205~207 °C); ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 8.35 (s, 1H), 7.62 (t, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.51 (d, $J=8.5$ Hz, 2H), 7.46 (d, $J=8.5$ Hz, 2H), 7.29~7.21 (m, 1H), 7.15 (s, 1H), 6.75 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.68 (t, $J=7.5$ Hz, 1H), 5.78 (s, 1H); ¹³C NMR (101 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 163.97, 148.12, 141.15, 133.87, 133.45, 129.22, 128.78, 127.84, 117.76, 115.42, 114.94, 66.24.

2-(2-氯苯基)-2,3-二氢喹啉-4(1*H*)-酮(**e**): 白色固体. m.p. 208~209 °C(文献值^[10d]: 207~209 °C); ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 8.23 (s, 1H), 7.67 (dd, $J=$

8.4, 5.0 Hz, 2H), 7.53~7.46 (m, 1H), 7.44~7.36 (m, 2H), 7.30~7.22 (m, 1H), 7.02 (s, 1H), 6.77 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.72 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 6.14 (s, 1H); ¹³C NMR (101 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 164.11, 148.12, 138.36, 133.91, 132.33, 130.76, 130.06, 129.21, 127.93, 127.85, 117.93, 115.16, 115.04, 64.18.

2-(3-溴苯基)-2,3-二氢喹啉-4(1*H*)-酮(**f**): 白色固体. m.p. 190~191 °C(文献值^[10d]: 227~228 °C); ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 8.39 (s, 1H), 7.68 (s, 1H), 7.61 (d, $J=7.7$ Hz, 1H), 7.54 (d, $J=8.2$ Hz, 1H), 7.49 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.35 (t, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.30~7.16 (m, 2H), 6.76 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.69 (t, $J=7.5$ Hz, 1H), 5.78 (s, 1H); ¹³C NMR (101 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 163.89, 147.96, 145.10, 133.95, 131.64, 131.06, 130.12, 127.84, 126.25, 122.07, 117.81, 115.36, 114.94, 65.99.

2-(2-溴苯基)-2,3-二氢喹啉-4(1*H*)-酮(**g**): 白色固体. m.p. 179~182 °C(文献值^[25]: 172~173 °C); ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 8.22 (s, 1H), 7.72~7.63 (m, 3H), 7.45 (t, $J=7.5$ Hz, 1H), 7.33 (td, $J=7.8, 1.6$ Hz, 1H), 7.30~7.23 (m, 1H), 7.00 (s, 1H), 6.80~6.68 (m, 2H), 6.10 (s, 1H); ¹³C NMR (101 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 164.11, 148.17, 139.61, 133.91, 133.27, 131.18, 129.60, 128.54, 127.86, 122.69, 118.00, 115.19, 115.09, 66.86.

2-(4-甲氧基苯基)-2,3-二氢喹啉-4(1*H*)-酮(**h**): 白色固体. m.p. 188~189 °C(文献值^[25]: 181~183 °C); ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 8.17 (d, $J=18.3$ Hz, 1H), 7.66~7.57 (m, 1H), 7.42 (d, $J=8.6$ Hz, 2H), 7.28~7.19 (m, 1H), 6.99 (d, $J=18.9$ Hz, 1H), 6.94 (d, $J=8.7$ Hz, 2H), 6.74 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.67 (t, $J=7.3$ Hz, 1H), 5.70 (s, 1H), 3.74 (s, 3H); ¹³C NMR (101 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 164.17, 159.91, 148.48, 133.94, 133.71, 128.68, 127.82, 117.56, 115.47, 114.88, 114.11, 66.77, 55.64.

2-(3-羟基苯基)-2,3-二氢喹啉-4(1*H*)-酮(**i**): 白色固体. m.p. 206~207 °C(文献值^[14]: 215~217 °C); ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 9.50 (s, 1H), 8.24 (s, 1H), 7.61 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.28~7.20 (m, 1H), 7.20~7.12 (m, 1H), 7.08 (s, 1H), 6.89 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 6.72 (dd, $J=12.3, 8.8$ Hz, 2H), 6.66 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 5.65 (s, 1H); ¹³C NMR (101 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 163.99, 157.82, 148.28, 143.69, 133.75, 129.79, 127.81, 117.91, 117.46, 115.81, 115.33, 114.81, 114.12, 66.94.

2-(2-羟基苯基)-2,3-二氢喹啉-4(1*H*)-酮(**j**): 白色固体. m.p. 223~225 °C(文献值^[9]: 220~221 °C); ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 9.86 (s, 1H), 7.94 (s, 1H), 7.62 (d, $J=7.7$ Hz, 1H), 7.34 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.26~

7.18 (m, 1H), 7.18~7.10 (m, 1H), 6.86 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.83~6.71 (m, 3H), 6.66 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 6.01 (s, 1H); ^{13}C NMR (101 MHz, DMSO- d_6) δ : 164.47, 155.04, 148.57, 133.66, 129.73, 127.79, 127.69, 127.64, 119.25, 117.48, 115.82, 115.26, 115.02, 61.70.

2-(4-二甲氨基苯基)-2,3-二氢喹啉-4(1H)-酮(**k**): 白色固体. m.p. 215~217 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 8.09 (d, $J=14.2$ Hz, 1H), 7.61 (d, $J=6.9$ Hz, 1H), 7.30 (d, $J=8.7$ Hz, 2H), 7.26~7.18 (m, 1H), 6.92 (s, 1H), 6.75~6.69 (m, 3H), 6.66 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 5.63 (s, 1H), 2.88 (s, 6H); ^{13}C NMR (101 MHz, DMSO- d_6) δ : 164.30, 151.18, 148.68, 133.60, 129.12, 128.17, 127.80, 117.41, 115.51, 114.85, 112.40, 67.11.

2-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-2,3-二氢喹啉-4(1H)-酮(**l**): 白色固体. m.p. 224~225 °C (文献值^[9]: 227~228 °C); ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 9.09 (s, 1H), 8.11 (s, 1H), 7.62 (d, $J=7.7$ Hz, 1H), 7.29~7.20 (m, 1H), 7.10 (d, $J=1.7$ Hz, 1H), 6.98~6.93 (m, 1H), 6.89 (dd, $J=8.1, 1.7$ Hz, 1H), 6.76 (dd, $J=8.0, 5.5$ Hz, 2H), 6.68 (t, $J=7.5$ Hz, 1H), 5.66 (s, 1H), 3.76 (s, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, DMSO- d_6) δ : 164.28, 148.66, 147.88, 147.37, 133.68, 132.39, 127.82, 120.10, 117.58, 115.49, 115.38, 114.89, 111.58, 67.30, 56.07.

(*E*)-2-苯乙基-2,3-二氢喹啉-4(1H)-酮(**m**): 白色固体. m.p. 173~175 °C (文献值^[14]: 155~157 °C); ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 8.15 (d, $J=6.3$ Hz, 1H), 7.64 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.45 (d, $J=7.4$ Hz, 2H), 7.34 (t, $J=7.4$ Hz, 2H), 7.30~7.22 (m, 2H), 6.90 (s, 1H), 6.77 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.72~6.64 (m, 2H), 6.38 (dd, $J=15.8, 6.8$ Hz, 1H), 5.32 (d, $J=6.7$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (101 MHz, DMSO- d_6) δ : 163.86, 148.26, 136.18, 133.71, 132.12, 129.55, 129.20, 128.82, 128.61, 128.11, 127.85, 127.12, 117.61, 115.34, 115.01, 66.30.

2-正戊基-2,3-二氢喹啉-4(1H)-酮(**n**): 白色固体. m.p. 154~155 °C (文献值^[14]: 160~162 °C); ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 7.90 (s, 1H), 7.62~7.54 (m, 1H), 7.27~7.15 (m, 1H), 6.74 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.65 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 6.57 (s, 1H), 4.69 (t, $J=5.1$ Hz, 1H), 1.70~1.55 (m, 2H), 1.50~1.36 (m, 2H), 1.35~1.14 (m, 5H), 0.93~0.76 (m, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, DMSO- d_6) δ : 164.42, 148.99, 133.49, 127.81, 117.32, 115.48, 114.83, 64.91, 35.46, 31.65, 23.39, 22.55, 14.36.

2-正庚基-2,3-二氢喹啉-4(1H)-酮(**o**): 白色固体. m.p. 158~159 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 7.89 (s, 1H), 7.57 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.22 (t, $J=7.1$ Hz,

1H), 6.72 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.65 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 6.56 (s, 1H), 4.67 (t, $J=5.1$ Hz, 1H), 1.66~1.56 (m, 2H), 1.40 (s, 2H), 1.26 (s, 8H), 0.86 (t, $J=6.5$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, DMSO- d_6) δ : 164.41, 148.98, 133.48, 127.81, 117.32, 115.48, 114.82, 64.90, 35.50, 31.66, 29.37, 29.13, 23.70, 22.56, 14.41.

辅助材料(Supporting Information) 合成化合物的核磁谱图. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] Abdollahi-Alibeik, M.; Shabani, E. *Chin. Chem. Lett.* **2011**, *22*, 1163.
- [2] Abdel-Jalil, R. J.; Voelter, W.; Saeed, M. *Tetrahedron Lett.* **2004**, *45*, 3475.
- [3] Shi, D.; Rong, L.; Wang, J.; Zhuang, Q.; Wang, X.; Hu, H. *Tetrahedron Lett.* **2003**, *44*, 3199.
- [4] Shaabani, A.; Maleki, A.; Mofakham, H. *Synth. Commun.* **2008**, *38*, 3751.
- [5] Zong, Y.; Zhao, Y.; Luo, W.; Yu, X. H.; Wang, J. K.; Pan, Y. *Chin. Chem. Lett.* **2010**, *21*, 778.
- [6] Ghashang, M.; Mansoor, S. S.; Aswin, K. *Res. Chem. Intermed.* **2015**, *41*, 3347.
- [7] Xua, B. L.; Chen, J. P.; Qiao, R. Z.; Fu, D. C. *Chin. Chem. Lett.* **2008**, *19*, 537.
- [8] Zahed, K.-J.; Leila, Z. *Acta Chim. Slovaca* **2013**, *60*, 178.
- [9] Labade, V. B.; Shinde, P. V.; Shingare, M. S. *Tetrahedron Lett.* **2013**, *54*, 5578.
- [10] (a) Shaterian, H. R.; Aghakhanizadeh, M. *Res. Chem. Intermed.* **2014**, *40*, 1655;
(b) Wang, J.; Zong, Y.; Fu, R.; Niu, Y.; Yue, G.; Quan, Z.; Wang, X.; Pan, Y. *Ultrason. Sonochem.* **2014**, *21*, 29;
(c) Davoodnia, A.; Allameh, S.; Fakhari, A. R.; Tavakoli-Hoseini, N. *Chin. Chem. Lett.* **2010**, *21*, 550;
(d) Safaei, H. R.; Shekouhy, M.; Shafiee, V.; Davoodi, M. *J. Mol. Liq.* **2013**, *180*, 139;
(e) Yassaghi, G.; Davoodnia, A.; Allameh, S.; Zare-Bidaki, A.; Tavakoli-Hoseini, N. *Bull. Korean Chem. Soc.* **2012**, *33*, 2724;
(f) Wang, S. L.; Yang, K.; Wang, X. S. *Chin. J. Org. Chem.* **2011**, *31*, 1235 (in Chinese).
(王树良, 杨科, 王香善, 有机化学, **2011**, *31*, 1235.)
- [11] Dabiri, M.; Salehi, P.; Otokesh, S.; Baghbanzadeh, M.; Kozezhgari, G.; Mohammadi, A. A. *Tetrahedron Lett.* **2005**, *46*, 6123.
- [12] Dabiri, M.; Salehi, P.; Baghbanzadeh, M.; Zolfigol, M. A.; Agheb, M.; Heydari, S. *Catal. Commun.* **2008**, *9*, 785.
- [13] Abdollahi-Alibeik, M.; Shabani, E. *J. Iranian Chem. Soc.* **2014**, *11*, 351.
- [14] Dhanunjaya Rao, A. V.; Vyakarnam, B. P.; Bhaskar, T.; Jogdand, N. R.; Kalita, D.; Lilakar, J. K. D.; Siddaiah, V.; Douglas Sanasi, P.; Raghunadh, A. *Tetrahedron Lett.* **2015**, *56*, 4714.
- [15] Parthasaradhi, Y.; Rakhi, C.; Suresh, S.; Tangenda, S. *J. Eur. J. Chem.* **2013**, *4*, 462.
- [16] Branneby, C.; Carlqvist, P.; Magnusson, A.; Hult, K.; Brinck, T.; Berglund, P. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 874.
- [17] Chen, X.; Liu, B.-K.; Kang, H.; Lin, X.-F. *J. Mol. Catal. B: Enzym.* **2011**, *68*, 71.
- [18] Guan, Z.; Fu, J.-P.; He, Y.-H. *Tetrahedron Lett.* **2012**, *53*, 4959.

- [19] Purkarthofer, T.; Gruber, K.; Gruber-Khadjawi, M.; Waich, K.; Skranc, W.; Mink, D.; Griengl, H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2006**, *45*, 3454.
- [20] Cai, J.-F.; Guan, Z.; He, Y.-H. *J. Mol. Catal. B: Enzym.* **2011**, *68*, 240.
- [21] Mo, T.; Wang, J.; Gao, B. W.; Zhang, L.; Liu, X.; Wang, X. H.; Tu, P. F.; Shi, S. P. *Chin. J. Org. Chem.* **2015**, *35*, 1052 (in Chinese).
- (莫婷, 王娟, 高博闻, 张乐, 刘晓, 王晓辉, 涂鹏飞, 史社坡, 有机化学, **2015**, *35*, 1052.)
- [22] Wu, Q.; Liu, B.-K.; Lin, X.-F. *Curr. Org. Chem.* **2010**, *14*, 1966.
- [23] Humble, M. S.; Berglund, P. *Eur. J. Org. Chem.* **2011**, 3391.
- [24] Kapoor, M.; Gupta, M. N. *Process Biochem.* **2012**, *47*, 555.
- [25] Safari, J.; Gandomi-Ravandi, S. *J. Mol. Catal. A: Chem.* **2014**, *390*, 1.

(Li, L.; Fan, Y.)