喹啉酮和吡啶酮稠合的氧杂双环[3.3.1]壬烷的合成

叶明琰 邱少中 殷国栋*

(湖北师范大学化学化工学院 污染物分析与资源化湖北省重点实验室 黄石 435002)

摘要 以 2-羟基查尔酮与 4-羟基-2(1*H*)-喹啉酮或 4-羟基-2(1*H*)-吡啶酮在正丙醇中回流反应, 立体选择性地合成了喹啉酮和吡啶酮稠合的 2,8-二氧杂双环[3.3.1]壬烷衍生物。其中, 喹啉酮片段通过烷基化反应可转化为相应的氮烷基取代的喹啉酮和氧烷基取代的喹啉结构。目标产物均未见文献报道, 其结构都通过了 ^1H NMR、 ^{13}C NMR、IR 和 HRMS 的表征, 6-苯基-2,12-二氢-1*H*-6,12-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]吡啶-1-酮(**3r**)和 1-异丙氧基-8-苯基-14*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉(**6c**)的结构和立体构型还进一步获得了 X 射线单晶衍射的证实。

关键词 4-羟基-2(1*H*)-喹啉酮; 4-羟基-2(1*H*)-吡啶酮; 双环[3.3.1]壬烷; 烷基化; 单晶结构

Synthesis of Quinolinone- and Pyridinone-Fused Oxabicyclo[3.3.1]nonanes

Ye, Mingyan Qiu, Shaozhong Yin, Guodong*

(Hubei Key Laboratory of Pollutant Analysis and Reuse Technology, College of Chemistry and Chemical Engineering, Hubei Normal University, Huangshi 435002)

Abstract An efficient and stereoselective synthesis of quinolinone- and pyridinone-fused 2,8-dioxabicyclo[3.3.1]nonanes by the reaction of 2-hydroxychalcones with 4-hydroxy-2(1*H*)-quinolinones/4-hydroxy-2(1*H*)-pyridinones in refluxing *n*-PrOH is described. The quinolinone fragment can be converted into the corresponding *N*-alkylated quinolinones and *O*-alkylated quinolines by the alkylation reaction. All the unknown compounds are characterized by means of ^1H NMR, ^{13}C NMR, IR and HRMS. The structures and configurations of 6-phenyl-2,12-dihydro-1*H*-6,12-methanobenzo[7,8][1,3]dioxocino[5,4-*c*]pyridin-1-one (**3r**) and 1-isopropoxy-8-phenyl-14*H*-8,14-methanobenzo[7,8][1,3]dioxocino[5,4-*c*]quinoline (**6c**) are further confirmed by X-ray single crystal diffraction analysis.

Keywords 4-hydroxy-2(1*H*)-quinolinone; 4-hydroxy-2(1*H*)-pyridinone; bicyclo[3.3.1]nonane; alkylation; X-ray structure

2(1*H*)-喹啉酮和 2(1*H*)-吡啶酮是两类重要的杂环化合物, 其结构片段大量存在于许多天然生物碱中, 如 Euodenine A、Funiculosin、Ilicicoline H 等^[1-4]。含有这类杂环骨架的分子常常展现出良好的抗菌、抗病毒和抗癌活性^[5-7]。4-羟基-2(1*H*)-喹啉酮是一个含有多官能团的分子, 羟基和氨基都容易参与反应, 3-位碳原子也具有很好的亲核性, 因此被广泛应用于合成一些功能化的杂环化合物^[8-10]。此外, 双环[3.3.1]壬烷是一种具有 V-型结构的迷人分子^[11,12], 它们在药物化学和分子识别中表现出潜在的应用价值^[13,14], 因此, 这类化合物的制备与功能化近年来受到了化学家的持续关注^[15-20]。在最近的研究中, 我们发展了一种以 2-羟基查尔酮与六元环状

的 1,3-二酮(或萘酚/取代苯酚)高立体选择性地合成 2,8-二氧杂双环[3.3.1]壬烷的新方法^[21-23]。然而, 目前鲜有文献引入含氮芳香环于此类结构中^[24], 此处我们进一步将反应底物拓展为 4-羟基-2(1*H*)-喹啉酮和 4-羟基-2(1*H*)-吡啶酮衍生物, 立体选择性地合成了系列新型含有喹啉酮和吡啶酮稠合的 2,8-二氧杂双环[3.3.1]壬烷, 并发现前者与卤代烷烃反应, 喹啉酮片段可有效地转化为相应的氮烷基取代的喹啉酮和氧烷基取代的喹啉结构。

1 结果与讨论

在前面的工作中, 我们发现甲苯或正丙醇是合成香

* Corresponding authors. E-mail: gdyin@hbnu.edu.cn; gdyin_hbnu@163.com

Received September 26, 2016; revised November 3, 2016; published online November 29, 2016.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21542009).

国家自然科学基金(No. 21542009)资助项目。

豆素耦合的 2,8-二氧杂双环[3.3.1]壬烷衍生物的理想溶剂^[21]。考虑到反应底物的溶解性,我们将 2-羟基查尔酮(**1a**, 0.5 mmol)和 4-羟基-2(1*H*)-喹啉酮(**2a**, 0.5 mmol)混合于正丙醇中,反应回流 12 h 后反应原料消失,冷却至室温后,发现有大量的白色固体从溶液中析出,通过了 ¹H NMR、¹³C NMR、IR 和 HRMS 的表征,证实其结构为 8-苯基-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3a**)。为了拓展该反应底物的范围,我们尝试以各种取代的 2-羟基查尔酮^[25]与 4-羟基-2(1*H*)-喹啉酮反应来考察该方法的通用性,实验结果如 Eq. 1 所示。当底物 **1** 中 R¹ 为氢原子, R² 为苯环上连接供电子取代基(甲基、甲氧基),相应的目标产物 **3b~3d** 可以较理想的收率分离得到。另外,当 R² 为苯环上连接卤原子(氟、氯和溴),反应以 68%~76% 产率得到产物 **3e~3g**。含有呋喃环、噻吩环和萘环取代的底物也适合该反应, **3h~3j** 的产率范围为 65%~83%。当 R² 为甲基以及 2-甲基-1-丙烯基时, **3k** 和 **3l** 分别以 53% 和 51% 的产率分离得到。若底物中 R² 为苯环或取代苯环, R¹ 分别为 4-溴、4-氯和 2,4-二氯取代的 2-羟基查尔酮时,产物 **3m~3o** 也可以 65%~80% 的产率得到。若 R¹ 和 R³ 分别为氢原子和甲基, R² 为苯环以及 4-甲基取代苯环时,则以 73% 和 75% 的产率分离得到 **3p** 和 **3q**。

3a: R ¹ = R ³ = H, R ² = C ₆ H ₅ , 82%	3j: R ¹ = R ³ = H, R ² = 1-Naphthyl, 83%
3b: R ¹ = R ³ = H, R ² = 4-MeC ₆ H ₄ , 80%	3k: R ¹ = R ³ = H, R ² = Me, 53%
3c: R ¹ = R ³ = H, R ² = 4-MeOC ₆ H ₄ , 79%	3l: R ¹ = R ³ = H, R ² = CH=C(CH ₃) ₂ , 51%
3d: R ¹ = R ³ = H, R ² = 3,4-(MeO) ₂ C ₆ H ₃ , 75%	3m: R ¹ = 4-Br, R ² = C ₆ H ₅ , R ³ = H, 79%
3e: R ¹ = R ³ = H, R ² = 4-FC ₆ H ₄ , 68%	3n: R ¹ = 4-Cl, R ² = 4-MeOC ₆ H ₄ , R ³ = H, 80%
3f: R ¹ = R ³ = H, R ² = 4-ClC ₆ H ₄ , 76%	3o: R ¹ = 2,4-diCl, R ² = 4-FC ₆ H ₄ , R ³ = H, 65%
3g: R ¹ = R ³ = H, R ² = 4-BrC ₆ H ₄ , 72%	3p: R ¹ = H, R ² = C ₆ H ₅ , R ³ = Me, 73%
3h: R ¹ = R ³ = H, R ² = 2-Furyl, 65%	3q: R ¹ = H, R ² = 4-MeC ₆ H ₄ , R ³ = Me, 75%
3i: R ¹ = R ³ = H, R ² = 2-Thienyl, 67%	

图1 化合物 **3r** 的晶体结构(省去了 H₂O)

Figure 1 X-ray structure of compound **3r** (H₂O is omitted for clarity)

环[3.3.1]壬烷产物(**6c**), 相应的氮烷基取代的产物 **5c** 并没有分离得到. 可能是由于异丙基立体因素影响, 在形成氧烷基化时, 空间位阻更小的缘故. **6c** 的结构也获得了 X 射线单晶衍射的进一步证实(CCDC 号为 1505510), 如图 2 所示.

图2 化合物 **6c** 的晶体结构

Figure 2 X-ray structure of compound **6c**

2 结论

本文报道了一种简单有效合成喹啉酮和吡啶酮稠合的 2,8-二氧杂双环[3.3.1]壬烷衍生物 **3** 的方法, 反应将易得的 2-羟基查尔酮(**1**)与 4-羟基-2(1*H*)-喹啉酮或 4-羟基-2(1*H*)-吡啶酮(**2**)在正丙醇中回流既可以得到产物, 无需其它催化剂. 药物分子 4-羟基-5-氯-2(1*H*)-吡啶酮也成功地引入到目标产物中. 我们将 **3a** 在碱性条件下与卤代烷烃反应, 将喹啉酮片段转化成了相应的烷氮基取代的喹啉酮和氧烷基取代的喹啉. 本文中合成的目标产物均未见文献报道, 其结构都通过了 ¹H NMR、¹³C NMR、IR 和 HRMS 的表征, 其中 **3r** 和 **6c** 的结构和立体构型还获得了 X 射线单晶衍射的证实.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

熔点采用泰克 X-4 型数字显示显微熔点仪测定, 温度未经校正; ¹H NMR 和 ¹³C NMR 采用 Bruker AV 300 型核磁共振仪测定, CDCl₃ 或 DMSO-*d*₆ 为溶剂, TMS 为内标; IR 采用 Nicolet 5700 型红外分光光度仪测定(KBr 压片); HRMS 采用 Bruker UltrafleXtreme MALDI TOF/TOF[以 α-氰基-4-羟基肉桂酸(HCCA)为基质]型高分辨质谱仪测定; X 射线单晶衍射是通过 Bruker SMART APEX CCD 测定.

所用试剂均为市售分析纯, 未进一步纯化. 所用有机溶剂在使用前均经过干燥并蒸馏提纯.

3.2 实验方法

3.2.1 目标化合物 **3** 的合成

将 2-羟基查尔酮类化合物 **1** (0.5 mmol)和 4-羟基-2(1*H*)-吡啶酮衍生物 **2** (0.5 mmol)加入到 25 mL 耐压管中, 再向其中加入正丙醇(5 mL), 反应一段时间后有大量固体析出. 当反应物消失后[8~12 h, 用薄层色谱(TLC)监测], 将混合物冷却至室温, 固体用少量无水乙醇洗涤, 抽滤, 干燥, 得到目标化合物 **3a~3u**.

8-苯基-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3a**): 白色固体 151 mg, 产率 82%. m.p. > 300 °C; ¹H NMR (300 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 11.63 (s, 1H), 7.83~7.80 (m, 3H), 7.57~7.42 (m, 5H), 7.30 (d, *J* = 8.1 Hz, 1H), 7.22~7.14 (m, 2H), 7.02~6.92 (m, 2H), 4.39~4.37 (m, 1H), 2.47 (d, *J* = 2.7 Hz, 2H); ¹³C NMR (75 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 161.0, 154.3, 151.4, 140.1, 137.3, 130.7, 129.1, 128.5, 127.8, 126.3, 125.6, 121.8, 121.7, 121.4, 115.9, 115.3, 113.5, 111.4, 99.4, 31.5, 26.0; IR (KBr) ν: 3417, 2950, 1653, 1492, 1398, 1233, 1035, 989, 753, 499 cm⁻¹; HRMS (MALDI) calcd for C₂₄H₁₈NO₃ [M+H]⁺ 368.1281, found 368.1280.

8-(4-甲基苯基)-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3b**): 白色固体 153 mg, 产率 80%. m.p. > 300 °C; ¹H NMR (300 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 11.62 (s, 1H), 7.80 (d, *J* = 7.9 Hz, 1H), 7.69 (d, *J* = 7.7 Hz, 2H), 7.53~7.42 (m, 2H), 7.35~7.29 (m, 3H), 7.18 (q, *J* = 7.9 Hz, 2H), 7.01~6.92 (m, 2H), 4.37 (s, 1H), 2.50 (s, 2H), 2.38 (s, 3H); ¹³C NMR (75 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 161.0, 154.3, 151.4, 138.5, 137.32, 137.27, 130.6, 129.0, 127.8, 126.3, 125.5, 121.71, 121.68, 121.3, 115.8, 115.3, 113.5, 111.3, 99.4, 31.5, 26.1, 20.8; IR (KBr) ν: 3434, 2945, 1653, 1491, 1398, 1229, 1034, 992, 861, 750 cm⁻¹; HRMS (MALDI) calcd for C₂₅H₂₀NO₃ [M+H]⁺ 382.1438, found

382.1440.

8-(4-甲氧基苯基)-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3c**): 白色固体 157 mg, 产率 79%. m.p. > 300 °C; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 11.17 (s, 1H), 7.98 (d, $J=7.4$ Hz, 1H), 7.73 (d, $J=8.9$ Hz, 2H), 7.63 (dd, $J=7.5, 1.3$ Hz, 1H), 7.54~7.49 (m, 1H), 7.35 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.23~7.12 (m, 2H), 7.02 (d, $J=8.8$ Hz, 3H), 6.94 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 4.61~4.59 (m, 1H), 3.88 (s, 3H), 2.50~2.35 (m, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 163.1, 160.2, 156.3, 151.8, 137.1, 132.8, 130.6, 128.1, 127.9, 127.1, 126.0, 122.6, 122.2, 121.6, 116.2, 115.7, 114.8, 113.8, 111.1, 99.7, 55.4, 33.1, 26.8; IR (KBr) ν : 3436, 2946, 1652, 1510, 1443, 1244, 1102, 1033, 999, 750 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{20}\text{NO}_4$ [$\text{M} + \text{H}$] $^+$ 398.1387, found 398.1394.

8-(3,4-二甲氧基苯基)-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3d**): 白色固体 160 mg, 产率 75%. m.p. > 300 °C; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 11.16 (s, 1H), 7.98 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.64 (d, $J=6.3$ Hz, 1H), 7.53 (t, $J=7.1$ Hz, 1H), 7.39~7.34 (m, 2H), 7.31 (d, $J=2.0$ Hz, 1H), 7.25~7.13 (m, 2H), 7.05~6.93 (m, 3H), 4.61 (s, 1H), 3.96 (s, 6H), 2.52~2.37 (m, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 163.2, 156.3, 151.8, 149.7, 148.9, 137.1, 133.1, 130.6, 128.2, 127.9, 126.1, 122.5, 122.3, 121.7, 118.3, 116.2, 115.8, 114.8, 111.1, 110.8, 109.2, 99.7, 56.1, 56.0, 33.0, 26.8; IR (KBr) ν : 3430, 3001, 1653, 1513, 1345, 1133, 1098, 1025, 752 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{22}\text{NO}_5$ [$\text{M} + \text{H}$] $^+$ 428.1492, found 428.1492.

8-(4-氟苯基)-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3e**): 白色固体 131 mg, 产率 68%. m.p. > 300 °C; ^1H NMR (300 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.63 (s, 1H), 7.90~7.79 (m, 3H), 7.54~7.48 (m, 1H), 7.45 (d, $J=1.4$ Hz, 1H), 7.42~7.29 (m, 3H), 7.18 (q, $J=7.4$ Hz, 2H), 7.02~6.92 (m, 2H), 4.39~4.37 (m, 1H), 2.51 (s, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 162.4 (d, $^1J_{\text{C-F}}=244.0$ Hz), 160.9, 154.2, 151.3, 137.3, 136.5 (d, $^4J_{\text{C-F}}=3.0$ Hz), 130.7, 128.1 (d, $^3J_{\text{C-F}}=8.9$ Hz), 127.8, 126.2, 121.74, 121.69, 121.4, 115.8, 115.30 (d, $^2J_{\text{C-F}}=21.5$ Hz), 115.26, 113.4, 111.4, 99.1, 31.3, 26.0; IR (KBr) ν : 3432, 2850, 1653, 1502, 1399, 1231, 1101, 1003, 835 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{17}\text{FNO}_3$ [$\text{M} + \text{H}$] $^+$ 386.1187, found 386.1186.

8-(4-氯苯基)-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3f**): 白色固体 153 mg,

产率 76%. m.p. > 300 °C; ^1H NMR (300 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.65 (s, 1H), 7.86~7.79 (m, 3H), 7.61 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.51 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.43 (d, $J=7.4$ Hz, 1H), 7.30 (d, $J=8.2$ Hz, 1H), 7.18 (q, $J=8.1$ Hz, 2H), 7.03~6.93 (m, 2H), 4.38 (s, 1H), 2.48 (s, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 160.9, 154.2, 151.2, 139.1, 137.3, 133.9, 130.7, 128.6, 127.9, 127.8, 126.2, 121.8, 121.7, 121.5, 115.9, 115.3, 113.4, 111.4, 99.1, 31.2, 25.9; IR (KBr) ν : 3727, 3424, 2860, 1663, 1435, 1328, 1094, 881, 863 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{17}\text{ClNO}_3$ [$\text{M} + \text{H}$] $^+$ 402.0891, found 402.0890.

8-(4-溴苯基)-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3g**): 白色固体 161 mg, 产率 72%. m.p. > 300 °C; ^1H NMR (300 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.63 (s, 1H), 7.82~7.73 (m, 5H), 7.53~7.43 (m, 2H), 7.32~7.29 (m, 1H), 7.22~7.17 (m, 2H), 7.02~6.95 (m, 2H), 4.38 (s, 1H), 2.50~2.48 (m, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 160.9, 154.1, 151.2, 139.5, 137.3, 131.4, 130.6, 128.0, 127.8, 126.2, 122.5, 121.71, 121.66, 121.4, 115.8, 115.2, 113.4, 111.3, 99.1, 31.1, 25.9; IR (KBr) ν : 3442, 2850, 1651, 1489, 1394, 1230, 1101, 1034, 749 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{17}\text{BrNO}$ [$\text{M} + \text{H}$] $^+$ 446.0386, found 446.0392.

8-(2-呋喃基)-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3h**): 白色固体 115 mg, 产率 65%. m.p. > 300 °C; ^1H NMR (300 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.65 (s, 1H), 7.85~7.79 (m, 2H), 7.53~7.44 (m, 1H), 7.41 (d, $J=1.2$ Hz, 1H), 7.29 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.22~7.12 (m, 2H), 7.00~6.92 (m, 3H), 6.64~6.63 (m, 1H), 4.41~4.40 (m, 1H), 2.62~2.57 (m, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 160.8, 153.6, 151.0, 150.8, 143.8, 137.2, 130.7, 127.9, 126.1, 121.8, 121.5, 115.8, 115.3, 113.2, 111.4, 110.7, 108.2, 95.7, 28.7, 25.2; IR (KBr) ν : 3428, 2850, 2357, 1654, 1397, 1103, 961, 884, 750 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{22}\text{H}_{16}\text{NO}_4$ [$\text{M} + \text{H}$] $^+$ 358.1074, found 358.1072.

8-(2-噻吩基)-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3i**): 白色固体 125 mg, 产率 67%. m.p. > 300 °C; ^1H NMR (300 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.65 (d, $J=1.9$ Hz, 1H), 7.77 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.71 (d, $J=3.8$ Hz, 1H), 7.70~7.48 (m, 2H), 7.43 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.31~7.28 (m, 1H), 7.23~7.13 (m, 3H), 6.97~6.93 (m, 2H), 4.40 (s, 1H), 2.71~2.61 (m, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 160.9, 153.9, 151.0, 143.1, 137.3, 130.8, 127.9, 127.3, 127.0, 126.1, 125.8, 121.9, 121.6,

115.9, 115.4, 113.3, 111.5, 98.4, 31.5, 26.0; IR (KBr) ν : 3434, 2852, 1651, 1492, 1397, 1101, 986, 877, 755 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{22}\text{H}_{16}\text{NO}_3\text{S}$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 374.0845, found 374.0842.

8-(1-萘基)-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3j**): 白色固体 173 mg, 产率 83%. m.p. > 300 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 10.86 (s, 1H), 8.41 (d, $J=8.3$ Hz, 1H), 8.11 (d, $J=6.5$ Hz, 1H), 7.99~7.95 (m, 2H), 7.91 (d, $J=7.4$ Hz, 1H), 7.70 (d, $J=1.4$ Hz, 1H), 7.68~7.58 (m, 2H), 7.55~7.47 (m, 2H), 7.34 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.21~7.15 (m, 2H), 7.04~6.97 (m, 2H), 4.71~4.69 (m, 1H), 2.87~2.72 (m, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 163.3, 155.9, 151.4, 137.2, 135.3, 134.8, 130.7, 130.5, 129.1, 128.2, 128.1, 126.4, 125.74, 125.66, 124.8, 124.3, 122.7, 122.3, 121.8, 116.4, 115.8, 114.8, 111.4, 100.8, 31.0, 26.4; IR (KBr) ν : 3407, 2853, 1650, 1495, 1398, 1290, 1113, 938, 750 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{28}\text{H}_{20}\text{NO}_3$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 418.1438, found 418.1437.

8-甲基-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3k**): 白色固体 81 mg, 产率 53%. m.p. > 300 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 10.16 (s, 1H), 7.91 (d, $J=8.2$ Hz, 1H), 7.54 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.50~7.44 (m, 1H), 7.22~7.16 (m, 2H), 7.11~7.05 (m, 1H), 6.91~6.85 (m, 2H), 4.50~4.48 (m, 1H), 2.34~2.18 (m, 2H), 2.00 (s, 3H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 162.6, 156.1, 151.5, 136.7, 130.5, 128.1, 127.7, 125.9, 122.7, 122.1, 121.3, 115.9, 115.2, 114.7, 111.0, 99.0, 30.8, 26.9, 26.2; IR (KBr) ν : 3432, 3065, 2942, 1653, 1489, 1447, 1149, 1086, 809 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{NO}_3$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 306.1125, found 306.1123.

8-(2-甲基-1-丙烯基)-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3l**): 白色固体 88 mg, 产率 51%. m.p. > 300 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 10.68 (s, 1H), 7.93 (d, $J=0.9$ Hz, 1H), 7.91 (d, $J=1.0$ Hz, 1H), 7.57~7.50 (m, 1H), 7.28 (s, 1H), 7.19 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.12~7.07 (m, 1H), 6.90 (t, $J=7.7$ Hz, 2H), 5.80 (s, 1H), 4.50~4.48 (m, 1H), 2.39~2.23 (m, 2H), 1.92 (s, 6H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 163.3, 156.1, 151.5, 140.7, 137.1, 130.4, 128.1, 127.8, 126.2, 124.2, 122.6, 122.1, 121.4, 116.1, 115.7, 114.8, 111.0, 99.1, 30.5, 26.9, 26.2, 19.3; IR (KBr) ν : 3436, 2852, 1649, 1441, 1399, 1100, 957, 880, 752 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{NO}_3$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 346.1438, found 346.1432.

12-溴-8-苯基-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并

[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3m**): 白色固体 176 mg, 产率 79%. m.p. > 300 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.69 (s, 1H), 7.83~7.81 (m, 3H), 7.58~7.49 (m, 5H), 7.36~7.31 (m, 2H), 7.22 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.01 (d, $J=8.7$ Hz, 1H), 4.38 (s, 1H), 2.51 (s, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 160.9, 154.4, 150.9, 139.7, 137.4, 130.9, 130.4, 129.9, 129.3, 128.9, 128.6, 125.7, 121.9, 121.8, 118.2, 115.4, 113.4, 112.6, 110.7, 99.6, 30.9, 25.9; IR (KBr) ν : 3434, 2818, 1652, 1488, 1402, 1243, 1102, 949, 753 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{17}\text{BrNO}_3$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 446.0386, found 446.0391.

12-氯-8-(4-甲氧基苯基)-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3n**): 白色固体 172 mg, 产率 80%. m.p. > 300 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.65 (s, 1H), 7.81~7.72 (m, 3H), 7.52~7.49 (m, 1H), 7.41 (s, 1H), 7.32 (d, $J=8.2$ Hz, 1H), 7.20 (s, 2H), 7.08~7.02 (m, 3H), 4.36 (s, 1H), 3.82 (s, 3H), 2.47 (s, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 160.9, 159.8, 154.5, 150.5, 137.3, 131.9, 130.8, 128.4, 127.5, 127.0, 124.7, 121.8, 121.7, 117.7, 115.3, 113.8, 113.4, 110.6, 99.6, 55.2, 31.0, 26.1; IR (KBr) ν : 2948, 2841, 1652, 1510, 1242, 1028, 1002, 821, 755 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{19}\text{ClNO}_4$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 432.0997, found 432.0999.

10,12-二氯-8-(4-氟苯基)-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3o**): 白色固体 148 mg, 产率 65%. m.p. > 300 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.74 (s, 1H), 7.90 (t, $J=7.3$ Hz, 2H), 7.81 (d, $J=7.9$ Hz, 1H), 7.57~7.51 (m, 2H), 7.43~7.32 (m, 4H), 7.24~7.19 (m, 1H), 4.43 (s, 1H), 2.65~2.46 (m, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 162.6 (d, $^1J_{\text{C-F}}=244.5$ Hz), 160.8, 154.2, 146.4, 137.4, 135.5 (d, $^4J_{\text{C-F}}=2.9$ Hz), 131.0, 129.7, 128.2 (d, $^3J_{\text{C-F}}=8.6$ Hz), 127.5, 126.1, 125.0, 121.9, 121.8, 120.9, 115.46 (d, $^2J_{\text{C-F}}=21.6$ Hz), 115.38, 113.2, 110.0, 99.9, 30.5, 26.2; IR (KBr) ν : 3498, 2947, 2411, 1652, 1507, 1292, 1099, 834, 752 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{15}\text{Cl}_2\text{FNO}_3$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 454.0408, found 454.0398.

2-甲基-8-苯基-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3p**): 白色固体 143 mg, 产率 73%. m.p. 185~186 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 8.09~8.06 (m, 1H), 7.82~7.78 (m, 2H), 7.63~7.60 (m, 1H), 7.58~7.46 (m, 4H), 7.32 (d, $J=8.5$ Hz, 1H), 7.23~7.13 (m, 2H), 7.05~6.93 (m, 2H), 4.60~4.58 (m, 1H), 3.71 (s, 3H), 2.48~2.33 (m, 2H); ^{13}C NMR

(75 MHz, CDCl_3) δ : 161.7, 154.4, 151.8, 140.6, 138.6, 130.8, 129.1, 128.5, 128.2, 127.9, 126.1, 125.8, 123.1, 121.9, 121.7, 116.1, 115.5, 114.0, 111.1, 99.5, 33.2, 29.4, 27.4; IR (KBr) ν : 3434, 1638, 1490, 1397, 1271, 1116, 1038, 959, 751 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{20}\text{NO}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 382.1438, found 382.1438.

2-甲基-8-(4-甲基苯基)-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3q**): 白色固体 148 mg, 产率 75%. m.p. 191~192 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 8.06 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.68 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 7.61 (d, $J=7.0$ Hz, 1H), 7.54 (t, $J=8.6$ Hz, 1H), 7.31 (d, $J=7.8$ Hz, 3H), 7.22~7.13 (m, 2H), 7.04~6.93 (m, 2H), 4.58 (s, 1H), 3.70 (s, 3H), 2.43~2.32 (m, 5H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 161.7, 154.5, 151.9, 139.0, 138.6, 137.7, 130.8, 129.2, 128.2, 127.9, 126.1, 125.7, 123.1, 121.8, 121.6, 116.1, 115.5, 113.9, 111.0, 99.6, 33.2, 29.4, 27.4, 21.2; IR (KBr) ν : 3434, 1636, 1466, 1395, 1270, 1180, 1004, 956, 755 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{22}\text{NO}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 396.1594, found 396.1595.

6-苯基-2,12-二氢-1*H*-6,12-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]吡啶-1-酮(**3r**): 白色固体 124 mg, 产率 78%. m.p. 246~248 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 11.28 (s, 1H), 7.73~7.69 (m, 2H), 7.55~7.52 (m, 1H), 7.50~7.42 (m, 3H), 7.18~7.12 (m, 2H), 7.03 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.96~6.91 (m, 1H), 6.12~6.09 (m, 1H), 4.43~4.42 (m, 1H), 2.40~2.26 (m, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 163.7, 161.2, 151.7, 140.3, 132.5, 129.1, 128.4, 128.0, 127.9, 126.1, 125.6, 121.6, 116.2, 112.2, 100.8, 99.4, 32.7, 26.4; IR (KBr) ν : 3436, 2361, 1642, 1558, 1465, 1119, 1004, 1029, 755 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{NO}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 318.1125, found 318.1123.

3-甲基-6-苯基-2,12-二氢-1*H*-6,12-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]吡啶-1-酮(**3s**): 白色固体 113 mg, 产率 68%. m.p. 277~279 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 12.19 (s, 1H), 7.72~7.69 (m, 2H), 7.51~7.42 (m, 4H), 7.16~7.10 (m, 1H), 7.01 (d, $J=7.5$ Hz, 1H), 6.92~6.86 (m, 1H), 5.90 (s, 1H), 4.39~4.37 (m, 1H), 2.32~2.28 (m, 5H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 164.2, 161.4, 151.8, 143.6, 140.5, 129.0, 128.4, 127.8, 127.7, 126.5, 125.6, 121.4, 116.2, 108.7, 99.4, 99.3, 33.0, 26.3, 19.0; IR (KBr) ν : 3423, 2361, 1632, 1449, 1255, 1178, 1109, 1026, 797, 757 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{18}\text{NO}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 332.1281, found 332.1280.

4-乙酯基-6-苯基-2,12-二氢-1*H*-6,12-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]吡啶-1-酮(**3t**): 白色固体 148 mg,

产率 76%. m.p. 244~246 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 12.09 (s, 1H), 8.11 (s, 1H), 7.87~7.84 (m, 2H), 7.55~7.44 (m, 4H), 7.21~7.15 (m, 1H), 7.03~6.93 (m, 2H), 4.46~4.44 (m, 1H), 4.41~4.26 (m, 2H), 2.51~2.22 (m, 2H), 1.35 (t, $J=7.1$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 163.5, 163.3, 159.5, 151.7, 140.1, 139.3, 129.1, 128.4, 128.1, 128.0, 126.0, 125.5, 121.7, 116.3, 112.1, 105.3, 99.9, 61.1, 32.2, 26.4, 14.3; IR (KBr) ν : 2857, 2363, 1726, 1637, 1440, 1285 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{23}\text{H}_{20}\text{NO}_5$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 390.1336, found 390.1341.

4-氯-6-苯基-2,12-二氢-1*H*-6,12-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]吡啶-1-酮(**3u**): 白色固体 114 mg, 产率 65%. m.p. >300 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.69 (s, 1H), 7.75~7.72 (m, 2H), 7.55~7.47 (m, 4H), 7.39 (dd, $J=7.5, 1.5$ Hz, 1H), 7.21~7.15 (m, 1H), 7.02~6.92 (m, 2H), 4.28~4.26 (m, 1H), 2.47~2.34 (m, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 160.3, 155.1, 151.1, 139.7, 132.1, 129.1, 128.4, 127.9, 127.7, 126.0, 125.5, 121.4, 115.9, 112.5, 103.3, 99.6, 31.1, 26.1; IR (KBr) ν : 3434, 2760, 1651, 1483, 1246, 1163, 1076, 928, 757 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{15}\text{ClNO}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 352.0735, found 352.0731.

3.2.2 目标化合物 5/6 的合成

将 8-苯基-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**3a**) (0.5 mmol)和溴代物 **4** (1.5 mmol)加入到 25 mL 耐压管中, 以 3.0 equiv.的碳酸钾为碱, 再向其中加入 *N,N*-二甲基甲酰胺(DMF) (5 mL), 当反应物消失后(3~8 h, 用 TLC 监测), 将混合物冷却至室温, 减压除去溶剂, 加入 30 mL 水后用乙酸乙酯萃取 (20 mL $\times$ 3), 合并有机相后干燥、过滤, 再减压除去乙酸乙酯后, 剩余物以石油醚和乙酸乙酯为洗脱剂(体积比为 5:1~20:1), 通过硅胶柱层析分离得到目标化合物。

2-乙基-8-苯基-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**5a**): 白色固体 119 mg, 产率 60%. m.p. 210~212 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 8.07 (dd, $J=8.0, 1.2$ Hz, 1H), 7.81~7.78 (m, 2H), 7.64~7.61 (m, 1H), 7.54~7.46 (m, 4H), 7.31 (d, $J=8.5$ Hz, 1H), 7.22~7.14 (m, 2H), 7.04 (d, $J=7.7$ Hz, 1H), 6.99~6.94 (m, 1H), 4.60~4.58 (m, 1H), 4.44~4.23 (m, 2H), 2.46~2.32 (m, 2H), 1.33 (t, $J=7.1$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 161.1, 154.3, 151.8, 140.6, 137.5, 130.7, 129.1, 128.5, 128.3, 127.8, 126.1, 125.7, 123.2, 121.64, 121.61, 116.1, 115.6, 113.8, 110.9, 99.5, 37.3, 33.2, 27.3, 12.9; IR (KBr) ν : 3441, 1632, 1451, 1393,

1232, 1130, 892, 760, 696 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{22}\text{NO}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 396.1594, found 396.1597.

2-苄基-8-苯基-2,14-二氢-1*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉-1-酮(**5b**): 白色固体 119 mg, 产率 52%. m.p. 223~224 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 8.07 (dd, $J=1.3$, 7.9 Hz, 1H), 7.81 (dd, $J=1.8$, 8.1 Hz, 2H), 7.63 (dd, $J=1.5$, 7.5 Hz, 1H), 7.54~7.46 (m, 3H), 7.41~7.36 (m, 2H), 7.31~7.26 (m, 2H), 7.22~7.14 (m, 5H), 7.06 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.00~6.97 (m, 1H), 5.74 (d, $J=16.2$ Hz, 1H), 5.32 (d, $J=15.9$ Hz, 1H), 4.66~4.64 (m, 1H), 2.50~2.37 (m, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 161.9, 154.8, 151.8, 140.6, 138.1, 136.7, 130.8, 129.1, 128.7, 128.5, 128.3, 127.9, 127.1, 126.5, 126.1, 125.8, 123.1, 122.0, 121.8, 116.2, 115.7, 114.8, 110.9, 99.7, 46.1, 33.2, 27.4; IR (KBr) ν : 3431, 2923, 1632, 1597, 1454, 1131, 1006, 753, 697 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{31}\text{H}_{24}\text{NO}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 458.1751, found 458.1747.

1-乙氧基-8-苯基-14*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉(**6a**): 白色固体 24 mg, 产率 12%. m.p. 216~217 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 8.13 (d, $J=8.3$ Hz, 1H), 7.84~7.81 (m, 2H), 7.73 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.58~7.44 (m, 5H), 7.33 (t, $J=7.0$ Hz, 1H), 7.18~7.12 (m, 1H), 7.04 (d, $J=7.5$ Hz, 1H), 6.96~6.92 (m, 1H), 4.66~4.56 (m, 2H), 4.55~4.53 (m, 1H), 2.49~2.38 (m, 2H), 1.57~1.53 (m, 3H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 159.6, 155.1, 152.1, 145.6, 140.9, 129.4, 129.0, 128.5, 127.9, 127.8, 126.8, 126.2, 125.8, 123.4, 121.6, 121.4, 118.2, 116.4, 106.8, 99.3, 62.0, 33.1, 27.0, 14.8; IR (KBr) ν : 3431, 2922, 1631, 1401, 1347, 1116, 887, 755, 696 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{22}\text{NO}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 396.1594, found 396.1598.

1-苄氧基-8-苯基-14*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]二氧桥[5,4-*c*]喹啉(**6b**): 白色固体 30 mg, 产率 13%. m.p. 234~236 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 8.15 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.83~7.76 (m, 3H), 7.60 (d, $J=7.5$ Hz, 3H), 7.48 (t, $J=7.6$ Hz, 4H), 7.33~7.30 (m, 4H), 7.13 (t, $J=7.7$ Hz, 1H), 7.03 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 6.86 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 5.56 (s, 2H), 4.54 (s, 1H), 2.41 (s, 2H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 159.3, 155.5, 152.1, 145.5, 140.9, 137.5, 129.6, 129.0, 128.5, 128.4, 127.9, 126.9, 126.0, 125.8, 123.6, 121.7, 121.4, 118.4, 116.4, 106.8, 99.4, 68.1, 33.1, 27.0; IR (KBr) ν : 3441, 1629, 1417, 1340, 1103, 999, 872, 760, 690 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{31}\text{H}_{24}\text{NO}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 458.1751, found 458.1749.

1-异丙氧基-8-苯基-14*H*-8,14-亚甲基苯并[7,8][1,3]

二氧桥[5,4-*c*]喹啉(**6c**): 白色固体 137 mg, 产率 67%. m.p. 218~220 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) δ : 8.05~8.02 (m, 1H), 7.75~7.72 (m, 2H), 7.63 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.48~7.42 (m, 3H), 7.40~7.37 (m, 1H), 7.25~7.20 (m, 1H), 7.15~7.03 (m, 2H), 6.96~6.94 (m, 1H), 6.88~6.82 (m, 1H), 5.59~5.51 (m, 1H), 4.44~4.42 (m, 1H), 2.34~2.32 (m, 2H) 1.44 (d, $J=6.2$ Hz, 3H), 1.37 (d, $J=6.2$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) δ : 159.0, 155.1, 152.2, 145.6, 140.9, 129.3, 129.0, 128.5, 127.9, 127.8, 126.8, 126.2, 125.8, 123.2, 121.5, 121.3, 118.0, 116.4, 107.0, 99.2, 68.3, 33.0, 26.9, 22.4, 22.3; IR (KBr) ν : 3439, 2968, 1948, 1624, 1417, 1100, 876, 804, 753 cm^{-1} ; HRMS (MALDI) calcd for $\text{C}_{27}\text{H}_{24}\text{NO}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 410.1751, found 410.1753.

辅助材料(Supporting Information) 化合物 **3a**~**3u**, **5a**, **5b** 和 **6a**~**6c** 的 ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 图谱, **3r** 和 **6c** 的晶体结构数据. 这些材料可以免费从本刊网站 (<http://sioc-journal.cn/>) 上下载.

References

- [1] Neve, J. E.; Wijesekera, H. P.; Duffy, S.; Jenkins, I. D.; Ripper, J. A.; Teague, S. J.; Campitelli, M.; Garavelas, A.; Nikolakopoulos, G.; Le, P. V.; de A. Leone, P.; Pham, N. B.; Shelton, P.; Fraser, N.; Carroll, A. R.; Avery, V. M.; McCrae, C.; Williams, N.; Quinn, R. J. *J. Med. Chem.* **2014**, *57*, 1252.
- [2] Zhao, S.; Huang, J.; Cheng, J.; Liu, B.; Chen, C. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, *32*, 651 (in Chinese). (赵圣印, 黄婧, 程健, 刘保硕, 陈晨, 有机化学, **2012**, *32*, 651.)
- [3] Banbury, L. K.; Shou, Q.; Renshaw, D. E.; Lambley, E. H.; Grieser, H. J.; Mon H.; Wohlmuth, H. J. *Ethnopharmacol.* **2015**, *163*, 251.
- [4] Ahsan, M.; Haque, M. R.; Hossain, M. B.; Islam, S. N.; Gray, A. I.; Hasan, C. M. *Phytochemistry* **2014**, *103*, 8.
- [5] Tedesco, R.; Shaw, A. N.; Bambal, R.; Chai, D.; Concha, N. O.; Darcy, M. G.; Dhanak, D.; Fitch, D. M.; Gates, A.; Gerhardt, W. G.; Haleboua, D. L.; Han, C.; Hofmann, G. A.; Johnston, V. K.; Kaura, A. C.; Liu, N.; Keenan, R. M.; Lin-Goerke, J.; Sarisky, R. T.; Wiggall, K. J.; Zimmerman, M. N.; Duffy, K. J. *J. Med. Chem.* **2006**, *49*, 971.
- [6] Chen, T.; Luo, Y.; Hu, Y.; Yang, B.; Lu, W. *Eur. J. Med. Chem.* **2013**, *64*, 613.
- [7] Detsi, A.; Bouloubasi, D.; Prousis, K. C.; Koufaki, M.; Athanassellis, G.; Melagraki, G.; Afantitis, A.; Lgglessi-Markopoulou, O.; Kontogiorgis, C.; Hadjipavlou-Litina, D. J. *J. Med. Chem.* **2007**, *50*, 2450.
- [8] Nishino, H.; Kumabe, R.; Hamada, R.; Yakut, M. *Tetrahedron* **2014**, *70*, 1437.
- [9] Lei, M.; Ma, L.; Hu, L. *Tetrahedron Lett.* **2011**, *52*, 2597.
- [10] Pei, W.; Deng, Q.; Wang, H.; Sun L. *Chin. J. Org. Chem.* **2006**, *26*, 364 (in Chinese). (裴文, 邓琼, 王海滨, 孙莉, 有机化学, **2006**, *26*, 364.)
- [11] Presset, M.; Coquerel, Y.; Rodriguez, J. *Chem. Rev.* **2013**, *113*, 525.
- [12] Ruiz, M.; López-Alvarado, P.; Giorgi, G.; Menéndez, J. C. *Chem.*

- Soc. Rev.* **2011**, *40*, 3445.
- [13] Chen, D.; Kuo, P.; Yang, D. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2005**, *15*, 2665.
- [14] He, Z.; Yang, X.; Jiang, W. *Org. Lett.* **2015**, *17*, 3880.
- [15] Wang, F.; Chen, F.; Qu, M.; Li, T.; Liu, Y.; Shi, M. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 3360.
- [16] Reddy, G. M.; Sridhar, P. R. *Eur. J. Org. Chem.* **2014**, 1496.
- [17] Xia, L.; Cai, H.; Lee, Y. R. *Org. Biomol. Chem.* **2014**, *12*, 4386.
- [18] Jiang, X.; Song, Z.; Xu, C.; Yao, Q.; Zhang, A. *Eur. J. Org. Chem.* **2014**, 418.
- [19] Srinivas, V.; Koketsu, M. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 11612.
- [20] Ganguly, N. C.; Roy, S.; Mondal, P. *RSC Adv.* **2014**, *4*, 42078.
- [21] Yin, G.; Ren, T.; Rao, Y.; Zhou, Y.; Li, Z.; Shu, W.; Wu, A. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 3132.
- [22] Rao, Y.; Yin, G. *Org. Biomol. Chem.* **2013**, *11*, 6029.
- [23] Rao, Y.; Liu, M.; Wu, L.; Yin, G. *RSC Adv.* **2014**, *4*, 64551.
- [24] Bingi, C.; Emmadi, N. R.; Chennapuram, M.; Nanubolu, J. B.; Atmakur, K. *RSC Adv.* **2014**, *4*, 35009.
- [25] Yin, G.; Fan, L.; Ren, T.; Zheng, C.; Tao, Q.; Wu, A.; She, N. *Org. Biomol. Chem.* **2012**, *10*, 8877.
- [26] Kinoshita, T.; Nashimoto, A.; Yamamura, Y.; Okamura, T.; Sasako, M.; Sakamoto, J.; Kojima, H.; Hiratsuka, M.; Arai, K.; Sairenji, M.; Fukushima, N.; Kimura, H.; Nakajima, T. *Gastric Cancer* **2004**, *7*, 104.
- [27] Luiza, B. D. O.; Borgati, T. F.; de Freitas, R. P.; Ruiz, A. L.; Marchetti, G. M.; de Carvalho, J. E.; da Cunha, E. F. F.; Ramalho, T. C.; Alves, R. B. *Eur. J. Med. Chem.* **2014**, *84*, 595.
- [28] Hao, X.; Xu, Z.; Lu, H.; Dai, X.; Yang, T.; Lin, X.; Ren, F. *Org. Lett.* **2015**, *17*, 3382.
- [29] Torhan, M. C.; Peet, N. P.; Williams, J. D. *Tetrahedron Lett.* **2013**, *54*, 3926.

(Li, L.; Lu, Z.)