一锅法合成多取代色酮并双环吡啶类化合物

陈 亮 王保取 赵宇澄 严胜骄* 林 军*

(云南大学化学科学与工程学院 教育部自然资源药物化学重点实验室 昆明 650091)

摘要 建立了一种简捷、绿色合成多取代色酮并双环吡啶类化合物的合成方法。该方法是利用色酮-3-甲醛 **1** 与 *N*-苄基硝基烯酮缩胺(NBNKAs, **2**)在乙醇中反应,一步合成色酮并双环吡啶化合物。通过直接抽滤得目标产物 **3**,无需额外的后处理操作。该方法具有合成成本低,反应溶剂生物相容性好,反应条件温和,原子经济性,高产率(93~98%)及产物具有潜在的生物活性等显著优势。

关键词 环境友好;原子经济;无催化剂;咪唑并吡啶;新烟碱类

One-Pot Synthesis of Multisubstituted Chromone-Fused Bicyclic Pyridine Compounds

Chen, Liang Wang, Baoqu Zhao, Yucheng Yan, Shengjiao* Lin, Jun*

(Key Laboratory of Medicinal Chemistry for Natural Resource, Ministry of Education, School of Chemical Science and Technology, Yunnan University, Kunming 650091)

Abstract A concise and environment friendly route for the synthesis of multisubstituted chromone-fused bicyclic pyridine compounds via one-step reaction of chromone-3-carboxaldehyde **1** and *N*-benzyl nitro ketene aminals (NBNKAs, **2**) in ethanol media has been developed. The targeted compounds **3** can efficiently obtain by filter without extra post-treatment. The reaction is particularly attractive due to following features: low-cost and biocompatibility solvent, mild temperature, atom economy, high yields, and potential biological activity.

Keywords environment friendly; atom economy; catalyst-free; bicyclic pyridine; neonicotinoids

化工产品和药物的生产离不开化学合成。化学合成丰富人们物质世界的同时,不可避免地带来很多问题。包括资源和能源的浪费,以及环境污染等^[1,2]。而如何应对由化学合成带来的污染已成为现代化学工作者急需思考和面对的问题。理想的化学合成应该是一个绿色环保和高效低碳的过程^[3,4]。美国著名化学家 Trost^[5]在1991年提出了“原子经济性”的原则,认为在设计合成路线的时候应该尽可能地消除或者减少有害物质的产生,美国环境保护组织(U.S. EPA)也倡导化学反应应满足“绿色化学”的要求^[6]。而本文旨在探索如何绿色、高效构筑 C—C 和 C—N 键并合成含色酮骨架结构的双环咪唑并吡啶类化合物的。含氮杂环化合物在合成药物^[7,8]及天然产物中扮演着十分重要的角色^[9,10]。

含氮杂环化合物具有丰富多样的生物活性,比如说抗癌^[11]、抗病毒^[12]、治疗心脑血管疾病^[13]、镇静安眠等^[14,15]。咪唑并吡啶作为含氮杂环化合物家族中较为重要的一员,已经在很多临床药物中发挥着重要的作用^[16,17],已经商品化的药物包括奥普力农^[18]、法倔唑^[19]、唑吡旦^[20]等。

奥普力农(强心药)

法倔唑

唑吡旦(安眠药)

* Corresponding authors. E-mail: yansj@ynu.edu.cn; linjun@ynu.edu.cn

Received December 12, 2016; revised January 21, 2017; published online February 20, 2017.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. U1202221, 21362042, 21262042, 21662042), the Talent Found in Yunnan Province (No. 2012HB001), and the Excellent Young Talents of Yunnan University (No. XT412003).

国家自然科学基金(Nos. U1202221, 21362042, 21262042, 21662042)、云南省后备人才(No. 2012HB001)、云南大学青年英才计划(No. XT412003)资助项目。

新烟碱型类似物(如吡虫啉^[21]、6-Cl-PMNI^[22]、啉虫啉^[23]等)因其良好的杀虫活性以及较低的哺乳动物毒性,迅速发展并成为继有机磷农药、氨基甲酸酯及除虫菊酯之后的第四代新型农药^[24,25]。而新烟碱类似物,因其特殊的结构特征: (1)柔性的苄基侧链, (2)强吸电子的硝基, (3)芳香核, (4)和双键相连的胺基。李忠课题组^[26,27]开展一系列新烟碱类似物的研究工作,合成获得很多活性化合物。其中,新烟碱类似物 *N*-苄基硝基烯酮缩胺(NBN-KAs, **2**)属于多功能合成砌块即杂环烯酮缩胺(HKAs)类化合物^[28,29]。NBNKAs 在构建具有潜在生物活性的含氮杂环化合物方面有独特的优势^[30,31]。

黄酮类药物在抗癌、抗衰老及治疗血管疾病方面发挥着重要作用^[32,33]。黄酮类化合物均含有色酮母核。本文拟根据药物拼合原理,把色酮结构及新烟碱结构拼合到目标化合物双环咪唑并吡啉类化合物中,希望新杂合物具有更优、更广谱的生物活性,为今后进行生物活性普筛打下基础。

本文目标产物的合成用取代色酮-3-甲醛化合物 **1** 与 **2** 反应,通过 **2** α -C 选择性对色酮羰基加成脱水、氨基对色酮双键进行迈克尔加成得目标产物(Eq. 1)。相对其他文献报道的杂环构筑方法^[34],本方法符合绿色合成原则,操作简单,反应条件温和,反应时间短,原子利用率高,产率高。

1 结果与讨论

1.1 反应条件的筛选

称取 1.1 mmol 的色酮-3-甲醛 **1a** 和 1.0 mmol 的 1-(4-硝基苄基)-2-(硝基亚甲基)咪唑烷(**2a**)加入到 25 mL 圆底烧瓶中,加入 15 mL 溶剂搅拌,之后对反应溶剂、催化剂、时间以及温度对产率的影响进行了筛选,结果见表

1.

表 1 优化反应条件

Table 1 Optimization of reaction conditions^a

Entry	Solvent	Catalyst	T/°C	Time/min	Yield ^b /%
1	EtOH	—	r.t.	60	75
2	DCM	—	r.t.	120	76
3	EtOH	—	Reflux	20	96
4	DMF	—	Reflux	30	72
5	Toluene	—	Reflux	60	81
6	1,4-Dioxane	—	Reflux	60	84
7	CH ₃ CN	—	Reflux	60	74
8	MeOH	—	Reflux	30	78
9	H ₂ O	—	Reflux	60	65
10	EtOH	K ₂ CO ₃	Reflux	20	81
11	EtOH	Et ₃ N	Reflux	20	90
12	EtOH	Piperidine	Reflux	20	92
13	EtOH	Cs ₂ CO ₃	Reflux	20	80

^a Reactions were carried out using **1a** (1.1 mmol), **2a** (1.0 mmol), and solvent (15 mL). ^b Isolated yield based on NBNKA **2a**.

最初我们尝试了在室温下,分别以 EtOH 和 *N,N*-二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂,无催化剂条件下的反应,以薄层色谱(TLC)作为检测手段,结果显示(表 1, Entries 1~2),两种情况下都有目标化合物 **3aa** 生成,但是两种条件下,原料都没有反应完。然后又考查了 EtOH 作为溶剂回流条件下的反应(表 1, Entry 3),结果显示升高温度对反应是有利的,能在较短时间(20 min)以较高产率(96%)获得目标化合物 **3aa**。我们进一步考察了不同溶剂对反应的影响,结果显示(表 1, Entries 4~9),不论是质子性溶剂(EtOH, MeOH, H₂O),还是非质子性溶剂(DCM, toluene, 1,4-dioxane)都能得到目标产物。但是产率存在一定的差异(72%~65%),我们推测可能是由于目标产物最后都是以沉淀的形式从反应液中析出,所以溶剂的极性对产率会造成影响,对产物溶解性好的溶剂会使得产率下降,但这并不意味着对产物溶解性差的溶剂就能给出高的产率(Entries 5, 9)。部分溶剂由于没办法对底物进行有效地溶解,使得底物无法充分接触,反应受阻,导致反应底物和产物混在一起,影响后处理。在最优溶剂选择为 EtOH 的基础上,进一步研究了催化剂对本反应的影响,结果显示(表 1, Entries 10~13),催

化剂的加入反而降低了产率。

综合来看, 最优的合成条件为以乙醇作为溶剂, 底物 1:1, 无催化剂回流 20 min, 能够以优异的产率 (96%) 得目标化合物 **3aa**。且反应结束后待反应液冷却到室温, 过滤后取沉淀干燥即可得纯的目标产物。

1.2 目标产物及产率

在最佳条件基础上, 为进一步的验证反应的普适性, 我们以色酮-3-甲醛 **1a~1d** 与 *N*-苄基的硝基烯酮缩胺 **2a~2k** 反应, 成功合成 30 个双环咪唑并吡啶类化合物 **3aa~3dk**。结果详见表 2。

实验过程中我们发现, 当色酮-3-甲醛的 C(6)位上是吸电子基团(比如 F 和 Cl)时, 反应的速度明显比 C(6)

位上是给电子基团 CH₃ 的时候快, 根据我们推测的反应机理(Scheme 1)来说, 有可能是色酮的苯环上有吸电子基团的时候, 能够提高色酮羰基碳的电正性, 有利于 *N*-苄基的硝基烯酮缩胺 α -C 对其进攻, 所以造成反应速度加快。根据以上推测, 实际的反应速率顺序应为: F > Cl > H > CH₃, 但是实际实验观察结果则是 Cl > F > H > CH₃。造成上述结果的原因可能是由 C(6)位是 F 的时候, F 原子容易和 NH 里的 H 原子形成氢键, 干扰了 NH 中 H 原子与色酮羰基上氧原子氢键的形成。最终导致含 F 色酮的反应速度低于含 Cl 色酮。

通过的实验数据的分析可以发现, 不论是色酮-3-甲醛上取代基的种类还是 *N*-苄基硝基烯酮缩胺的芳香

表 2 一锅法合成化合物 **3**^a
Table 2 One-pot protocol for the synthesis of compound **3**

Entry	R	1	Ar	2	3	Yield ^b /%
1	H	1a	4-Nitrophenyl	2a	3aa	96
2	H	1a	4-(Trifluoromethyl)phenyl	2b	3ab	98
3	H	1a	4-Cyanophenyl	2c	3ac	93
4	H	1a	4-Fluorophenyl	2d	3ad	96
5	H	1a	4-Chlorophenyl	2e	3ae	97
6	H	1a	Phenyl	2f	3af	95
7	H	1a	4-Methylphenyl	2g	3ag	97
8	H	1a	4-Methoxyphenyl	2h	3ah	96
9	H	1a	3-Fluorophenyl	2i	3ai	94
10	H	1a	3,5-Difluorophenyl	2j	3aj	94
11	H	1a	6-Chloropyridin-3-yl	2k	3ak	95
12	H	1a	2-Chlorothiazol-5-yl	2l	3al	93
13	F	1b	4-(Trifluoromethyl)phenyl	2b	3bb	95
14	F	1b	4-Cyanophenyl	2c	3bc	94
15	F	1b	4-Fluorophenyl	2d	3bd	95
16	F	1b	4-Chlorophenyl	2e	3be	96
17	F	1b	Phenyl	2f	3bf	97
18	F	1b	4-Methylphenyl	2g	3bg	96
19	F	1b	4-Methoxyphenyl	2h	3bh	95
20	F	1b	3-Fluorophenyl	2i	3bi	94
21	F	1b	3,5-Difluorophenyl	2j	3bj	98
22	F	1b	6-Chloropyridin-3-yl	2k	3bk	96
23	F	1b	2-Chlorothiazol-5-yl	2l	3bl	95
24	Cl	1c	4-(Trifluoromethyl)phenyl	2b	3cb	95
25	Cl	1c	4-Fluorophenyl	2d	3cd	96
26	Cl	1c	4-Methylphenyl	2g	3cg	97
27	Cl	1c	4-Methoxyphenyl	2h	3ch	96
28	CH ₃	1d	4-Cyanophenyl	2c	3dc	98
29	CH ₃	1d	4-Methoxyphenyl	2h	3dh	98
30	CH ₃	1d	6-Chloropyridin-3-yl	2k	3dk	97

^a All reactions were run under the following conditions: **1** (1.1 mmol) and **2** (1.0 mmol) were refluxed in the solvent EtOH (15 mL) for 20 min. ^b Isolated yield based on NBNKAs **2**.

图式 1 合成目标产物 3 反应机理的推断

Scheme 1 Mechanism hypotheses for the synthesis of target compounds 3

环种类, 对反应的产率均无明显影响. 结合最终产物以沉淀形式析出这一现象, 说明此反应有很好的热力学优势以及较为广泛的适用性.

1.3 反应机理

我们推测反应机理如 Scheme 1 所示. NBNKAs 化合物氨基上的 H 原子首先和色酮-3-甲醛羰基氧原子形成分子间的氢键^[35,36]. 而氢键的形成提高了色酮-3-甲醛中羰基碳原子的电正性, 使得其亲电反应活性提高. 另一方面, 分子间氢键的形成起到了定位作用, 有利于 NBNKAs 中双键 α -C 对色酮醛基亲核加成得中间体 4. 然后中间体 4 脱去一分子水, 而 N 进攻色酮的 C(2) 位点, 经过双键位置的重排, 得到目标产物 3.

2 结论

本文建立了一种绿色、高效一步法合成多取代色酮并双环吡啶类衍生物的方法. 该方法利用 C(6) 位不同取代基的色酮-3-甲醛与不同芳香取代的 *N*-苄基硝基烯酮缩胺类化合物(NBNKAs)反应快速合成一系列含色酮骨架结构的咪唑并吡啶类化合物. 且反应结束后, 经过简单过滤就能得到目标产物. 反应过程符合绿色化学的理念, 溶剂环保, 整个反应只脱出一分子水, 反应原子利用率高, 产率高. 另一方面, 合成所用两个原料本身就具有很好的生物活性, 这为后续对产物的活性筛选提供了良好的基础.

3 实验部分

3.1 仪器和试剂

IR: 傅里叶红外光谱仪(Thermo Nicolet Avatar 360 型); HRMS: 高分辨质谱仪(Agilent CL/Msd TOF); NMR: 核磁共振仪 Bruck DRX500 (^1H : 500 MHz, ^{13}C : 125 MHz), Bruck DRX600 (^1H : 600 MHz, ^{13}C : 150 MHz); 熔点仪(XT-4A 控温型显微熔点测定仪); 控温型电磁搅

拌器. GF₂₅₄ 高效薄层层析板, 分析纯或化学纯试剂, NBNKAs 2 按文献[37]制备.

3.2 化合物 3 的合成

称取 1.1 mmol 色酮-3-甲醛 1 和 1.0 mmol *N*-苄基硝基烯酮缩胺 2 共同加入到 25 mL 圆底烧瓶中, 加入 15 mL 乙醇, 充分搅拌并加热回流 20 min, TLC 监测直至原料消失, 停止反应. 待反应液冷却至室温后过滤, 取沉淀在红外灯下干燥, 得到目标产物 3aa~3dk, 产率为 93%~98%.

4-硝基-3-(4-硝基苄基)-1,2,3,11a-四氢-6*H*-苯并吡喃并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(3aa): 黄色固体, m.p. 258~259 °C; ^1H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 8.25 (d, $J=9.0$ Hz, 2H, ArH), 7.92 (s, 1H, CH), 7.83~7.85 (m, 1H, ArH), 7.68 (d, $J=9.0$ Hz, 2H, ArH), 7.61~7.65 (m, 1H, ArH), 7.17~7.20 (m, 1H, ArH), 7.11 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, ArH), 6.47 (s, 1H, CH), 5.01 (d, $J=17.3$ Hz, 1H, CH₂), 4.83 (d, $J=17.5$ Hz, 1H, CH₂), 3.84~4.21 (m, 2H, CH₂), 3.93~3.97 (m, 2H, CH₂); ^{13}C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.4, 156.6, 155.6, 147.3, 144.7, 136.6, 130.3, 128.8, 127.4, 124.0, 123.5, 123.2, 118.6, 112.4, 110.3, 85.9, 55.1, 51.3, 45.7; IR (KBr) ν : 1662, 1615, 1552, 1513, 1342, 1318, 1295, 1219, 622 cm^{-1} ; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₁H₁₇N₄O₆ [M+H]⁺ 421.1143, found 421.1140.

4-硝基-3-(4-(三氟甲基)苄基)-1,2,3,11a-四氢-6*H*-苯并吡喃并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(3ab): 黄色固体, m.p. 240~241 °C; ^1H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.93 (s, 1H, CH), 7.83~7.84 (m, 1H, ArH), 7.75~7.77 (m, 2H, ArH), 7.62~7.63 (m, 3H, ArH), 7.17~7.20 (m, 1H, ArH), 7.11 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, ArH), 6.46 (s, 1H, CH), 4.97 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.80 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.16~4.20 (m, 1H, CH₂), 3.91~3.95 (m, 2H, CH₂), 3.83~3.87 (m, 1H, CH₂); ^{13}C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.3, 156.6, 155.5, 141.4, 136.5, 130.4, 128.5 (d, $^2J_{\text{C-F}}=32.5$ Hz), 128.5, 127.4, 125.8 (d, $^3J_{\text{C-F}}=3.8$ Hz), 123.2~123.7 (m), 118.6, 112.3, 110.3, 85.9, 55.0, 51.2, 45.6; IR (KBr) ν : 1657, 1616, 1557, 1460, 1326, 1295, 1114, 618 cm^{-1} ; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₂H₁₇F₃N₃O₄ [M+H]⁺ 444.1166, found 444.1167.

4-((4-硝基-6-氧代-1,2-二氢-6*H*-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-3(11*aH*)-基)甲基)苯甲腈(3ac): 黄色固体, m.p. 243~244 °C; ^1H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.91 (s, 1H, CH), 7.83~7.87 (m, 3H, ArH), 7.59~7.64 (m, 3H, ArH), 7.19 (d, $J=7.5$ Hz, 1H, ArH), 7.11 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, ArH), 6.46 (s, 1H, CH), 4.96 (d, $J=16.5$ Hz,

1H, CH₂), 4.79 (d, $J=17.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.18~4.19 (m, 1H, CH₂), 3.91~3.95 (m, 2H, CH₂), 3.85 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.3, 156.6, 155.5, 142.5, 136.6, 132.8, 130.4, 128.6, 127.4, 123.5, 123.2, 119.2, 118.6, 112.3, 110.6, 110.3, 85.9, 55.2, 51.3, 45.6; IR (KBr) ν : 2222, 1661, 1615, 1553, 1460, 1307, 1293, 1220, 694 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₂H₁₇N₄O₄ [M+H]⁺ 401.1244, found 401.1243.

3-(4-氟苄基)-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-苯并吡喃并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3ad**): 黄色固体, m.p. 234~235 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.92 (s, 1H, CH), 7.82~7.84 (m, 1H, ArH), 7.60~7.64 (m, 1H, ArH), 7.43~7.46 (m, 2H, ArH), 7.16~7.24 (m, 3H, ArH), 7.10 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, ArH), 6.43 (s, 1H, CH), 4.86 (d, $J=15.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.72 (d, $J=15.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.14~4.16 (m, 1H, CH₂), 3.87~3.91 (m, 2H, CH₂), 3.81~3.83 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.3, 162.1 (d, ¹ $J_{C-F}=241.2$ Hz), 156.6, 155.1, 136.5, 132.2, 130.2 (d, ³ $J_{C-F}=8.8$ Hz), 127.4, 123.5, 123.2, 118.6, 115.8 (d, ² $J_{C-F}=21.3$ Hz), 112.2, 110.4, 85.9, 54.3, 50.8, 45.5; IR (KBr) ν : 3902, 1662, 1609, 1578, 1513, 1290, 1260, 1211, 1188, 624 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₁H₁₇FN₃O₄ [M+H]⁺ 394.1198, found 394.1201.

3-(4-氯苄基)-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3ae**): 黄色固体, m.p. 249~250 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.91 (s, 1H, CH), 7.82~7.84 (m, 1H, ArH), 7.61~7.64 (m, 1H, ArH), 7.41~7.46 (m, 4H, ArH), 7.17~7.20 (m, 1H, ArH), 7.10 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, ArH), 6.44 (s, 1H, CH), 4.86 (d, $J=16.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.71 (d, $J=16.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.15~4.17 (m, 1H, CH₂), 3.88~3.92 (m, 2H, CH₂), 3.80~3.84 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.3, 156.6, 155.2, 136.6, 135.3, 132.6, 130.4, 129.9, 128.9, 127.4, 123.5, 123.2, 118.6, 112.3, 110.3, 85.9, 54.4, 51.0, 45.5; IR (KBr) ν : 2975, 1663, 1612, 1462, 1289, 1211, 1187, 622 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₁H₁₇ClN₃O₄ [M+H]⁺ 410.0902, found 410.0900.

3-苄基-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-苯并吡喃并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3af**): 黄色固体, m.p. 242~243 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.91 (s, 1H, CH), 7.82~7.84 (m, 1H, ArH), 7.60~7.64 (m, 1H, ArH), 7.31~7.41 (m, 4H, ArH), 7.16~7.19 (m, 1H, ArH), 7.10 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, ArH), 6.44 (s, 1H, CH), 4.88 (d, $J=15.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.75 (d, $J=16.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.15~4.16 (m, 1H, CH₂), 3.88~3.92 (m, 2H, CH₂),

3.79~3.83 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.3, 156.6, 155.1, 136.5, 136.1, 130.5, 129.0, 128.1, 127.4, 123.6, 123.2, 118.6, 112.2, 110.4, 85.9, 54.9, 51.0, 45.5; IR (KBr) ν : 3077, 1662, 1612, 1462, 1287, 1211, 1189, 1146, 1035, 625 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₁H₁₈N₃O₄ [M+H]⁺ 376.1292, found 376.1291.

3-(4-甲基苄基)-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-苯并吡喃并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3ag**): 黄色固体, m.p. 219.5~220 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.91 (s, 1H, CH), 7.82~7.84 (m, 1H, ArH), 7.60~7.63 (m, 1H, ArH), 7.26 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, ArH), 7.16~7.20 (m, 3H, ArH), 7.09 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, ArH), 6.42 (s, 1H, CH), 4.82 (d, $J=15.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.71 (d, $J=15.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.13~4.14 (m, 1H, CH₂), 3.86~3.90 (m, 2H, CH₂), 3.79 (m, 1H, CH₂), 2.30 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.3, 156.6, 154.9, 136.4, 136.5, 132.9, 130.6, 129.6, 128.2, 127.3, 123.6, 123.2, 118.6, 112.1, 110.5, 85.9, 54.5, 50.8, 45.4, 21.2; IR (KBr) ν : 3075, 1662, 1611, 1557, 1462, 1288, 1211, 11190, 1145, 624 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₂H₂₀N₃O₄ [M+H]⁺ 390.1448, found 390.1448.

3-(4-甲氧基苄基)-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-苯并吡喃并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3ah**): 黄色固体, m.p. 229~230 °C; ¹H NMR (600 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.91 (s, 1H, CH), 7.82~7.83 (m, 1H, ArH), 7.60~7.63 (m, 1H, ArH), 7.31 (d, $J=8.3$ Hz, 2H, ArH), 7.16~7.19 (m, 1H, ArH), 7.08~7.10 (m, 1H, ArH), 6.95 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, ArH), 6.42 (s, 1H, CH), 4.79 (d, $J=15.2$ Hz, 1H, CH₂), 4.69 (d, $J=15.2$ Hz, 1H, CH₂), 4.11~4.15 (m, 1H, CH₂), 3.85~3.89 (m, 2H, CH₂), 3.78~3.79 (m, 1H, CH₂), 3.75 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (150 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.3, 159.4, 156.6, 154.8, 136.5, 130.6, 129.7, 127.7, 127.3, 123.5, 123.2, 118.6, 114.5, 112.2, 110.5, 85.9, 55.6, 54.1, 50.6, 45.4; IR (KBr) ν : 3075, 2833, 1660, 1611, 1580, 1515, 1305, 1259, 1210, 1188, 623 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₂H₂₀N₃O₅ [M+H]⁺ 406.1397, found 406.1398.

3-(3-氟苄基)-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-苯并吡喃并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3ai**): 黄色固体, m.p. 218~219 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.92 (s, 1H, CH), 7.83~7.85 (m, 1H, ArH), 7.61~7.64 (m, 1H, ArH), 7.42~7.46 (m, 1H, ArH), 7.27 (d, $J=10.0$ Hz, 1H, ArH), 7.14~7.23 (m, 2H, ArH), 7.11 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, ArH), 6.44 (s, 1H, CH), 4.90 (d, $J=16.0$ Hz, 1H, CH₂),

4.72 (d, $J=16.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.15~4.18 (m, 1H, CH₂), 3.90~3.94 (m, 2H, CH₂), 3.81~3.85 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.3, 162.8 (d, $^1J_{\text{C-F}}=241.3$ Hz), 156.6, 155.3, 139.2 (d, $^3J_{\text{C-F}}=6.3$ Hz), 136.5, 130.9 (d, $^3J_{\text{C-F}}=8.8$ Hz), 130.5, 127.4, 123.9, 123.5, 123.2, 118.6, 114.9, 114.8 (d, $^2J_{\text{C-F}}=21.3$ Hz), 112.3, 110.4, 85.9, 54.7, 51.1, 45.5; IR (KBr) ν : 3071, 1608, 1578, 1513, 1289, 1259, 1210, 1186, 1145, 623 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₁H₁₇FN₃O₄ [M+H]⁺ 394.1198, found 394.1201.

3-(3,5-二氟苄基)-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-苯并吡喃并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3aj**): 黄色固体, m.p. 243.5~244 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.92 (s, 1H, CH), 7.83~7.85 (m, 1H, ArH), 7.61~7.63 (m, 1H, ArH), 7.16~7.20 (m, 3H, ArH), 7.11 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, ArH), 6.45 (s, 1H, CH), 4.89 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.68 (d, $J=17.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.17~4.19 (m, 1H, CH₂), 3.91~3.95 (m, 2H, CH₂), 3.84 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.3, 162.9 (dd, $^1J_{\text{C-F}}=246.3$ Hz, $^3J_{\text{C-F}}=13.8$ Hz), 156.6, 155.5, 141.4, 136.6, 130.4, 127.4, 123.6, 123.2, 118.6, 112.4, 111.0 (d, $^2J_{\text{C-F}}=25.0$ Hz), 110.3, 103.3 (t, $^2J_{\text{C-F}}=26.3$ Hz), 85.9, 54.8, 51.2, 45.6; IR (KBr) ν : 3076, 1665, 1619, 1551, 1452, 1272, 1222, 616 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₁H₁₆F₂N₃O₄ [M+H]⁺ 412.1103, found 412.1103.

3-((6-氯吡啶-3-基)甲基)-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-苯并吡喃并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3ak**): 黄色固体, m.p. 230~231 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 8.46 (d, $J=2.0$ Hz, 1H, CH), 7.90~7.92 (m, 2H, ArH), 7.83~7.84 (m, 1H, ArH), 7.61~7.64 (m, 1H, ArH), 7.55 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, ArH), 7.17~7.20 (m, 1H, ArH), 7.10 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, ArH), 6.44 (s, 1H, CH), 4.90 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.72 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.15~4.20 (m, 1H, CH₂), 3.92~3.96 (m, 2H, CH₂), 3.79~3.85 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.3, 156.6, 155.5, 149.9, 149.5, 139.5, 136.5, 131.8, 130.3, 127.4, 124.5, 123.5, 123.2, 118.6, 112.4, 110.3, 85.9, 52.6, 51.1, 45.6; IR (KBr) ν : 1659, 1614, 1549, 1460, 1328, 1293, 1278, 1219, 622 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₀H₁₆ClN₄O₄ [M+H]⁺ 411.0855, found 411.0854.

3-((2-氯噻唑-5-基)甲基)-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-苯并吡喃并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3al**): 黄色固体, m.p. 258~259 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.92 (s, 1H, CH), 7.82~7.84 (m, 1H, ArH), 7.78 (s, 1H, ArH), 7.61~7.64 (m, 1H, ArH), 7.17~7.20 (s, 1H, ArH),

7.10 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, ArH), 6.43 (s, 1H, CH), 4.99 (d, $J=16.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.83 (d, $J=16.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.15~4.16 (m, 1H, CH₂), 3.88~3.96 (m, 2H, CH₂), 3.77~3.79 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.3, 156.5, 154.8, 152.3, 142.2, 136.7, 135.7, 130.0, 127.4, 123.4, 123.3, 118.6, 112.9, 110.3, 85.7, 50.4, 48.6, 45.4; IR (KBr) ν : 1613, 1563, 1294, 1267, 1215, 1052, 619 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₁₈H₁₄ClN₄O₄S [M+H]⁺ 417.0419, found 417.0417.

8-氟-4-硝基-3-(4-(三氟甲基)苄基)-1,2,3,11a-四氢-6H-苯并吡喃并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3bb**): 黄色固体, m.p. 233~234 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.95 (s, 1H, CH), 7.56 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, ArH), 7.63 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, ArH), 7.49~7.53 (m, 2H, ArH), 7.16~7.18 (m, 1H, ArH), 6.45 (s, 1H, CH), 4.97 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.81 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.15~4.20 (m, 1H, CH₂), 3.92~3.95 (m, 2H, CH₂), 3.81~3.87 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 178.5, 157.8 (d, $^1J_{\text{C-F}}=238.8$ Hz), 155.4, 152.8, 141.3, 131.1, 128.5 (d, $^2J_{\text{C-F}}=31.3$ Hz), 128.5, 125.7 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 124.4 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 123.6, 123.7 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.8$ Hz), 120.8 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 112.3 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.8$ Hz), 111.5, 110.5, 86.0, 55.0, 51.2, 45.6; IR (KBr) ν : 2891, 1656, 1601, 1555, 1479, 1324, 1275, 1258, 1126, 1065, 631 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₂H₁₆F₄N₃O₄ [M+H]⁺ 462.1071, found 462.1069.

4-((8-氟-4-硝基-6-氧代-1,2-二氢-6H-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-3(11aH)-基)甲基)苯甲腈(**3bc**): 黄色固体, m.p. 258~259 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.93 (s, 1H, CH), 7.87 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, ArH), 7.60 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, ArH), 7.49~7.53 (m, 2H, ArH), 7.16~7.19 (m, 1H, ArH), 6.45 (s, 1H, CH), 4.96 (d, $J=17.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.79 (d, $J=17.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.15~4.20 (m, 1H, CH₂), 3.91~3.95 (m, 2H, CH₂), 3.83~3.87 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 178.5, 157.8 (d, $^1J_{\text{C-F}}=238.8$ Hz), 155.5, 152.8, 142.4, 132.7, 131.0, 128.6, 124.4 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 123.7 (d, $^2J_{\text{C-F}}=25.0$ Hz), 120.8 (d, $^3J_{\text{C-F}}=8.8$ Hz), 119.3, 112.3 (d, $^2J_{\text{C-F}}=22.5$ Hz), 111.5, 110.6, 110.5, 86.0, 55.2, 51.3, 45.7; IR (KBr) ν : 2225, 1656, 1603, 1554, 1479, 1317, 1280, 1258, 1218, 621 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₂H₁₆FN₄O₄ [M+H]⁺ 419.1150, found 419.1151.

8-氟-3-(4-氟苄基)-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3bd**): 黄色固体, m.p. 204~205 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.94 (s,

1H, CH), 7.43~7.52 (m, 4H, ArH), 7.20~7.24 (m, 2H, ArH), 7.14~7.17 (m, 1H, ArH), 6.42 (s, 1H, CH), 4.85 (d, $J=15.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.72 (d, $J=16.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.12~4.16 (m, 1H, CH₂), 3.87~3.91 (m, 2H, CH₂), 3.76~3.82 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 178.5, 162.1 (d, $^1J_{\text{C-F}}=242.5$ Hz), 157.8 (d, $^1J_{\text{C-F}}=238.8$ Hz), 155.0, 152.8, 132.2 (d, $^4J_{\text{C-F}}=2.5$ Hz), 131.2, 130.2 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 124.4 (d, $^3J_{\text{C-F}}=6.3$ Hz), 123.7 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.8$ Hz), 120.8 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 115.8 (d, $^2J_{\text{C-F}}=21.3$ Hz), 112.3 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.8$ Hz), 111.4, 110.6, 86.1, 54.3, 50.9, 45.5; IR (KBr) ν : 3075, 1667, 1618, 1575, 1476, 1306, 1260, 1187, 952, 618 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₁H₁₆F₂N₃O₄ [M+H]⁺ 412.1103, found 412.1102.

3-(4-氯苄基)-8-氟-4-硝基-1,2,3,11*a*-四氢-6*H*-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3be**): 黄色固体, m.p. 236~237 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.93 (s, 1H, CH), 7.48~7.53 (m, 2H, ArH), 7.41~7.46 (m, 4H, ArH), 7.15~7.17 (m, 1H, ArH), 6.42 (s, 1H, CH), 4.86 (d, $J=16.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.71 (d, $J=16.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.12~4.16 (m, 1H, CH₂), 3.88~3.92 (m, 2H, CH₂), 3.79~3.83 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 178.5, 157.8 (d, $^1J_{\text{C-F}}=240.0$ Hz), 155.1, 152.8, 135.2, 132.7, 131.1, 129.9, 128.9, 124.4 (d, $^3J_{\text{C-F}}=6.3$ Hz), 123.7 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.8$ Hz), 120.8 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 112.3 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.8$ Hz), 111.4, 110.6, 86.0, 54.4, 51.0, 45.6; IR (KBr) ν : 3081, 1655, 1603, 1557, 1479, 1280, 1260, 1216, 619 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₁H₁₆ClFN₃O₄ [M+H]⁺ 428.0808, found 428.0809.

3-苄基-8-氟-4-硝基-1,2,3,11*a*-四氢-6*H*-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3bf**): 黄色固体, m.p. 231~232 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.94 (s, 1H, CH), 7.48~7.52 (m, 2H, ArH), 7.37~7.40 (m, 3H, ArH), 7.33~7.34 (m, 1H, ArH), 7.14~7.17 (m, 1H, ArH), 6.42 (s, 1H, CH), 4.88 (d, $J=16.0$ Hz, 1H, CH₂), 4.75 (d, $J=15.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.13~4.15 (m, 1H, CH₂), 3.89~3.92 (m, 2H, CH₂), 3.79~3.83 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 178.5, 157.8 (d, $^1J_{\text{C-F}}=238.8$ Hz), 155.0, 152.8, 136.0, 131.2, 129.0, 128.1 (d, $^3J_{\text{C-F}}=8.8$ Hz), 124.4 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 123.7 (d, $^2J_{\text{C-F}}=25.0$ Hz), 120.8 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 112.3 (d, $^2J_{\text{C-F}}=22.5$ Hz), 111.3, 110.7, 86.1, 54.9, 51.0, 45.5; IR (KBr) ν : 3068, 1665, 1609, 1548, 1481, 1287, 1254, 1200, 1024, 620 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₁H₁₇FN₃O₄ [M+H]⁺ 394.1198, found 394.1199.

8-氟-3-(4-甲基苄基)-4-硝基-1,2,3,11*a*-四氢-6*H*-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3bg**): 黄色固体, m.p. 212~213 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.93 (s, 1H, CH), 7.48~7.52 (m, 2H, ArH), 7.26 (d, $J=7.5$ Hz, 2H, ArH), 7.20 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, ArH), 7.14~7.17 (m, 1H, ArH), 6.41 (s, 1H, CH), 4.82 (d, $J=15.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.71 (d, $J=15.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.12~4.14 (m, 1H, CH₂), 3.87~3.91 (m, 2H, CH₂), 3.77~3.79 (m, 1H, CH₂), 2.31 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 178.5, 157.8 (d, $^1J_{\text{C-F}}=238.8$ Hz), 154.8, 152.8, 137.4, 132.9, 131.2, 129.6, 128.2, 124.4 (d, $^3J_{\text{C-F}}=6.3$ Hz), 123.7 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.8$ Hz), 120.8 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 112.3 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.8$ Hz), 111.3, 110.7, 86.1, 54.5, 50.8, 45.5, 21.2; IR (KBr) ν : 2924, 1666, 1609, 1575, 1311, 1259, 1187, 619 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₂H₁₉FN₃O₄ [M+H]⁺ 408.1354, found 408.1354.

8-氟-3-(4-甲氧基苄基)-4-硝基-1,2,3,11*a*-四氢-6*H*-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3bh**): 黄色固体, m.p. 219~220 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.93 (s, 1H, CH), 7.47~7.52 (m, 2H, ArH), 7.30 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, ArH), 7.14~7.17 (m, 1H, ArH), 6.95 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, ArH), 6.41 (s, 1H, CH), 4.79 (d, $J=15.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.69 (d, $J=15.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.09~4.14 (m, 1H, CH₂), 3.85~3.89 (m, 2H, CH₂), 3.73~3.79 (m, 1H, CH₂), 3.76 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 178.5, 159.4, 157.8 (d, $^1J_{\text{C-F}}=238.8$ Hz), 154.7, 152.8, 131.2, 129.7, 127.6, 124.4 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 123.7 (d, $^2J_{\text{C-F}}=25.0$ Hz), 120.8 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 114.5, 112.3 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.8$ Hz), 111.3, 110.7, 86.1, 55.6, 54.1, 50.7, 45.4; IR (KBr) ν : 3073, 1662, 1568, 1510, 1443, 1267, 1212, 617 cm⁻¹; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₂H₁₉FN₃O₅ [M+H]⁺ 424.1303, found 424.1305.

8-氟-3-(3-氟苄基)-4-硝基-1,2,3,11*a*-四氢-6*H*-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3bi**): 黄色固体, m.p. 237~238 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.94 (s, 1H, CH), 7.48~7.52 (m, 2H, ArH), 7.41~7.46 (m, 1H, ArH), 7.26~7.29 (m, 1H, ArH), 7.22 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, ArH), 7.14~7.18 (m, 2H, ArH), 6.43 (s, 1H, CH), 4.89 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.72 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH₂), 4.13~4.17 (m, 1H, CH₂), 3.90~3.94 (m, 2H, CH₂), 3.81~3.85 (m, 1H, CH₂); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 178.5, 162.8 (d, $^1J_{\text{C-F}}=241.3$ Hz), 157.8 (d, $^1J_{\text{C-F}}=238.8$ Hz), 155.2, 152.9, 139.2 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 131.1, 130.9 (d, $^3J_{\text{C-F}}=8.8$ Hz), 124.4 (d, $^3J_{\text{C-F}}=6.3$ Hz), 123.9, 123.7 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.8$ Hz), 120.8 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 114.9,

114.7, 112.3 (d, $^2J_{\text{C-F}}=22.5$ Hz), 111.4, 110.6, 86.1, 54.7, 51.1, 45.6; IR (KBr) ν : 3076, 1655, 1608, 1553, 1484, 1284, 1251, 1215, 949, 620 cm^{-1} ; HRMS (TOF ES $^+$) calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{16}\text{F}_2\text{N}_3\text{O}_4$ [M+H] $^+$ 412.1103, found 412.1101.

3-(3,5-二氟苄基)-8-氟-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3bj**): 黄色固体, m.p. 256~257 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 7.94 (s, 1H, CH), 7.49~7.53 (m, 2H, ArH), 7.16~7.17 (m, 4H, ArH), 6.44 (s, 1H, CH), 4.88 (d, $J=17.0$ Hz, 1H, CH $_2$), 4.68 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH $_2$), 4.16~4.18 (m, 1H, CH $_2$), 3.91~3.95 (m, 2H, CH $_2$), 3.82~3.86 (m, 1H, CH $_2$); ^{13}C NMR (125 MHz, DMSO- d_6) δ : 178.5, 162.9 (dd, $^1J_{\text{C-F}}=244.4$ Hz, $^3J_{\text{C-F}}=13.1$ Hz), 162.9 (d, $^1J_{\text{C-F}}=245.0$ Hz), 157.8 (d, $^1J_{\text{C-F}}=238.8$ Hz), 155.5, 152.9, 141.3, 131.1, 124.4, 123.7 (d, $^2J_{\text{C-F}}=25.0$ Hz), 120.8 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 112.3 (d, $^2J_{\text{C-F}}=22.5$ Hz), 111.5, 111.0 (d, $^2J_{\text{C-F}}=25.0$ Hz), 110.5, 103.3 (m), 86.1, 54.7, 51.2, 45.7; ^{19}F NMR (470 MHz, DMSO- d_6) δ : -109.9, -119.8; IR (KBr) ν : 3080, 1657, 1598, 1554, 1482, 1299, 1252, 1217, 1119, 612 cm^{-1} ; HRMS (TOF ES $^+$) calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{15}\text{F}_3\text{N}_3\text{O}_4$ [M+H] $^+$ 430.1009, found 430.1008.

3-((6-氯吡啶-3-基)甲基)-8-氟-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3bk**): 黄色固体, m.p. 218~219 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 8.46 (s, 1H, CH), 7.90~7.93 (m, 2H, ArH), 7.49~7.56 (m, 3H, ArH), 7.15~7.18 (m, 1H, ArH), 6.43 (s, 1H, CH), 4.90 (d, $J=16.0$ Hz, 1H, CH $_2$), 4.73 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH $_2$), 4.14~4.17 (m, 1H, CH $_2$), 3.92~3.96 (m, 2H, CH $_2$), 3.81~3.85 (m, 1H, CH $_2$); ^{13}C NMR (125 MHz, DMSO- d_6) δ : 178.5, 157.8 (d, $^1J_{\text{C-F}}=240.0$ Hz), 155.4, 152.9, 149.9, 149.4, 139.4, 131.7, 131.0, 124.5, 124.4 (d, $^3J_{\text{C-F}}=6.3$ Hz), 123.7 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.8$ Hz), 120.8 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 112.3 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.8$ Hz), 111.6, 110.5, 86.0, 52.6, 51.1, 45.7; IR (KBr) ν : 3074, 1661, 1575, 1560, 1481, 1315, 1257, 1211, 616 cm^{-1} ; HRMS (TOF ES $^+$) calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{15}\text{ClF}_2\text{N}_4\text{O}_4$ [M+H] $^+$ 429.0760, found 429.0762.

3-((2-氯噻唑-5-基)甲基)-8-氟-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3bl**): 黄色固体, m.p. 230~231 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 7.94 (s, 1H, CH), 7.79 (s, 1H, ArH), 7.49~7.52 (m, 2H, ArH), 7.15~7.17 (m, 1H, ArH), 6.42 (s, 1H, CH), 4.99 (d, $J=15.5$ Hz, 1H, CH $_2$), 4.84 (d, $J=16.0$ Hz, 1H, CH $_2$), 4.14~4.15 (m, 1H, CH $_2$), 3.89~3.96 (m, 2H, CH $_2$), 3.78~3.80 (m, 1H, CH $_2$); ^{13}C NMR (125 MHz, DMSO- d_6) δ : 178.5, 157.8 (d, $^1J_{\text{C-F}}=238.8$ Hz), 154.7, 152.8, 152.3,

142.3, 135.6, 130.7, 124.3 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 123.8 (d, $^2J_{\text{C-F}}=25.0$ Hz), 120.8 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 112.3 (d, $^2J_{\text{C-F}}=23.8$ Hz), 112.1, 110.5, 85.8, 50.4, 48.6, 45.5; IR (KBr) ν : 3067, 1663, 1568, 1482, 1258, 1213, 1049, 615 cm^{-1} ; HRMS (TOF ES $^+$) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{13}\text{ClF}_2\text{N}_4\text{O}_4\text{S}$ [M+H] $^+$ 435.0325, found 435.0327.

8-氯-4-硝基-3-(4-(三氟甲基)苄基)-1,2,3,11a-四氢-6H-苯并吡喃并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3cb**): 黄色固体, m.p. 243~244 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 7.94 (s, 1H, CH), 7.75~7.77 (m, 3H, ArH), 7.62~7.65 (m, 3H, ArH), 7.16 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, ArH), 6.48 (s, 1H, CH), 4.97 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH $_2$), 4.81 (d, $J=16.5$ Hz, 1H, CH $_2$), 4.17~4.18 (m, 1H, CH $_2$), 3.92~3.95 (m, 2H, CH $_2$), 3.83~3.87 (m, 1H, CH $_2$); ^{13}C NMR (125 MHz, DMSO- d_6) δ : 178.5, 155.3, 155.2, 141.3, 136.0, 131.3, 128.5 (d, $^3J_{\text{C-F}}=31.3$ Hz), 128.5, 127.3, 125.8 (m), 123.7~125.8 (m), 124.7, 121.0, 111.2, 110.6, 86.2, 55.0, 51.2, 45.7; IR (KBr) ν : 1655, 1614, 1557, 1478, 1327, 1264, 1121, 1066, 615 cm^{-1} ; HRMS (TOF ES $^+$) calcd for $\text{C}_{22}\text{H}_{16}\text{ClF}_3\text{N}_3\text{O}_4$ [M+H] $^+$ 478.0776, found 478.0776.

8-氯-3-(4-氟苄基)-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3cd**): 黄色固体, m.p. 242~243 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 7.93 (s, 1H, CH), 7.75 (d, $J=2.5$ Hz, 1H, ArH), 7.64~7.67 (m, 1H, ArH), 7.43~7.46 (m, 2H, ArH), 7.20~7.24 (m, 2H, ArH), 7.14 (d, $J=9.0$ Hz, 1H, ArH), 6.45 (s, 1H, CH), 4.85 (d, $J=15.0$ Hz, 1H, CH $_2$), 4.72 (d, $J=15.0$ Hz, 1H, CH $_2$), 4.13~4.15 (m, 1H, CH $_2$), 3.87~3.91 (m, 2H, CH $_2$), 3.81 (m, 1H, CH $_2$); ^{13}C NMR (125 MHz, DMSO- d_6) δ : 178.2, 162.1 (d, $^1J_{\text{C-F}}=242.5$ Hz), 155.2, 154.9, 135.7, 132.1 (d, $^4J_{\text{C-F}}=2.5$ Hz), 131.3, 130.2 (d, $^3J_{\text{C-F}}=7.5$ Hz), 127.2, 126.3, 124.7, 121.0, 115.8 (d, $^2J_{\text{C-F}}=21.3$ Hz), 111.1, 110.7, 86.2, 54.3, 50.9, 45.6; IR (KBr) ν : 3072, 1655, 1615, 1562, 1479, 1362, 1270, 1213, 619 cm^{-1} ; HRMS (TOF ES $^+$) calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{16}\text{ClF}_2\text{N}_3\text{O}_4$ [M+H] $^+$ 428.0808, found 428.0810.

8-氯-3-(4-甲基苄基)-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-色烯并[3,2-*e*]咪唑并[1,2-*a*]吡啶-6-酮(**3cg**): 黄色固体, m.p. 233~234 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 7.93 (s, 1H, CH), 7.75 (d, $J=2.5$ Hz, 1H, ArH), 7.64~7.67 (m, 1H, ArH), 7.14~7.27 (m, 5H, ArH), 6.45 (s, 1H, CH), 4.73~4.80 (m, 2H, CH $_2$), 4.10~4.14 (m, 1H, CH $_2$), 3.88~3.91 (m, 2H, CH $_2$), 3.78~3.82 (m, 1H, CH $_2$), 2.31 (s, 3H, CH $_3$); ^{13}C NMR (125 MHz, DMSO- d_6) δ : 178.1, 155.2, 154.8, 137.4, 136.0, 132.9, 129.6, 128.2, 127.2,

126.3, 124.7, 121.0, 111.1, 86.3, 54.5, 50.9, 45.5, 21.2; IR (KBr) ν : 3071, 1654, 1614, 1562, 1480, 1376, 1270, 1215, 619 cm^{-1} ; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₂H₁₉ClN₃O₄ [M+H]⁺ 424.1059, found 424.1057.

8-氯-3-(4-甲氧基苄基)-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-色烯并[3,2-e]咪唑并[1,2-a]吡啶-6-酮(**3ch**): 黄色固体, m.p. 218~219 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.93 (s, 1H, CH), 7.74 (d, *J*=3.0 Hz, 1H, ArH), 7.63~7.66 (m, 1H, ArH), 7.31 (d, *J*=8.5 Hz, 2H, ArH), 7.14 (d, *J*=8.5 Hz, 1H, ArH), 6.95 (d, *J*=8.5 Hz, 2H, ArH), 6.44 (s, 1H, CH), 4.78 (d, *J*=14.0 Hz, 1H, CH₂), 4.69 (d, *J*=14.5 Hz, 1H, CH₂), 4.11~4.12 (m, 1H, CH₂), 3.86~3.89 (m, 2H, CH₂), 3.74~3.78 (m, 1H, CH₂), 3.76 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 178.2, 159.4, 155.2, 154.6, 135.9, 131.4, 129.7, 127.6, 127.2, 126.3, 124.7, 121.0, 114.5, 111.0, 110.7, 86.2, 55.6, 54.1, 50.7, 45.5; IR (KBr) ν : 2932, 1651, 1610, 1557, 1509, 1279, 1245, 1221, 1119, 620 cm^{-1} ; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₂H₁₉ClN₃O₅ [M+H]⁺ 440.1008, found 440.1008.

4-((8-甲基-4-硝基-6-氧代-1,2-二氢-6H-色烯并[3,2-e]咪唑并[1,2-a]吡啶-3(11aH)-基)甲基)苄腈(**3dc**): 黄色固体, m.p. 290~291 °C; ¹H NMR (600 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.90(s, 1H, CH), 7.87 (d, *J*=7.9 Hz, 1H, ArH), 7.59~7.63 (m, 3H, ArH), 7.45 (d, *J*=8.2 Hz, 1H, ArH), 7.02 (d, *J*=8.4 Hz, 1H, ArH), 6.40 (s, 1H, CH), 4.96 (d, *J*=17.0 Hz, 1H, CH₂), 4.78 (d, *J*=16.9 Hz, 1H, CH₂), 4.16~4.20 (m, 1H, CH₂), 3.91~3.94 (m, 2H, CH₂), 3.81~3.86 (m, 1H, CH₂), 2.32 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (150 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.4, 155.5, 154.6, 142.5, 137.3, 132.8, 132.4, 130.2, 128.6, 127.0, 123.2, 119.2, 118.5, 112.6, 110.6, 110.3, 85.7, 55.2, 51.3, 45.6, 20.6; IR (KBr) ν : 2223, 1658, 1622, 1554, 1507, 1485, 1307, 1288, 1218, 623 cm^{-1} ; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₃H₁₉N₄O₄ [M+H]⁺ 415.1401, found 415.1398.

(4-甲氧基苄基)-8-甲基-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-色烯并[3,2-e]咪唑并[1,2-a]吡啶-6-酮(**3dh**): 黄色固体, m.p. 207~208 °C; ¹H NMR (600 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 7.91 (s, 1H, CH), 7.62 (s, 1H, CH), 7.43 (d, *J*=8.3 Hz, 1H, ArH), 7.31 (d, *J*=7.9 Hz, 2H, ArH), 6.99 (d, *J*=8.3 Hz, 1H, ArH), 6.95 (d, *J*=8.22 Hz, 2H, ArH), 6.36 (s, 1H, CH), 4.80 (d, *J*=15.2 Hz, 1H, CH₂), 4.69 (d, *J*=15.2 Hz, 1H, CH₂), 4.09~4.13 (m, 1H, CH₂), 3.85~3.88 (m, 2H, CH₂), 3.74~3.78 (m, 1H, CH₂), 3.76 (s, 3H, CH₃), 2.31 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (150 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.3, 159.3, 154.8, 154.6, 137.3, 132.3, 130.4, 129.7, 127.0,

123.2, 118.4, 114.5, 112.4, 110.4, 85.8, 55.6, 54.1, 50.6, 45.4, 20.6; IR (KBr) ν : 1655, 1617, 1554, 1504, 1311, 1275, 1212, 1195, 623 cm^{-1} ; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₃H₂₂N₃O₅ [M+H]⁺ 420.1554, found 420.1557.

3-((6-氯吡啶-3-基)甲基)-8-甲基-4-硝基-1,2,3,11a-四氢-6H-色烯并[3,2-e]咪唑并[1,2-a]吡啶-6-酮(**3dk**): 黄色固体, m.p. 248~249 °C; ¹H NMR (600 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 8.46 (s, 1H, CH), 7.91 (s, 2H, ArH), 7.63 (s, 1H, ArH), 7.57 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, ArH), 7.45 (d, *J*=7.0 Hz, 1H, ArH), 7.01 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, ArH), 6.39 (s, 1H, CH), 4.90 (d, *J*=16.3 Hz, 1H, CH₂), 4.72 (d, *J*=16.2 Hz, 1H, CH₂), 4.16~4.17 (m, 1H, CH₂), 3.93 (s, 2H, CH₂), 3.81~4.83 (m, 1H, CH₂), 2.32 (s, 3H, CH₃); ¹³C NMR (150 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 179.4, 155.5, 154.6, 149.8, 149.5, 139.5, 137.3, 132.4, 131.8, 130.2, 127.0, 124.5, 123.2, 118.5, 112.7, 110.3, 85.8, 52.6, 51.1, 45.6, 20.5; IR (KBr) ν : 1661, 1624, 1555, 1506, 1452, 1290, 1216, 623 cm^{-1} ; HRMS (TOF ES⁺) calcd for C₂₁H₁₈ClN₄O₄ [M+H]⁺ 425.1008, found 425.1008.

辅助材料(Supporting Information) 化合物的 ¹H NMR 和 ¹³C NMR 谱图. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] Hunt, A. J.; Sin, E. H. K.; Marriott, R.; Clark, J. H. *ChemSusChem* **2010**, *3*, 306.
- [2] Agana, B. A.; Reeve, D.; Orbell, J. D. *J. Environ. Manage.* **2013**, *114*, 445.
- [3] Marr, P. C.; Marr, A. C. *Green Chem.* **2016**, *18*, 105.
- [4] Marteel-Parrish, A. E. *J. Chem. Educ.* **2014**, *91*, 1084.
- [5] Trost, B. M. *Science* **1991**, *254*, 1471.
- [6] Misono, M. *Yuki Gosei Kagaku Kyokaiishi* **2003**, *61*, 406.
- [7] Hartman, G. J.; Jin, Q. Z.; Collins, G. J.; Lee, K. N.; Ho, C. T.; Chang, S. S. *J. Agric. Food Chem.* **1983**, *31*, 1030.
- [8] Ren, T.; Liu, W.; Xue, Q.; Wang, H. *Lubr. Sci.* **1993**, *5*, 205.
- [9] Ueda, Y.; Connolly, T. P.; Kadow, J. F.; Meanwell, N. A.; Wang, T.; Chen, C.-P. H.; Yeung, K.-S.; Zhang, Z.; Leahy, D. K.; Pack, S. K.; Soundararajan, N.; Sirard, P.; Levesque, K.; Thoraval, D. *US 20050209246*, **2005** [*Chem. Abstr.* **2005**, *143*, 306343].
- [10] Garuti, L.; Roberti, M.; Pizzirani, D. *Mini-Rev. Med. Chem.* **2007**, *7*, 481.
- [11] Schultz, C.; Link, A.; Leost, M.; Zaharevitz, D. W.; Gussio, R.; Sausville, E. A.; Meijer, L.; Kunick, C. *J. Med. Chem.* **1999**, *42*, 2909.
- [12] Pluta, K.; Morak-Mlodawska, B.; Jelen, M. *Eur. J. Med. Chem.* **2011**, *46*, 3179.
- [13] Sujatha, K.; Shanmugam, P.; Perumal, P. T.; Muralidharan, D.; Rajendran, M. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2006**, *16*, 4893.
- [14] Helal, C. J.; Kang, Z.; Hou, X.; Pandit, J.; Chappie, T. A.; Humphrey, J. M.; Marr, E. S.; Fennell, K. F.; Chenard, L. K.; Fox, C.; Schmidt, C. J.; Williams, R. D.; Chapin, D. S.; Siuciak, J.; Lebel, L.; Menniti, F.; Cianfrogna, J.; Fonseca, K. R.; Nelson, F. R.; O'Connor, R.; MacDougall, M.; McDowell, L.; Liras, S. *J. Med. Chem.* **2011**, *54*, 4536.
- [15] Kim, I. Y.; Kim, S. H. *KR 2016006050*, **2016** [*Chem. Abstr.* **2016**,

- 164, 225869].
- [16] Lhassani, M.; Chavignon, O.; Chezal, J.-M.; Teulade, J.-C.; Chapat, J.-P.; Snoeck, R.; Andrei, G.; Balzarini, J.; De Clercq, E.; Gueiffier, A. *Eur. J. Med. Chem.* **1999**, *34*, 271.
- [17] Alcarazo, M.; Roseblade, S. J.; Cowley, A. R.; Fernandez, R.; Brown, J. M.; Lassaletta, J. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 3290.
- [18] Mizushige, K.; Ueda, T.; Yukiiri, K.; Suzuki, H. *Cardiovasc. Drug Rev.* **2002**, *20*, 163.
- [19] Ankley, G. T.; Kahl, M. D.; Jensen, K. M.; Hornung, M. W.; Korte, J. J.; Makynen, E. A.; Leino, R. L. *Toxicol. Sci.* **2002**, *67*, 121.
- [20] Veber, D. F.; Johnson, S. R.; Cheng, H.-Y.; Smith, B. R.; Ward, K. W.; Kopple, K. D. *J. Med. Chem.* **2002**, *45*, 2615.
- [21] Bai, D.; Lummis, S. C. R.; Leicht, W.; Breer, H.; Sattelle, D. B. *Pestic. Sci.* **1991**, *33*, 197.
- [22] Feng, X.-G.; Liu, X.-W.; Han, Z.-L.; Guan, L.-T.; Xu, L.-Z. *J. Qingdao Univ. Sci. Technol., Nat. Sci. Ed.* **2012**, *33*, 381.
- [23] Li, J.; Huang, T.; Li, L.; Ding, T.; Zhu, H.; Yang, B.; Ye, Q.; Gan, J. *J. Agric. Food Chem.* **2016**, *64*, 8109.
- [24] Tomizawa, M.; Casida, J. E. *Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.* **2005**, *45*, 247.
- [25] Bao, H.; Shao, X.; Zhang, Y.; Deng, Y.; Xu, X.; Liu, Z.; Li, Z. *J. Agric. Food Chem.* **2016**, *64*, 5148.
- [26] Lu, S.; Zhuang, Y.; Wu, N.; Feng, Y.; Cheng, J.; Li, Z.; Chen, J.; Yuan, J.; Xu, X. *J. Agric. Food Chem.* **2013**, *61*, 10858.
- [27] Shao, X.; Xu, Z.; Zhao, X.; Xu, X.; Tao, L.; Li, Z.; Qian, X. *J. Agric. Food Chem.* **2010**, *58*, 2690.
- [28] (a) Huang, Z.; Wang, M. *Heterocycles* **1994**, *37*, 1233.
(b) Kong, L.; Yang, R.; Du, X.; Yan, S.; Lin, J. *Chin. J. Org. Chem.* **2016**, *36*, 2437 (in Chinese).
(孔令斌, 杨瑞霞, 杜璇璇, 严胜骄, 林军, 有机化学, **2016**, *36*, 2437.)
- (c) Peng, M.; Yang, R.; Liu, X.; Yan, S.; Lin, J. *Chin. J. Org. Chem.* **2015**, *35*, 1754 (in Chinese).
(彭美阳, 杨瑞霞, 刘昔敏, 严胜骄, 林军, 有机化学, **2015**, *35*, 1754.)
- [29] (a) Chen, X.-B.; Liu, Z.-C.; Lin, X.-R.; Huang, R.; Yan, S.-J.; Lin, J. *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2014**, *2*, 2391.
(b) Luo, D.; Cui, S.; Hu, X.; Yan, S.; Lin, J. *Chin. J. Org. Chem.* **2017**, *37*, 166 (in Chinese).
(罗大云, 崔时胜, 胡兴梅, 林军, 严胜骄, 有机化学, **2017**, *37*, 166.)
- [30] Yu, F.-C.; Huang, R.; Ni, H.; Fan, J.; Yan, S.-J.; Lin, J. *Green Chem.* **2013**, *15*, 453.
- [31] Chen, X.-B.; Liu, Z.-C.; Yang, L.-F.; Yan, S.-J.; Lin, J. *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2014**, *2*, 1155.
- [32] Xiao, X.; Wang, X.; Gui, X.; Chen, L.; Huang, B. *Chem. Biodiversity* **2016**, *11*, 1427.
- [33] Mir, S. A. *Int. J. PharmTech Res.* **2016**, *9*, 70.
- [34] (a) Ding, Z.-W.; Tan, Q.-T.; Liu, B.-X.; Xu, K.; Xu, B. *Acta Chim. Sinica* **2015**, *73*, 1302 (in Chinese).
(丁正伟, 谭启涛, 刘秉新, 张可, 许斌, 化学学报, **2015**, *73*, 1302.)
(b) Zhao, J.-B.; Zhang, Q. *Acta Chim. Sinica* **2015**, *73*, 1235 (in Chinese).
(赵金钵, 张前, 化学学报, **2015**, *73*, 1235.)
- [35] Alizadeh, A.; Bayat, F.; Zhu, Z. *Res. Chem. Intermed.* **2016**, *42*, 5927.
- [36] Yaqub, M.; Perveen, R.; Shafiq, Z.; Pervez, H.; Tahir, M. N. *Synlett* **2012**, *23*, 1755.
- [37] Nishiwaki, H.; Nakagawa, Y.; Takeda, D. Y.; Okazawa, A.; Akamatsu, M.; Miyagawa, H.; Ueno, T.; Nishimura, K. *Pest Manage. Sci.* **2000**, *56*, 875.

(Li, L.; Lu, Z.)