α -烷氧酰胺亚甲基磷酸酯合成方法的研究

黄晓丽 任林静 Sajjad Ali 蒲家志* 姚秋丽*

(遵义医学院药学院 遵义 563000)

摘要 α -烷氧酰胺亚甲基磷酸酯由于亚甲基结构的特殊性使得其合成方法很有限, 针对该问题研究了这一类型化合物的合成方法学. 以乙酸乙酯作为溶剂, 在氢氧化锂碱性条件下, α -芳磺酰亚甲基氨基甲酸酯与磷酸二酯反应能以良好至中等的产率顺利地合成常见方法难以合成的 α -烷氧酰胺亚甲基磷酸酯. 该方法操作简便, 条件温和, 并可应用于克级规模反应.

关键词 α -烷氧酰胺亚甲基磷酸酯; α -磺酰亚甲基氨基甲酸酯; 磷酸酯

Study of the Synthesis of α -Alkoxy carbonyl-aminomethylphosphonates

Huang, Xiaoli Ren, Linjing Ali, Sajjad Pu, Jiazhi* Yao, Qiuli*

(School of Pharmacy, Zunyi Medical University, Zunyi 563000)

Abstract Methods for the synthesis of α -alkoxycarbonylaminomethylphosphonates are very limited because of the presence of unique methylene group in their structures. Thus the methodology for the synthesis of this kind of compounds is studied. Under the basic conditions of using LiOH, α -sulfonylmethylcarbamates reacted with dialkylphosphonates in the solvent of commercial EtOAc giving the products of α -alkoxycarbonylaminomethylphosphonates which are typically hard to be synthesized in good to moderate yields. This simple protocol runs under very mild conditions, and can be exploited for multigram amounts with good yield too.

Keywords α -alkoxycarbonylaminomethylphosphonate; α -sulfonylmethylcarbamate; phosphonate

α -氨基磷酸是天然氨基酸的结构类似物(图 1), 这一类型化合物具有特殊的化学性质, 并且具有广泛多样的生物性质, 如抗菌性、抗 HIV、抗癌活性等^[1-3], 因此, 其合成及活性研究一直是有机化学领域研究的热点^[4-6].

在这些结构的衍生物中, α -烷氧酰胺亚甲基磷酸酯是 α -氨基亚甲基磷酸最常见的保护形式, 其极性较小, 适合有机反应常规的衍生化操作. 它的亚甲基位可作为

有机化学反应关键的反应位点参与 Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) 反应^[7,8]、加成反应^[9,10]或取代反应^[11-14]等(Scheme 1). 然而, 目前常用的合成 α -氨基磷酸酯的方法(例如 Pudovik 反应)通常只适用于合成 α -芳基或烷基取代的磷酸酯, 不适用于合成 α -氨基亚甲基磷酸酯. Zwierzak 小组^[15]曾使用强碱氢化钠促进 BocNHCH₂Ts 与磷酸二乙酯反应合成 BocNHCH₂Ts 叔丁氧酰胺亚甲基磷酸二乙酯. 整体而言, 合成 BocNHCH₂Ts 氨基亚甲

图 1 氨基酸的结构类似物 α -氨基磷酸及其衍生物

Figure 1 An analogue of amino acids: α -aminophosphonic acids and their derivatives

* Corresponding authors. E-mail: yaoqiuli@zmc.edu.cn; 872580024@qq.com

Received January 25, 2017; revised March 8, 2017; published online April 13, 2017.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21462056), the Science and Technology Foundation of Guizhou Province (No. [2014]7542), and the Education Department of Guizhou Province (No. 201610661006).

国家自然科学基金(No. 21462056)、贵州省联合基金(No. [2014]7542)、贵州省大学生创新(No. 201610661006)资助项目.

图式 1 α -氨基亚甲基磷酸酯亚甲基位的反应

Scheme 1 Reactions of α -aminomethylphosphonates on the methylene group

基磷酸酯的方法很有限, 通常使用不易获得的底物, 或者需要剧烈的反应条件^[16~19].

在我们前期尝试合成 α -叔丁氧酰胺亚甲基磷酸酯 (**3a**) 时, 使用苯磺酰亚甲基氨基甲酸叔丁酯 (**1a**) 与磷酸二乙酯 (**2a**) 在 KOH 作用下反应, 只分离到很少的产物 **3a**, 大部分原料均已分解 (Eq. 1). 当采用 α -苯基取代的底物 **1b** 与 **2a** 在相同的条件下反应, 却可以 70% 的分离产率得到 α -叔丁氧酰胺苯基磷酸酯 **3b** (Eq. 2). 对比 Eq. 1 及 Eq. 2 发现 **1a** 与 **1b** 的区别是苯磺酰基邻位是否有取代基, 导致二者的稳定性及反应活性有较大的区别.

基于上述 α -氨基亚甲基磷酸酯特殊的化学性质, 及其在有机反应及生物活性各方面的应用, 我们决定进一步研究 α -烷氧酰胺亚甲基磷酸酯的合成方法.

1 结果与讨论

Eq. 2 中苯磺酰基可作为离去基团顺利地合成 α -苯基取代的磷酸酯 **3b**. 因此, 在条件筛选当中, 我们以 **1a** 与 **2a** 为模板反应, 将 2 equiv. 碱与 **1a** 在溶剂中混合 10 min, 再加入 **2a** (0.95 equiv.), 室温下反应直至底物 **2a** 完全消失时停止反应. 首先筛选不同的碱对反应的影响 (表 1, Entries 1~4). 碱性较弱的碳酸钾无法促进反应进行, 而碱性强的氢氧化钾及氢氧化钠均得到很低的产率, 这可能是由于磷酸酯在强碱中水解为磷酸盐; 唯有碱性中等的氢氧化锂反应 10 h 可获得 58% 的产率. 进一

步地将反应温度提高至 45 °C (表 1, Entry 5), 虽然反应速率提高, 但是产率降低, 这可能是升温促进产物分解为磷酸盐. 往体系中添加分子筛对反应无影响 (表 1, Entry 6), 但添加硫酸镁会降低反应速率, 反应 39 h 后仍有原料 **2a** 剩余, 产率也只有 36% (表 1, Entry 7).

表 1 **1a** 与 **2a** 反应的条件筛选^a

Table 1 Condition screening for the reaction of **1a** with **2a**

Entry	Base	Time/h	Solvent	Yield ^b %
1	K ₂ CO ₃	48	DCM	NR
2	LiOH	10	DCM	58
3	NaOH	10	DCM	0
4	KOH	4.5	DCM	14
5 ^c	LiOH	1.3	DCM	30
6 ^d	LiOH	18	DCM	58
7 ^e	LiOH	39	DCM	36
8	LiOH	10	Toluene	45
9	LiOH	10	CH ₃ CN	67 (58)
10	LiOH	10	DCE	70 (55)
11	LiOH	10	EtOAc	83 (63)
12	LiOH	4	EtOAc	95 (72)
13 ^f	LiOH	1.6	EtOAc	>95
14 ^g	LiOH	1.4	EtOAc	>95

^a Conditions: Ar, r.t., base (2 mmol), **1a** (1 mmol), **2a** (0.95 mmol), solvent (3 mL); ^b yields were determined by ³¹P NMR with BnPO(OEt)₂ as internal standard and the number within parentheses represents isolated yield after column chromatography; ^c 45 °C; ^d 3 Å molecular sieve (70 mg) was added; ^e MgSO₄ (48 mg, 0.4 mmol); ^f **2a** (0.48 mmol) was used instead; ^g **1a** (0.5 mmol) was used instead.

对反应溶剂 (表 1, Entries 8~11) 的筛选结果显示, 同样反应 10 h 之后, 甲苯为溶剂时产率有所降低 (45%); 而乙腈或二氯乙烷 (DCE) 作溶剂时产率有所提高; 乙酸乙酯作为溶剂时产率达到最高 (83% 的核磁产率及 63% 的分离产率).

以乙酸乙酯为溶剂, 通过核磁共振密切监测反应发现, 反应进行至 4 h 时, 原料 **2a** 恰好转化完全 (表 1, Entry 12), 此时能获得 95% 的核磁产率 (分离产率为 72%), 如果进一步延长反应时间, 产率会降低.

如果使用 0.48 equiv. 的 **2a** 进行反应, 在 1.6 h 时反应完全, 核磁监测可获得 >95% 的产物 **3a** (表 1, Entry 13); 相反地, 如果使用 0.5 equiv. 的 **1a** 进行反应, 同样在 1.4 h 时获得 >95% 的核磁产率 (表 1, Entry 14).

在获得以上结果的基础上, 考虑到原子经济性的问题, 我们选择使用表 1 Entry 12 的条件考察底物的适用性, 合成其他 α -烷氧酰胺亚甲基磷酸酯 (表 2). 从实验结果看, 对于氨基以 Boc 保护的磷酸丁酯 **3c** 可获得良好的

产率, 而磷酸甲酯 **3d** 或者氨基被 Cbz 保护的磷酸乙酯 **3e** 或丁酯 **3f** 产率偏低(34%~47%).

表 2 苯磺砷 **1** 与 **2** 反应合成 **3**^a

Table 2 Preparation of **3** by the reaction of phenylsulfones **1** with **2**

^a Reagents and conditions: Ar, r.t., LiOH (2 mmol), **1** (1 mmol), **2** (0.95 mmol), EtOAc (3 mL); isolated yield.

为解决上述产率偏低的问题, 我们使用对甲苯磺酰基(Ts)作为离去基团. 由于苯环对位有给电子的甲基取代, 使得底物的活性有所降低, 从而提高这个底物的稳定性. 因此 Ts 取代的底物 **1c** 或 **1d** 被用到底物拓展当中(表 3). 令人高兴的是, 与表 2 的结果相比, **1c** 或 **1d** 作为底物时产率得到了较大的提高: 氨基被 Boc 保护的磷酸乙酯 **3a**、丁酯 **3c** 或甲酯 **3d**, 分离产率分别为 83%、83% 及 50%; 也能以中等的产率合成 Cbz 保护的产物 **3e**、**3f** 及 **3g**.

表 3 对甲苯磺砷 **1** 与 **2** 反应合成 **3**^a

Table 3 Preparation of **3** by the reaction of tolylsulfones **1** with **2**

^a Reagents and conditions: Ar, r.t., LiOH (2 mmol), **1** (1 mmol), **2** (0.95 mmol), EtOAc (3 mL); isolated yield.

然而, 上述反应的机理目前并不明确, 在我们的对比实验当中, 如果改变加料方式: 先将磷酸二乙酯 **2a** (0.95 equiv.) 与碱 LiOH (2 equiv.) 在溶剂中混合 10 min, 再加 **1a**, 在这种加料模式下 **2a** 通常会离子化为活性更

高的三价磷形式 $[\text{LiOP}(\text{OEt})_2]^{[20,21]}$, 然而这种模式会将产率降低至 30%; 如果将 **1a**、**2a** 与 LiOH 混合后再加入溶剂, 此时产率也降低至 31%. 此外, 如果只使用 1 equiv. LiOH, 反应 3 d 后仍能检测到底物 **2a** 剩余 (Scheme 2). 以上结果表明碱在这个反应中起到至关重要的作用. 该反应可能涉及下述过程 (Scheme 3): **1a** 先与碱作用形成亚胺活性中间体, 该中间体可能再转化为比较稳定的三嗪, 后者再与离子化的 **2a** $[\text{LiOP}(\text{OEt})_2]$ 反应. 以上推断尚需要进一步研究证实.

图式 2 对照实验

Scheme 2 Control experiments

图式 3 可能的反应机理

Scheme 3 Proposed mechanism.

为了表明以上所发展的方法学的有效性, 我们将 50 mmol **1a** 与 47.5 mmol **2a** 反应, 能获得 9.27 g 产物 **3a**, 分离产率为 73% (Eq. 3), 与小量反应相比产率相当. 此外, 氨基的保护基亦可方便地转化, 比如 **3a** 的 Boc 保护基可方便地转化为 Cbz 或 Fmoc 保护 (Eqs. 4, 5).

2 结论

综上所述,本研究为 α -烷氧酰胺亚甲基膦酸酯提供了一种条件温和、操作简便、产率良好至中等的合成方法。本方法只需要以温和的氢氧化锂作为碱,使用无需特殊处理的乙酸乙酯作为溶剂,并且可应用至克级规模的合成当中。以上研究为进一步对 α -氨基亚甲基膦酸的反应性能及活性考察奠定了基础。

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

核磁共振仪为 Agilent-NMR-vnmrs 400 型,以 CDCl_3 为溶剂, TMS 为内标;高分辨质谱仪为 Thermo Scientific LTQ Orbitrap XL 型(ESI-HRMS);薄层层析板和硅胶购自青岛海洋化工厂。所用试剂为分析纯或化学纯级别,获得后直接使用,未纯化。

3.2 实验方法

3.2.1 α -烷氧酰胺亚甲基膦酸酯(3)的合成

取 25 mL 干燥的圆底烧瓶,在氩气保护下加入 LiOH (48 mg, 2 mmol)、**1** (1 mmol) 及 EtOAc (3 mL), 室温下搅拌反应 10 min 之后添加 **2** (0.95 mmol), 薄层色谱(TLC)显示反应完全之后过滤, 浓缩滤液。产物的核磁产率可通过添加内标 $\text{BnP}(\text{O})(\text{OEt})_2$ 用 ^{31}P NMR 确定; 分析纯的产物 **3** 可通过柱层析分离获得[V(石油醚): V(乙酸乙酯)=2:1]。

α -叔丁氧酰胺亚甲基膦酸二乙酯(**3a**)^[22]: 183 mg (表 1, Entry 12) 或 211 mg (Scheme 3), 产率 72% 或 83%, 无色油状。 ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 5.11 (br, 1H), 4.02 (m, 4H), 3.43 (dd, $J=12, 8$ Hz, 2H), 1.31 (s, 9H), 1.2 (m, 6H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 155.4 (d, $J=7$ Hz), 79.8 (s), 62.3 (d, $J=6$ Hz), 35.9 (d, $J=157$ Hz), 28.1 (s), 16.2 (d, $J=6$ Hz); ^{31}P NMR (CDCl_3 , 162 MHz) δ : 23.1; IR (film) ν : 3335, 2978, 2925, 1713, 1529, 1367, 1253, 1175, 1028, 970 cm^{-1} 。

α -叔丁氧酰胺亚甲基膦酸二丁酯(**3c**): 224 mg (Scheme 2) 或 255 mg (Scheme 3), 产率 73% 或 83%, 无色油状。 ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 5.02 (br, 1H), 3.95 (m, 4H), 3.44 (dd, $J=12, 8$ Hz, 2H), 1.54 (m, 4H), 1.33 (m, 9H), 1.24~1.29 (m, 4H), 0.82 (m, 6H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 155.4 (d, $J=7$ Hz), 79.8 (s), 66.0 (d, $J=7$ Hz), 35.8 (d, $J=156$ Hz), 32.4 (d, $J=6$ Hz), 28.1 (s), 18.5 (s), 13.4 (s); ^{31}P NMR (CDCl_3 , 162 MHz) δ : 23.2; IR (film) ν : 3359, 2959, 2926, 2872, 1715, 1026, 556 cm^{-1} 。HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{14}\text{H}_{31}\text{NO}_5\text{P}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 324.1934, found 324.1934。

α -叔丁氧酰胺亚甲基膦酸二甲酯(**3d**): 77 mg (Scheme 2) 或 114 mg (Scheme 3), 产率 34% 或 50%, 无色油状。 ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 5.06 (br, 1H), 3.72 (d, $J=12$ Hz, 6H), 3.52 (dd, $J=8, 4$ Hz, 2H), 1.38 (s, 9H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 155.5 (d, $J=7$ Hz), 80.1 (s), 52.9 (d, $J=6$ Hz), 35.2 (d, $J=156$ Hz), 28.2 (s); ^{31}P NMR (CDCl_3 , 162 MHz) δ : 25.7; IR (film) ν : 3289, 2960, 2927, 2855, 1712, 1529, 1252, 1034, 858 cm^{-1} 。HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_8\text{H}_{19}\text{NO}_5\text{P}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 240.0995, found 240.0996。

α -苄氧酰胺亚甲基膦酸二乙酯(**3e**)^[23]: 134 mg, 产率 47%, 无色油状。 ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.28 (m, 5H), 5.58 (br, 1H), 5.08 (s, 2H), 4.07 (m, 4H), 3.58 (dd, $J=12, 8$ Hz, 2H), 1.25 (t, $J=8$ Hz, 6H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 156.2 (d, $J=6$ Hz), 136.2 (s), 128.4 (s), 128.1 (s), 128.1 (s), 67.1 (s), 62.5 (d, $J=7$ Hz), 36.6 (d, $J=157$ Hz), 16.3 (d, $J=6$ Hz); ^{31}P NMR (CDCl_3 , 162 MHz) δ : 22.5; IR (film) ν : 3416, 3256, 2957, 2924, 1719, 1543, 1262, 1023, 971 cm^{-1} 。

α -苄氧酰胺亚甲基膦酸二丁酯(**3f**): 122 mg (Scheme 2) 或 112 mg (Scheme 3), 产率 36% 或 33%, 无色油状。 ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.29 (m, 5H), 5.42 (br, 1H), 5.09 (s, 2H), 4.02 (m, 4H), 3.59 (dd, $J=8, 4$ Hz, 2H), 1.59 (m, 4H), 1.34 (m, 4H), 0.89 (t, $J=8$ Hz, 6H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 156.2 (d, $J=7$ Hz), 136.2 (s), 128.5 (s), 128.2 (s), 128.0 (s), 67.1 (s), 66.3 (d, $J=7$ Hz), 36.5 (d, $J=157$ Hz), 32.4 (d, $J=6$ Hz), 18.6 (s), 13.5 (s); ^{31}P NMR (CDCl_3 , 162 MHz) δ : 22.5; IR (film) ν : 3257, 2960, 2874, 1723, 1544, 1264, 1025, 698 cm^{-1} 。HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{29}\text{NO}_5\text{P}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 358.1778, found 358.1778。

α -苄氧酰胺亚甲基膦酸二甲酯(**3g**)^[24]: 132 mg (Scheme 3), 产率 51%, 无色油状。 ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.32 (m, 5H), 5.45 (br, 1H), 5.10 (s, 2H), 3.74 (d, $J=12$ Hz, 6H), 3.63 (dd, $J=8, 4$ Hz, 2H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 156.3 (d, $J=7$ Hz), 136.1 (s), 128.5 (s), 128.2 (s), 128.1 (s), 67.2 (s), 53.0 (d, $J=6$ Hz), 35.7 (d, $J=157$ Hz); ^{31}P NMR (CDCl_3 , 162 MHz) δ : 25.4; IR (film) ν : 3420, 3271, 3063, 2957, 2925, 1720, 1545, 1266, 1145.9, 1033, 841 cm^{-1} 。

3.2.2 将 **3a** 转化为 **3e**

取 25 mL 干燥的圆底烧瓶,在氩气保护下将 **3a** (695 mg, 2.6 mmol) 溶于 DCM (5.2 mL), 0 $^\circ\text{C}$ 下添加三氟乙酸(5.2 mL), 反应 90 min 之后减压浓缩反应液。往上述粗产物添加甲苯(2.6 mL)、 Na_2CO_3 (212 mg, 7.2 mmol)

的水(3.6 mL)溶液以及 CbzCl (665 mg, 3.9 mmol), 室温反应 2 d, TLC 检测反应完全后, 分出有机相, 水相用 EtOAc 萃取(20 mL×2), 合并有机相, 有机相用饱和食盐水(10 mL)洗涤, 并用无水硫酸钠干燥, 减压浓缩, 柱层析分离得到产物 **3e** 650 mg, 产率 83%.

3.2.3 将 **3a** 转化为 **3h**

取 25 mL 干燥的圆底烧瓶, 在氩气保护下将 **3a** (695 mg, 2.6 mmol)溶于 DCM (5.2 mL), 0 °C 下添加三氟乙酸(5.2 mL), 反应 90 min 之后减压浓缩反应液. 往上述粗产物添加二氧六环(6.8 mL)、二异丙基乙基胺(3360 mg, 26 mmol)以及 Fmoc-Cl (2949 mg, 11.4 mmol)的二氧六环(7 mL)溶液, 室温反应 1 d, TLC 检测反应完全后, 反应液倒入水(20 mL)中, 再用乙醚萃取(50 mL×3). 合并有机相, 有机相用无水硫酸镁干燥, 减压浓缩, 柱层析分离得到白色固体 **3h**^[25] 659 mg, 产率 65%. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.72 (d, $J=8$ Hz, 2H), 7.58 (d, $J=4$ Hz, 2H), 7.35 (t, $J=8$ Hz, 2H), 7.26 (t, $J=8$ Hz, 2H), 6.01 (br, 1H), 4.37 (d, $J=8$ Hz, 2H), 4.19 (t, $J=8$ Hz, 1H), 4.17~4.09 (m, 4H), 3.64 (dd, $J=8, 4$ Hz, 2H), 1.28 (t, $J=8$ Hz, 6H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 156.4 (d, $J=6$ Hz), 143.8 (s), 141.2 (s), 127.7 (s), 127.0 (s), 125.1 (s), 120.0 (s), 67.2 (s), 62.6 (d, $J=6$ Hz), 47.1 (s), 36.6 (d, $J=158$ Hz), 16.4 (d, $J=6$ Hz); ³¹P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ : 22.8; IR (film) ν : 3418, 3254, 3065, 2981, 2927, 1721, 1546, 1264, 1027, 971, 742 cm⁻¹.

辅助材料(Supporting Information) 新化合物 **3** 的核磁共振谱图. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] Kukuhar, V. P.; Hudson, H. R. *Aminophosphorus Acids and Aminophosphinic Acids*, Wiley, Chichester (UK), 2000.
- [2] Orsini, F.; Sello, G.; Sisti, M. *Curr. Med. Chem.* **2010**, *17*, 3, 264.
- [3] Galezowska, J.; Gumienna-Kontecka, E. *Coord. Chem. Rev.* **2012**, *256*, 105.
- [4] Wang, L.; Shen, Q.; Lu, L. *Chin. J. Chem.* **2013**, *31*, 892.
- [5] Gu, L.; Wang, R.; Huang, X.; Jin, C. *Chin. J. Chem.* **2012**, *30*, 2483.
- [6] Cai, Z.; Fan, Y.; Du, G.; He, L. *Chin. J. Chem.* **2012**, *30*, 1658.
- [7] Aciro, C.; Davies, S. G.; Garner, A. C.; Ishii, Y.; Key, M.; Ling, K. B.; Prasad, R. S.; Roberts, P. M.; Rodriguez-Solla, H.; O'Leary-Steele, C.; Russell, A. J.; Sangane, H. J.; Savory, E. D.; Smith, A. D.; Thomson, J. E. *Tetrahedron* **2008**, *64*(39), 9320.
- [8] Zapata, F.; Caballero, A.; Espinosa, A.; Tarraga, A.; Molina, P. *Eur. J. Inorg. Chem.* **2010** (5), 697.
- [9] Boulos, L. S.; Ewies, E. F.; Fahmy, A. F. M.; Mohram, M. E. *Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem.* **2013**, *188*(6), 790.
- [10] Aboussafy, C. L.; Clive, D. L. J. *J. Org. Chem.* **2012**, *77*(11), 5125.
- [11] El-Sayed, N. F.; Ewies, E. F.; Boulos, L. S.; Moharam, M. E. *Res. J. Pharm., Biol. Chem. Sci.* **2014**, *5*(5), 926.
- [12] Ramirez-Marroquin, O. A.; Romero-Estudillo, I.; Viveros-Ceballos, J. L.; Cativiela, C.; Ordóñez, M. *Eur. J. Org. Chem.* **2016**, (2), 308.
- [13] Yamashita, Y.; Nam, L. C.; Dutton, M. J.; Yoshimoto, S.; Kobayashi, S. *Chem. Commun.* **2015**, *51*(96), 17064.
- [14] Burchacka, E.; Skorenski, M.; Sienczyk, M.; Oleksyszyn, J. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2013**, *23*(5), 1412.
- [15] Klepac, A.; Zwierzak, A. *Tetrahedron Lett.* **2002**, *43*(6), 1079.
- [16] Diel, P. J.; Maier, L. *Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem.* **1988**, *36*(1~2), 85.
- [17] Osapay, G.; Szilagyi, I.; Seres, J. *Tetrahedron* **1987**, *43*(13), 2977.
- [18] Maier, L. *Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem.* **1990**, *47*(3~4), 361.
- [19] Nasief, N. N.; Hangauer, D. *Eur. J. Med. Chem.* **2015**, *90*, 897.
- [20] Zhang, D.; Yuan, C. Y. *Chem.-Eur. J.* **2008**, *14*, 6049.
- [21] Yao, Q.; Yuan, C. J. *Org. Chem.* **2013**, *78*, 6962.
- [22] Kapeller, D. C.; Hammerschmidt, F. *Chem.-Eur. J.* **2009**, *15*(23), 5729.
- [23] Zon, J. *Pol. J. Chem.* **1979**, *53*(2), 541.
- [24] Cullis, P. M.; Harger, M. J. *P. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2* **2002**, 1538.
- [25] Hirschmann, R.; Yager, K. M.; Taylor, C. M.; Witherington, J.; Sprengeler, P. A.; Phillips, B. W.; Moore, W.; Smith, A. B., III *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, *119*(35), 8177.

(Li, L.; Fan, Y.)