有机化学

Youji Huaxue

Chinese Journal of Organic Chemistry

ISSN 0253-2786
CN 31-1321/O6
<http://sioc-journal.cn>

金属有机化学专辑

第 37 卷 第 5 期 Vol. 37 No. 5 2017

ISSN 0253-2786

中国化学会 主办
中国科学院上海有机化学研究所

安耐吉化学-缔造中国化学试剂高端品牌

- 安耐吉化学 (Energy Chemical) 是萨恩化学技术(上海)有限公司的自主试剂品牌。
- 以专业技术为主体，集化学产品的研发、制造、经营于一体。凭借强大的全球化学资源整合能力，专业的质控管理体系以及人性化的服务模式，尤其擅长小分子药物中间体、催化及反应试剂、有机膦配体等系列产品。
- 总部位于上海，建有国内首家控温、控湿、无尘化学品专业库房，在北京、上海、广州等地均设有分支机构。
- 可立即供应的常备库存达20,000余种，为科学研究乃至工业化生产的各个阶段提供品质卓越的高品质化学产品。

公司新地址：上海市浦东新区环科路515号1号楼1206室
购买试剂热线：400-005-6266
公司网址：www.energy-chemical.com

SepaBean™ machine 独特的快速液相色谱系统

三泰科技（常州）有限公司专利产品 专利号ZL2012 1032 0096.0

便捷的操作界面

可以通过平板电脑及手机等移动设备直接控制系统和功能操作

省时，省心，省力

色谱柱管理系统

专用的色谱柱具有唯一的RFID标识，可通过电子标签跟踪和管理色谱柱的使用历史，有助于多次使用

追踪相同色谱峰

试管架带彩色馏分收集显示屏方便识别追踪相同的色谱峰

应用领域：有机合成、天然药物化学、材料化学等领域的分离纯化过程

内置化学知识库

强大的内置化学知识库，每一次的分离纯化都可以变成经验和知识

还在使用玻璃柱做过柱分离纯化？

使用SepaBean™ machine，解放你的双手，帮您节省溶剂！

三种优惠方案，还能免费试用，更有惊喜“学院价”等你来！

SepaBean™ machine 贵吗？

有了“分离豆配额”，实际成交价非常低了，不要太划算啊。

SepaFlash®

高效系列
快速分离柱

键合相
快速分离柱

十三年专注快速分离柱
值得信赖的国际品牌
江苏省科技厅认定“高新技术产品”

iLOK系列
快速分离柱

标准型
快速分离柱

中国制造

试用/订购热线：400-625-6090
在线商店：www.chembeango.com

三泰科技（常州）有限公司 成立于2004年，是一家致力于开发和应用分离纯化技术的高科技企业。公司的产品和服务主要应用于生物医药、天然产物、精细化工和石油产品等领域。

CHEMICAL
SERVICE

工厂直供试剂
真实 | 优质 | 平价

贵金属催化剂 有机配体 工厂直供

12012-95-2

12092-47-6

12112-67-3

12148-71-9

12150-46-8

1291-32-3

1295-35-8

131274-22-1

14243-64-2

13965-03-2

14221-01-3

12354-84-6

武林至尊

宝刀屠龙

号令天下

莫敢不从

倚天不出

谁与争锋

10万元现金大奖 舍我其谁

即日起

1. 发表Science, Nature期刊论文奖励10万元大奖
2. 发表JACS, Angew.Chem. Int.Ed.奖励1000元
3. Chemical Service将于每年的3、4月期间颁发10万元大奖

活动细则, 详见Chemical Service官网
或致电客服电话: 021-6070-2684

1000元优惠券 等你来拿

新用户注册即送100元×10张优惠券, 满500立减100, 减! 减! 减!

国内领先 国际品质

专注金属催化剂及膦配体10年

Ru	Rh	Pd	Ir	N
Au	Pt	P	S	Li

50 亩

生产基地，公斤到吨级生产能力

LC

洁净车间

ICP-MS

江苏欣诺科催化剂有限公司

前 言

中国化学会第十九届全国金属有机化学学术讨论会于2016年10月28~31日在浙江大学紫金港校区体育馆成功举行。本届会议由中国化学会主办,浙江大学化学系、浙江省化学会和中国科学院上海有机化学研究所金属有机化学国家重点实验室共同承办,并得到国家自然科学基金委与浙江省科协的资助。本届会议云集了我国金属有机化学界的著名专家学者以及广大研究生约1500人,其中包括8位院士、25位国家杰青等著名专家学者,另外,还邀请了美国、香港以及新加坡的著名化学家。与会代表围绕金属有机化学研究的前沿科学问题展开热烈交流,展示最新研究成果、展望学科未来,极大地促进了我国金属有机化学研究的进一步发展。

本届会议共收到会议论文549篇,参会代表们围绕金属有机化学研究的前沿科学问题,以大会报告、邀请报告、口头报告和墙报展等进行了形式多样、丰富多彩交流。会议共安排了5个大会报告、1个黄耀曾金属有机化学终身成就奖获奖报告、2个黄耀曾金属有机化学奖获奖报告、25个邀请报告、24个口头报告以及317个墙报展。会议的成功举办,也获得中国化学会的赞誉,并授予本次会议承办单位“优秀学术交流组织奖”。本届会议还得到了国家自然科学基金委员会、浙江省科协和26家相关领域企业和公司的赞助与支持,在此表示衷心地感谢!

为了支持我国金属有机化学的发展,集中展示我国金属有机化学研究的最新成果,《有机化学》编辑部于2017年5月出版一期“金属有机化学专辑”。该专辑共录用稿件29篇,其中综述与进展8篇,研究论文14篇,研究简报6篇,研究通讯1篇。感谢《有机化学》编辑部对本专辑按时出版所付出的辛劳!萨恩化学技术(上海)有限公司、苏州欣家园化学科技有限公司、江苏欣诺科催化剂有限公司、三泰科技(常州)有限公司对本专辑印刷出版提供了大力支持,在此也深表感谢!

中国化学会第十九届全国金属有机
化学学术讨论会组委会主席

《有机化学》主编

铜催化烯酸和苯硫酚类化合物的氧硫化反应研究:
合成硫化内酯类化合物

陈漫漫 王力竞* 李 玮*

(河北大学化学与环境科学学院 保定 071002)

摘要 发展了一类烯酸和苯硫酚类化合物在铜催化下进行的自由基历程的氧硫化反应, 合成了一系列的硫化内酯类化合物. 该反应操作简便且反应条件温和.

关键词 铜催化; 苯硫酚; 自由基反应; 氧硫化反应; 内酯

Copper-Catalyzed Oxysulfenylation of Alkenoic Acids with Benzenethiols: A Strategy to Construct Sulfenylated Lactones

Chen, Manman Wang, Lijing* Li, Wei*

(College of Chemistry & Environmental Science, Hebei University, Baoding 071002)

Abstract An efficient copper-catalyzed oxysulfenylation of alkenoic acids with benzenethiols via radical pathway was developed. The reactions are easy to be conducted under mild conditions and form a broad range of sulfenylated lactones.

Keywords copper-catalyzed; benzenethiols; radical reaction; oxysulfenylation; lactones

有机硫化合物作为一类重要的合成中间体和生物活性物质广泛应用于有机合成、药物化学和材料科学等领域^[1]. 因此, 长期以来有机化学家一直致力于开发高效可靠的 C—S 键构建方法^[2]. 自从 Migita 小组^[3]首次在钯催化下实现硫醇和芳基卤化物的偶联反应以来, 通过过渡金属(如 Pd^[4]、Cu^[5]、Fe^[6]和 Rh^[7])催化策略来构建 C—S 键已经取得了长足的发展. 但是, 在过渡金属催化下通过硫自由基与烯炔类底物反应来构建 C—S 键的例子还鲜有报道. 最近, 自由基加成反应得到了快速发展, 已经成为实现烯炔化合物 1,2-双官能团化的重要方法, 并且已广泛应用于多种杂环体系的构建^[8]. 因此, 结合上述策略在过渡金属催化下发展硫自由基参与的 C—S 键构建方法具有重要意义.

在有机化学中, 由于内酯结构大量存在于具有生物活性的天然和非天然分子中, 其合成显得较为重要. 通常, 人们利用烯酸的氧化内酯化来构建该结构^[9]. 但是该方法往往需要化学计量的氧化剂和卤盐, 有时甚至还

需要两步反应. 因此从绿色化学的角度看, 发展操作简便、反应条件温和以及官能团兼容性好的新方法是十分必要的. 近年来 Buchwald 小组^[10]在这方面做了一些开创性的工作, 他们发现在铜催化下产生的三氟甲基自由基、叠氮自由基、砷基自由基、苯基自由基以及烷基自由基可以与烯酸发生双官能团化反应得到相应的官能团化内酯化合物. 随后 2016 年, 江焕峰小组报道了在溴化铜催化下, 对甲苯亚磺酸钠与 4-戊烯酸通过自由基途径合成相应硫化内酯产物的例子. 遗憾的是在这篇报道中他们主要研究的是硫化环醚化合物的合成, 而对于硫化内酯化合物并未进行深入探讨^[11]. 另外虽然该研究涉及到了过渡金属催化下通过自由基途径合成硫代内酯的内容, 但是鉴于含硫内酯化合物的重要性, 人们寻找其他可替代的方法依然是迫切的^[12].

鉴于我们^[13]对合成含硫化合物一直以来的兴趣和研究工作, 在这里我们希望苯硫酚和烯酸化合物在铜催化下能够发生自由基历程的氧硫化反应, 从而高效地构

* Corresponding authors. E-mail: wanglj0405@163.com; liweihebeilab@163.com

Received February 27, 2017; revised April 1, 2017; published online April 18, 2017.

Project supported by the Hebei Province Science, foundation for Key Program (No. B2016201031), the Hebei Province Higher School Science, foundation for High-level Personnel (No. GCC2014014), and the Hebei Province Science, foundation for Youths (No. B2017201041).

河北省自然科学基金重点(No. B2016201031)、河北省高等学校高层次人才科学研究(No. GCC2014014)、河北省自然科学基金青年(No. B2017201041)资助项目.

建硫化内酯化合物. 我们将有关不同条件对该反应的影响总结在了表 1 中.

1 结果与讨论

1.1 反应条件优化

选择 4-戊烯酸(**1a**)和对甲基苯硫酚(**2a**)作为模板底物来进行反应条件的优化. 首先, 在空气条件下, 将 0.2 mmol 的 **1a**、2 equiv. 的 **2a** 以及 0.2 equiv. CuBr 投入到 2 mL 的 DMSO 中在 120 °C 下反应 24 h, 以 70% 的收率得到目标产物 **3a** (Entry 1). 随后, 其他溶剂被用于反应条件的筛选. 但令人遗憾的是 DMF、甲苯和乙腈都不能有效地促进该反应的进行(Entries 2~4). 接着筛选了不同的铜盐[比如 CuI、CuCl、CuBr₂ 和 Cu(OTf)₂], 除了 CuI 的收率能达到 62% 以外, 其他基本无反应(Entries 5~8), 而当使用 1 equiv. CuBr₂ 时能够以 62% 收率得到目标产物(Entry 9). 另外, 还考察了配体(如 1,10-菲罗啉和 2,2'-联吡啶)对反应的影响, 也没有发现明显的促进作用(Entries 10~11). 对反应温度进行筛查, 发现在 100 °C 下能够得到 68% 的收率, 而升高温度至 140 °C, 产率发生明显的下降(Entries 12~13). 对催化剂的用量也进行了调整, 但收率仍没有得到改善(Entries 14~15). 进一

步对底物 **2a** 的用量进行了筛查, 然而也没有理想的结果出现(Entries 16~17). 此外, 做了两组对照试验, 反应在氩气条件下是不能发生的, 而在氧气条件下能有 64% 的收率(Entries 18~19). 有趣的是当利用经过纯化处理的二甲基亚砜(DMSO)作为溶剂的话, 产率可以提升到 73% (Entry 20). 综上所述, 最佳反应条件是在 120 °C 下于空气中, 0.2 mmol **1a**、2 equiv. **2a**、0.2 equiv. CuBr 和 2 mL DMSO 进行反应(Entry 20).

1.2 底物适用范围考察

为了研究反应的底物适用范围, 在最优化反应条件下考察了多种苯硫酚类化合物和烯酸化合物, 结果如表 2 所示. 首先, 对苯硫酚类化合物进行了考察, 发现取代基在邻对位时其收率要好于在间位时的情况, 说明取代基空间效应的影响较小. 具体如下: 当取代基在邻位时, 无论是带有吸电子基还是供电子基的苯硫酚都有非常好的收率, 电子效应的影响较小(Entries 2~4); 当取代基在间位时, 带吸电子基和供电子基的底物都能达到中等及以上的收率, 但带吸电子基的收率要好于带供电子基的收率(Entries 5~7); 当取代基在对位时, 氯基取代的收率能达到 82% (Entry 8), 甲氧基取代的收率也有

表 1 反应条件筛选和优化^a
Table 1 Optimization of the reaction conditions

Entry	[Cu] (equiv.)	Ligand (0.2 equiv.)	Solvent	Temp./°C	Yield ^b /%
1	CuBr (0.2)	—	DMSO	120	70
2	CuBr (0.2)	—	DMF	120	—
3	CuBr (0.2)	—	Toluene	120	—
4	CuBr (0.2)	—	CH ₃ CN	120	—
5	CuI (0.2)	—	DMSO	120	62
6	CuCl (0.2)	—	DMSO	120	Trace
7	CuBr ₂ (0.2)	—	DMSO	120	—
8	Cu(OTf) ₂ (0.2)	—	DMSO	120	—
9	CuBr ₂ (1.0)	—	DMSO	120	62
10	CuBr (0.2)	1,10-Phen	DMSO	120	66
11	CuBr (0.2)	2,2-Bipy	DMSO	120	66
12	CuBr (0.2)	—	DMSO	100	68
13	CuBr (0.2)	—	DMSO	140	57
14	CuBr (0.1)	—	DMSO	120	50
15	CuBr (0.5)	—	DMSO	120	56
16 ^c	CuBr (0.2)	—	DMSO	120	62
17 ^d	CuBr (0.2)	—	DMSO	120	63
18 ^e	CuBr (0.2)	—	DMSO	120	—
19 ^f	CuBr (0.2)	—	DMSO	120	64
20 ^g	CuBr (0.2)	—	DMSO	120	73

^a 反应条件: 120 °C 下, 将 **1a** (0.2 mmol), **2a** (2 equiv.), 铜盐(0.2 equiv.), 投入到溶剂(2 mL)中于空气氛围下反应 24 h. ^b 分离产率. ^c 使用 1.5 equiv. 的 **2a**. ^d 使用 2.5 equiv. 的 **2a**. ^e 氩气条件下. ^f 氧气条件下. ^g 溶剂在使用前经过标准方法的纯化和干燥处理.

表2 铜催化烯酸类化合物和苯硫酚类化合物的氧硫化反应^a

Table 2 Copper-catalyzed oxysulfenylation of alkenoic acids with benzenethiols

Entry	1	2	3 ^b	Entry	1	2	3 ^b
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8							

^a 反应条件: 120 °C 下, 将 **1a** (0.2 mmol), **2a** (2 equiv.), 溴化亚铜 (0.2 equiv.), 投入到 DMSO (2 mL) 中于空气氛围下反应 24 h. ^b 分离产率.

70% (Entry 9), 然而硝基取代时收率只有 47% (Entry 10). 然后又考察了烯酸类化合物的适用性. 当 R¹、R² 位

置是双苯基或环己基时 **1b** 和 **1c** 分别只能以 24% 和 26% 的收率得到相应的产物 **2b** 和 **2c** (Entries 11, 12); 接着探讨了 R^3 位置是苯基取代的情况, **1d** 能以 53% 的收率得到目标产物 (Entry 13); 设计了底物 **1f**, 发现其能以 50% 的收率得到相应的六元环内酯产物 (Entry 14); 进一步检测了 R^4 、 R^5 位置是双甲基取代的影响, 发现底物 **1f** 能以 43% 的收率得到目标产物 (Entry 15).

1.3 可能的反应机理

为了弄清楚该反应的机理, 做了两组对照对照试验 (图 1): 当在标准反应条件下分别加入自由基抑制剂四甲基哌啶氧化物 (TEMPO) 和 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 (BHT) 时, 发现两者都能完全抑制反应的发生. 这说明该反应机理很可能是一个自由基的历程.

图 1 对照控制实验
Figure 1 Control experiments

根据上述实验结果以及前人的报道^[14]提出了以下可能的反应机理 (图 2): 首先一价铜在空气中氧气的作用下生成二价铜. 然后底物 **2a** 在二价铜作用下生成对甲基苯硫酚自由基 **A**. 紧接着自由基 **A** 加成到底物 **1a** 的双键上形成自由基 **B**. 自由基 **B** 再通过单电子氧化得到正离子中间体 **C**. 最后中间体 **C** 经过内部的亲核反应得到最终的产物 **3a**.

2 结论

本文报道了一例烯酸和苯硫酚类化合物在一价铜催化下进行的自由基历程的氧硫化反应. 通过该反应合成了一系列的硫化内酯类化合物. 该反应的反应条件温和且不需要额外的氧化剂. 这个反应进一步丰富了在过渡金属催化下通过硫自由基与烯烃类底物反应来构建 C—S 键的例子. 此外对于该反应的详细机理和实际应用还在进一步的研究中.

图 2 可能的反应机理
Figure 2 Proposed mechanism

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

核磁共振光谱测试使用 Bruker AVANCEIII 600 仪器测定, 以氘代氯仿作为溶剂, 三甲基硅烷为内标; 高分辨质谱测试使用 Agilent 6520 或 Thermo QExactive 傅里叶变换离子回旋共振质谱仪测定, ESI 源; 熔点测定用显微熔点测定仪测定, 温度未校正.

石油醚、乙酸乙酯为重蒸的工业级试剂, 其中石油醚的沸程控制在 60~90 °C. 柱层析硅胶 (200~300 目) 购自青岛海洋化工有限公司. 苯硫酚及其衍生物购自 Adamas 和 Alfa Aesar. 烯酸 (**1a**、**1e**) 和铜盐购自百灵威. TEMPO 和 BHT 购自上海毕得. DMSO 按标准方法进行无水处理后使用, 其他市售试剂均未经处理直接使用.

3.2 实验方法

3.2.1 烯酸 **1b**~**1d** 和 **1f** 的制备

在 0 °C 氩气条件下, 将丙酸 (1.28 g, 10.0 mmol, 1.00 equiv.) 的四氢呋喃 (THF) (10 mL) 溶液滴加到 25 mL 二异丙基氨基锂 (LDA) (25 mmol, 2.0 mol/L in THF) 的 THF 溶液中. 将混合物在室温下搅拌 40 min, 然后在回流下搅拌 50 min, 接着将其冷却至 0 °C, 滴加烯丙基溴 (3.02 g, 25.0 mmol, 2.5 equiv.). 将所得淡黄色溶液在室温下搅拌过夜, 通过加入 NH_4Cl (饱和溶液, 50 mL) 淬灭反应. 将水层与有机相分离, 用 $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl (约 25 mL) 酸化, 用 Et_2O (50 mL $\times$ 3) 萃取. 合并的乙醚层用 K_2CO_3 (质量分数为 20% 的溶液, 50 mL $\times$ 3) 洗涤, 将合并的所得水层用 $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ H_2SO_4 酸化至 pH 为 3, 并用 Et_2O (50 mL $\times$ 3) 萃取. 合并的有机层用无水 MgSO_4 干燥, 过滤并真空浓缩. 粗产物通过柱层析分离纯化, 使用石油醚和乙酸乙酯作为洗脱剂, 可以得到目标化合物 **1b**~**1c**.

2,2-二苯基戊-4-烯酸(**1b**)^[15]: 白色固体. ¹H NMR (CDCl₃, 600 MHz) δ : 10.21 (s, 1H), 7.30~7.23 (m, 10H), 5.62~5.55 (m, 1H), 4.92~4.90 (m, 2H), 3.15 (d, $J=6.6$ Hz, 2H).

1-烯丙基环己烷-1-羧酸(**1c**)^[15]: 无色液体. ¹H NMR (CDCl₃, 600 MHz) δ : 11.42 (s, 1H), 5.79~5.72 (m, 1H), 5.06~5.04 (m, 2H), 2.29 (d, $J=7.2$ Hz, 2H), 2.04 (d, $J=13.2$ Hz, 2H), 1.61~1.56 (m, 3H), 1.45~1.38 (m, 2H), 1.28~1.22 (m, 3H).

在 0 °C 下, 向甲基三苯基溴化磷(4.64 g, 13 mmol) 的 THF (20 mL) 悬浮液中加入叔丁醇钠(2.92 g, 26 mmol). 然后将混合物搅拌 30 min. 接着在 0 °C 下将 3-苯甲酰基丙酸(1.71 g, 10 mmol) 加入到反应混合物中. 将混合物放至室温, 然后搅拌 16 h. 旋蒸除去 THF 后, 加入二氯甲烷和 1 mol·L⁻¹ NaOH 溶液. 水层用二氯甲烷洗涤, 然后加入 2 mol·L⁻¹ HCl 溶液直到水层的 pH 为 2, 再用二氯甲烷萃取两次并用无水 Na₂SO₄ 干燥, 过滤并在减压下浓缩. 粗产物通过柱层析分离纯化, 使用石油醚和乙酸乙酯作为洗脱剂, 得到 4-苯基戊-4-烯酸(**1d**)^[15], 白色固体. ¹H NMR (CDCl₃, 600 MHz) δ : 7.40 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 7.33 (t, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.29~7.25 (m, 1H), 5.32 (s, 1H), 5.11 (d, $J=0.6$ Hz, 1H), 2.85 (t, $J=7.2$ Hz, 2H), 2.53 (t, $J=7.8$ Hz, 2H).

将 3-甲基-2-丁烯-1-醇(1.72 g, 20 mmol) 和丙酸(50 mg, 0.7 mmol) 加入到 25 mL 原乙酸三乙酯中, 然后混合物在 120~130 °C 下加热 11 h. 接着将反应混合物冷却至室温, 倒入 50 mL 冰冷的 5% H₂SO₄ 的混合物中. 搅拌过夜后, 将混合物用 Et₂O 萃取, 用饱和 NaHCO₃ 溶液和饱和 NaCl 溶液洗涤, 用无水 Na₂SO₄ 干燥. 通过减压蒸馏除去溶剂, 得到粗产物. 在 5 °C 下, 将残余物于 1 h 内分批加入到含 50% NaOH (水溶液) 的 50 mL EtOH-H₂O ($V:V=1:1$) 溶液中. 加入完成后, 将反应混合物放至室温, 搅拌 4 h, 分层. 有机相用 5% KOH 洗涤, 合并的水相在冰浴中冷却, 用浓 HCl 酸化, 用 CH₂Cl₂ 萃取三次. 将合并的有机萃取物用无水 Na₂SO₄ 干燥, 并通过减压蒸馏除去溶剂. 粗产物通过柱层析纯化, 使用石油醚和乙酸乙酯作为洗脱剂, 得到 3,3-二甲基-4-戊烯酸(**1f**)^[15], 无色液体. ¹H NMR (CDCl₃, 600 MHz) δ : 9.87 (s, 1H), 5.92 (dd, $J=17.4, 10.8$ Hz, 1H), 4.98 (dd, $J=25.2, 17.4$ Hz, 2H), 2.33 (s, 2H), 1.16 (s, 6H).

3.2.2 烯酸和苯硫酚的氧硫化反应

在空气条件下, 将 0.2 mmol 烯酸、0.4 mmol 苯硫酚类化合物和 0.04 mmol CuBr 加入到 2 mL DMSO 中. 然后将混合物在 120 °C 下搅拌 24 h. 通过薄层色谱(TLC) 监测反应完成后, 将反应混合物用水稀释, 并用乙酸乙

酯萃取 3 次. 合并的有机相再用水、饱和盐水各洗 2 次, 接着用无水 Na₂SO₄ 干燥, 真空浓缩, 最后通过柱层析分离纯化[洗脱: $V(\text{EtOAc}):V(\text{石油醚})=1:10\sim1:5$], 可以得到硫化内酯产物 **3**.

5-[(对甲基硫基)甲基]二氢呋喃-2(3H)-酮(**3a**)^[11,12b,16a]: 无色液体, 产率 73%. ¹H NMR (CDCl₃, 600 MHz) δ : 7.31 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.12 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 4.61~4.56 (m, 1H), 3.30 (dd, $J=13.8, 4.8$ Hz, 1H), 3.49 (dd, $J=13.8, 7.8$ Hz, 1H), 2.60~2.49 (m, 2H), 2.41~2.36 (m, 1H), 2.32 (s, 3H), 2.03~1.98 (m, 1H); ¹³C NMR (CDCl₃, 150 MHz) δ : 176.5, 137.3, 131.0, 130.8, 129.9, 78.6, 39.2, 28.4, 26.9, 21.0; HRMS (ESI) calcd for C₁₂H₁₅O₂S [M+H]⁺ 223.0786, found 223.0787.

5-[(2-氟苯基)硫基]甲基二氢呋喃-2(3H)-酮(**3b**): 白色固体, 产率 79%. mp 35~37 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 600 MHz) δ : 7.48~7.45 (m, 1H), 7.29~7.27 (m, 1H), 7.13~7.07 (m, 2H), 4.65 (dd, $J=7.2, 5.4$ Hz, 1H), 3.36 (dd, $J=14.4, 5.4$ Hz, 1H), 3.10 (dd, $J=13.8, 7.2$ Hz, 1H), 2.60~2.50 (m, 2H), 2.44~2.40 (m, 1H), 2.07~2.03 (m, 1H); ¹³C NMR (CDCl₃, 150 MHz) δ : 176.3, 161.9 (d, $J=246.0$ Hz), 133.5, 129.7 (d, $J=7.5$ Hz), 124.7 (d, $J=3.0$ Hz), 121.2 (d, $J=22.5$ Hz), 116.5 (d, $J=22.5$ Hz), 78.7, 38.2 (d, $J=3.0$ Hz), 28.4, 26.8; HRMS (ESI) calcd for C₁₁H₁₂FO₂S [M+H]⁺ 227.0535, found 227.0537.

5-[(2-氯苯基)硫基]甲基二氢呋喃-2(3H)-酮(**3c**): 白色固体, 产率 74%. mp 52~54 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 600 MHz) δ : 7.41 (dd, $J=9.0, 0.6$ Hz, 2H), 7.40~7.23 (m, 1H), 7.20~7.18 (m, 1H), 4.65 (dd, $J=7.2, 4.8$ Hz, 1H), 3.36 (dd, $J=13.8, 4.8$ Hz, 1H), 3.10 (dd, $J=13.8, 7.8$ Hz, 1H), 2.62~2.51 (m, 2H), 2.47~2.43 (m, 1H), 2.10~2.06 (m, 1H); ¹³C NMR (CDCl₃, 150 MHz) δ : 176.3, 135.0, 133.7, 130.6, 130.0, 127.9, 127.4, 78.2, 37.5, 28.4, 27.0; HRMS (ESI) calcd for C₁₁H₁₂ClO₂S [M+H]⁺ 243.0241, found 243.0241.

5-[(邻甲基硫基)甲基]二氢呋喃-2(3H)-酮(**3d**): 黄色液体, 产率 80%. ¹H NMR (CDCl₃, 600 MHz) δ : 7.35 (d, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.20~7.14 (m, 3H), 4.63~4.59 (m, 1H), 3.31 (dd, $J=13.8, 4.8$ Hz, 1H), 3.01 (dd, $J=13.2, 7.8$ Hz, 1H), 2.61~2.51 (m, 2H), 2.50~2.38 (m, 4H), 2.08~2.01 (m, 1H); ¹³C NMR (CDCl₃, 150 MHz) δ : 176.4, 138.6, 133.8, 130.5, 129.6, 126.9, 126.6, 78.4, 37.8, 28.4, 27.0, 20.5; HRMS (ESI) calcd for C₁₂H₁₅O₂S [M+H]⁺ 223.0786, found 223.0787.

5-[(3-氟苯基)硫基]甲基二氢呋喃-2(3H)-酮(**3e**): 黄色液体, 产率 64%. ¹H NMR (CDCl₃, 600 MHz) δ : 7.28

(dd, $J=13.8, 7.8$ Hz, 2H), 7.16 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.10~7.09 (m, 1H), 6.94~6.91 (m, 1H), 4.65 (dd, $J=7.2, 5.4$ Hz, 1H), 3.35 (dd, $J=13.8, 4.8$ Hz, 1H), 3.09 (dd, $J=13.8, 7.2$ Hz), 2.62~2.51 (m, 2H), 2.44~2.40 (m, 1H), 2.07~2.02 (m, 1H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 150 MHz) δ : 176.2, 162.8 (d, $J=247.5$ Hz), 137.2 (d, $J=7.5$ Hz), 130.5 (d, $J=9.0$ Hz), 125.1 (d, $J=3.0$ Hz), 116.4 (d, $J=24.0$ Hz), 113.8 (d, $J=21.0$ Hz), 78.2, 38.2, 28.4, 26.9; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{FO}_2\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 227.0535, found 227.0537.

5-[(3-溴苯基)硫基]甲基}二氢呋喃-2(3*H*)-酮(**3f**): 黄色液体, 产率 67%. ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 7.52 (s, 1H), 7.36 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.32 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.18 (t, $J=7.8$ Hz, 1H), 4.66~4.61 (m, 1H), 3.34 (dd, $J=13.8, 4.8$ Hz, 1H), 3.08 (dd, $J=13.8, 7.2$ Hz, 1H), 2.63~2.51 (m, 2H), 2.45~2.39 (m, 1H), 2.06~2.01 (m, 1H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 150 MHz) δ : 176.2, 137.2, 132.2, 130.5, 129.9, 128.3, 122.9, 78.2, 38.4, 28.4, 26.9; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{BrO}_2\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 286.9735, found 286.9736.

5-[(3-甲氧基苯基)硫基]甲基}二氢呋喃-2(3*H*)-酮(**3g**): 黄色液体, 产率 56%. ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 7.22 (t, $J=7.8$ Hz, 1H), 6.97 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 6.94 (s, 1H), 6.97 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 6.77 (dd, $J=8.4, 1.8$ Hz, 1H), 4.65~4.61 (m, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.36 (dd, $J=13.8, 4.8$ Hz, 1H), 3.04 (dd, $J=14.4, 7.8$ Hz, 1H), 2.62~2.50 (m, 2H), 2.44~2.38 (m, 1H), 2.06~2.01 (m, 1H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 150 MHz) δ : 176.4, 160.0, 135.9, 130.0, 122.1, 115.5, 112.6, 78.5, 55.3, 38.3, 28.4, 26.9; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 239.0735, found 239.0736.

5-[(4-氯苯基)硫基]甲基}二氢呋喃-2(3*H*)-酮(**3h**): 黄色液体, 产率 82%. ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 7.34 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.29~7.27 (m, 2H), 4.64~4.59 (m, 1H), 3.30 (dd, $J=13.8, 5.4$ Hz, 1H), 3.06 (dd, $J=13.8, 7.2$ Hz, 1H), 2.60~2.50 (m, 2H), 2.43~2.40 (m, 1H), 2.05~1.98 (m, 1H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 150 MHz) δ : 176.3, 133.3, 133.0, 131.6, 129.3, 78.3, 38.9, 28.4, 26.8; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{ClO}_2\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 243.0241, found 243.0241.

5-[(4-甲氧基苯基)硫基]甲基}二氢呋喃-2(3*H*)-酮(**3i**)^[16b]: 黄色液体, 产率 70%. ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 7.40 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 6.86 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 4.58~4.54 (m, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.22 (dd, $J=13.8, 4.8$ Hz, 1H), 2.93 (dd, $J=13.8, 7.8$ Hz, 1H), 2.58~2.48 (m, 2H), 2.24~2.36 (m, 1H), 2.03~1.98 (m, 1H); ^{13}C NMR

(CDCl_3 , 150 MHz) δ : 176.5, 159.5, 134.0, 124.7, 114.0, 78.7, 55.3, 40.4, 28.4, 26.8; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 239.0735, found 239.0736.

5-[(4-硝基苯基)硫基]甲基}二氢呋喃-2(3*H*)-酮(**3j**)^[12b]: 黄色固体, 产率 47%. m.p. 86~88 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 8.15 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 7.43 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 4.78~4.73 (m, 1H), 4.43 (dd, $J=13.8, 4.8$ Hz, 1H), 3.28 (dd, $J=14.4, 6.6$ Hz, 1H), 2.65~2.56 (m, 2H), 2.50~2.44 (m, 1H), 2.13~2.08 (m, 1H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 150 MHz) δ : 175.9, 145.7, 145.3, 127.2, 124.1, 77.8, 36.9, 28.3, 26.9; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{NO}_4\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 254.0480, found 254.0481.

3,3-二苯基-5-[(对甲苯基硫基)甲基]二氢呋喃-2(3*H*)-酮(**3ab**): 黄色液体, 产率 24%. ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 7.31~7.29 (m, 10H), 7.25 (d, $J=4.8$ Hz, 2H), 7.11 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 4.50~4.45 (m, 1H), 3.34 (dd, $J=13.2, 4.8$ Hz, 1H), 3.16 (dd, $J=13.2, 5.4$ Hz, 1H), 3.04 (dd, $J=13.8, 7.8$ Hz, 1H), 2.74 (dd, $J=13.2, 10.2$ Hz, 1H), 2.32 (s, 3H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 150 MHz) δ : 176.6, 141.8, 139.6, 137.4, 131.2, 130.0, 128.9, 128.4, 127.6, 127.3, 75.5, 58.0, 42.6, 38.9, 21.0; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{23}\text{O}_2\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 375.1410, found 375.1412.

3-[(对甲苯基硫基)甲基]-2-氧杂螺[4.5]癸烷-1-酮(**3ac**): 无色液体, 产率 26%. ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 7.31 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 7.13 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 4.50~4.48 (m, 1H), 3.23 (dd, $J=13.8, 5.4$ Hz, 1H), 2.97 (dd, $J=13.2, 7.2$ Hz, 1H), 2.44 (dd, $J=13.2, 6.6$ Hz, 1H), 2.33 (s, 3H), 1.84~1.76 (m, 3H), 1.75~1.70 (m, 1H), 1.63~1.61 (m, 1H), 1.58~1.56 (m, 2H), 1.53~1.50 (m, 1H), 1.38~1.32 (m, 2H), 1.27~1.21 (m, 1H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 150 MHz) δ : 180.9, 137.2, 130.9, 129.9, 75.4, 44.8, 39.7, 38.7, 34.2, 31.9, 25.2, 22.0, 21.0; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{O}_2\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 291.1408, found 291.1413.

5-苯基-5-[(对甲苯基硫基)甲基]二氢呋喃-2(3*H*)-酮(**3ad**): 无色液体, 产率 53%. ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 7.4~7.36 (m, 4H), 7.33~7.30 (m, 1H), 7.25 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.08 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 3.45 (d, $J=14.4$ Hz, 1H), 3.39 (d, $J=14.4$ Hz, 1H), 2.78~2.70 (m, 2H), 2.53~2.46 (m, 2H), 2.31 (s, 3H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 150 MHz) δ : 175.9, 142.5, 137.0, 132.3, 130.8, 129.8, 128.6, 128.1, 124.8, 88.3, 47.9, 32.5, 29.0, 21.0; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{S} [\text{M}+\text{H}]^+$ 299.1097, found 299.1100.

6-[(对甲苯基硫基)甲基]四氢-2*H*-吡喃-2-酮(**3ae**)^[16a]: 白色固体, 产率 50%. m.p. 69~71 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 7.29 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.12

(d, $J=8.4$ Hz, 2H), 4.38~4.35 (m, 1H), 3.29 (dd, $J=13.8$, 4.8 Hz, 1H), 2.97 (dd, $J=13.8$, 8.4 Hz, 1H), 2.57 (dd, $J=18.0$, 11.4 Hz, 1H), 2.47 (dd, $J=9.0$, 7.2 Hz, 1H), 2.33 (s, 3H), 2.18~2.15 (m, 1H), 1.94~1.91 (m, 1H), 1.82~1.79 (m, 1H), 1.59~1.56 (m, 1H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 150 MHz) δ : 170.9, 137.0, 131.3, 130.5, 129.9, 79.1, 39.3, 29.5, 26.7, 21.0, 18.3; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{S}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 237.0943, found 237.0944.

4,4-二甲基-5-[(对甲苯基硫基)甲基]二氢呋喃-2(3H)-酮(**3af**): 黄色液体, 产率 43%. ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 7.31 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 7.13 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 4.21 (dd, $J=7.2$, 4.8 Hz, 1H), 3.12 (dd, $J=13.8$, 7.2 Hz, 1H), 3.05 (dd, $J=14.4$, 5.4 Hz, 1H), 2.39 (d, $J=17.4$ Hz, 2H), 2.33 (s, 3H), 1.22 (s, 3H), 1.10 (s, 3H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 150 MHz) δ : 175.2, 137.2, 130.9, 129.9, 86.2, 44.8, 39.4, 34.5, 25.8, 21.4, 21.0; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{14}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{S}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 251.1098, found 251.1100.

辅助材料(Supporting Information) 产物 **3** 的核磁共振氢谱、碳谱和高分辨质谱。这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载。

References

- [1] (a) Page, P. C. B. *Organosulfur Chemistry I*. In *Topics in Current Chemistry*, Springer, Berlin, **1999**, Vol. 204.
(b) Page, P. C. B. *Organosulfur Chemistry II*. In *Topics in Current Chemistry*, Springer, Berlin, **1999**, Vol. 205.
(c) Jeppesen, J. O.; Nielsen, M. B.; Becher, J. *Chem. Rev.* **2004**, *104*, 5115.
(d) Secrist, J. A., III; Tiwari, K. N.; Riordan, J. M.; Montgomery, J. A. *J. Med. Chem.* **1991**, *34*, 2361.
(e) Bagli, J. F.; Mackay, W. D.; Ferdinandi, E. F. *J. Med. Chem.* **1976**, *19*, 876.
(f) Bichler, P.; Love, J. In *Topics of Organometallic Chemistry*, Ed.: Vigalok, A., Springer, Heidelberg, **2010**, Vol. 31, p. 39.
(g) McReynolds, M. D.; Dougherty, J. M.; Hanson, P. R. *Chem. Rev.* **2004**, *104*, 2239.
(h) Zyk, N. V.; Beloglazkina, E. K.; Belova, M. A.; Dubinina, N. S. *Russ. Chem. Rev.* **2003**, *72*, 769.
- [2] (a) Matsumoto, K.; Sugiyama, H. *Acc. Chem. Res.* **2002**, *35*, 915.
(b) Beletskaya, I. P.; Ananikov, V. P. *Chem. Rev.* **2011**, *111*, 1596.
(c) Shen, C.; Zhang, P.; Sun, Q.; Bai, S.; Hor, T. S. A.; Liu, X. *Chem. Soc. Rev.* **2015**, *44*, 291.
(d) Li, H.; Wang, Z.; Deng, W. *Chin. J. Org. Chem.* **2016**, *36*, 2419 (in Chinese).
(李红亮, 王正林, 邓卫平, 有机化学, **2016**, *36*, 2419.)
(e) Zhang, B.; Kang, Y.; Shi, R. *Chin. J. Org. Chem.* **2016**, *36*, 1814 (in Chinese).
(张变香, 亢永强, 史瑞雪, 有机化学, **2016**, *36*, 1814.)
(f) Wang, D.; Zhang, R.; Lin, S.; Deng, R.; Yan, Z. *Chin. J. Org. Chem.* **2016**, *36*, 2757 (in Chinese).
(王丁意, 张荣兴, 林森, 邓瑞红, 严兆华, 有机化学, **2016**, *36*, 2757.)
(g) Wang, J.; Wu, J.; Tian, W. *Chin. J. Chem.* **2015**, *33*, 632.
(h) Hu, D.; Bai, F.; Liu, Y.; Wan, J.-P. *Chin. J. Chem.* **2016**, *34*, 1053.
(i) Yu, H.; Zhang, Y. *Chin. J. Chem.* **2016**, *34*, 359.
- [3] (a) Migita, T.; Shimizu, T.; Asami, Y.; Shiobara, J.; Kato, Y.; Kosugi, M. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **1980**, *53*, 1385.
(b) Kosugi, M.; Shimizu, T.; Migita, T. *Chem. Lett.* **1978**, 13.
- [4] (a) Mann, G.; Baranano, D.; Hartwig, J. F.; Rheingold, A. L.; Guzei, I. A. *J. Am. Chem. Soc.* **1998**, *120*, 9205.
(b) Murata, M.; Buchwald, S. L. *Tetrahedron* **2004**, *60*, 7397.
(c) Itoh, T.; Mase, T. *Org. Lett.* **2004**, *6*, 4587.
(d) Fernandez-Rodroeguez, M. A.; Shen, Q.; Hartwig, J. F. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 2180.
(e) Itoh, T.; Mase, T. *Org. Lett.*, **2007**, *9*, 3687.
(f) Lee, J. Y.; Lee, P. H. *J. Org. Chem.* **2008**, *73*, 7413.
(g) Dahl, T.; Tornøe, C. W.; Bang-Andersen, B.; Nielsen, P.; Jorgensen, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 1726.
(h) Eichman, C. C.; Stambuli, J. P. *J. Org. Chem.* **2009**, *74*, 4005.
- [5] (a) Bates, C. G.; Gujadhur, R. K.; Venkataraman, D. *Org. Lett.* **2002**, *4*, 2803.
(b) Jammi, S.; Sakthivel, S.; Rout, L.; Mukherjee, T.; Mandal, S.; Mitra, R.; Saha, P.; Punniyamurthy, T. *J. Org. Chem.* **2009**, *74*, 1971.
(c) Larsson, P.-F.; Correa, A.; Carril, M.; Norrby, P.-O.; Bolm, C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 5691.
(d) Xu, H.-J.; Zhao, Y.-Q.; Feng, T.; Feng, Y.-S. *J. Org. Chem.* **2012**, *77*, 2878.
(e) Kumar, S.; Engman, L. *J. Org. Chem.* **2006**, *71*, 5400.
(f) Taniguchi, N. *J. Org. Chem.* **2007**, *72*, 1241.
(g) Zhang, S.; Qian, P.; Zhang, M.; Hu, M.; Cheng, J. *J. Org. Chem.* **2010**, *75*, 6732.
(h) Hao, W.; Zeng, J.; Cai, M. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 11686.
- [6] (a) Correa, A.; Carril, M.; Bolm, C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 2880.
(b) Wu, J.-R.; Lin, C.-H.; Lee, C.-F. *Chem. Commun.* **2009**, 4450.
(c) Lin, Y.-Y.; Wang, Y.-J.; Lin, C.-H.; Cheng, J.-H.; Lee, C.-F. *J. Org. Chem.* **2012**, *77*, 6100.
(d) Wang, H.; Wang, L.; Shang, J.; Li, X.; Wang, H.; Gui, J.; Lei, A. *Chem. Commun.* **2012**, *48*, 76.
- [7] (a) Arisawa, M.; Ichikawa, T.; Yamaguchi, M. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 5318.
(b) Arisawa, M.; Suzuki, T.; Ishikawa, T.; Yamaguchi, M. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 12214.
(c) Ajiki, K.; Hirano, M.; Tanaka, K. *Org. Lett.* **2005**, *7*, 4193.
- [8] (a) Patai, S. *The Chemistry of Double-Bonded Functional Groups*, Wiley, Chichester, **1997**.
(b) Wang, F.; Qi, X.; Liang, Z.; Chen, P.; Liu, G. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, *53*, 1881.
(c) Wang, F.; Wang, D.; Mu, X.; Chen, P.; Liu, G. *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 10202.
(d) Bunesco, A.; Wang, Q.; Zhu, J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, *54*, 3132.
(e) Liu, X.; Xiong, F.; Huang, X.; Xu, L.; Li, P.; Wu, X. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 6962.
(f) Chen, J.-R.; Yu, X.-Y.; Xiao, W.-J. *Synthesis* **2015**, *47*, 604.
(g) Song, R.-J.; Liu, Y.; Xie, Y.-X.; Li, J.-H. *Synthesis* **2015**, *47*, 1195.
- [9] (a) Hudlicky, M. *Oxidations in Organic Chemistry*, ACS Monograph Series 186, American Chemical Society, Washington, DC, **1990**, p. 174.
(b) Johnson, R. A.; Sharpless, K. B. In *Catalytic Asymmetric Synthesis*, 2nd ed., Ed.: Ojima, I., Wiley-VCH, New York, Weinheim, **2000**, p. 357.
- [10] (a) Zhu, R.; Buchwald, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2015**, *137*, 8069.
(b) Zhu, R.; Buchwald, S. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 12462.
(c) Zhu, R.; Buchwald, S. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 12655.
- [11] Gao, Y.; Gao, Y.; Tang, X.; Peng, J.; Hu, M.; Wu, W.; Jiang, H. *Org. Lett.* **2016**, *18*, 1158.
- [12] (a) Samii, Z. K. M. Abd El; Ashmawy, M. I. Al; Mellor, J. M. *Tetrahedron Lett.* **1987**, *28*, 1949.
(b) Vas'kevich, A. I.; Tsizorik, N. M.; Rusanov, E. B.; Staninets, V.

- I.; Vovk M. V. *Russ. J. Org. Chem.* **2012**, *48*, 193.
- [13] Wang, L.-J.; Chen, M.; Qi, L.; Xu, Z.; Li, W. *Chem. Commun.* **2017**, *53*, 2056.
- [14] (a) Huo, C.; Wang, Y.; Yuan, Y.; Chen, F.; Tang, J. *Chem. Commun.* **2016**, *52*, 7233.
(b) Huang, Z.; Zhang, D.; Qi, X.; Yan, Z.; Wang, M.; Yan, H.; Lei, A. *Org. Lett.*, **2016**, *18*, 2351.
- [15] Kang, Y.-B. Chen, X.-M. Yao, C.-Z. Ning, X.-S. *Chem. Commun.* **2016**, *52*, 6193.
- [16] (a) Samii, Z. K. M. Abel El.; Ashmawy, M. I Al.; Mellor, J. M. *Tetrahedron Lett.* **1986**, *27*, 5293.
(b) Tiecco, M.; Tingoli, M.; Testaferri, L.; Balducci, R. *J. Org. Chem.* **1992**, *57*, 4025.

(Li, L.; Fa, Y.)