C—H 键氧化生成酮的研究进展

任兰会 高爽*

(中国科学院大连化学物理研究所 大连 116023)

摘要 酮是合成医药、天然产物、农用化学品、染料等精细化学品的重要中间体, C—H 键氧化是制备酮最直接、最高效的合成方法之一. 综述比较了 C—H 键氧化生成酮的不同催化体系.

关键词 酮; C—H 键; 氧化

Recent Advances of the Oxidation of C—H Bonds to Ketones

Ren, Lanhui Gao, Shuang*

(Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023)

Abstract The ketones are important intermediates for the synthesis of fine chemicals, such as pharmaceuticals, natural products, agricultural chemicals, dyes, etc. The oxidation of C—H bonds is one of the most direct and efficient synthetic methods for the preparation of ketones. In this review, the oxidation of C—H bonds to ketones is reviewed.

Keywords ketone; C—H bond; oxidation

C—H 键是有机化合物中最基本的化学键之一, 碳氢化合物来源广泛、种类繁多、价格便宜, 其官能团化是生产其它化学品最简洁、最高效的方法之一^[1~11]. 通常所说的 C—H 键官能团化是指: 在金属试剂或者金属催化剂的作用下, C—H 键断裂, 生成碳金属键、自由基、卡宾等活性中间体, 这些活性中间体与其它的化学物质反应生成新的官能团. 金属试剂或者金属催化剂不仅可以有效地降低反应所需的活化能, 还能提高活性中间体的选择性^[12~14].

根据 C—H 键是否直接和金属中心作用, 可以将过渡金属催化剂参与的 C—H 键官能团化反应分为两种不同的反应机理: 内层机理和外层机理. 内层机理反应途径如 Scheme 1 所示, 首先在过渡金属作用下, C—H 键断裂, 生成的金属烷基或芳基中间体与其它的反应物反应, 最终实现 C—H 键官能团化. 这类反应的选择性取决于形成的金属烷基或芳基中间体的结构和性质, 位阻较小的 C—H 键往往具有较好的选择性. 外层机理反应途径如 Scheme 2 所示, 科学家们通过对生物酶催化反应历程的研究提出了外层机理. 首先氧化剂将过渡金属氧化成高氧化态的金属络合物(如金属酰氧、金属酰亚

胺或金属卡宾等), 然后高活性、高氧化态的金属络合物与 C—H 键发生反应(直接插入或攫氢/自由基复合), 最终实现 C—H 键的官能团化. 经历外层机理的 C—H 键官能团化反应, 选择性和键能的大小有关, 键能小, 选择性好, 这主要是因为键能小的碳氢化合物在官能团化反应中生成的碳自由基或离子等中间体比较稳定^[15].

图式 1 内层机理反应途径

Scheme 1 Inner mechanism of the reaction pathway

C—H 键氧化生成酮是 C—H 键官能团化的重要研究内容之一. 酮是合成医药、天然产物、农用化学品、染料等精细化学品的重要中间体, 例如苯甲酰基吡啶类化合物是合成众多医药产品的关键中间体(Scheme 1)^[16~19].

在传统的方法中, 化学计量的强氧化剂被用于 C—H 键氧化生成酮的反应, 例如高锰酸钾、铬试剂等. 使用这些氧化剂往往会产生大量副产品, 后处理麻烦, 对

* Corresponding author. E-mail: sgao@dicp.ac.cn

Received February 17, 2017; revised April 6, 2017; published online April 21, 2017.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21273225).

国家自然科学基金(No. 21273225)资助项目.

图式 2 外层机理反应途径

Scheme 2 Outer mechanism of the reaction pathway

图式 3 基于苯甲酰吡啶类化合物开发的医药化合物

Scheme 3 Pharmaceutical compounds coming from benzoylpyridines

环境造成很大的污染。目前环境问题日益突出, 开发绿色、高效、高选择性的 C—H 键氧化生成酮的催化体系已成为人们研究的热点^[20,21]。

本文主要综述比较了 C—H 键氧化生成酮的不同催化体系。

1 Fe 催化体系

C—H 键氧化是自然界中普遍存在的过程, 很多自然界中 C—H 键氧化反应都需要含有 Fe 的酶来催化。20 世纪 80 年代, 在自然界中氧化反应的启发下, 科学家 Gifsur-Yvette 提出了 Gif 化学体系^[22]。Gif 化学体系使用过渡金属(主要是铁)作为催化剂, 氧气作为氧化剂, 在吡啶中进行, 该体系必须加入还原剂。20 世纪 80 年代, Barton 首次将 Gif 化学体系用于温和条件下饱和烷烃氧化生成酮的反应, 并且发现直链烷烃中不同 C—H 键发生氧化反应的选择性为 3°>2°>1°^[23~30]。

2005 年, 王彦广等^[31]使用金属卟啉作为催化剂, 研究氯胺参与的四氢化萘的酰胺化反应时发现, 使用四苯基卟啉铁作为催化剂时, 四氢化萘被氧化生成四氢萘

酮。在进行深入研究后, 王彦广等^[31]报道了一种在氯胺的参与下, 以氧气作为氧化剂, Fe(TPP)Cl 催化烷基苯、二苯基甲烷类化合物、1,2,3,4-四氢化萘类化合物、2,3-二氢-1H-茚、茚和环己烯氧化生成酮的方法, 收率为 52%~87%, Fe(TPP)Cl 还可以催化环己烷氧化生成环己酮, 收率为 13% (Eq. 1)。

2010 年, White 等^[32]报道了一种 Fe(S,S-PDP)催化剂, 这种简单的铁络合物催化剂表现出和酶催化剂相当的选择性, 可以催化天然产物和饱和烷烃中 C—H 键生成酮, 氧化位点在一定条件下可以预测(Scheme 4)。

图式 4 Fe(S,S-PDP)催化天然产物氧化生成酮

Scheme 4 Oxidation of natural product to ketone with Fe(S,S-PDP) as catalyst

2013 年, Kappe 等^[33]将微反应器应用于苄基吡啶类化合物氧化生成酮的反应. 使用碳酸丙烯酯作为反应溶剂, 空气作为氧化剂, FeCl_3 作为催化剂, 在 $200\text{ }^\circ\text{C}$ 下反应 13 min, 可以将 2-(4-甲基苄基)吡啶、2-(4-氯苄基)吡啶和 2-(4-氟苄基)吡啶氧化生成酮, 收率分别是 69%, 81%, 83% (Eq. 2). 微反应器在很大程度上提高了反应速率和催化剂的活性.

2013 年, Novák 等^[34]报道了一种 FeCl_3 或 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 催化茆类化合物、二苯基甲烷类化合物、烷基苯、2-乙基噻吩、1,2,3,4-四氢化萘、氧杂蒽和 9,10-二氢蒽氧化生成酮的方法, 收率为 21%~98%. 作者发现表面活性剂可以显著地加快反应速率, 而且表面活性剂分子中亲油部分的碳链越长, 效果越明显.

2015 年, Draye 等^[35]报道了一种 $\text{Fe}(\text{TAML})\text{Li}$ 催化剂 (Eq. 3), 使用叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 在 $-10\text{ }^\circ\text{C}$ 时, 可以将烷基苯、二苯基甲烷、氧杂蒽、1,2,3,4-四氢化萘、乙基吡啶类化合物和苄基吡啶类化合物氧化生成酮, 收率为 8%~99%. 但是, $\text{Fe}(\text{TAML})\text{Li}$ 催化剂对反应液的 pH 值要求较高.

2015 年, 王戈等^[36]将 FeCl_3 固定到聚(4-乙烯吡啶)上制备了一种 Fe-P4VP 催化剂, 使用叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 在 $80\text{ }^\circ\text{C}$ 下反应 24 h, 可以将烷基苯、茆和双

(4-氟苄基)甲烷氧化生成酮, 转化率为 73%~99%, 选

择性为 90%~99%(Eq. 4). Fe-P4VP 催化剂可以溶解在有机溶剂中, 二乙烯苯的含量影响反应体系中催化剂的活性.

2016 年, Repo 等^[37]报道了一种 Fe(III)-THA(胸腺嘧啶-1-乙酸)催化剂, 使用过氧化氢作为氧化剂, 可以将饱和烷烃、2,3-二氢-1*H*-茚、1,2,3,4-四氢化萘、二苯基甲烷、乙苯、2-苄基吡啶、环己烯和环辛烯氧化生成酮, 收率为 4%~95% (Eq. 5).

2016 年, Wolf 等^[38]报道了一种核黄素四乙酸酯 (RFT)和[Fe(TPA)-(MeCN)₂](ClO₄)₂ [TPA: 三(2-吡啶基甲基)胺]组成的催化体系, 可以催化乙苯类化合物、氧杂蒽、硫杂蒽、2,3-二氢-1*H*-茚和 1,2,3,4-四氢化萘氧化生成酮, 收率为 70%~99% (Eq. 6). 核黄素四乙酸酯在 440 nm 蓝色光照射下会原位产生过氧化氢, 避免了直接使用容易爆炸的过氧化氢. 过氧化氢在金属 Fe 的存在下会迅速分解, 所以使用过氧化氢作为氧化剂时, 一般会过量使用, 而且需要慢慢滴加. 这种原位产生过氧化氢的方法可以彻底避免上述问题, 降低了使用成本.

2 Cu 催化体系

铜作为一种廉价易得的金属, 在氧化反应中有广泛

的用途, 很多在生物体中进行的氧化反应也是由含铜的酶催化的.

1996 年, Murahashi 等^[39]报道了一种由 CuCl₂ 和 18-冠-6 组成的 Cu-冠醚催化剂, 在乙醛存在下, 使用氧气作为氧化剂, 可以将正己烷、环己烷和乙苯氧化生成酮, 收率分别为 44%、61%、13%.

2003 年, Punniyamurthy 等^[40]报道了一种 Salen-H₄/Cu 催化剂(Eq. 7), 使用 30%过氧化氢水溶液作为氧化剂, 可以将乙苯、丁苯、苯乙酸乙酯、1,2,3,4-四氢化萘和环己烷氧化生成酮, 收率分别为 86%、88%、82%、89%、18%.

2009 年, Gorden 等^[41]报道了一种 Benzyl-salquCu 催化剂(图 1), 使用 3 equiv. 叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 以乙腈作为反应溶剂, 回流 18 h, 可以氧化烷基苯、二苯基甲烷、1,2,3,4-四氢化萘和 2-乙基萘生成酮, 收率为 66%~99%. 当发生反应的亚甲基邻位为供电子取代基时, 反应结果较好; 为吸电子取代基时, 反应结果较差.

图 1 Benzyl-salquCu 的结构
Figure 1 Structure of benzyl-salquCu

2012 年, Gorden 等^[42]在之前工作的基础上, 报道了一种 isopropyl-salquCu 催化剂, 使用叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 可以氧化环戊烯类化合物和环己烯类化合物生成酮, 收率为 11%~99% (Eq. 8).

2012 年, Maes 等^[43]使用 CuI 作为催化剂, 以氧气为氧化剂, 在酸性条件(AcOH)下氧化苄基吡啶类化合物和苄基嘧啶类化合物生成酮, 收率为 61%~85% (Eq. 9). 即使底物中含有容易被氧化的甲硫基时, CuI/AcOH/O₂ 体系依然能高选择性地氧化相应的亚甲基.

2014 年, 张致慧等^[44]将原位产生的 Cu-MOF(Cu-(NO₃)₂-BTC 为前体, BTC: 1,3,5-苯三羧酸)负载到多孔二氧化硅材料的孔中, 制备了一种多相铜催化剂, 以叔丁基过氧化氢为氧化剂, 可以氧化乙苯、丙苯、二苯基甲烷、苄和 1,2,3,4-四氢化萘生成酮, 转化率分别为 99%, 96%、29%、18%、95%, 选择性均大于 99% (Eq. 10). 作者用 DMSO 替换 DMF/水/乙醇混合体系, 避免了 Cu-MOF 快速聚集, 同时也避免了 Cu-MOF 在二氧化硅材料的表面结晶. 循环 12 次后, 催化活性没有降低.

2015 年, Lam 等^[45]报道了一种含氟有机配体(Eq. 11), 使用该配体和 CuI 的络合物作为催化剂, 叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 可以氧化环己烯类化合物、烷基苯、苄、二苯基甲烷、2,3-二氢-1H-茚、9,10-二氢蒽和 1-对甲苯磺酰基-1,2,3,4-四氢喹啉生成酮, 收率为 51%~88%. 这种含氟有机配体在经历了 5 次循环实验后, 活

性只有少许下降.

2015 年, 雷爱文等^[46]首次将活化剂引入到 C—H 键氧化反应中. 使用氯乙酸乙酯作为活化剂, 一水合氯化铜作为催化剂, 氧气作为氧化剂, 在 DMF 中, 130 °C 反应 24 h, 可以氧化吡啶侧链 C—H 键、喹啉侧链 C—H 键、苯并咪唑侧链 C—H 键、苯并异噻唑侧链 C—H 键和喹喔啉侧链 C—H 键生成酮, 收率为 30%~92% (Eq. 12).

3 Ru 催化体系

1995 年, Mak 等^[47]报道了一种钌氧化物, 在三氟乙酸、2,2'-联吡啶和二氯甲烷的参与下, 这种钌氧化物可以氧化环己烷、正己烷、2-甲基丁烷和乙苯生成酮, 收率分别为 64%、31%、11%、10%. 2000 年, Mak 等^[48]优化了该氧化体系, 将 2,2'-联吡啶换成 6,6'-二氯-2,2'-联

吡啶, 改进后的氧化体系不仅可以氧化 C—H 键生成酮, 还可以将伯醇或仲醇氧化生成醛或酮。

2009 年, Lee 等^[49]报道了一种阳离子络合物 $[(\text{pymox-Me}_2)\text{RuCl}_2]^+\text{BF}_4^-$ 催化剂(Scheme 5), 使用叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 水作为溶剂, 在室温下可以氧化烷基苯、2-乙基萘、9,10-二氢蒽、2,3-二氢-1*H*-茚、氧杂蒽、茈、环己烷和环辛烷生成酮, 收率为 41%~89%。

图式 5 $[(\text{pymox-Me}_2)\text{RuCl}_2]^+\text{BF}_4^-$ 的合成路线

Scheme 5 The synthetic route of $[(\text{pymox-Me}_2)\text{RuCl}_2]^+\text{BF}_4^-$

2009 年, Yusubov 等^[50]报道了一种串联催化体系, 在钌催化剂的作用下, 过硫酸氢钾将碘苯氧化成亚碘酰苯, 然后亚碘酰苯氧化烷基苯、9,10-二氢蒽、2,3-二氢-1*H*-茈和 1,2,3,4-四氢化萘生成酮, 收率为 69%~95% (Scheme 6)。

图式 6 串联的碘苯和三氯化钌催化 C—H 键氧化生成酮的过程

Scheme 6 Process of the oxidation of C—H bonds to ketones with tandem iodobenzene and RuCl_3 as catalyst

2014 年, Oisaki 等^[51]报道了一种以 $\text{Ru}(\text{bpy})_3^{2+}$ -Cu(I) 作为光敏剂的光催化体系。使用氧气作为氧化剂, 在可见光的照射下, 可以氧化茈类化合物生成酮, 收率为 41%~95% (Eq. 12)。

4 Mn 催化体系

含金属锰的催化剂被广泛地应用于氧化反应, 特别是烯烃环氧化反应^[52~54]、醇氧化反应^[55~57]和硫醚氧化反应^[58]。

1998 年, Lee 等^[59]报道了一种 Mn(III) salen 催化剂 (图 2), 使用亚碘酰苯或次氯酸钠作为氧化剂, 可以氧化烷基苯、二苯基甲烷、氧杂蒽、2,3-二氢-1*H*-茈类化合物、1,2,3,4-四氢化萘和 9,10-二氢蒽生成酮, 收率为 22%~92%。作者认为反应底物先被氧化生成仲醇, 仲醇进一步被氧化生成酮。

图 2 Mn(III) salen 的结构

Figure 2 Structure of Mn(III) salen

2001 年, 陈焜铭等^[60]报道了一种茈酮衍生物类配体 (图 3), 使用该配体和四水合乙酸锰在氯仿溶液中回流 12 h 后, 减压蒸出溶剂, 固体直接用于氧化反应。使用 2 equiv. 叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 0 °C 下, 可以氧化丙苯、1,2,3,4-四氢化萘、茈和 9,10-二氢蒽生成酮, 收率分别为 91%、88%、63%、52%。

图 3 茈酮衍生物类配体的结构

Figure 3 Structure of camphanone derivative ligand

2006 年, Shing 等^[61]使用 $\text{Mn}(\text{OAc})_3$ 作为催化剂, 以叔丁基过氧化氢为氧化剂, 在氮气氛围中, 可以氧化 Δ^5 -类固醇类化合物生成具有优异抗癌活性的 Δ^5 -en-7-酮类化合物 (Eq. 13)。在氧气氛围中, 可以氧化环己烯类化合物生成酮 (Eq. 14)。由于三价锰离子在水溶液中容易发生歧化反应生成二价锰离子和四价锰离子, 作者加入 3

A 分子筛抑制三价锰离子的歧化反应.

2012 年, Jayaram 等^[62]还原高锰酸钾制备了一种纳米 MnO_2 催化剂, 使用 3 equiv. 叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 在 80 °C 下反应 10 h, 可以氧化二苯基甲烷、1,2,3,4-四氢化萘、2,3-二氢-1*H*-茚、茚、1,2-二氢茇、蒽-9(10*H*)-酮、异丁基苯和氧杂蒽生成酮, 转化率分别为 92%、92%、89%、100%、88%、100%、85%、100%, 选择性分别为 100%、80%、100%、100%、100%、100%、95%、100%. 催化剂经历 6 次循环后, 活性没有降低.

2014 年, 孙伟等^[63]报道了一种仿生的 *S*-PMB- Mn(OTf)_2 催化剂(图 4), 使用过氧化氢作为氧化剂, 在酸性条件(乙酸)下, 可以氧化烷基苯、二苯基甲烷、1,2,3,4-四氢化萘、氧杂蒽、环己烷和环辛烷生成酮, 收率为 15%~82%.

2015 年, 吴传德等^[64]使用四苯基氨基卟啉和三聚氰酰氯反应, 将产物和四水合氯化锰络合制备了一种多相锰卟啉催化剂, 使用叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 可

图 4 *S*-PMB- Mn(OTf)_2 的结构
Figure 4 Structure of *S*-PMB- Mn(OTf)_2

以氧化乙苯、丙苯、1,2,3,4-四氢化萘、二苯基甲烷和 4-乙基-1,1'-联苯生成酮, 收率分别为 99%、91%、73%、57%、76%.

2015 年, Shaabani 等^[65]报道了一种天然白羊毛负载的 MnO_2 催化剂. 首先用氢氧化钠溶液洗涤羊毛, 然后分别用蒸馏水和甲醇洗涤, 干燥后, 将处理后的羊毛切割成微粒(20~500 μm). 将羊毛微粒放入到高锰酸钾水溶液中搅拌 12 h, 过滤, 干燥后得到天然白羊毛负载的 MnO_2 催化剂. 使用空气作为氧化剂, 天然白羊毛负载的 MnO_2 可以催化烷基苯、二苯基甲烷、2,3-二氢-1*H*-茚、1,2,3,4-四氢化萘、9,10-二氢蒽、茚和氧杂蒽氧化生成酮, 收率为 86%~100%.

2015 年, 高爽等^[66]报道了一种双三氟甲磺酸锰催化吡啶侧链 C—H 键氧化生成酮的方法. 作者选择苄基吡啶类化合物、6,7-二氢-5*H*-环戊基[*b*]吡啶类化合物和 2-乙基吡啶作为反应底物, 优化后的反应条件为: 0.5 mol% Mn(OTf)_2 , 5 equiv. 叔丁基过氧化氢, 2.5 mL 水, 25 °C 反应 24 h. 在优化的反应条件下, 多种 6,7-二氢-5*H*-环戊基[*b*]吡啶类化合物可以被氧化生成酮, 收率为 73%~88% (Eq. 15). 相比文献报道的方法, 作者使用了更加绿色环保的氧化剂(65%叔丁基过氧化氢水溶液)替代了 CrO_3 . 文献报道的方法使用的溶剂为 H_2SO_4 - HOAc , 不仅对环境污染大, 而且对设备腐蚀严重, 作者使用 H_2O 为溶剂, 彻底解决了上述问题. 使用叔丁醇作为反应溶剂, Mn(OTf)_2 还能催化苄基吡啶类化合物和 2-乙基吡啶氧化生成酮, 收率为 31%~87%.

2016 年, 高爽等^[67]将 $\text{Mn(NO}_3)_2$ 和 1,10-菲啰啉的络合物在氮气氛围中煅烧制备了多种 $\text{MnO}_x\text{-N@C}$, 选择苄基吡啶类化合物和 6,7-二氢-5*H*-环戊基[*b*]吡啶类化合物作为反应底物, 研究了 $\text{MnO}_x\text{-N@C}$ 催化吡啶侧链 C—H 键氧化生成酮的方法(Scheme 7). 优化后的反应条件为: 1 mg $\text{MnO}_x\text{-N@C}$ (600 °C), 3 equiv. 叔丁基过

图式 7 双三氟甲磺酸锰催化 C—H 键氧化生成酮的方法
Scheme 7 Oxidation of C—H bonds to ketones with $\text{Mn}(\text{OTf})_2$ as catalyst

氧化氢, 无溶剂条件下, 60 °C 反应 12 h. 在优化的反应条件下, 多种吡啶类化合物和 6,7-二氢-5H-环戊基 [b]吡啶类化合物均能顺利地发生氧化反应, 生成相应的酮, 收率为 38%~95% (Eq. 15). 利用透射电子显微镜(TEM)和 X 射线光电子能谱分析(XPS)对 $\text{MnO}_x\text{-N@C}$ (600 °C)进行了初步表征. TEM 谱图表明 $\text{MnO}_x\text{-N@C}$ (600 °C)中 MnO_x 粒子的大小为 1.7~6.6 nm. N1s 的谱图表明 $\text{MnO}_x\text{-N@C}$ (600 °C)中的 N 主要以 C—N、C=N 和吡咯型 N 的形式存在. $\text{Mn}2p_{3/2}$ 的谱图表明 $\text{MnO}_x\text{-N@C}$ (600 °C)中存在多种价态的 Mn, 分别为 Mn(II)、Mn(III)和 Mn(IV). 在连续循环 6 次后, $\text{MnO}_x\text{-N@C}$ (600 °C)依然具有很高的催化活性, 这说明 $\text{MnO}_x\text{-N@C}$ (600 °C)的稳定性很好. $\text{MnO}_x\text{-N@C}$ (600 °C)能催化克级规模的放大实验.

5 Co 催化体系

1996 年, Ishii 等^[68]使用 *N*-羟基邻苯二甲酰亚胺 (NHPI)作为主催化剂, 以 $\text{Co}(\text{acac})_n$ ($n=2, 3$)作为助催化剂, 进行了环己烷和烷基苯氧化的研究. 环己烷的转化率为 43%, 环己酮的产率为 31%, 反应中生成了己二酸. 烷基苯的氧化产物主要是苯甲酸, 难以停留在酮产物阶段.

2002 年, Minisci 等^[69]报道了一种 NHPI- $\text{Co}(\text{II})$ 催化剂, 使用氧气作为氧化剂, 在极性溶剂中, 可以氧化 *N* 邻位 C—H 键生成羰基化合物(醛、酮、羧酸、酰胺), 产物的类型取决于底物的类型和反应条件.

2008 年, Shaabani 等^[70]报道了一种酞菁 $\text{Co}(\text{II})$ 催化剂, 以溴化 1-丁基-3-甲基咪唑为溶剂, O_2 为氧化剂, 可以催化乙苯、丙苯、丁苯、二苯基甲烷、苄、2,3-二氢-1*H*-茚、1,2,3,4-四氢化萘和氧杂蒽氧化生成酮, 收率分别为 77%、78%、81%、83%、91%、84%、89%、93%.

2009 年, 何良年等^[71]使用醋酸钴作为催化剂, 氧气作为氧化剂, 氧化苄、1,2-二氢茚、1,2,3,4-四氢化萘、乙苯、丁苯和环己烷生成酮, 收率分别为 83%、58%、

73%、20%、13%、4%. 作者使用聚乙二醇氧化裂解产生自由基, 进而引发该氧化反应. 作者还发现超临界 CO_2 可以促进该氧化反应.

2013 年, 李斌栋等^[72]报道了一种二氧化硅负载的西弗碱钴, 在乙酸溶液中, 使用该席夫碱钴和 NHPI 作为催化剂, 以氧气为氧化剂, 可以氧化二苯基甲烷、2,3-二氢-1*H*-茚、1,2,3,4-四氢化萘、苄、1,2-二氢茚、乙苯、丙苯和丁苯生成酮, 转化率分别为 83%、70%、68%、70%、66%、98%、58%、52%, 选择性分别为 95%、99%、94%、96%、99%、99%、90%、91%. 在循环 5 次后, 催化剂的活性没有降低.

2014 年, Islam 等^[73]报道了一种聚合物固定的多相钴催化剂. 首先, 4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚(PAR)和氯甲基聚苯乙烯反应得到固定的有机配体(PS-PAR), 然后固定的有机配体和乙酸钴络合得到多相的 PS-PAR-Co (Scheme 8). 同时使用过氧化氢和氧气作为氧化剂, 可以氧化烷基苯、二苯基甲烷、苄、1,2-二氢茚、1,2,3,4-四氢化萘、2,3-二氢-1*H*-茚、苊-9(10*H*)-酮和氧杂蒽生成酮, 转化率为 80%~93%, 选择性为 90%~100%. 循环 6 次后, 催化剂的活性没有降低. 此外, 该催化剂能用于烯烃环氧化反应.

图式 8 PS-PAR-Co 催化剂的制备方法
Scheme 8 The preparation of PS-PAR-Co catalyst

2014 年, Shaabani 等^[74]通过一系列化学反应将 4,9,16,23-四氨基酞菁钴固定到纤维素上制备了一种多相钴催化剂. 在碱性条件(KOH)下, 以 NHPI 和该多相钴作为催化剂, 以邻二甲苯为溶剂, 以氧气为氧化剂, 加热回流, 可以氧化乙苯、丁苯、庚苯、氧杂蒽、1,2,3,4-四氢化萘、苯并二氢吡喃、2,3-二氢-1*H*-茚、二苯基甲烷和苄生成酮, 收率分别为 89%、85%、85%、91%、88%、91%、87%、82%. 循环 6 次后, 催化剂的活性没有降低.

2017 年, Stahl 等^[75]将 $\text{NHPI}/\text{Co}(\text{OAc})_2/\text{O}_2$ 体系应用于苄基型 C—H 键氧化生成酮的反应. 该体系可用于含有吡啶、苯并咪唑、噻吩等杂环的底物氧化生成酮的反应, 收率为 50%~94%.

6 Zn 催化体系

2012 年, 吴晓峰^[76]使用 ZnBr_2 作为催化剂, 过氧化氢作为氧化剂, 在酸性环境(三氟乙酸)中, 氧化二苯基甲烷类化合物、烷基苯、9,10-二氢蒽、氧杂蒽、4-苄基吡啶、2,3-二氢-1H-茛和茛生成酮, 收率为 18%~93% (Eq. 16).

7 Ce 催化体系

铈作为重要的稀土金属, 被广泛地应用于氧化反应. 二氧化铈可以通过 Ce^{3+} 和 Ce^{4+} 之间的氧化还原转变存储氧, 这种储氧能力和它的粒径大小、形状、形态以及表面积有关. 2012 年, Akhlaghinia 等^[77]报道了一种纳米二氧化铈催化剂, 以溴酸钾作为氧化剂, 可以将乙苯、1-乙基-4-甲基苯、对溴乙苯、二苯基甲烷、9,10-二氢蒽和 2-苄基吡啶氧化生成酮, 收率分别为 80%、85%、90%、95%、95%、95%.

通过在 CeO_2 中掺杂低价态的金属可以产生氧负离子. 2015 年, Chowdhury 等^[78]制备了一系列 Sm 掺杂的 CeO_2 催化剂($\text{Ce}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}_2$, $x=0\sim0.1$), 作者发现 Sm 的掺杂量为 5% 时, $\text{Ce}_{0.95}\text{Sm}_{0.05}\text{O}_2$ 对乙苯氧化具有最高的催化活性. 作者将 $\text{Ce}_{0.95}\text{Sm}_{0.05}\text{O}_2$ 应用于丁苯、二苯基甲烷、1,2,3,4-四氢化萘、环己烯和环戊烯氧化生成酮的反应, 转化率分别为 60%、71%、76%、98%、73%, 选择性分别为 100%、84%、90%、65%、100%.

8 Rh 催化体系

一般来讲, 可以发生自身单电子氧化还原过程的金属多被用来催化 C—H 键氧化反应, 比如 Fe ($\text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+}$), Cu ($\text{Cu}^+ \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+}$), Co ($\text{Co}^{2+} \rightleftharpoons \text{Co}^{3+}$)^[79~85]. 2004 年, Doyle 团队^[86]基于 Rh_2^{4+} 和 Rh_2^{5+} 之间的氧化还原转变, 开发了一种 $\text{Rh}_2(\text{cap})_4$ 催化剂. 使用叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 以二氯甲烷作为溶剂, 在碱性条件下, $\text{Rh}_2(\text{cap})_4$ 可以催化环己烯类化合物和环戊烯类化合物氧化生成酮, 收率为 60%~94% (Scheme 9). 2005 年, Doyle 团队^[87]在以往工作的基础上, 开发了 $\text{Rh}_2(\text{cap})_4/\text{TBHP}/\text{KHCO}_3$ 体系, 实现了乙苯类化合物、1,2,3,4-四

图式 9 $\text{Rh}_2(\text{cap})_4$ 催化 C—H 键氧化生成酮

Scheme 9 The oxidation of C—H bonds to ketones with $\text{Rh}_2(\text{cap})_4$ as catalyst

氢化萘类化合物、2,3-二氢-1H-茛类化合物、1,2,3,4-四氢喹啉类化合物、苯并二氢吡喃、二苯基甲烷、茛和氧杂蒽氧化生成酮的反应, 收率为 20%~99%.

2012 年, 卢崇道等^[88]在 Doyle 团队的工作的启发下, 设计、合成了一系列新型铑催化剂 $\text{Rh}_2(\text{sip})_4$, 作者依据相关实验数据给出了 $\text{Rh}_2(\text{sip})_4$ 的立体结构 (Eq. 17). $\text{Rh}_2(\text{sip})_4$ 能催化烷基苯、1,2,3,4-四氢化萘类化合物、二苯基甲烷、氧杂蒽和 9,10-二氢蒽氧化生成酮, 收率为 41%~97%.

2015 年, 王元桦等^[89]报道了一种 $\text{Rh}_2(\text{esp})_2$ 催化剂. 在 Doyle 团队报道的工作中, 催化剂 $\text{Rh}_2(\text{cap})_4$ 经历了 $\text{Rh}_2^{4+}/\text{Rh}_2^{5+}$ 单电子氧化还原转变, 进而催化 C—H 键氧化生成酮. $\text{Rh}_2(\text{esp})_2$ 并未被氧化成 $\text{Rh}_2(\text{esp})_2^+$, $\text{Rh}_2(\text{esp})_2$ 催化 C—H 键氧化生成酮, 并且 $\text{Rh}_2(\text{esp})_2$ 更稳定. 作者分离回收的 $\text{Rh}_2(\text{esp})_2$ 依然表现出很高的催化活性. 使用叔丁基过氧化氢(70%水溶液)作为氧化剂, $\text{Rh}_2(\text{esp})_2$ 可以催化烯丙基型和苄基型 C—H 键氧化生成酮.

9 Bi 催化体系

金属铋虽然是一种重金属, 但是铋具有很低的毒

性^[90~92]. 1998 年, Banik 等^[93]将铋酸钠用于苄基型 C—H 键的氧化, 铋酸钠作为钠盐沉淀之一, 溶解性很差, 这导致其用量大, 反应时间长. 2005 年, Barrent 等^[94]报道了一种 Bi/吡啶-2-甲酸/叔丁基过氧化氢体系. 以吡啶和乙酸混合液作为反应溶剂, 可以氧化烷基苯、烷基吡啶、2-乙基噻吩、1,2,3,4-四氢化萘、二苯基甲烷、茚类化合物、氧杂蒽、10,11-二氢-5*H*-二苯并[*a,d*][7]轮烯和 2,3-二氢-1*H*-茚生成酮, 收率为 48%~99%. 吡啶-2-甲酸和金属铋形成络合物, 促进了金属铋的溶解. 作者认为该氧化过程是一个自由基过程, 不经历 Bi(III)-Bi(V)的循环, 反应机理类似于 Gif-GoAgg 氧化反应.

10 Au 催化体系

金虽然是一种稀有元素, 但是其储量比钯、铂、铑等金属的储量大, 价格也相对便宜. 近年来, 金络合物被广泛地应用于 C—C 键、C—O 键、C—N 键、C—S 键和 C—F 键等化学键的构筑^[95~111]. 2009 年, 李焕荣等^[112]使用氯金酸钾作为催化剂, 以叔丁基过氧化氢为氧化剂, 氧化二苯基甲烷类化合物、茚、1,2,3,4-四氢化萘和 10,11-二氢-5*H*-二苯并[*a,d*][7]轮烯生成酮, 收率为 58%~99%.

11 Re 催化体系

甲基三氧化铼作为高效的催化剂被用于许多氧化反应中, 但是甲基三氧化铼使用麻烦, 并且价格昂贵^[113~116]. 2011 年, 朱成建等^[117]报道了一种 $\text{ReOCl}_3(\text{O-PPh}_3)(\text{SMe}_2)$ 催化剂, 使用叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 该催化剂可以催化烷基苯、二苯基甲烷类化合物、茚、2,3-二氢-1*H*-茚和 1,2,3,4-四氢化萘氧化生成酮, 收率为 34%~97%.

12 Pd 催化体系

2002 年, Corey 等^[118]使用 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ 作为催化剂, 以叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 在碱性条件(K_2CO_3)下, 氧化环戊-2-烯-1-基苯、2,3,4,5-四氢-1,1'-联苯、1-(叔丁基)环己-1-烯、环戊烯和环己烯生成酮, 收率分别为 71%、75%、85%、71%、79%.

2011 年, SanMartin 等^[119]报道了两种钯络合物(图 5), 分别为 NCN 型(Cat. 1)和 CNC 型(Cat. 2). 使用这两种钯络合物中的一种作为催化剂, 以氧气为氧化剂, 在聚乙二醇 400 中, 可以氧化乙苯、1,2-二苯基乙烷、氧杂蒽、9,10-二氢蒽、二苯基甲烷和茚生成酮, 使用 NCN 型钯络合物作为催化剂时, 收率分别为 93%、92%、76%、90%、60%、98%, 使用 CNC 型钯络合物作为催化剂时, 收率分别为 98%、89%、77%、95%、60%、94%.

图 5 NCN 型和 CNC 型钯络合物的结构

Figure 5 Structures of NCN and CNC pincer palladium complexes

13 Ag 催化体系

2012 年, Burri 等^[120]报道了一种 Ag/SBA-15 催化剂, 使用叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 可以氧化烷基苯、2-乙基萘、2-乙基蒽、二苯基甲烷、2,3-二氢-1*H*-茚、茚、环己烷、环庚烷和环辛烷生成酮, 转化率为 40%~99%, 选择性为 69%~99%.

14 KBr 催化体系

2008 年, Kita 等^[121]报道了一种在 KBr 和蒙脱石-K-10 的存在下, 亚碘酰苯氧化烷基苯、2,3-二氢-1*H*-茚、1,2,3,4-四氢化萘类化合物、二苯基甲烷、茚、氧杂蒽、蒽-9(10*H*)-酮、硫杂蒽和 4-苄基吡啶生成酮的方法, 收率为 43%~94%. 作者认为亚碘酰苯和溴化钾反应生成活性物种 **1**, 活性物种 **1** 分解产生溴自由基和自由基 **A**, 在蒙脱石-K-10 催化下, 自由基 **A** 将底物转变成碳自由基 **B**, 碳自由基 **B** 和溴自由基反应生成苄溴中间体 **2**, 苄溴中间体 **2** 水解产生仲醇, 仲醇被氧化生成酮 (Scheme 10).

图式 10 KBr 和蒙脱石-K-10 催化 C—H 键氧化反应的机理
Scheme 10 The reaction mechanism of the oxidation of C—H bonds with KBr and montmorillonite as catalyst

2012 年, Togo 等^[122]报道了两种基于溴化钾和过硫酸氢钾的催化氧化体系 (Scheme 11). 两种方法的反应条件为: (1) 0.5 equiv. 溴化钾, 3.0 equiv. 过硫酸氢钾作为氧化

剂, 硝基甲烷作为反应溶剂, 50 °C 反应 24 h. (2) 1.2 equiv. 溴化钾, 1.2 equiv. 过硫酸氢钾作为氧化剂, 二氯甲烷和水的混合溶液作为反应溶剂(二氯甲烷: 水=9:1), 光照, 室温反应 24 h. 方法(2)对于含有吸电子基的乙苯类化合物的氧化效果好于方法(1), 但是方法(2)对于甲苯类化合物氧化的选择性不好, 不能将氧化产物停留在醛, 而是氧化生成酸.

图式 11 基于溴化钾和过硫酸氢钾的 C—H 键的氧化

Scheme 11 The oxidation of C—H bonds based on KBr and oxone

15 非金属催化体系

2004 年, Hayashi 等^[123]使用活性炭作为催化剂, 用氧气作为氧化剂, 氧化 9*H*-苈-2-甲醛、2-硝基-9*H*-苈、*N*-(9*H*-苈基-2-基)乙酰胺、蒽-9(10*H*)-酮、9*H*-氧杂蒽、9*H*-硫杂蒽、二苯基甲烷生成酮, 收率分别为 77%、77%、71%、84%、94%、88%、26%.

2009 年, 王志勇等^[124]开发一种碘-吡啶催化体系, 使用叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 在碱性环境(碳酸钾)中, 可以氧化二苯基甲烷类化合物、苈、2-苈基吡啶、烷基苯类化合物氧化生成酮, 收率为 42%~99%.

2013 年, 马丁等^[125]报道了一种氮掺杂的碳材料, 使用叔丁基过氧化氢作为氧化剂, 可以氧化烷基苯类化合物、二苯基甲烷、苈、正己烷、环己烷生成酮, 收率为 7%~99%. 作者发现这种碳材料中氮含量对催化活性影响很大.

2015 年, 李浩等^[126]报道了一种含有磺酸钠基团的 TEMPO 催化剂, 使用 NaNO₂ 和 HCl 作为共催化剂, 以氧气作为氧化剂, 乙腈作为反应溶剂, 可以氧化氧杂蒽类化合物、吡啶类化合物、硫杂蒽和二苯基甲烷类化合物生成酮, 收率为 52%~92% (Eq. 18). 这种 TEMPO 催化剂能通过萃取回收, 作者对回收的 TEMPO 催化剂进行了 6 次循环试验, 催化活性没有降低.

2015 年, 沈振陆等^[127]报道了一种 DDQ/TBN/O₂ (TBN: 亚硝酸叔丁酯)催化氧化体系. DDQ 为催化剂, TBN 为 NO 来源, 活化分子氧. 该体系可以催化氧化二苯基甲烷类化合物生成酮, 收率为 65%~99% (Eq. 19).

2015 年, 高爽课等^[128]选择苈基吡啶类化合物作为反应底物, 以氧气作为氧化剂, 研究了 H₄NI-AcOH 协同催化吡啶侧链 C—H 键氧化生成酮的方法. 优化后的反应条件为: 5 mol% H₄NI, 10 mol% AcOH, 0.1 MPa 氧气, 无溶剂条件下, 100 °C 反应 24 h. 在优化的反应条件下, 多种 2-苈基吡啶类化合物和 4-苈基吡啶类化合物均能顺利地发生氧化反应, 生成相应的酮, 收率为 61%~97% (Scheme 12). 该方法具有优异的化学选择性, 不氧化底物中的苈位甲基、苈位乙基和甲硫基. 通过对反应机理的研究, 发现 AcOH 和苈基吡啶类化合物反应生成的盐促进了该氧化反应. 对照实验证明了 H₄NI 和 AcOH 协同催化的机理: 在 AcOH 的参与下, H₄NI 被氧气氧化成 I₂, I₂ 催化苈基吡啶类化合物氧化生成酮, AcOH 不仅参与了 H₄NI 被氧化成 I₂ 的过程, 还提高了该

图式 12 H₄NI-AcOH 协同催化 C—H 键氧化生成酮

Scheme 12 Oxidation of C—H bonds to ketones with H₄NI-AcOH as synergistic catalyst

氧化反应的选择性. 氧化剂是氧气, 而且不需要溶剂, 所以该氧化反应是非常绿色环保的. $\text{H}_4\text{NI-AcOH}$ 可以催化克级规模的放大实验, 具有非常好的实用性.

2015 年, 雷爱文等^[129]使用 9-苯基-10-甲基吡啶盐作为光催化剂, 氧气作为氧化剂, 在可见光的照射下, 氧化二苯基甲烷类化合物生成酮, 收率为 28%~77% (Eq. 20). 作者通过同位素标记实验证明了产物酮中的 O 来自于氧气.

2016 年, Shaabani 等^[130]使用氯磺酸和四甲基胍反应制备了一种 $\text{TMG-SO}_3\text{H}$ 催化剂, 使用溴酸钠作为氧化剂, $\text{TMG-SO}_3\text{H}$ 可以催化 2,3-二氢-1*H*-茚、乙苯、氧杂蒽、1,2,3,4-四氢化萘、二苯基甲烷和茚氧化生成酮, 收率分别为 96%、90%、80%、88%、99%、90%.

16 结论和展望

酮是一类非常重要的化工中间体, 无论是在实验室基础研究中, 还是工业化生产中都占有非常重要的地位. 虽然许多有机反应可以生成酮类化合物, 比如醇氧化反应、烯烃或炔烃氧化反应以及傅克反应等. 相比上述反应, C—H 键氧化生成酮具有反应路线短、原料价格低等优点. 以往文献报道的 C—H 键氧化生成酮的研究主要是烷基苯、二苯基甲烷类化合物、茚类化合物、氧杂蒽类化合物、环己烯类化合物和饱和烷烃的氧化. 迄今为止, 很少有文献报道杂环侧链 C—H 键氧化生成酮的方法, 含有杂环结构的酮又是十分重要的有机合成中间体, 因此杂环侧链 C—H 键氧化生成酮的研究具有重要的理论意义和应用背景.

References

- [1] Simandil, T. *Catalytic Activation of Dioxygen by Metal Complexes*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, **1992**, 1.
- [2] Suresh, A. K.; Sharmat, M. M.; Sridhar, T. *Ind. Eng. Chem. Res.* **2000**, 39, 3958.
- [3] Ertl, G.; Knozinger, H.; Weitkam, P. J. *Handbook of Heterogeneous Catalysis*, Wiley & Sons-VCH Publishers, Weinheim, **1997**.
- [4] Wang, L. H.; Li, H. Q.; Ke, M.; Zhao, S. Q.; Fan, Z. M. *Nat. Gas*

- Chem. Ind.* **2001**, 16, 53 (in Chinese).
- (王临红, 李红旗, 柯明, 赵锁奇, 范志明, 天然气化工, **2001**, 16, 53.)
- [5] Bernaard, M. *Chem. Rev.* **1992**, 92, 1411.
- [6] Dolphin, D.; Traylor, T. G.; Xie, L. Y. *Acc. Chem. Res.* **1997**, 30, 251.
- [7] Lu, P.; Feng, C.; Luo, D. P. *Acta Chim. Sinica* **2015**, 73, 1315 (in Chinese).
- (鲁平, 冯超, 罗德平, 化学学报, **2015**, 73, 1315.)
- [8] Chen, C.; Qiu, H. H. *Chin. J. Org. Chem.* **2016**, 36, 826 (in Chinese).
- (陈翠, 邱会华, 有机化学, **2016**, 36, 826.)
- [9] Xu, X.; Guan, Y. H.; Xu, D. C.; Li, X. S. *Chin. J. Org. Chem.* **2016**, 36, 850 (in Chinese).
- (徐星, 关耀辉, 徐东成, 李新生, 有机化学, **2016**, 36, 850.)
- [10] Hu, Z. Y.; Tong, X. F.; Liu, G. X. *Chin. J. Org. Chem.* **2015**, 35, 539 (in Chinese).
- (胡志勇, 童晓峰, 刘桂霞, 有机化学, **2015**, 35, 539.)
- [11] Lu, Q. Q.; Yi, H.; Lei, A. W. *Acta Chim. Sinica* **2015**, 73, 1245 (in Chinese).
- (陆庆全, 易红, 雷爱文, 化学学报, **2015**, 73, 1245.)
- [12] Shilov, A. E.; Shulpin, G. B. *Chem. Rev.* **1997**, 97, 2879.
- [13] Crabtree, R. H. *J. Organomet. Chem.* **2004**, 689, 4083.
- [14] Giri, R.; Shi, B. R.; Engle, K. M.; Mangel, N.; Yu, J. Q. *Chem. Soc. Rev.* **2009**, 38, 3242.
- [15] Dick, A. R.; Sanford, M. S. *Tetrahedron* **2006**, 62, 2439.
- [16] Kleemann, A.; Engel, J.; Kutscher, B.; Reichert, D. *Pharmaceutical Substances: Syntheses, Patents, Applications*, 4th ed., Georg Thieme, Stuttgart, **2001**.
- [17] Reis, D. C.; Pinto, M. C. X.; Souza-Fagundes, E. M.; Wardell, S. M. S. V.; Wardell, J. L.; Beraldo, H. *Eur. J. Med. Chem.* **2010**, 45, 3904.
- [18] Guyton, A. C.; Hall, J. E. *Textbook of Medical Physiology*, 11th ed., Philadelphia, PA, Elsevier Saunders, **2005**.
- [19] Easmon, J.; Heinisch, G.; Pürstinger, G.; Langer, T.; Österreich, J. K. *J. Med. Chem.* **1997**, 40, 4420.
- [20] Crook, K. E.; McElval, S. M.; McElvain, S. M. *J. Am. Chem. Soc.* **1930**, 52, 4006.
- [21] Huntress, E. H.; Walter, H. C. *J. Am. Chem. Soc.* **1948**, 70, 3702.
- [22] Watson, P. L. *J. Am. Chem. Soc.* **1983**, 21, 6491.
- [23] Barton, D. H. R.; Taylor, D. K.; Hu, B. *Tetrahedron Lett.* **1996**, 8, 1133.
- [24] Fridovich, I. *Science* **1978**, 201, 875.
- [25] Han, S.; Eltis, L. D.; Timmis, K. N.; Muchmore, S. W.; Bolin, J. T. *Science* **1995**, 270, 976.
- [26] Ford, P. C.; Fernandez, B. O.; Lim, M. D. *Chem. Rev.* **2005**, 105, 2439.
- [27] Barton, D. H. R.; Doller, D. *Acc. Chem. Res.* **1992**, 25, 504.
- [28] Barton, D. H. R. *Chem. Soc. Rev.* **1996**, 25, 237.
- [29] Stavropoulos, P.; C-Elenligil-C-Etin, R.; Tapper, A. E. *Acc. Chem. Res.* **2001**, 34, 745.
- [30] Perkins, M. J. *Chem. Soc. Rev.* **1996**, 25, 229.
- [31] Li, S. J.; Wang, Y. G. A. *Tetrahedron Lett.* **2005**, 46, 8013.
- [32] Chen, M. S.; White, M. C. *Science* **2010**, 327, 566.
- [33] Pieber, B.; Kappe, C. O. *Green Chem.* **2013**, 15, 320.
- [34] Szabó, F.; Pethó, B.; Gonda, Z.; Novák, Z. *RSC Adv.* **2013**, 3, 4903.
- [35] Napoly, F.; Kieffer, R.; Gérard, L. J.; Henry, C. G.; Draye, M.; Andrioletti, B. *Tetrahedron Lett.* **2015**, 56, 2517.
- [36] Fan, S.; Luan, Y.; Wang, J. J.; Gao, H. Y.; Zhang, X. W.; Wang, G. J. *Mol. Catal. A: Chem.* **2015**, 404~405, 186.
- [37] Al-Hunaiti, A.; Raisanen, M.; Repo, T. *Chem. Commun.* **2016**, 52, 2043.
- [38] Muhlendorf, B.; Wolf, R. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2016**, 55, 427.
- [39] Komiya, N.; Naota, T.; Murahashi, S. I. *Tetrahedron Lett.* **1996**, 37, 1633.
- [40] Velusamy, S.; Punniyamurthy, T. *Tetrahedron Lett.* **2003**, 44, 8955.
- [41] Wu, X. H.; Gorden, A. E. V. *Eur. J. Org. Chem.* **2009**, 503.
- [42] Li, Y. C.; Lee, T. B.; Wang, T. Y.; Gamble, A. V. Gorden, A. E. V. *J.*

- Org. Chem.* **2012**, 77, 4628.
- [43] Houwer, J. D.; Tehrani, K. A.; Maes, B. U. W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, 51, 2745.
- [44] Song, G. Q.; Lu, Y. X.; Zhang, Q.; Wang, F.; Ma, X. K.; Huang, X. F.; Zhang, Z. H. *RSC Adv.* **2014**, 4, 30221.
- [45] Ang, W. J.; Lam, Y. L. *Org. Biomol. Chem.* **2015**, 13, 1048.
- [46] Liu, J. M.; Zhang, X.; Yi H.; Liu, C.; Liu, R.; Zhang, H.; Zhuo, K. L.; Lei, A. W. C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, 54, 1261.
- [47] Lau, T. C.; Mak, C. K. *Chem. Commun.* **1995**, 943.
- [48] Che, C. M.; Cheng, K. W.; Chan, M. C. W.; Lau, T. C.; Mak, C. K. *J. Org. Chem.* **2000**, 65, 7996.
- [49] Yi, C. S.; Kwon, K. H.; Lee, D. W. *Org. Lett.* **2009**, 11, 1567.
- [50] Yusubov, M. S.; Zagulyaeva, A. A.; Zhdankin, V. V. *Chem. Eur. J.* **2009**, 15, 11091.
- [51] Kojima, M.; Oisaki, K.; Kanai, M. *Tetrahedron Lett.* **2014**, 55, 4736.
- [52] Dai, W. Li, J.; Li, G. S.; Yang, H.; Wang, L. Y.; Gao, S. *Org. Lett.* **2013**, 15, 4138.
- [53] Dai, W.; Shang, S. S.; Chen, B.; Li, s.; Wang, L. Y.; Ren, L. H.; Gao, S. *J. Org. Chem.* **2014**, 79, 6688.
- [54] Dai, W.; Li, G. S.; Chen, B.; Wang, L. Y.; Gao, S. *Org. Lett.* **2015**, 17, 904.
- [55] Dai, W.; Li, J.; Chen, B.; Li, G. S.; Lv, Y.; Wang, L. Y.; Gao, S. *Org. Lett.* **2013**, 15, 5658.
- [56] Dai, W.; Li, G. S.; Wang, L. Y.; Chen, B.; Shang, S. S.; Lv, Y.; Gao, S. *RSC Adv.* **2014**, 4, 46545.
- [57] Dai, W.; Mi, Y.; Lv, Y.; Chen, B.; Li, G. S.; Chen, G. G.; Gao, S. *Adv. Synth. Catal.* **2016**, 4, 667.
- [58] Dai, W.; Lv, Y.; Wang, L. Y.; Shang, S. S.; Chen, B.; Li, G. S.; Gao, S. *Chem. Commun.* **2015**, 51, 11268.
- [59] Lee, N. H.; Lee, C. S.; Jung, D. S. *Tetrahedron Lett.* **1998**, 39, 1385.
- [60] Pan, J. F.; Chen, K. J. *Mol. Catal. A: Chem.* **2001**, 176, 19.
- [61] Shing, T. K. M.; Yeung, Y. Y.; Su, P. L. *Org. Lett.* **2006**, 8, 3149.
- [62] Burange, A. S.; Kale, S. R.; Jayaram, R. V. *Tetrahedron Lett.* **2012**, 53, 2989.
- [63] Shen, D. Y.; Miao, C. X.; Wang, S. F. Xia, C. G.; Sun, W. *Org. Lett.* **2014**, 16, 1108.
- [64] Zou, C.; Zhao, M.; Wu, C. D. *Catal. Commun.* **2015**, 66, 116.
- [65] Shaabani, A.; Hezarkhani, Z.; Badali, E. *RSC Adv.* **2015**, 5, 61759.
- [66] Ren, L. H.; Wang, L. Y.; Lv, Y.; Shang, S. S.; Bo Chen, B.; Gao, S. *Green Chem.* **2015**, 17, 2369.
- [67] Ren, L. H.; Wang, L. Y.; Lü, Y.; Li, G. S.; Gao, S. *Chin. J. Catal.* **2016**, 37, 1216 (in Chinese).
(任兰会, 王连月, 吕迎, 李国松, 高爽, 催化学报, **2016**, 37, 1216.)
- [68] Ishii, Y.; Iwahama, T.; Sakaguchi, S.; Nakayama, K.; Nishiyama, Y. *J. Org. Chem.* **1996**, 61, 4520.
- [69] Minisci, F.; Punta, C.; Recupero, F.; Pedulli, F. F.; Franco, G. J. *Org. Chem.* **2002**, 67, 2671.
- [70] Shaabani, A.; Farhangi, E.; Rahmati, A. *Appl. Catal. A-Gen.* **2008**, 338, 14.
- [71] Wang, J. Q.; He, L. N. *New J. Chem.* **2009**, 33, 1637.
- [72] Chen, L.; Li, B. D.; Xu, Q. X.; Liu, D. B. *Chin. Chem. Lett.* **2013**, 24, 849 (in Chinese).
(陈磊, 李斌栋, 徐秀霞, 刘大斌, 中国化学快报, **2013**, 24, 849.)
- [73] Islam, S. M.; Ghosh, K.; Molla, R. A.; Roy, S. A.; Salam, N.; Iqbal, M. A. J. *Organomet. Chem.* **2014**, 774, 61.
- [74] Shaabani, A.; Keshipour, S.; Hamidzad, M.; Shaabani, S. J. *Mol. Catal. A: Chem.* **2014**, 395, 494.
- [75] Hruszkewycz, D. P.; Miles, K. C.; Thielb, O. R.; Stahl, S. S. *Chem. Sci.* **2017**, 8, 1282.
- [76] Wu, X. F. *Tetrahedron Lett.* **2012**, 53, 6123.
- [77] Akhlaghinia, B.; Ebrahimabadi, H.; Goharshadi, E. K.; Samiee, S. Rezazadeh, S. J. *Mol. Catal. A: Chem.* **2012**, 357, 67.
- [78] Pahari, S. K.; Pal, P.; Sinhamahapatra, A.; Saha, A.; Santra, C.; Ghosh, S. C.; Chowdhury, B.; Panda, A. B. *RSC Adv.* **2015**, 5, 45144.
- [79] Bien, S.; Segal, Y. J. *Org. Chem.* **1977**, 42, 1685.
- [80] Noels, A. F.; Hubert, A. J.; Teyssie, P. J. *Organomet. Chem.* **1979**, 166, 79.
- [81] Moody, C. J.; Palmer, F. N. *Tetrahedron Lett.* **2001**, 43, 139.
- [82] Doyle, M. P.; Westrum, L. J.; Wolthuis, W. N. E.; See, M. M.; Boone, W. P.; Bagheri, V.; Pearson, M. M. *J. Am. Chem. Soc.* **1993**, 115, 958.
- [83] Doyle, M. P.; Ren, T. *Chiral Dirhodium(II) Catalysts and Their Applications*, Wiley, New York, **2001**, 49, 113.
- [84] Das, K.; Kadish, K. M.; Bear, J. L. *Inorg. Chem.* **1978**, 17, 930.
- [85] Zhu, T. P.; Ahsan, M. Q.; Malinski, T.; Kadish, K. M.; Bear, J. L. *Inorg. Chem.* **1984**, 23, 2.
- [86] Catino, A. J.; Forslund, R. E.; Doyle, M. P. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, 126, 13622.
- [87] Catino, A. J.; Nichols, J. M.; Choi, H.; Gottipamula, S.; Doyle, M. P. *Org. Lett.* **2005**, 7, 5167.
- [88] Abudurehman, W.; Xiarepati, T.; Lu, C. D. *Eur. J. Org. Chem.* **2012**, 3088.
- [89] Wang, Y.; Kuang, Y.; Wang, Y. H. *Chem. Commun.* **2015**, 51, 5852.
- [90] Matano, Y.; Nomura, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, 123, 6443.
- [91] Firouzabadi, H.; Iranpoor, N.; Amani, K. *Synth. Commun.* **2004**, 34, 3587.
- [92] Salvador, J. A. R.; Silvestre, S. M. *Tetrahedron Lett.* **2005**, 46, 2581.
- [93] Banik, B. K.; Venkatraman, M. S.; Mukhopadhyay, C.; Becker, F. F. *Tetrahedron Lett.* **1998**, 39, 7247.
- [94] Bonvin, Y.; Callens, E.; Larrosa, I.; Henderson, D. A.; Oldham, J.; Burton, A. J.; Barrett, A. G. M. *Org. Lett.* **2005**, 7, 4549.
- [95] Hoffmann-Roder, A.; Krause, N. *Org. Biomol. Chem.* **2005**, 3, 387.
- [96] Cinellu, M. A.; Minghetti, G.; Cocco, F.; Stoccoro, S.; Zucca, A.; Manassero, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2005**, 44, 6892.
- [97] Hashmia, S. K.; Hutchings, G. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2006**, 45, 7896.
- [98] Li, Z.; Brouwer, C.; He, C. *Chem. Rev.* **2008**, 108, 3239.
- [99] Yao, T.; Zhang, X.; Larock, R. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, 126, 11164.
- [100] Sherry, B. D.; Toste, F. D. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, 126, 15978.
- [101] Wei, C.; Li, C. J. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, 125, 9584.
- [102] Zhang, L.; Kozmin, S. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, 126, 11806.
- [103] Yao, X.; Li, C. J. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, 126, 6884.
- [104] Teles, J. H.; Brode, S. Chabanas, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1998**, 37, 1415.
- [105] Arcadi, A.; Giuseppe, S. D.; Marinelli, F.; Rossi E. *Adv. Synth. Catal.* **2001**, 343, 443.
- [106] Shi, X.; Gorin, D. J.; Tosite, F. D. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, 127, 5802.
- [107] Zhang, L.; Kozmin, S. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, 127, 6962.
- [108] Mamane, V.; Gress, T.; Krause, H.; Furstner, A. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, 126, 8654.
- [109] Luzung, M. R.; Markham, J. P.; Toste, F. D. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, 126, 10858.
- [110] Yang, C. G.; He, C. J. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, 127, 6966.
- [111] Shapiro, N. D.; Toste, F. D. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, 129, 4160.
- [112] Li, H. R.; Li, Z. P.; Shi, Z. J. *Tetrahedron* **2009**, 65, 1856.
- [113] Kühn, F. E.; Santos, A. M.; Gonçalves, I. S.; Romão, C. C.; Lopes, A. D. *Appl. Organomet. Chem.* **2001**, 15, 43.
- [114] Ghorai, P.; Dussault, P. H. *Org. Lett.* **2009**, 11, 213.
- [115] Ghorai, P.; Dussault, P. H. *Org. Lett.* **2008**, 10, 4577.
- [116] Bernini, R.; Mincione, E.; Barontini, M.; Fabrizi, G.; Pasqualetti, M.; Tempesta, S. *Tetrahedron* **2006**, 62, 7733.
- [117] Peng, H.; Lin, A.; Zhang, Y.; Jiang, H. L.; Zhou, J. C.; Cheng, Y. X.; Zhu, C. J.; Hu, H. W. *ACS Catal.* **2012**, 2, 163.
- [118] Yu, J. Q.; Corey, E. J. *Org. Lett.* **2002**, 4, 2727.
- [119] Urgoiti, G.; SanMartin, R.; Herrero, M. T.; Domínguez, E. *Green Chem.* **2011**, 13, 2161.
- [120] Anand, N.; Reddy, K. H. P.; Prasad, G. V. S.; Rao, K. S. R.; Burri, D. R. *Catal. Commun.* **2012**, 23, 5.
- [121] Dohi, T.; Takenaga, N.; Takenaga, G. A.; Fujioka, H.; Kita, Y. J.

- Org. Chem.* **2008**, *73*, 7365.
- [122] Moriyama, K.; Takemura, M.; Togo, H. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 2414.
- [123] Kawabata, H.; Hayashi, M. *Tetrahedron Lett.* **2004**, *45*, 5457.
- [124] Zhang, J. T.; Wang, Z. T.; Wang, Y.; Wan, C. F.; Zheng, X. Q.; Wang, Z. Y. *Green Chem.* **2009**, *11*, 1973.
- [125] Gao, Y. J.; Hu, G.; Zhong, J.; Shi, Z. J.; Zhu, Y. S.; Su, D. S.; Wang, J. G.; Bao, X. H.; Ma, D. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 2109.
- [126] Zhang, Z. G.; Gao, Y.; Liu, Y.; Li, J. J.; Xie, H. X.; Li, H.; Wang, W. *Org. Lett.* **2015**, *17*, 5492.
- [127] Ma, J. Q.; Hu, Z. M.; Li, M. C.; Zhao, W. J.; Hua, X. Q.; Mo, W. M.; Hua, B. X.; Sun, N.; Shen, Z. L. *Tetrahedron* **2015**, *71*, 6733.
- [128] Ren, L. H.; Wang, L. Y.; Lü, Y.; Li, G. S.; Gao, S. *Org. Lett.* **2015**, *17*, 2078.
- [129] Yi, H.; Bian, C. L.; Hu, X.; Niua, L. B.; Lei, A. W. *Chem. Commun.* **2015**, *51*, 14046.
- [130] Shaabani, A.; Laeini, M. S.; Shaabani, S.; Seyyedhamzeh, M. *New J. Chem.* **2016**, *40*, 2079.

(Lu, Y.)