由 α -氨基亚甲基膦酸酯构建偕二胺衍生物

黄晓丽 任林静 蒲家志 贺春阳 姚秋丽*

(遵义医学院药学院 遵义 563000)

摘要 报道了由 α -氨基亚甲基膦酸酯构建膦酸酯的偕二胺衍生物的研究。在前期的研究中, 磺砒与磷酸二乙酯的反应主要生成产物 α -氨基亚甲基膦酸酯; 当降低磷酸二乙酯的用量时, 检测到另一副产物—— α -氨基亚甲基膦酸酯的偕二胺衍生物。研究表明这一类独特的化学结构具有潜在的抗癌活性, 但关于其合成的研究报道很少, 针对这一背景, 进一步研究了这一类型化合物的合成方法学。以石油醚作为溶剂, 在氢氧化锂碱性条件下, α -磺酰烷氨基甲酸酯与 α -烷氧酰胺亚甲基膦酸酯反应, 能以良好至优秀的产率顺利地合成 α -氨基亚甲基膦酸酯的偕二胺衍生物。该方法操作简便, 条件温和, 底物适用性广。

关键词 α -氨基亚甲基膦酸酯; 偕二胺衍生物; 磺砒

An Access to the *gem*-Diamine Derivatives from α -Carbamatemethylphosphonate

Huang, Xiaoli Ren, Linjing Pu, Jiazhi He, Chunyang Yao, Qiuli*

(School of Pharmacy, Zunyi Medical University, Zunyi, 563000)

Abstract The preparation of *gem*-diamine derivatives of phosphonates from α -carbamatemethylphosphonates is reported. In our earlier work, the reaction of sulfone with dialkylphosphonate gave α -carbamatemethylphosphonate as the major product. However, *gem*-diamine derivative of phosphonate was unexpectedly formed as a side product when decreasing the amount of dialkylphosphonate. Although few reports exist on the synthesis of this unique structure, *gem*-diamine derivatives have shown potential biological activity as an anti-cancer reagent. After optimization, a methodology for the synthesis of *gem*-diamine derivatives of α -carbamatemethylphosphonate is provided. The reaction of α -carbamatemethylsulfone with α -carbamatemethylphosphonate using LiOH as a base and commercial petroleum ether as solvent provided *gem*-diamine derivatives in good to excellent yields. This simple protocol runs under very mild conditions, and has a broad substrate scope.

Keywords α -carbamatemethylphosphonate; *gem*-diamine derivatives; sulfone

α -氨基膦酸是天然氨基酸的结构类似物(图 1), 这一类型化合物具有特殊的化学性质, 并且具有广泛多样的生物性质, 如抗菌性、抗 HIV、抗癌活性等等^[1~3], 因此, 其合成及活性研究一直是有机化学领域研究的热点^[4~6]。

在前期研究 α -氨基亚甲基膦酸酯 **3a** 由磺砒 **1a** 与磷酸二乙酯 **2a** 反应合成的过程当中^[7], 我们意外地发现将磷酸二乙酯 **2a** 的用量由 0.95 equiv. 降低至 0.5 equiv. 时, 该反应会以 26% 的分离产率生成偕二胺衍生物 **4a** (Eq. 1)。化合物 **4a** 独特的化学结构引起了我们的兴趣,

图 1 α -氨基酸和 α -氨基膦酸的结构

Figure 1 Structures of amino acids and their analogue α -aminophosphonic acids

研究表明偕二胺衍生物由于其活泼的偕二胺结构而具有丰富的生物学活性, 如作为抗癌试剂^[8,9]、糖苷酶抑制剂、糖基转移酶抑制剂^[10,11]、HIV-1 蛋白酶抑制剂^[12]、

* Corresponding author. E-mail: yaoqiuli@zmc.edu.cn

Received February 15, 2017; revised March 20, 2017; published online May 4, 2017.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21462056), the Science and Technology Foundation of Guizhou Province (No. [2014]7542) and the Education Department of Guizhou Province (No. 201610661006).

国家自然科学基金基金(No. 21462056)、贵州省联合基金(No. [2014]7542)及贵州省大学生创新(No. 201610661006)资助项目

Conditions 1: **2a** (0.95 equiv.), 4 h, **3a** isolated yield 72%, **4a** traces
 Conditions 2: **2a** (0.5 equiv.), 9 h, **3a** isolated yield 47%, **4a** isolated yield 26%

鸦片受体抑制剂等^[13,14], 其合成^[15-17]及活性研究是有机化学及生物化学的研究热点; 而 α -氨基亚甲基磷酸酯的偕二胺衍生物可作为激酶抑制剂表现出抗癌活性^[18,19]; 但是在文献中其合成研究的报道较少, 主要是对环状的偕二胺^[20-22]或二亚胺化合物进行磷酰化^[23]或者醛的缩合反应^[24,25]。基于上述背景, 我们决定进一步考察 α -氨基亚甲基磷酸酯偕二胺衍生物的合成方法学。

1 结果与讨论

我们首先以磺砜 **1a** 与磷酸二乙酯 **2a** (0.2 equiv.) 的反应来进行反应条件的筛选(表 1)。以 LiOH 为碱, EtOAc 为溶剂, 在室温下反应 9 h, 与 Eq. 1 结果一致的是, 进一步降低 **2a** 的用量能以更高的分离产率(41%)合成偕二胺衍生物 **4a** (表 1, Entry 1); 但是将 LiOH 换为碱性更弱的 K₂CO₃ 或碱性更强的 NaOH 或 KOH 均无产物或只获得 <5% 的产率(表 1, Entries 2~4)。将 **2a** 的用量降低至 0.14 equiv. 或升高至 0.25 或 0.33 equiv. 对产率的影响极少(表 1, Entries 5~7)。将溶剂换为极性更大的 DMF 或中等极性的 CH₃CN、丙酮或 THF 等, 产率均降低(表 1, Entries 8~11); 极性更小的 DCM、DCE、Et₂O 或甲苯作为溶剂产率也降低(表 1, Entries 12~15); 而使用极性很小的正己烷或石油醚时产率分别提高至 47% 和 50%(表 1, Entries 16, 17)。进一步以石油醚为溶剂, 将反应温度升高至 50 °C 或降低至 0 °C 均使产率降低(表 1, Entries 18, 19)。

从实验结果我们推测, 偕二胺衍生物 **4a** 可能是由中间产物 **3a** 与 **1a** 进一步反应而得到的, 因此, 我们用 α -氨基亚甲基磷酸酯 **3a** (0.25 equiv.) 代替磷酸二乙酯 **2a** 时反应 5 h 后薄层色谱(TLC)显示底物 **3a** 转化完全, 此时分离产率能提高至 83% (表 1, Entry 20), 理论上 **4a** 仍能继续与一分子或多分子 **1a** 反应生成三胺基或多胺基取代的磷酸酯, 不过在此条件下未分离得到这些副产物。

在获得以上优化结果的基础上, 我们进一步考察底物的适用性, 合成其他 α -氨基亚甲基磷酸酯的偕二胺衍生物(表 2)。以 Boc 或 Cbz 保护的氨基亚甲基磷酸酯

表 1 **1a** 与 **2a** 反应的条件筛选^a

Table 1 Condition screening for the reaction of **1a** with **2a**

$ \text{BocHN}-\text{CH}_2-\text{SO}_2\text{Ph} + \text{H}-\text{P}(\text{O})(\text{OEt})_2 \xrightarrow[\text{r.t.}]{\text{base, solvent}} \text{BocHN}-\text{CH}_2-\text{N}(\text{Boc})-\text{CH}_2-\text{P}(\text{O})(\text{OEt})_2 $				
Entry	Base	Solvent	Time/h	Yield ^b /%
1	LiOH	EtOAc	9	41
2	K ₂ CO ₃	EtOAc	9	<5
3	NaOH	EtOAc	9	<5
4	KOH	EtOAc	9	0
5 ^b	LiOH	EtOAc	9	41
6 ^c	LiOH	EtOAc	9	39
7 ^d	LiOH	EtOAc	9	39
8	LiOH	DMF	9	15
9	LiOH	CH ₃ CN	9	13
10	LiOH	CH ₃ COCH ₃	9	25
11	LiOH	THF	9	32
12	LiOH	DCM	9	14
13	LiOH	DCE	9	27
14	LiOH	Et ₂ O	9	30
15	LiOH	PhCH ₃	9	36
16	LiOH	<i>n</i> -Hexane	9	47
17	LiOH	Petroleum ether	9	50
18 ^e	LiOH	Petroleum ether	9	9
19 ^f	LiOH	Petroleum ether	9	20
20 ^g	LiOH	Petroleum ether	5	83

^a Reaction conditions: base (2 mmol), **1a** (1 mmol), **2a** (0.2 mmol), solvent (3 mL), at room temperature under Ar; isolated yield after column chromatography. ^b **2a** (0.14 mmol); ^c **2a** (0.25 mmol); ^d **2a** (0.33 mmol); ^e at 50 °C; ^f at 0 °C; ^g **3a** (0.25 mmol) was used instead of **2a**.

3a~**3e** 均可顺利地与苯磺砜 **1a** 或 **1b** 反应, 可获得良好的产率(49%~87%)。

考虑到使用对甲苯磺酰基(Ts)作为离去基团可能会由于苯环对位有给电性的甲基取代, 使得底物的活性有所降低, 从而提高这个底物的稳定性。因此 Ts 取代的底物 **1c**~**1f** 被用到底物拓展当中(表 3)。令人高兴的是, 无论是亚甲基磺砜(**1c**、**1d**, 产率 41%~86%)还是具有苯基或丁基或乙基取代的磺砜(**1e**~**1f**, 产率 55%~94%), 该类底物同样能顺利地转化为偕二胺衍生物 **4**, 产率普遍优秀, 从实验结果来看, 有苯基或丁基或乙基取代的磺砜反应的产率普遍比亚甲基磺砜高, 这可能与反应中间体的稳定性有关^[7]。该反应可能涉及 **1** 转化为亚胺中间体, 该中间体继续与 **3** 反应, 有苯基等取代的亚胺稳定性比无取代的亚胺要高, 因而前者产率高。

该反应的机理可能是在碱性条件下底物 **1** 的磺砜基离去形成亚胺中间体, 化合物 **3** 的酰胺基具有较弱的亲核性, 其与亚胺中间体反应进而得到最终产物偕二胺 **4**。

2 结论

综上所述, 本研究为 α -氨基亚甲基磷酸酯的偕二胺

表 2 苯磺砜 1 与 3 反应合成 4^a

Table 2 Preparation of **4** by the reaction of phenylsulfones **1** with **3**

^a Reaction conditions: LiOH (2 mmol), **1** (1 mmol), **3** (0.25 mmol), petroleum ether (3 mL) at room temperature under Ar, isolated yield after column chromatography.

表3 对甲苯磺砜 **1** 与 **3** 反应合成 **4**^a

Table 3 Preparation of **4** by the reaction of tolylsulfones **1** with **3**

R¹ = H, Pg = Boc (**1c**); R¹ = H, Pg = Cbz (**1d**); R¹ = Ph, Pg = Boc (**1e**); R¹ = Ph, Pg = Cbz (**1f**); R¹ = *n*-Bu, Pg = Boc (**1g**); R¹ = Et, Pg = Boc (**1h**)
R² = Et, Pg' = Boc (**3a**); R² = *n*-Bu, Pg' = Boc (**3b**); R² = Et, Pg' = Cbz (**3c**); R² = *n*-Bu, Pg' = Cbz (**3d**); R² = Me, Pg' = Cbz (**3e**); R² = Me, Pg' = Boc (**3f**)

^a Reaction conditions: LiOH (2 mmol), **1** (1 mmol), **3** (0.25 mmol), petroleum ether (3 mL), at room temperature under Ar; isolated yield after column chromatography.

衍生物提供了一种条件温和、操作简便、高产率的合成方法。本方法只需要以温和的氢氧化锂作为碱,使用无需特殊处理的石油醚作为溶剂,具有良好的底物适用性,为进一步对该类化合物化学及生物学活性的考察奠定了基础。

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

核磁共振仪为 Agilent-NMR-v NMRs 400 型, CDCl_3 为溶剂,以 TMS 为内标;高分辨质谱仪为 Thermo Scientific LTQ Orbitrap XL 型(ESI-HRMS)。薄层层析板和硅胶购自青岛海洋化工厂。氢氧化锂购自阿达玛斯试剂有限公司。所用试剂为分析纯级别,获得后直接使用,未纯化。

3.2 实验操作

取 25 mL 干燥的圆底烧瓶,在氩气保护下加入氢氧化锂(48 mg, 2 mmol)、化合物 **1** (271 mg, 1 mmol),再次抽换氩气后加入化合物 **3** (0.25 mmol)及石油醚(3 mL),室温下反应, TLC 显示反应完全之后过滤、浓缩,通过快速柱层析纯化[$V(\text{石油醚}) : V(\text{乙酸乙酯}) = 3 : 1$ 至 $1 : 1$]得到产物 **4**。由于产物 **4** 的酰胺键具有部分烯醇式的顺反异构体,因此该类化合物部分氢、碳以及磷显示不等价的信号;对于这些异构体同一个 H 或 C 或 P 的两个信号在文中用 and 来表示。

偕二胺 **4a**: 82 或 80 mg, 产率 83%或 80%, 无色油状物。 ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 5.55 (br s, 1H), 4.56 (s, 2H), 4.05~4.00 (m, 4H), 3.70 (d, $^2J_{\text{P-H}} = 8$ Hz, 2H, $\text{CH}_2\text{-P}$), 1.35 (s, 9H), 1.31 (s, 9H), 1.21~1.20 (m, 6H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 156.0, 154.6 (NHCO), 155.2, 154.2 (NCO), 80.5, 79.0, 62.0 (d, $^2J_{\text{P-C}} = 7$ Hz, P-O- CH_2) and 61.8 (d, $^2J_{\text{P-C}} = 6$ Hz, P-O- CH_2), 54.0 and 53.3 (N- $\text{CH}_2\text{-NH}$), 42.2 (d, $^1J_{\text{P-C}} = 157$ Hz, $\text{CH}_2\text{-P}$) and 41.3 (d, $^1J_{\text{P-C}} = 156$ Hz, $\text{CH}_2\text{-P}$), 28.0, 27.9, 16.1~16.0 (m); ^{31}P NMR (CDCl_3 , 162 MHz) δ : 23.2 and 22.9; IR (film) ν : 3348, 2927, 1703, 1248, 1154, 1053, 1026, 774 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{34}\text{N}_2\text{O}_7\text{P}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 397.2098, found 397.2097.

偕二胺 **4b**: 70 或 82 mg, 产率 60%或 71%, 无色油状物。 ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 5.54 (br s, 1H), 4.63 (s, 2H), 4.04~4.02 (m, 4H), 3.78 (d, $^2J_{\text{P-H}} = 8$ Hz, 2H, $\text{CH}_2\text{-P}$), 1.61 (br s, 4H), 1.43 (s, 9H), 1.39 (s, 9H), 1.35 (m, 4H), 0.90~0.88 (m, 6H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 156.0 and 155.0 (NHCO), 155.3 and 154.5 (NCO), 81.0, 79.6, 66.0 (d, $^2J_{\text{P-C}} = 6$ Hz, P-O- CH_2) and 65.8 (d, $^2J_{\text{P-C}} = 7$ Hz, P-O- CH_2), 54.5 and 53.8 (N- $\text{CH}_2\text{-NH}$), 42.6 (d,

$^1J_{\text{P-C}} = 157$ Hz, $\text{CH}_2\text{-P}$) and 41.8 (d, $^1J_{\text{P-C}} = 157$ Hz, $\text{CH}_2\text{-P}$), 32.53 (d, $^3J_{\text{P-C}} = 6$ Hz, P-O- $\text{CH}_2\text{-CH}_2$) and 32.46 (d, $^3J_{\text{P-C}} = 6$ Hz, P-O- $\text{CH}_2\text{-CH}_2$), 28.3, 18.6, 13.6; ^{31}P NMR (CDCl_3 , 162 MHz) δ : 23.3 and 23.0; IR (film) ν : 3353, 2962, 1703, 1248, 1154, 1062, 1025 cm^{-1} . HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{42}\text{N}_2\text{O}_7\text{P}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 453.2724, found 453.2723.

偕二胺 **4c**: 82 或 80 mg, 产率 77%或 74%, 无色油状物。 ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.33 (br s, 5H), 5.62 and 5.49 (s, 1H, NH), 5.15 and 5.13 (s, 2H, Ph- CH_2), 4.73~4.71 (m, 2H), 4.11~4.02 (m, 4H), 3.88 (d, $^2J_{\text{P-H}} = 8$ Hz, 2H, $\text{CH}_2\text{-P}$), 1.41 (s, 9H), 1.26~1.22 (m, 6H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 156.0 and 155.6 (NHCO), 155.8 and 155.4 (NCO), 136.1 and 135.8 (*ipso*-C), 128.53 and 128.49 (*meta*-CH), 128.2 (*para*-CH), 128.1 and 128.0 (*ortho*-CH), 79.9, 67.8, 62.4 (d, $^2J_{\text{P-C}} = 7$ Hz, P-O- CH_2) and 62.3 (d, $^2J_{\text{P-C}} = 7$ Hz, P-O- CH_2), 54.4 and 54.1 (N- $\text{CH}_2\text{-NH}$), 43.3 and 41.7 ($\text{CH}_2\text{-P}$), 28.3, 16.3 (d, $^3J_{\text{P-C}} = 5$ Hz, P-O- $\text{CH}_2\text{-CH}_3$); ^{31}P NMR (CDCl_3 , 162 MHz) δ : 23.8 and 23.3; IR (film) ν : 3358, 3063, 2927, 2363, 1708, 1245, 1158, 1053, 1026 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{32}\text{N}_2\text{O}_7\text{P}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 431.1942, found 431.1940.

偕二胺 **4d**: 87 mg, 产率 86%, 无色油状物。 ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.31 (s, 5H), 5.71 and 5.49 (s, 1H, NH), 5.12 and 5.11 (s, 2H, Ph- CH_2), 4.68 (s, 2H), 3.88 (d, $^2J_{\text{P-H}} = 8$ Hz, 2H, $\text{CH}_2\text{-P}$), 3.71 (d, $^3J_{\text{P-H}} = 12$ Hz, 3H, OCH₃), 3.61 (d, $^3J_{\text{P-H}} = 12$ Hz, 3H, OCH₃), 1.38 (s, 9H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 156.2 and 155.7 (NHCO), 155.7 and 155.4 (NCO), 136.0 and 135.8 (*ipso*-C), 128.52 and 128.49 (*meta*-CH), 128.3 (*para*-CH), 128.17 and 127.9 (*ortho*-CH), 80.00 and 79.95 (C(CH₃)₃), 67.9, 54.3 and 54.0 (N- $\text{CH}_2\text{-NH}$), 52.82 (d, $^2J_{\text{P-C}} = 12$ Hz, P-O-CH₃) and 52.76 (d, $^2J_{\text{P-C}} = 14$ Hz, P-O-CH₃), 42.0 (d, $^1J_{\text{P-C}} = 156$ Hz, $\text{CH}_2\text{-P}$), 28.2; ^{31}P NMR (CDCl_3 , 162 MHz) δ : 25.6 and 25.0; IR (film) ν : 3348, 3063, 2925, 1705, 1247, 1154, 1114, 1027 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{28}\text{N}_2\text{-O}_7\text{P}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 403.1629, found 403.1628.

偕二胺 **4e**: 68 mg 或 100 mg, 产率 56%或 82%, 无色油状物。 ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.31 (s, 5H), 5.69 and 5.54 (s, 1H, NH), 5.13 and 5.10 (s, 2H, Ph- CH_2), 4.70 (s, 2H), 4.01~3.95 (m, 4H), 3.87 (d, $^2J_{\text{P-H}} = 8$ Hz, 2H, $\text{CH}_2\text{-P}$), 1.57~1.53 (m, 4H), 1.38 (s, 9H), 1.33~1.21 (m, 4H), 0.87~0.85 (m, 6H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 156.0 and 155.5 (NHCO), 155.8 and 155.4 (NCO), 136.1 and 135.8 (*ipso*-C), 128.5, 128.2, 128.0 and

127.9 (*ortho*-CH), 79.8, 67.8, 66.1 (d, $^2J_{P-C}=7$ Hz, P-O-CH₂) and 65.9 (d, $^2J_{P-C}=7$ Hz, P-O-CH₂), 54.4 and 54.1 (N-CH₂-NH), 42.4 (d, $^1J_{P-C}=158$ Hz, CH₂-P), 32.4 (d, $^3J_{P-C}=6$ Hz, P-O-CH₂-CH₂), 28.2, 18.6, 13.5; ^{31}P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ : 22.8 and 22.4; IR (film) ν : 3391, 3071, 2925, 1707, 1252, 1143, 1075, 1040 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₄₀N₂O₇P [M+H]⁺ 487.2568, found 487.2567.

偕二胺 **4f**: 52 或 56 mg, 产率 49% 或 52%, 无色油状物。 ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.31 (br s, 5H), 5.96 (s, 1H), 5.13 and 5.07 (s, 2H, Ph-CH₂), 4.73~4.70 (m, 2H, NH-CH₂), 4.12~4.09 (m, 4H), 3.81 (d, $^2J_{P-H}=8$ Hz, 2H, CH₂-P), 1.42 (s, 9H), 1.28 (s, 3H), 1.22 (s, 3H); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 156.8 and 154.9 (NHCO), 156.1 and 154.4 (NCO), 136.2, 128.5, 128.1, 128.0, 81.2, 66.8, 62.4 (d, $^2J_{P-C}=6$ Hz, P-O-CH₂) and 62.2 (d, $^2J_{P-C}=6$ Hz, P-O-CH₂), 54.9 and 54.3 (N-CH₂-NH), 42.9 (d, $^1J_{P-C}=158$ Hz, CH₂-P) and 42.0 (d, $^1J_{P-C}=157$ Hz, CH₂-P), 28.2, 16.4 (d, $^3J_{P-C}=6$ Hz, P-O-CH₂-CH₃) and 16.3 (d, $^3J_{P-C}=5$ Hz, P-O-CH₂-CH₃); ^{31}P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ : 23.4 and 23.1; IR (film) ν : 3261, 3034, 2979, 1703, 1243, 1157, 1054, 1028 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₁₉H₃₂N₂O₇P [M+H]⁺ 431.1942, found 431.1942.

偕二胺 **4g**: 78 或 61 mg, 产率 68% 或 53%, 无色油状物。 ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.28 (s, 10H), 6.33 and 6.10 (s, 1H, NH), 5.12~5.05 (m, 4H), 4.80~4.76 (m, 2H, NH-CH₂), 4.08~3.97 (m, 4H), 3.89 (d, $^2J_{P-H}=12$ Hz, 2H, CH₂-P), 1.24~1.17 (m, 6H); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 157.0 and 155.7 (NHCO), 156.3 and 155.3 (NCO), 136.2, 136.1 and 135.8 (*ipso*-C), 128.5, 128.2~128.0 (m), 67.9, 66.9, 62.5 (d, $^2J_{P-C}=6$ Hz, P-O-CH₂) and 62.3 (d, $^2J_{P-C}=6$ Hz, P-O-CH₂), 54.8 and 54.5 (N-CH₂-NH), 42.6 (d, $^1J_{P-C}=157$ Hz, CH₂-P) and 42.5 (d, $^1J_{P-C}=156$ Hz, CH₂-P), 16.3 (d, $^3J_{P-C}=3$ Hz, P-O-CH₂-CH₃); ^{31}P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ : 22.8 and 22.3; IR (film) ν : 3358, 3065, 2925, 1712, 1243, 1180, 1054, 1025 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₂H₃₀N₂O₇P [M+H]⁺ 465.1785, found 465.1783.

偕二胺 **4h**: 113 或 81 mg, 产率 87% 或 62%, 无色油状物。 ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.33~7.32 (m, 10H), 6.07 and 5.92 (s, 1H, NH), 5.15~5.07 (m, 4H), 4.82~4.78 (m, 2H), 4.04~3.96 (m, 4H), 3.91 (d, $^2J_{P-H}=8$ Hz, 2H, CH₂-P), 1.59~1.54 (m, 4H), 1.36~1.30 (m, 4H), 0.91~0.86 (m, 6H); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 156.8 and 155.7 (NHCO), 156.2 and 155.3 (NCO), 136.1, 136.0

and 135.8 (*ipso*-C), 128.5, 128.3~128.0 (m), 67.9, 67.0, 66.1 (d, $^2J_{P-C}=7$ Hz, P-O-CH₂) and 66.0 (d, $^2J_{P-C}=6$ Hz, P-O-CH₂), 54.9 and 54.6 (N-CH₂-NH), 42.6 (d, $^1J_{P-C}=157$ Hz, CH₂-P) and 42.6 (d, $^1J_{P-C}=157$ Hz, CH₂-P), 32.5 (d, $^3J_{P-C}=6$ Hz, P-O-CH₂-CH₂), 18.6, 13.6; ^{31}P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ : 22.7 and 22.3; IR (film) ν : 3374, 3034, 2925, 1710, 1242, 1180, 1075, 1027 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₆H₃₈N₂O₇P [M+H]⁺ 521.2411, found 521.2410.

偕二胺 **4i**: 57 或 44 mg, 产率 52% 或 41%, 无色油状物。 ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.33~7.32 (m, 10H), 6.06 and 5.84 (s, 1H, NH), 5.15~5.08 (m, 4H), 4.80~4.76 (m, 2H), 3.92 (d, $^2J_{P-H}=8$ Hz, 2H, CH₂-P), 3.73 (d, $^3J_{P-H}=8$ Hz, 3H, OCH₃), 3.64 (d, $^3J_{P-H}=12$ Hz, 3H, OCH₃); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 156.9 and 155.7 (NHCO), 156.4 and 155.4 (NCO), 136.1, 135.9 and 135.8 (*ipso*-C), 128.5, 128.3, 128.2~128.0 (m), 68.1 and 68.0 (Ph-CH₂O-CON), 67.0, 54.8 and 54.5 (N-CH₂-NH), 52.9 (d, $^2J_{P-C}=6$ Hz, P-O-CH₃) and 52.8 (d, $^2J_{P-C}=6$ Hz, P-O-CH₃), 41.8 (d, $^1J_{P-C}=157$ Hz, CH₂-P); ^{31}P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ : 25.5 and 24.9; IR (film) ν : 3347, 3063, 2924, 1704, 1239, 1186, 1142, 1027 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₀H₂₆N₂O₇P [M+H]⁺ 437.1472, found 437.1470.

偕二胺 **4j**: 54 mg, 产率 54%, 无色油状物。 ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.33~7.31 (m, 5H), 5.90 and 5.83 (s, 1H, NH), 5.08 (s, 2H), 4.71 (s, 2H), 3.84 (d, $^2J_{P-H}=12$ Hz, 2H, CH₂-P), 3.75 (d, $^3J_{P-H}=8$ Hz, 6H, OCH₃), 1.44 (s, 9H); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 156.9 and 154.9 (NHCO), 156.3 and 154.5 (NCO), 136.1, 128.5, 128.2, 128.1, 81.5, 67.0, 54.9 and 54.3 (N-CH₂-NH), 53.0~52.8 (m, P-O-CH₃), 42.2 (d, $^1J_{P-C}=158$ Hz, CH₂-P) and 41.5 (d, $^1J_{P-C}=154$ Hz, CH₂-P), 28.2; ^{31}P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ : 26.0 and 25.5; IR (film) ν : 3335, 3058, 2926, 1703, 1243, 1155, 1030 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₁₇H₂₈N₂O₇P [M+H]⁺ 403.1629, found 403.1629.

偕二胺 **4k**: 61 mg, 产率 55%, 无色油状物。 ^1H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.35~7.26 (m, 5H), 6.70~6.65 (s, 1H, NH), 6.65 (s, 1H), 4.03~4.01 (m, 1H), 3.76 (d, $^3J_{P-H}=12$ Hz, 3H, OCH₃), 3.69 (d, $^3J_{P-H}=8$ Hz, 3H, OCH₃), 3.23 (br s, 1H), 1.46 (s, 9H), 1.39 (s, 9H); ^{13}C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 155.0, 154.6, 138.3, 128.5, 127.8, 126.2, 81.7, 79.7, 66.4, 53.0 (d, $^2J_{P-C}=5$ Hz, P-O-CH₃) and 52.7 (d, $^2J_{P-C}=5$ Hz, P-O-CH₃), 39.6 (d, $^1J_{P-C}=168$ Hz, CH₂-P), 28.4, 28.1; ^{31}P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ : 26.4 and 26.0; IR (film) ν : 3348, 3061, 2962, 1710, 1246, 1160, 1064, 1024 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₀H₃₄N₂-

O₇P [M+H]⁺ 445.2098, found 445.2098.

偕二胺 **4l**: 84 mg, 产率 70%, 无色油状物. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ: 7.33~7.26 (m, 10H), 6.88~6.77 (m, 2H), 5.18 (s, 2H), 4.05 (br s, 1H), 3.64 (d, ³J_{P-H}=12 Hz, 6H, OCH₃), 3.25 (br s, 1H), 1.46 (s, 9H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ: 155.6, 155.0, 137.6, 135.9, 128.7, 128.4, 128.1, 127.8, 126.3, 79.9, 68.1, 67.4 and 66.3 (N-CH-NH), 53.2~52.8 (m, P-O-CH₃), 40.0 (d, ¹J_{P-C}=164 Hz, CH₂-P), 28.4; ³¹P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ: 25.8 and 25.0; IR (film) ν: 3329, 3063, 2925, 2359, 1705, 1247, 1143, 1091, 1029 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₃₂N₂O₇P [M+H]⁺ 479.1942, found 479.1941.

偕二胺 **4m**: 84 mg, 产率 73%, 无色油状物. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ: 5.92 (br s, 1H, NH), 5.39~5.16 (m, 1H, NH-CH), 4.17~4.08 (m, 4H), 3.97 (br s, 1H), 3.54 (br s, 1H), 1.83~1.81 (m, 2H), 1.47 (s, 9H), 1.42 (s, 9H), 1.33~1.29 (m, 10H), 0.88 (t, ³J_{H-H}=12 Hz, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ: 154.9, 154.6, 80.9, 79.2, 64.4 (m, N-CH-NH), 62.4~62.1 (m, P-O-CH₂), 38.6 (d, ¹J_{P-C}=160 Hz, CH₂-P), 33.6, 28.29, 28.26, 28.0, 22.2, 16.40~16.38 (m, P-O-CH₂-CH₃), 13.9; ³¹P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ: 23.9 and 23.2; IR (film) ν: 3372, 2925, 1702, 1247, 1180, 1068, 1029 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₀H₄₂N₂O₇P [M+H]⁺ 453.2724, found 453.2724.

偕二胺 **4n**: 100 mg, 产率 79%, 无色油状物. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ: 5.95 (br s, 1H, NH), 5.40~5.14 (m, 1H, NH-CH), 4.06~3.99 (m, 5H P-O-CH₂ and P-CH₂), 3.55 (br s, 1H, P-CH₂), 1.89~1.77 (m, 2H), 1.67~1.59 (m, 4H), 1.46 (s, 9H), 1.41 (s, 9H), 1.39~1.33 (m, 4H), 1.30~1.24 (m, 4H), 0.93~0.86 (m, 9H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ: 154.9, 154.6, 80.9, 79.2, 66.1~65.9 (m, P-O-CH₂), 64.4~64.2 (m, N-CH-NH), 39.3 (d, ¹J_{P-C}=208 Hz, CH₂-P), 33.7, 32.6~32.5 (m, P-O-CH₂-CH₂), 28.32, 28.29, 28.1, 22.3, 18.7, 14.0, 13.6; ³¹P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ: 23.9 and 23.3; IR (film) ν: 3305, 2961, 1699, 1244, 1178, 1066, 1024 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₄H₅₀N₂O₇P [M+H]⁺ 509.3350, found 509.3350.

偕二胺 **4o**: 70 mg, 产率 66%, 无色油状物. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ: 5.77 (br s, 1H), 5.31~5.17 (m, 1H, NH-CH), 3.95~3.93 (m, 1H), 3.76~3.72 (m, 6H), 3.58~3.56 (m, 1H), 2.04~1.75 (m, 2H), 1.46 (s, 9H), 1.41 (s, 9H), 1.30~1.22 (m, 4H), 0.87 (t, ³J_{H-H}=6 Hz, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ: 155.0, 154.4, 81.1, 79.4, 64.9~64.7 (m, NH-CH), 53.0~52.7 (m, P-O-CH₃), 38.7

(d, ¹J_{P-C}=154 Hz, CH₂-P), 33.6, 28.30, 28.28, 28.0, 22.2, 14.0; ³¹P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ: 26.3; IR (film) ν: 3308, 2927, 1721, 1245, 1179, 1038, 867 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₁₈H₃₈N₂O₇P⁺ [M+H] 425.2411, found 425.2410.

偕二胺 **4p**: 105 mg, 产率 86%, 无色油状物. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ: 7.35~7.26 (m, 5H), 5.82 (br s, 1H), 5.47~5.15 (m, 3H), 4.06~4.01 (m, 5H), 3.62 (br s, 1H), 2.08~1.78 (m, 2H), 1.40 (s, 9H), 1.25~1.23 (m, 10H), 0.85 (s, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ: 155.7, 154.8, 136.2, 128.4, 128.1, 128.0, 79.6, 67.6, 64.7, 62.3, 42.9 (d, ¹J_{P-C}=165 Hz, CH₂-P) and 39.8 (d, ¹J_{P-C}=146 Hz, CH₂-P), 33.6 and 33.2 (CH₂-CH-NH), 28.3, 28.1, 22.2, 16.3 (d, ³J_{P-C}=6 Hz, P-O-CH₂-CH₃), 14.0; ³¹P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ: 23.3 and 22.4; IR (film) ν: 3331, 3065, 2927, 1708, 1217, 1166, 1028 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₃H₄₀N₂O₇P [M+H]⁺ 487.2568, found 487.2563.

偕二胺 **4q**: 123 mg, 产率 91%, 无色油状物. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ: 7.35~7.26 (m, 5H), 5.87 (br s, 1H), 5.46~5.15 (m, 3H), 4.00~3.96 (m, 5H), 3.64 (s, 1H), 1.89~1.80 (m, 2H), 1.59~1.53 (m, 4H), 1.41 (s, 9H), 1.35~1.24 (m, 8H), 0.91~0.87 (m, 9H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ: 155.5, 154.9, 136.2, 128.4, 128.05, 127.95, 79.5, 67.6, 66.1~65.9 (m, P-O-CH₂), 64.6, 42.8 (d, ¹J_{P-C}=162 Hz, CH₂-P) and 39.7 (d, ¹J_{P-C}=142 Hz, CH₂-P), 33.7 and 33.2 (CH₂-CH-NH), 32.5~32.4 (m, P-O-CH₂-CH₂), 28.3, 28.1, 22.2, 18.6, 14.0, 13.6; ³¹P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ: 23.3 and 22.5; IR (film) ν: 3303, 3065, 2960, 1713, 1242, 1174, 1066, 1027 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₇H₄₈N₂O₇P [M+H]⁺ 543.3194, found 543.3195.

偕二胺 **4r**: 107 mg, 产率 93%, 无色油状物. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ: 7.37~7.26 (m, 5H), 5.70 (br s, 1H), 5.16~5.14 (m, 3H), 3.98 (br s, 1H), 3.68~3.66 (m, 7H), 2.02~1.77 (m, 2H), 1.41 (s, 9H), 1.28 (br s, 4H), 0.85 (br s, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ: 155.5, 155.0, 136.1, 128.5, 128.1, 128.0, 79.7, 67.7, 65.0, 52.8 (d, ²J_{P-C}=6 Hz, P-O-CH₃), 42.3 (d, ¹J_{P-C}=162 Hz, CH₂-P) and 39.6 (d, ¹J_{P-C}=157 Hz, CH₂-P), 33.6 and 33.2 (CH₂-CH-NH), 28.3, 28.1, 22.2, 13.9; ³¹P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ: 25.8 and 24.9; IR (film) ν: 3454, 3066, 2925, 1712, 1245, 1180, 1142, 1039 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₁H₃₆N₂O₇P [M+H]⁺ 459.2255, found 459.2254.

偕二胺 **4s**: 81 mg, 产率 77%, 无色油状物. ¹H NMR

(CDCl₃, 400 MHz) δ : 5.88 (s, 1H), 5.27~5.09 (m, 1H, NH), 4.16~4.06 (m, 4H), 3.99 (br s, 1H), 3.53 (br s, 1H), 1.81 (br s, 2H), 1.46 (s, 9H), 1.41 (s, 9H), 1.31~1.28 (m, 6H), 0.91~0.88 (m, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 155.0, 154.5, 80.9, 79.2, 67.8~65.8 (m, NH-CH), 62.4~62.1 (m, P-O-CH₂), 39.0 (d, ¹J_{P-C}=154 Hz, CH₂-P), 28.29, 28.26, 27.1, 16.4~16.3 (m, P-O-CH₂-CH₃), 10.4; ³¹P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ : 25.7 and 24.8; IR (film) ν : 3308, 2927, 1722, 1242, 1144, 1054, 1029 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₁₈H₃₈N₂O₇P [M+H]⁺ 425.2411, found 425.2412.

偕二胺 **4t**: 92 mg, 产率 87%, 无色油状物. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 5.92 (br s, 1H), 5.28~5.03 (m, 1H, NH), 4.03~4.01 (m, 5H), 3.52 (br s, 1H), 1.79 (br s, 2H), 1.60 (br s, 4H), 1.44 (s, 9H), 1.39 (s, 9H), 1.35~1.33 (m, 4H), 0.90~0.88 (m, 9H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 155.0, 154.6, 80.9, 79.2, 67.8 (br s, NH-CH), 66.1~65.8 (m, P-O-CH₂), 38.7 (d, ¹J_{P-C}=163 Hz, CH₂-P), 32.5~32.4 (m, P-O-CH₂-CH₂), 28.3, 28.2, 27.1, 18.6, 13.5, 10.3; ³¹P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ : 23.8 and 23.2; IR (film) ν : 3307, 2963, 1721, 1242, 1146, 1069, 1026 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₂H₄₆N₂O₇P [M+H]⁺ 481.3037, found 481.3037.

偕二胺 **4u**: 108 mg, 产率 94%, 无色油状物. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.35~7.26 (m, 5H), 5.81 (br s, 1H), 5.37~5.02 (m, 3H), 4.06~4.04 (m, 5H), 3.62 (br s, 1H), 1.83 (br s, 2H), 1.41 (s, 9H), 1.23 (br s, 6H), 0.9 (br s, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 155.4, 155.0, 136.2, 128.4, 128.1, 127.9, 79.6, 67.6, 68.7 and 66.2 (N-CH-NH), 62.3 (d, ²J_{P-C}=5 Hz, P-O-CH₂), 42.9 (d, ¹J_{P-C}=158 Hz, CH₂-P) and 40.0 (d, ¹J_{P-C}=160 Hz, CH₂-P), 28.3, 27.2 and 26.6 (CH₂-CH-NH), 16.3 (d, ³J_{P-C}=6 Hz, P-O-CH₂-CH₃), 10.4; ³¹P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ : 23.2 and 22.4; IR (film) ν : 3342, 3063, 2927, 1705, 1240, 1143, 1028, 965 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₁H₃₆N₂O₇P [M+H]⁺ 459.2255, found 459.2255.

偕二胺 **4v**: 99 mg, 产率 92%, 无色油状物. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.31~7.24 (m, 5H), 5.73 (s, 1H), 5.29~4.97 (m, 3H), 3.97~3.95 (m, 1H), 3.64~3.62 (m, 7H), 1.76 (br s, 2H), 1.37 (s, 9H), 0.85 (br s, 3H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 155.6, 155.0, 136.1, 128.5, 128.1, 128.0, 79.7, 67.7, 68.8 and 66.4 (N-CH-NH), 52.8 (d, ²J_{P-C}=4 Hz, P-O-CH₃), 42.2 (d, ¹J_{P-C}=154 Hz, CH₂-P) and 39.5 (d, ¹J_{P-C}=153 Hz, CH₂-P), 28.3, 27.2 and 26.5 (CH₂-CH-NH), 10.4; ³¹P NMR (CDCl₃, 162

MHz) δ : 25.7 and 24.8; IR (film) ν : 3521, 3079, 2925, 1723, 1221, 1142, 1075 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₁₉H₃₂N₂O₇P [M+H]⁺ 431.1942, found 431.1942.

偕二胺 **4w**: 116 mg, 产率 90%, 无色油状物. ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ : 7.35~7.26 (m, 5H), 5.86 (br s, 1H), 5.40~5.04 (m, 3H), 4.00~3.98 (m, 5H), 3.63 (br s, 1H), 1.87 (br s, 2H), 1.58~1.56 (m, 4H), 1.42 (s, 9H), 1.34~1.25 (m, 4H), 0.90~0.88 (m, 9H); ¹³C NMR (CDCl₃, 100 MHz) δ : 155.0, 154.4, 136.2, 128.5, 128.1, 127.9, 79.6, 68.7, 67.7~67.5 (m, NH-CH-N), 66.2~66.0 (m, P-O-CH₂), 42.7 (d, ¹J_{P-C}=164 Hz, CH₂-P) and 39.8 (d, ¹J_{P-C}=167 Hz, CH₂-P), 32.5 (d, ³J_{P-C}=2 Hz, P-O-CH₂-CH₂) and 32.4 (d, ³J_{P-C}=2 Hz, P-O-CH₂-CH₂), 28.3, 27.1 and 26.5 (CH₂-CH-NH), 18.6 (d, ⁴J_{P-C}=2 Hz, P-O-CH₂-CH₂-CH₂), 13.6, 10.4; ³¹P NMR (CDCl₃, 162 MHz) δ : 23.3 and 22.5; IR (film) ν : 3451, 3064, 2926, 1710, 1240, 1179, 1075, 1025 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₂₅H₄₄N₂O₇P [M+H]⁺ 515.2881, found 515.2882.

辅助材料(Supporting Information) 新化合物偕二胺 **4** 的核磁谱图. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] Kukuhar, V. P.; Hudson, H. R. *Aminophosphorus Acids and Aminophosphinic Acids*, Wiley, Chichester (UK), 2000.
- [2] Orsini, F.; Sello, G.; Sisti, M. *Curr. Med. Chem.* **2010**, *17*, 264.
- [3] Galezowska, J.; Gumienna-Kontecka, E. *Coord. Chem. Rev.* **2012**, *256*, 105.
- [4] Wang, L.; Shen, Q.; Lu, L. *Chin. J. Chem.* **2013**, *31*, 892.
- [5] Gu, L.; Wang, R.; Huang, X.; Jin, C. *Chin. J. Chem.* **2012**, *30*, 2483.
- [6] Cai, Z.; Fan, Y.; Du, G.; He, L. *Chin. J. Chem.* **2012**, *30*, 1658.
- [7] Huang, X. L.; Ren, L. J.; Sajjad Ali; Pu, J. Z.; Yao, Q. L. *Chin. J. Org. Chem.* **2017**, *37*, 2073 (in Chinese).
(黄晓丽, 任林静, Sajjad Ali, 蒲家志, 姚秋丽, 有机化学, **2017**, *37*, 2073.)
- [8] Carriero, M. V.; De R., M.; Pavone, V. *US 8354374*, **2013** [Chem. Abstr. **2013**, *166*, 368674].
- [9] Sanchez-Fernandez, E. M.; Goncalves-Pereira, R.; Riquez-Cuadro, R.; Plata, G. B.; Padron, J. M.; Garcia F. J. M.; Ortiz M. C. *Carbohydr. Res.* **2016**, *429*, 113.
- [10] Nishimura, Y. *J. Antibiot.* **2009**, *62*, 407.
- [11] Nishimura, Y.; Shitara, E.; Adachi, H.; Toyoshima, M.; Nakajima, M.; Okami, Y.; Takeuchi, T. *J. Org. Chem.* **2000**, *65*, 2.
- [12] Marastoni, M.; Bortolotti, F.; Salvadori, S.; Tomatis, R. *Arzneim. Forsch.* **1998**, *48*, 709.
- [13] Kondo, M.; Kitajima, H.; Yasunaga, T.; Kodama, H.; Costa, T.; Shimohigashi, Y. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **1995**, *68*, 3161.
- [14] Chorev, M.; Goodman, M. *Acc. Chem. Res.* **1993**, *26*, 266.
- [15] Yang, J.; Chu, X.; Ji, S. *Chin. J. Org. Chem.* **2014**, *34*, 2462 (in Chinese).
(杨锦明, 褚雪强, 纪顺俊, 有机化学, **2014**, *34*, 2462.)
- [16] Zhang, S.; Cha, L.; Li, L.; Hu, Y.; Li, Y.; Zha, Z.; Wang, Z. *J. Org. Chem.* **2016**, *81*, 3177.
- [17] Sanchez-F. E. M.; Alvarez, E.; Ortiz M. C.; Garcia F. J. M. *J. Org.*

- Chem.* **2014**, 79, 117228.
- [18] Cannizzaro, C.; Chen, J. M.; Chen, X.; Cho, A.; Chong, L. S.; Desai, M.; Fardis, M.; Kirschberg, T.; Mackman, R. L.; Swaminathan, S.; Watkins, W. J. *US 7417055B2*, **2004** [*Chem. Abstr.* **2004**, 149, 307869].
- [19] Yan, W.; Stone, E.; Zhang, Y. *Biochemistry* **2017**, 56, 876.
- [20] Studer, A.; Seebach, D. *Heterocycles* **1995**, 40, 357.
- [21] Katritzky, A. R.; Suzuki, K.; He, H. *J. Org. Chem.* **2002**, 67, 3109.
- [22] Schickll, C. P.; Seebach, D. *Liebigs Ann. Chem.* **1991**, 655.
- [23] Pudovik, A. N.; Shagidullin, R. R.; Khairullin, V. K.; Vandyukova, I. I.; Chernova, A. V.; Gainullin, R. M.; Pudovik, M. A. *Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim.* **1996**, 1303.
- [24] Bailly, T.; Burgada, R. *Phosphorus. Sulfur. Silicon. Relat. Elem.* **1995**, 101, 131.
- [25] Viveros-Ceballos, J.; Ordonez, M.; Sayago, F. J.; Jimenez, A. I.; Cativiela, C. *Eur. J. Org. Chem.* **2016**, 2711.

(Lu, Y.)