烯醇硅醚经三氯甲基自由基加成串联消除反应合成 β,β -二氯- α,β -不饱和酮

葛浩程 杜科莹 盛卫坚*

(浙江工业大学化学工程学院 杭州 310014)

摘要 以二叔丁基过氧化物(DTBP)作氧化剂, 氯仿或四氯化碳作三氯甲基自由基源及反应溶剂, 由芳酮衍生的烯醇硅醚经自由基加成串联消除反应合成了 β,β -二氯- α,β -不饱和酮, 反应无需金属催化剂, 条件温和, 烯醇硅醚底物具有良好的普适性。

关键词 三氯甲基自由基; 烯醇硅醚; β,β -二氯- α,β -不饱和酮

Synthesis of β,β -Dichloro- α,β -unsaturated Ketones by Trichloromethyl Radical Addition/Elimination of Enol Silyl Ethers

Ge, Haochen Du, Keying Sheng, Weijian*

(College of Chemical Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014)

Abstract Using di-*tert*-butyl peroxide (DTBP) as oxidant, chloroform or carbon tetrachloride as trichloromethyl radical source and reaction solvent, enol silyl ethers derived from aryl ketone was transferred to β,β -dichloro- α,β -unsaturated ketone by trichloromethyl radical addition/elimination. The conditions are mild with avoiding the use of metal catalysts, and the enol silyl ethers substrate has good universality.

Keywords trichloromethyl radical; enol silyl ethers; β,β -dichloro- α,β -unsaturated ketone

α,β -不饱和羰基骨架通过区域或立体选择性的化学转化可构建多种多样的化合物^[1], β,β -二氯- α,β -不饱和酮因 β 位氯原子的存在, 在后续转化中增添了更多的可能, 但至今其合成方法并不多^[2]. 烯醇硅醚由于包含一个富电子的双键, 具有很好的与亲电试剂反应的活性, 等同于酮类似物, 可通过 Aldol 缩合^[3]、Mannich 反应^[4]、烯丙基化反应^[5]、Michael 加成^[6]、与多氟烷基亲电试剂反应^[7]等在酮的 α 位引入各种基团. 自由基具有反应活性高、来源广泛的特点, 自由基对烯醇硅醚双键加成同样具有很好的反应活性. 氮自由基^[8]、氧自由基^[9]、硫自由基^[10]、碳自由基^[11]对烯醇硅醚双键的加成再经后继转化的文献大量涌现, 其中由卤代烃脱去卤素生成烷基自由基^[12]的研究工作获得了广泛报道.

氯仿(CHCl_3)和四氯化碳(CCl_4)是常见溶剂, 同时也是很好的多氯甲基自由基源, 在自由基引发剂或光催化剂作用下产生多氯甲基自由基, 参与后续反应^[13]. 设想以烯醇硅醚为反应底物, 氯仿或四氯化碳作为三氯甲基

自由基源, 对烯醇硅醚双键进行加成, 脱去硅基得到 α -三氯甲基酮, 进一步脱去一分子氯化氢得到 β,β -二氯- α,β -不饱和酮化合物. 实验证明, 这个研究策略可行, 多数烯醇硅醚能以良好收率获得目标产物. 1-芳基-1-三甲基硅氧基乙烯衍生物 **1** 的合成路线见 Eq. (1).

1 结果与讨论

1.1 氯仿为试剂时反应条件的优化

以 1-苯基-1-三甲硅氧基乙烯(**1a**)为底物, 以氯仿为三氯甲基自由基源及溶剂, 反应温度 110 °C, 对反应进行了研究, 结果见表 1.

首先考察了氧化剂对反应的影响(Entries 1~5). 其中以二叔丁基过氧化物(DTBP)为优选, 当选择 2.5

* Corresponding author. E-mail: swj@zjut.edu.cn

Received November 15, 2019; revised March 10, 2020; published online March 31, 2020.

equiv. DTBP 时产物收率为 51% (Entry 5). 对酸碱添加剂的使用进行了考察, 反应发现添加碱(1.0 equiv. 三乙胺)或添加酸(1.0 equiv. 醋酸)时反应被显著抑制(Entries 6, 7). DTBP 的用量实验表明 2.0 equiv. 最佳(Entries 8~10), 升高或降低反应温度没有带来正向的积极影响(Entries 11, 12); 反应物浓度实验表明, 当选用 2.0 mL CHCl_3 时产物收率稍有提高(Entry 14). 令人惊喜的是, 当使用无水纯化氯仿时产物收率有了显著提高, 达到了 76% (Entry 15); 当选择 CH_3CN 为溶剂, 氯仿用量为 5.0 equiv. 时, 并未能获得理想的结果(Entry 16).

表 1 氯仿为三氯甲基源时反应条件优化^a

Table 1 Optimization of the reaction conditions while CHCl_3 as reagent

Entry	Oxidant (equiv.)	CHCl_3/mL	Yield ^b /%
1	TBHP (2.5)	3	12
2	30% H_2O_2 (2.5)	3	16
3	BPO (2.5)	3	0
4	ABIN (2.5)	3	0
5	DTBP (2.5)	3	51
6 ^c	DTBP (2.5)	3	Trace
7 ^d	DTBP (2.5)	3	Trace
8	DTBP (1.5)	3	45
9	DTBP (2.0)	3	50
10	DTBP (3.0)	3	44
11 ^e	DTBP (2.0)	3	6
12 ^f	DTBP (2.0)	3	39
13	DTBP (2.0)	1	40
14	DTBP (2.0)	2	56
15 ^g	DTBP (2.0)	2	76
16 ^h	DTBP (2.0)	1.5 mmol	20

^a Reaction conditions: 0.3 mmol of **1a**, under N_2 , sealed tube. ^b Isolated yield. ^c 0.3 mmol of triethylamine (TEA) was used. ^d 0.3 mmol of acetic acid was used. ^e 90 °C. ^f 130 °C. ^g CHCl_3 was dehydrated. ^h 2.0 mL of CH_3CN as solvent.

综上所述, 确定了该反应的较优条件为: 0.3 mmol **1a**, 2.0 mL 无水纯化氯仿, 0.6 mmol DTBP, 110 °C, 氮气保护下封管反应。

1.2 氯仿为试剂时底物范围的扩展

基于上述优化的反应条件, 对反应的底物适用性进行了考察, 结果见表 2. 当氯仿作为三氯甲基自由基源时, 不同结构的烯醇硅醚均能以中等至良好收率转化为目标产物. 实验结果表明: 当 R^1 为取代苯基时, 取代基的电子效应并不显著, 并未获得吸电子基有利或不利的结论; 同时苯环上邻位连有基团时并未表现出明显的位阻效应, 这和自由基对双键加成反应位点与芳基有一定距离有关. R^1 为噻吩-2-基时, 产物 **2o** 的收率为 37%, 并

不理想. R^2 为非氢原子时, 产物 **2m** 和 **2n** 的收率与 **2a** 相比有一定下降, 这与优化条件下, 后处理 **2m** 与 **2n** 时反应体系中存在一定量未转化为目标产物的中间产物 α -三氯甲基酮有关。

表 2 烯醇硅醚结构对反应的影响^a

Table 2 Effect of enol silyl ethers structure to the reaction

2a $\text{R} = \text{H}$, $\text{Y} = 76\%$	2l , $\text{Y} = 64\%$
2b $\text{R} = o\text{-CH}_3$, $\text{Y} = 79\%$	2m , $\text{Y} = 58\%$
2c $\text{R} = p\text{-CH}_3$, $\text{Y} = 74\%$	
2d $\text{R} = p\text{-OCH}_3$, $\text{Y} = 51\%$	
2e $\text{R} = m\text{-OCH}_3$, $\text{Y} = 58\%$	
2f $\text{R} = p\text{-F}$, $\text{Y} = 64\%$	
2g $\text{R} = o\text{-F}$, $\text{Y} = 50\%$	
2h $\text{R} = p\text{-Cl}$, $\text{Y} = 49\%$	2n , $\text{Y} = 57\%$
2i $\text{R} = o\text{-Cl}$, $\text{Y} = 49\%$	2o , $\text{Y} = 37\%$
2j $\text{R} = p\text{-Br}$, $\text{Y} = 72\%$	
2k $\text{R} = p\text{-NO}_2$, $\text{Y} = 46\%$	

^a Reaction conditions: 0.5 mmol of **1a**, 3.4 mL of dehydrated CHCl_3 , 1.0 mmol of DTBP, under N_2 , sealed tube, 110 °C, isolated yield.

1.3 四氯化碳为试剂时反应条件的优化

当选择四氯化碳为三氯甲基自由基源及溶剂时, 在类似氯仿为试剂的优化条件下, 烯醇硅醚 **1a** 能以中等到良好的收率转化为目标产物 **2a**, 稍有不同的是添加剂碱在反应中起到了相当关键的作用, 具体的优化结果见表 3.

首先考察了氧化剂对反应的影响(Entries 1~5), 其中以 DTBP 为优选, 当选择 2.0 equiv. DTBP 时产物收率为 38% (Entry 2). 对碱添加剂的使用进行了考察, 反应发现添加碱(醋酸钠、三乙胺、磷酸二氢钾、碳酸钾)时产物收率均有较显著提高, 其中以添加 1.5 equiv. 三乙胺为优选(Entries 5~10). DTBP 的用量实验表明 2.0 equiv. 最佳(Entries 10~12), 当温度为 120 °C 时产物收率有了一定的提高(Entry 13). 当增大反应物浓度时产物收率达到 82% (Entry 15); 无水纯化四氯化碳代替试剂四氯化碳时收率稍有提高, 达到 83% (Entry 16).

综上所述, 确定了该反应的较优条件为: 0.3 mmol **1a**, 2.0 mL 无水纯化 CCl_4 , 0.6 mmol DTBP, 0.45 mmol TEA, 120 °C, 氮气保护下封管反应。

1.4 四氯化碳为试剂时底物范围的扩展

基于上述优化的反应条件, 对反应底物的适用性进行了考察, 结果见表 4. 当四氯化碳作为三氯甲基自由

表3 CCl₄为试剂时反应条件优化^aTable 3 Optimization of the reaction conditions while CCl₄ as reagent

Entry	Oxidant (equiv.)	CCl ₄ /mL	Additive (equiv.)	T/°C	Yield ^b /%
1	BPO (2.0)	3	—	110	18
2	DTBP (2.0)	3	—	110	38
3	TBHP (2.0)	3	—	110	0
4	DCP (2.0)	3	—	110	20
5	DTBP (2.0)	3	TEA (2.0)	110	66
6	DTBP (2.0)	3	NaOAc (2.0)	110	54
7	DTBP (2.0)	3	KH ₂ PO ₄ (2.0)	110	45
8	DTBP (2.0)	3	K ₂ CO ₃ (2.0)	110	49
9	DTBP (2.0)	3	TEA (1.0)	110	65
10	DTBP (2.0)	3	TEA (1.5)	110	72
11	DTBP (1.5)	3	TEA (1.5)	110	65
12	DTBP (2.5)	3	TEA (1.5)	110	67
13	DTBP (2.0)	3	TEA (1.5)	120	78
14	DTBP (2.0)	3	TEA (1.5)	130	73
15	DTBP (2.0)	2	TEA (1.5)	120	82
16 ^c	DTBP (2.0)	2	TEA (1.5)	120	83

^a Reaction conditions: 0.3 mmol **1a**, under N₂, sealed tube. ^b Isolated yield. ^c CCl₄ was dehydrated.

表4 CCl₄为试剂烯醇硅醚结构对反应的影响^aTable 4 Effect of enol silyl ethers structure to the reaction while CCl₄ as reagent

1	2
2a R = H, Yield 83%	2i Yield 42%
2b R = <i>o</i> -CH ₃ , Yield 66%	2j Yield 72%
2c R = <i>p</i> -CH ₃ , Yield 64%	2k Yield 41%
2d R = <i>p</i> -OCH ₃ , Yield 82%	2l Yield 64%
2e R = <i>m</i> -OCH ₃ , Yield 74%	2m Yield 49%
2f R = <i>p</i> -F, Yield 91%	
2g R = <i>o</i> -F, Yield 85%	
2h R = <i>p</i> -Cl, Yield 74%	
2i R = <i>o</i> -Cl, Yield 68%	
2j R = <i>p</i> -Br, Yield 72%	
2k R = <i>m</i> -NO ₂ , Yield 41%	
2l R = <i>p</i> -CF ₃ , Yield 66%	
2m R = <i>m</i> -Cl, Yield 81%	

^a Reaction conditions: 0.5 mmol of **1a**, 3.4 mL of dehydrated CCl₄, 1.0 mmol of DTBP, 0.75 mmol of TEA, under N₂, sealed tube, 120 °C, isolated yield.

基源时,与氯仿作对比,大部分底物收率均有较明显的提高.实验结果表明:当R¹为取代苯基时,苯环上取代基的电子效应并不显著,同时苯环上邻位连有基团时并未表现出明显的位阻效应.当R²为非氢原子时,产物**2n**获得了理想的收率.当R¹为噻吩-2-基时,产物**2o**也

获得了可接受的结果.

1.5 可能的反应机理

提出如 Scheme 1 所示可能的反应机理: DTBP 受热分解生成叔丁基氧自由基,氯仿在叔丁基氧自由基的氧化下生成三氯甲基自由基,三氯甲基自由基对烯醇硅醚**1**双键进行加成生成中间体**3**,**3**经叔丁基氧自由基氧化生成中间体**4**,**4**脱去三甲硅基生成α-三氯甲基芳酮**5**,**5**进一步脱去一分子氯化氢得到目标产物**2**.四氯化碳为三氯甲基自由基源时机理类似.

图1 反应的可能机理

Scheme 1 Possible reaction mechanism

2 结论

以芳酮衍生的烯醇硅醚为底物,在DTBP的作用下,以氯仿和四氯化碳为三氯甲基自由基源及溶剂,分别在110 °C和120 °C下建立了合成β,β-二氯-α,β-不饱和酮衍生物的新方法.该法操作简单,无需金属催化,对底物的基团容忍性强,为合成β,β-二氯-α,β-不饱和酮衍生物提供了一个有效途径.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

熔点在X-4型显微熔点仪上测定,温度计未校正;核磁共振谱在ANANCE IIII (500M)型核磁共振波谱仪上测定,TMS为内标,CDCl₃为溶剂.所有试剂均为国产分析纯试剂,柱层析硅胶为国产200~300目,石油醚(PE)、乙酸乙酯(EA)为重蒸工业级试剂,其中PE的沸程控制在60~90 °C.氯仿无水纯化方法:氢化钙回流,常压蒸馏;四氯化碳无水纯化方法:五氧化二磷干燥,常压蒸馏.1-芳基-1-三甲基硅氧基乙烯衍生物**1**的合成参考文献[14]进行.

3.2 实验方法

3.2.1 β,β-二氯-α,β-不饱和酮(**2**)的合成(氯仿为三氯甲基源)

以**2a**化合物的合成为例.将0.5 mmol 烯醇硅醚**1a**

置于史莱克反应管中, 抽空换氮三次, 氮气氛围下加入 3.4 mL 无水纯化 CHCl_3 , 1.0 mmol DTBP, 110 °C 封管反应 4 h, 薄层色谱(TLC)跟踪反应, 反应完全后反应液经减压浓缩, 残余物经硅胶柱层析分离(展开剂为石油醚和乙酸乙酯混合液), 得淡黄色液体 **2a**, 83.0 mg, 收率 83%。其余产物的合成均与 **2a** 化合物方法相同。

当四氯化碳为三氯甲基源及溶剂时, 实验操作方法和上述类似。

3.3 产物结构表征

1-苯基-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2a**)^[2c]: 淡黄色油状物。 CHCl_3 为试剂: 产率 76%; CCl_4 为试剂: 产率 83%。 ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 7.29 (d, $J=5.0$ Hz, 1H), 7.51 (t, $J=5.0$ Hz, 2H), 7.62 (t, $J=5.0$ Hz, 1H), 7.94 (d, $J=10.0$ Hz, 2H)。

1-(2-甲基苯基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2b**): 淡黄色油状物。 CHCl_3 为试剂: 产率 79%; CCl_4 为试剂: 产率 66%。 ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 7.61~7.58 (m, 1H), 7.43 (td, $J=7.5$, 1.3 Hz, 1H), 7.32~7.27 (m, 2H), 7.06 (s, 1H), 2.54 (s, 3H); ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) δ : 20.88, 125.89, 126.96, 129.12, 132.02, 134.98, 137.29, 138.82, 190.03. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{Cl}_2\text{O}$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 215.0030, found 215.0031。

1-(4-甲基苯基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2c**)^[2c]: 淡黄色液体。 CHCl_3 为试剂: 产率 74%; CCl_4 为试剂: 产率 64%。 ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 7.86~7.82 (m, 2H), 7.31 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.26 (s, 1H), 2.44 (s, 3H)。

1-(4-甲氧基苯基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2d**)^[2c]: 淡黄色液体。 CHCl_3 为试剂: 产率 51%; CCl_4 为试剂: 产率 82%。 ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 7.93 (d, $J=8.9$ Hz, 2H), 7.22 (s, 1H), 6.98 (d, $J=8.9$ Hz, 2H), 3.90 (s, 3H)。

1-(3-甲氧基苯基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2e**): 淡黄色液体。 CHCl_3 为试剂: 产率 58%; CCl_4 为试剂: 产率 74%。 ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 7.53~7.46 (m, 2H), 7.41 (t, $J=7.9$ Hz, 1H), 7.27 (d, $J=1.7$ Hz, 1H), 7.16 (ddd, $J=8.2$, 2.6, 0.9 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H); ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) δ : 55.52, 112.62, 120.37, 121.09, 124.10, 129.83, 135.59, 138.32, 160.08, 186.41. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{Cl}_2\text{O}_2$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 230.9980, found 230.9976。

1-(4-氟苯基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2f**)^[2c]: 淡黄色液体。 CHCl_3 为试剂: 产率 64%; CCl_4 为试剂: 产率 91%。 ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 8.01~7.94 (m, 2H), 7.24 (s, 1H), 7.21~7.15 (m, 2H)。

1-(2-氟苯基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2g**): 淡黄色液体。 CHCl_3 为试剂: 产率 50%; CCl_4 为试剂: 产率 85%。 ^1H

NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 7.84 (td, $J=7.6$, 1.8 Hz, 1H), 7.57 (dddd, $J=8.3$, 7.2, 5.1, 1.8 Hz, 1H), 7.30~7.25 (m, 2H), 7.16 (ddd, $J=11.1$, 8.3, 0.8 Hz, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) δ : 116.70(d, $J_{\text{C-F}}=225$ Hz), 124.78 (d, $J_{\text{C-F}}=37.5$ Hz), 126.18 (d, $J_{\text{C-F}}=125$ Hz), 126.48 (d, $J_{\text{C-F}}=75.0$ Hz), 131.08 (d, $J_{\text{C-F}}=25.0$ Hz), 135.06 (d, $J_{\text{C-F}}=100.0$ Hz), 136.49, 160.28, 162.31, 183.99 (d, $J_{\text{C-F}}=25.0$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_9\text{H}_5\text{Cl}_2\text{FO}$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 218.9780, found 218.9777。

1-(4-氯苯基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2h**)^[2c]: 淡黄色固体。 CHCl_3 为试剂: 产率 49%; CCl_4 为试剂: 产率 74%。 m.p. 61~62 °C(文献值^[2c]: 49~51 °C); ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 7.90~7.85 (m, 2H), 7.51~7.46 (m, 2H), 7.24 (s, 1H)。

1-(2-氯苯基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2i**): 淡黄色液体。 CHCl_3 为试剂: 产率 49%; CCl_4 为试剂: 产率 68%。 ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 7.56~7.51 (m, 1H), 7.49~7.42 (m, 2H), 7.37 (ddd, $J=7.7$, 5.1, 3.5 Hz, 1H), 7.10 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) δ : 126.66, 127.21, 129.97, 130.55, 131.60, 132.57, 136.83, 138.35, 187.84. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_9\text{H}_5\text{Cl}_3\text{O}$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 234.9484, found 234.9481。

1-(4-溴苯基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2j**)^[2d]: 黄色固体。 CHCl_3 为试剂: 产率 72%; CCl_4 为试剂: 产率 72%。 m.p. 77~78 °C(文献值^[2d]: 72~73.5 °C); ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 7.80 (d, $J=8.6$ Hz, 2H), 7.66 (d, $J=8.7$ Hz, 2H), 7.23 (s, 1H)。

1-(4-硝基苯基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2k**)^[2c]: 黄色固体。 CHCl_3 为试剂: 产率 46%。 m.p. 115~116 °C(文献值^[2c]: 113~114 °C); ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 8.36 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 8.09 (d, $J=8.9$ Hz, 2H), 7.31 (s, 1H)。

1-(1-萘基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2l**): 淡黄色油状物。 CHCl_3 为试剂: 产率 64%; CCl_4 为试剂: 产率 42%。 ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 8.64 (d, $J=8.6$ Hz, 1H), 8.05 (d, $J=8.2$ Hz, 1H), 7.90 (dd, $J=21.9$, 7.6 Hz, 2H), 7.68~7.50 (m, 3H), 7.21 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) δ : 124.46, 125.45, 126.79, 127.33, 128.33, 128.62, 129.06, 130.31, 133.59, 133.96, 135.09, 135.33, 189.71. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_8\text{Cl}_2\text{O}$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 251.0030, found 251.0028。

1,2-二苯基-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2m**)^[2c]: 淡黄色液体。 CHCl_3 为试剂: 产率 58%。 ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 8.08~8.02 (m, 2H), 7.65~7.59 (m, 1H), 7.50~7.55 (m, 4H), 7.42~7.33 (m, 3H)。

2-二氯亚甲基-1-四氢萘酮(**2n**): 淡黄色液体。 CHCl_3

为试剂: 产率 57%; CCl_4 为试剂: 产率 64%. ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 8.13 (dd, $J=7.9, 1.1$ Hz, 1H), 7.52 (td, $J=7.5, 1.4$ Hz, 1H), 7.38 (t, $J=7.5$ Hz, 1H), 7.26 (d, 1H), 3.14~3.05 (m, 4H); ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) δ : 28.74, 31.26, 127.24, 128.35, 128.42, 128.45, 133.03, 133.30, 133.69, 142.76, 184.64. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{11}\text{H}_8\text{Cl}_2\text{O}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 227.0030, found 227.0025.

1-(2-噻吩基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2o**)^[15]: 淡黄色液体. CHCl_3 为试剂: 产率 37%; CCl_4 为试剂: 产率 49%; ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 7.75~7.71 (m, 2H), 7.25 (s, 1H), 7.18 (dd, $J=4.9, 3.9$ Hz, 1H).

1-(3-硝基苯基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2p**)^[2d]: 黄色固体. CCl_4 为试剂: 产率 41%. m.p. 102~103 °C (文献值^[2d] 96~97 °C). ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 8.74 (t, $J=1.9$ Hz, 1H), 8.48 (ddd, $J=8.2, 2.2, 1.0$ Hz, 1H), 8.31~8.24 (m, 1H), 7.74 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.34 (s, 1H).

1-(4-三氟甲基苯基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2q**): 黄色固体. CCl_4 为试剂: 产率 66%. m.p. 56~57 °C; ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 8.04 (d, $J=8.2$ Hz, 2H), 7.78 (d, $J=8.2$ Hz, 2H), 7.29 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) δ : 122.39, 123.34, 124.56, 125.95 (t, $J_{\text{C-F}}=37.5$ Hz), 128.78, 134.78, 135.04, 137.41, 139.75, 185.57; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{10}\text{H}_5\text{Cl}_2\text{F}_3\text{O}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 268.9748, found 268.9745.

1-(3-氯苯基)-3,3-二氯-2-丙烯-1-酮(**2r**): 淡黄色液体. CCl_4 为试剂: 产率 81%. ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) δ : 7.90 (t, $J=1.8$ Hz, 1H), 7.83~7.78 (m, 1H), 7.59 (ddd, $J=8.0, 2.0, 1.0$ Hz, 1H), 7.46 (t, $J=7.9$ Hz, 1H), 7.25 (s, 1H); ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) δ : 123.45, 126.54, 128.52, 130.20, 133.62, 135.28, 136.82, 138.57, 185.28. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_9\text{H}_5\text{Cl}_3\text{O}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 234.9484, found 234.9480.

References

- [1] (a) Nicolaou, K. C.; Snyder, S. A.; Montagnon, T.; Vassilikogiannakis, G. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2002**, *41*, 1668.
(b) Melchiorre, P. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 9748.
- [2] (a) Galina, G. L.; Valentina, A. K.; Elena, V. R.; Khanh, Q. H.; Dmitrii, O. S.; Igor, B. R. *Tetrahedron*. **2011**, *67*, 1844.
(b) Ian, W. J. S.; Sudhir, B. A. *J. Org. Chem.* **1982**, *47*, 374.
(c) Nobumasa, K.; Kumiko, U.; Manabu, Y.; Toshio, S. *J. Organomet. Chem.* **1998**, *552*, 39.
(d) Shinji, M.; Yoshiaki, K.; Tomoyuki, A.; Noboru, S.; Shireru, T. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1972**, 741.
(e) Pavel, S. L.; Ivan, V. S.; Victor, N. K.; Vitaly, A. R.; Alexander, V. P.; Valentina, A. K.; Igor, B. R.; Valentine, G. N. *Org. Chem. Front.* **2019**, *6*, 335.
(f) Somai, M.; Krishna, B.; Lee, Y. R. *Adv. Synth. Catal.* **2014**, *356*(16), 3422.
- [3] (a) Lefebvre, O.; Brigaud, T.; Portella, C. *J. Org. Chem.* **2001**, *66*, 1941.
(b) Itsuno, S.; Arima, S.; Haraguchi, N. *Tetrahedron* **2005**, *61*, 12074.
(c) Dell'Amico, L.; Zanardi, F. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2019**, *58*, 3264.
(d) Li, J. D.; Li, Y. A.; Sun, J. A.; Gui, Y.; Huang, Y. K.; Zha, Z. G.; Wang, Z. Y. *Chem. Commun.* **2019**, *55*, 630.
- [4] (a) Kashikura, W.; Mori, K.; Akiyama, T. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 1860.
(b) Li, J. S.; Liu, Y. J.; Zhang, G. W.; Ma, J. A. *Org. Lett.* **2017**, *19*, 6364.
- [5] Étienne, B.; Katy, C.; Olivier, M.; Mélanie, T.; Jean-Francois, P. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 1034.
- [6] (a) Yu, J. S.; Liao, F. M.; Gao, W. M.; Liao, K.; Zuo, R. L.; Zhou, J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, *54*, 7381.
(b) Hao, Y. J.; Hu, X. S.; Yu, J. S.; Zhou, F.; Zhou, Y.; Zhou, J. *Tetrahedron* **2018**, *74*, 7395.
- [7] (a) Huo, H. H.; Wang, C. Y.; Harms, K.; Meggers, E. *J. Am. Chem. Soc.* **2015**, *137*, 9551.
(b) Katayev, D.; Va'clavik, J.; Brüning, F.; Commare, B.; Togni, A. *Chem. Commun.* **2016**, *52*, 4049.
(c) Jérémy, J.; Khaled, C.; Ren, Y. F.; Hervé, V.; Maylis, O.; Sébastien, B.; Louis, F.; Marine, D. M. *Chem.-Eur. J.* **2017**, *23*, 15030.
(d) Xu, C.; Song, X. N.; Guo, J.; Chen, S. B.; Gao, J.; Jiang, J.; Gao, F. Y.; Li, Y. X. *Org. Lett.* **2018**, *20*, 3933.
- [8] (a) Rathore, R.; Kochi, J. K. *J. Org. Chem.* **1996**, *61*, 627.
(b) Zlotorzynska, M.; Zhai, H.; Sammis, G. M. *J. Org. Chem.* **2010**, *75*, 864.
- [9] (a) Zlotorzynska, M.; Zhai, H.; Sammis, G. M. *Org. Lett.* **2008**, *10*, 5083.
(b) Montserrat, R.; Joe, C. T. L.; Christine, R. D.; Glenn, M. S. *J. Org. Chem.* **2011**, *76*, 7720.
- [10] (a) Kamigata, N.; Udodaira, K.; Shimizu, T. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1997**, 783.
(b) Liu, T. S.; Zheng, D. Q.; Ding, Y. C.; Fan, X. N.; Wu, J. *Chem. Asian J.* **2017**, *12*, 465.
- [11] (a) Sakakura, T.; Hara, M.; Tanaka, M. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1994**, 283.
(b) Diego, F. B.; Jose, C. G. *Adv. Synth. Catal.* **2018**, *360*, 2773.
(c) Kong, W. G.; Yu, C. J.; An, H. J.; Song, Q. L. *Org. Lett.* **2018**, *20*, 349.
- [12] (a) Mikami, K.; Tomita, Y.; Ichikawa, Y.; Amikura, K.; Itoh, Y. *Org. Lett.* **2006**, *8*, 4671.
(b) Pham, P. V.; Nagib, D. A.; MacMillan, D. W. C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 6119.
(c) Huang, M. W.; Li, L.; Zhao, Z. G.; Chen, Q. Y.; Guo, Y. *Synthesis* **2015**, *47*, 3891.
(d) Zhang, X.; Qin, J.; Huang, X. Q.; Meggers, E. *Eur. J. Org. Chem.* **2018**, 571.
- [13] Chloroform as dichloromethyl radical source, see:
(a) Chen, C.; Tan, H.; Liu, B. F.; Yue, C. C.; Liu, W. B. *Org. Chem. Front.* **2018**, *5*, 3143.
(b) Robynne, K. N.; Su, Y. L.; Liu, S. Q.; Melina, R.; Zhang, X. H.; Michael, P. D. *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 16643.
Chloroform or carbon tetrachloride as trichloromethyl radical source, see:
(c) Dowbenko, R. *Org. Synth. Coll.* **1973**, *5*, 93.
(d) Mitani, M.; Takuya, K.; Kuratate, T. *J. Org. Chem.* **1994**, *59*, 1279.
(e) Laurent, Q.; Katrin, T.; Kay, S. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 7440.
(f) Zhou, Y. H.; Wu, C. P.; Dong, X. L.; Qu, J. P. *J. Org. Chem.* **2016**, *81*, 5202.
- [14] Khan, I.; Reed-Berendt, B. G.; Melen, R. L.; Morrill, L. C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2018**, *57*, 12356.
- [15] Burkhardt, U.; John, S. *J. Prakt. Chem.* **1987**, *329*, 332.

(Li, L.; Fan, Y.)