三氯化硼为介导的 2-(1-炔基)-2-烯炔-1-酮的硼酸酯化环化

吴毅^a 肖元晶^{*,a} 张俊良^{*,a,b}^(a) 华东师范大学化学与分子工程学院 上海市绿色化学与化学工程绿色化重点实验室 上海 200062)^(b) 复旦大学化学系 上海 200438)

摘要 发展了一种无金属作用, 以三氯化硼为介导的对 2-(1-炔基)-2-烯炔-1-酮的硼酸酯化环化, 有效合成具有多官能的萘硼酸酯化合物。产物中存在的硼酸酯官能团能够进行多样化的衍生化。该方法具有操作简单、中等至良好的收率、易于克级规模制备且能实现多种合成转化的优点。同时, 该工作开发了 2-(1-炔基)-2-烯炔-1-酮的新合成应用。

关键词 无金属; 硼酸酯化; 环化; 萘硼酸酯; 转化

BCl₃ Mediated Borylative Cyclization of 2-(1-Alkynyl)-2-alken-1-onesWu, Yi^a Xiao, Yuanjing^{*,a} Zhang, Junliang^{*,a,b}^(a) Shanghai Key Laboratory of Green Chemistry and Chemical Processes, School of Chemistry and Molecular Engineering, East China Normal University, Shanghai 200062)^(b) Department of Chemistry, Fudan University, Shanghai 200438)

Abstract A metal-free, BCl₃ mediated borylative cyclization of 2-(1-alkynyl)-2-alken-1-ones leading to synthetic valuable multi-functionalized naphthalene boronates in one step was developed. The boronate functionality present in the product provides many opportunities for derivatization. The salient features of this reaction include moderate to good yields, gram-scale synthesis and diverse synthetic transformations. In the meantime, the new synthetic applications of 2-(1-alkynyl)-2-alken-1-ones have been developed.

Keywords metal free; borylative; cyclization; naphthalene boronates; transformations

萘环是许多具有生物活性的天然产物的基本骨架, 其衍生物在材料科学与药学中也起着至关重要的作用(图 1)^[1-3]。鉴于它们的重要性, 时至今日, 已经开发了多种合成取代的萘衍生物的方法^[4]。值得注意的是, 在超分子化学和光化学领域中, 通过 Suzuki-Miyaura 偶联反应能够将高活性的萘硼酸或酯衍生物的萘环有效地引入到有使用价值的目标分子中^[5]。传统的使用格氏试剂或有机锂试剂合成萘硼酸或酯衍生物的合成方法, 需要严格的无水环境、低温以及官能团耐受性较差等缺点^[6]。虽然目前发展了使用过渡金属催化芳基卤化物或芳基的 C—H 键硼化^[7], 以及非过渡金属催化高官能团耐受性的芳基卤化物或芳基胺的硼化^[8]已经成为互补的合成方法, 但是, 这些合成方法通常需要预构芳环骨架。

图 1 带有萘环的药物化学化合物
Figure 1 Naphthalene-containing pharmaceuticals

* Corresponding authors. E-mail: yjxiao@chem.ecnu.edu.cn; jlzhang@chem.ecnu.edu.cn

Received May 10, 2020; revised June 8, 2020; published online June 30, 2020.

Dedicated to the 40th anniversary of Chinese Journal of Organic Chemistry.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21372084, 21425205, 21871093), the Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University of Ministry of Education and the National Basic Research Program of China (973 Program, No. 2015CB-856600).

国家自然科学基金(Nos. 21372084, 21425205, 21871093)、教育部长江学者和创新团队发展计划和国家重点基础研究发展计划(973 计划, No. 2015CB-856600)资助项目。

从合成的观点来看, 通过环化反应引入新的官能化基团是具有吸引力的. 在这种情况下, 采用过渡金属催化或硼介导对单不饱和以及多不饱和底物进行环化硼化, 从而构建含硼取代基的碳环或者杂环化合物得到了广泛的关注^[9]. 2012 年, Erker 课题组^[10]采用了亲电性硼烷诱导的硼化环化策略, 以 1,2-双(炔基)苯衍生物为底物, $\text{RB}(\text{C}_6\text{F}_5)_2$ 作为硼源, 通过连续 1,1-碳硼化过程合成硼化的萘衍生物(图 2a). 2015 年, Ingleson 课题组^[11]以廉价的 BCl_3 作为硼源, 通过环化硼化-氧化两步实现了萘硼酸酯衍生物的合成(图 2b). 基于我们课题组^[12-13]在 2-(1-炔基)-2-烯炔-1-酮(共轭烯炔酮)化学转化的研究基础上, 我们设想是否能够通过 BCl_3 诱导实现其硼化环化, 进而为萘硼类化合物的合成提供新的途径. 如果 BCl_3 活化共轭烯炔酮的炔基部分, 使其碳中心具有足够的亲电性, 那么就可以通过分子内的 SEAr 反应直接得到萘硼类化合物.

图 2 硼化环化反应生成含硼官能团的萘衍生物

Figure 2 Borylative cyclizations leading to boryl-functionalized naphthalene derivatives

2 结果与讨论

2.1 反应条件优化

首先以共轭烯炔酮 **1a** 为模板底物, BCl_3 为硼源, 二

氯甲烷为溶剂, 在室温下反应 8 h. 随后加入频哪醇与 N,N -二异丙基乙胺于室温下反应 1 h. 在此反应条件下以 50% 的产率得到了环化产物 **3a**. 接下来进一步考察了其他条件对反应的影响. 首先尝试了以 BBr_3 、 BF_3 以及 CatBCl 为硼源, 仅能以极低的产率或无法得到目标产物(表 1, Entries 2~4). 之后, 以 BCl_3 为硼源, 对 BCl_3 的用量以及不同的温度进行了筛选. 结果表明, 在相对较低的反应温度通常比较高的反应温度反应效果更好(表 1, Entries 5~9). 值得注意的是, 在 $-30\text{ }^\circ\text{C}$ 下进行反应时, 通过将 BCl_3 的量稍微减少到 1.8 equiv., 所需产物 **3a** 的产率可以显著提高至 85%(表 1, Entry 10). 增加或者减少 BCl_3 的量时, 将降低所需产物的收率(表 1, Entries 8, 11). 最后, 筛选反应溶剂发现, 卤代烷烃通常

表 1 反应条件优化^a

Table 1 Initial reaction discovery and condition optimization

Entry	[B] (equiv.)	Solvent	Temp/ $^\circ\text{C}$	Yield ^b /%
1	BCl_3 (2.0)	DCM	r.t.	50
2	BBr_3 (2.0)	DCM	r.t.	6
3	$\text{BF}_3 \cdot \text{OEt}_2$ (2.0)	DCM	r.t.	0
4	CatBCl (2.0)	DCM	r.t.	0
5	BCl_3 (2.0)	DCM	50	42
6	BCl_3 (2.0)	DCM	0	54
7	BCl_3 (2.0)	DCM	-20	64
8	BCl_3 (2.0)	DCM	-30	75
9	BCl_3 (2.0)	DCM	-40	75
10	BCl_3 (1.8)	DCM	-30	(85) 80 ^c
11	BCl_3 (1.5)	DCM	-30	54
12	BCl_3 (1.8)	DCE	-30	71
13	BCl_3 (1.8)	CHCl_3	-30	65
14	BCl_3 (1.8)	CCl_4	-30	20
15	BCl_3 (1.8)	Toluene	-30	14
16	BCl_3 (1.8)	THF	-30	NR
17	BCl_3 (1.8)	1,4-Dioxane	-30	NR
18	BCl_3 (1.8)	DMF	-30	NR
19	BCl_3 (1.8)	DMSO	-30	NR

^a Reaction conditions: **1a** (0.2 mmol), BCl_3 (1.0 mol·L⁻¹ in DCM), in solvent (2.0 mL), 8.0 h, under Ar. CatBCl = B-chlorocatecholborane. DIPEA = N,N -Diisopropylethylamine. NR = no reaction. ^b Determined by ^1H NMR analysis using dibromomethane as an internal standard. ^c Isolated yield.

比其他溶剂提供的结果更好, 二氯甲烷的效果最为显著(表 1, Entries 10~15), 并且, 使用四氢呋喃、1,4-二氧六环、*N,N*-二甲基甲酰胺以及二甲亚砆都无法得到目标产物(表 1, Entries 16~19)。

2.2 底物普适性研究

通过对反应条件的系统优化, 最终确定了反应的最优条件: BCl_3 (1.8 equiv.) 为硼源, 二氯甲烷为溶剂, 反应温度为 $-30\text{ }^\circ\text{C}$ 。在此条件下对底物的范围进行了考察(图 3)。结果表明, (1)这种环合方法难以耐受在叁键位置(R^1)上烷基的存在, 带有烷基的炔烃生成了非常复杂的混合物, 并且很难干净地分离出所需的萘硼酸酯。(2)连接至双键(R^3)的带有不同取代基的芳基对反应的产率有很大影响。例如, 在苯基上没有甲氧基的 **1b**, 反应仅得到中等程度的分离收率(67%), 并且通过 X 射线分析进一步证实产物 **3b** 的结构^[14]。然而, 具有强供电子取代基的底物收率相对较低, 例如, 与双键相连的苯环上带有甲硫基的 **1c**、苯基的 **1d** 与三甲氧基的 **1e** 反应, 分别可得到 12%, 37% 和 54% 分离产率。含醚底物得到相对较低的产率可能归因于 BCl_3 裂解了醚键^[11]。(3)炔基上具有不同的芳基对反应的影响较小, 以 50%~90% 的分离产率得到了相应的萘硼酸酯衍生物 **3f**~**3j**。同时, 将 **3i** 进行克级规模制备, 可以得到 79% (1.71 g) 的分离产率。此外, 炔基上有杂芳基取代基时, 例如 2-噻吩, 同样能够表现出良好的反应性(**3k**, 54%)。(4)该反应过程对羰基上的取代基 R^2 表现出良好的耐受性 **3l**~**3p**。

有趣的是, 当连接在双键上的苯环间位为甲氧基的共轭烯炔酮 **1q** 在标准反应条件下反应时, 在甲氧基的邻位发生区域特异性环化, 可以获得相应的萘硼酸酯化合物 **3q**, 并且将 BCl_3 的用量增加至 4.0 equiv., 能够将产率提高至 72% [Eq. (1)]。然而, 当使用连接在双键上的苯环邻位为甲氧基的共轭烯炔酮 **1r** 时, 未观察到环化产物萘硼酸酯化合物 **3r** [Eq. (2)]。同时, 没有酮羰基的简单共轭烯炔 **1s**^[15] 在 BCl_3 作用下, 并没有得到环化目标产物[Eq. (3)]。尽管酮羰基的作用目前尚不清楚, 推测其可能扮演着导向基团的作用^[16], 酮羰基与 BCl_3 相互作用利于其对炔基的活化。

2.3 产物转化的研究

通过使用在双键和叁键位置的苯环上带有两个甲氧基的共轭烯炔酮 **1i**, 可以实现克级规模合成高度官能化的萘硼酸酯化合物。其中存在的硼酸酯为衍生化提供了许多可能(图 4)。例如, 在化学计量的 CuBr_2 的作用下, **3i** 的硼酸酯基很容易转化成溴, 以 61% 的产率得到溴萘化合物 **4a**; **3i** 通过经典的 Suzuki-Miyaura 偶联反应与 2-溴萘作用, 以 59% 的产率得到联萘化合物 **4b**; 叠氮基可

图 3 底物扩展

Figure 3 Scope of 2-(1-alkynyl)-2-alken-1-ones

以轻松地通过 **3i** 与 TMSN_3 在铜催化下引入到萘环上, 叠氮化萘 **4c** 以 67% 产率获得; 通过用 KOMe 处理 **3i**, 硼酯基容易被除去, 并且氢化萘 **4d** 以 61% 的产率获得。

3 结论

我们研究了无金属的 BCl_3 介导的 2-(1-炔基)-2-烯炔-1-酮的硼化环化反应, 能够实现一步合成有价值的多官能化萘硼酸酯化合物。该策略为构建各种萘硼化合物提供了一种简洁的方法。目前正在进行进一步研究,

图4 3i的产物转化

Figure 4 Synthetic transformation of 3i

包括对 BCl₃ 介导的环化过程的机理和合成应用, 以及酮羰基在其中的作用机制。

4 实验部分

4.1 仪器与试剂

2-(1-炔基)-2-烯炔-1-酮根据相应的参考文献合成得到^[17], 其余试剂均从商业渠道上购买得到(Energy, 国药, TCI and J&K), 未经纯化直接使用。¹H NMR 及 ¹³C NMR 在 Bruker (400 MHz), Bruker (500 MHz)测得。样品溶于氘代氯仿于常温下测试, TMS 为内标。使用 NMR 标准如下: CDCl₃ δ 7.26 (¹H NMR), 77.2 (¹³C NMR)。

4.2 化合物 3a~3q 的合成

在带有搅拌子干燥的 10 mL Schlenk 管中加入 1 (0.2 mmol)和 2.0 mL 二氯甲烷, 冷却至 -30 °C。往其中加入 BCl₃ (0.36 mmol, 1 mol·L⁻¹ in DCM), 搅拌约 8 h, 通过薄层色谱(TLC)检测 1 消失。随后加入频哪醇(0.6 mmol)和 *N,N*-二异丙基乙胺(3 mmol), 于室温下搅拌 1 h。最后, 经柱色谱分离得到相应的产物, 洗脱剂 *V*(石油醚): *V*(乙酸乙酯)=6:1。

1-(6-甲氧基-4-苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)乙-1-酮 (3a): 红色固体, 产率 80%。m.p. 148~150 °C; ¹H NMR (500 MHz, Chloroform-*d*) δ: 9.26 (d, *J*=11.3 Hz, 1H), 8.19 (d, *J*=11.1 Hz, 1H), 7.55~7.47 (m, 2H), 7.43 (t, *J*=7.6 Hz, 2H), 7.40~7.33 (m, 1H), 7.07 (dd, *J*=11.3, 2.8 Hz, 1H), 6.92 (dd, *J*=11.1, 2.8 Hz, 1H), 3.96 (s, 3H), 2.80

(s, 3H), 1.22 (s, 12H); ^{13}C NMR (126 MHz, CDCl_3) δ : 195.37, 168.74, 137.82, 137.64, 137.32, 137.09, 136.98, 135.66, 131.07, 130.73, 127.94, 126.96, 114.49, 114.21, 83.99, 56.14, 30.83, 25.01. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{27}\text{BNaO}_4$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 425.1899, found 425.1907.

1-(4-苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)乙-1-酮(**3b**): 白色固体, 产率 67%. m.p. 176~178 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, $\text{Chloroform-}d$) δ : 8.44 (s, 1H), 7.99 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.58~7.53 (m, 1H), 7.53~7.38 (m, 7H), 2.79 (s, 3H), 1.10 (s, 12H); ^{13}C NMR (126 MHz, CDCl_3) δ : 199.60, 145.30, 139.51, 137.07, 134.83, 132.59, 131.00, 130.06, 129.41, 128.58, 127.72, 127.50, 126.65, 126.60, 83.39, 25.27, 25.09. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{25}\text{BNaO}_3$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 395.1793, found 395.1799.

1-(6-甲硫基-4-苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)乙-1-酮(**3c**): 紫色固体, 产率 12%. m.p. 106~108 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, $\text{Chloroform-}d$) δ : 9.02 (d, $J=10.8$ Hz, 1H), 8.03 (d, $J=10.6$ Hz, 1H), 7.49 (d, $J=7.0$ Hz, 2H), 7.43 (t, $J=7.4$ Hz, 2H), 7.37 (d, $J=7.1$ Hz, 1H), 7.21 (dd, $J=10.8, 1.8$ Hz, 1H), 7.06 (dd, $J=10.6, 1.8$ Hz, 1H), 2.80 (s, 3H), 2.53 (s, 3H), 1.23 (s, 12H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 195.06, 156.31, 139.08, 137.87, 136.89, 136.77, 135.17, 135.04, 131.05, 131.01, 128.02, 127.10, 123.31, 122.81, 84.05, 30.82, 25.03, 16.19. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{27}\text{BNaO}_3\text{S}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 441.1671, found 441.1673.

1-(4,6-二苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)乙-1-酮(**3d**): 黄色固体, 产率 37%. m.p. 237~238 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, $\text{Chloroform-}d$) δ : 8.42 (s, 1H), 8.02 (d, $J=8.5$ Hz, 1H), 7.78 (dd, $J=8.5, 1.8$ Hz, 1H), 7.66 (d, $J=1.7$ Hz, 1H), 7.53~7.49 (m, 2H), 7.48~7.34 (m, 6H), 7.36~7.27 (m, 1H), 2.76 (s, 3H), 1.09 (s, 12H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 199.49, 145.56, 141.26, 140.74, 139.41, 137.09, 135.14, 131.78, 131.03, 129.99, 129.78, 128.86, 127.82, 127.69, 127.61, 127.48, 126.38, 124.49, 83.42, 25.28, 25.14. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{30}\text{H}_{29}\text{BNaO}_3$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 471.2107, found 471.2110.

1-(5,6,7-三甲氧基-4-苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)乙-1-酮(**3e**): 黄色固体, 产率 54%. m.p. 173~175 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, $\text{Chloroform-}d$) δ : 8.25 (s, 1H), 7.38~7.27 (m, 5H), 7.10 (s, 1H), 3.99 (s, 3H), 3.86 (s, 3H), 3.19 (s, 3H), 2.70 (s, 3H), 1.06 (s, 12H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 199.23, 153.39, 150.04, 144.61, 143.16, 142.95, 136.55, 130.94, 129.78, 129.15, 126.54, 126.21, 125.41, 104.37, 83.26, 60.87 (d, $J=2.5$ Hz), 60.59, 55.79 (d, $J=2.6$ Hz), 25.37. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{27}\text{H}_{31}\text{BNaO}_6$ $[\text{M} +$

$\text{Na}]^+$ 485.2111, found 485.2111.

1-(4-对氟苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)乙-1-酮(**3f**): 白色固体, 产率 70%. m.p. 206~208 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, $\text{Chloroform-}d$) δ : 8.45 (s, 1H), 8.00 (dd, $J=8.1, 1.3$ Hz, 1H), 7.60~7.53 (m, 1H), 7.54~7.47 (m, 1H), 7.45 (dd, $J=8.4, 1.2$ Hz, 1H), 7.42~7.35 (m, 2H), 7.22~7.14 (m, 2H), 2.78 (s, 3H), 1.14 (s, 12H); ^{13}C NMR (126 MHz, CDCl_3) δ : 199.57, 162.58 (d, $J=246.2$ Hz), 144.08, 137.08, 135.43 (d, $J=3.3$ Hz), 134.88, 132.67 (d, $J=8.0$ Hz), 132.61, 130.25, 129.52, 128.76, 126.77, 126.31, 114.64 (d, $J=21.2$ Hz), 83.47, 25.23, 25.12. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{24}\text{BFNaO}_3$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 413.1699, found 413.1701.

1-(4-对甲基苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)乙-1-酮(**3g**): 白色固体, 产率 58%. m.p. 172~174 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, $\text{Chloroform-}d$) δ : 8.43 (s, 1H), 7.98 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.58~7.50 (m, 2H), 7.51~7.44 (m, 1H), 7.30 (q, 4H), 2.78 (s, 3H), 2.47 (s, 3H), 1.11 (s, 12H); ^{13}C NMR (126 MHz, CDCl_3) δ : 199.61, 145.41, 137.11, 137.08, 136.49, 134.99, 132.60, 130.87, 129.95, 129.38, 128.49, 128.31, 126.66, 126.60, 83.37, 77.30, 77.04, 76.79, 25.28, 25.06, 21.28. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{27}\text{BNaO}_3$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 409.1950, found 409.1951.

1-(6-甲氧基-4-对溴苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)乙-1-酮(**3h**): 红色固体, 产率 50%. m.p. 121~123 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, $\text{Chloroform-}d$) δ : 9.21 (d, $J=11.3$ Hz, 1H), 8.12 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 7.60~7.56 (m, 2H), 7.42~7.36 (m, 2H), 7.07 (dd, $J=11.3, 2.8$ Hz, 1H), 6.92 (dd, $J=11.1, 2.8$ Hz, 1H), 3.96 (s, 3H), 2.81 (s, 3H), 1.27 (s, 12H); ^{13}C NMR (126 MHz, CDCl_3) δ : 195.23, 168.90, 137.45, 137.26, 136.71, 136.09, 136.08, 135.55, 132.68, 131.09, 131.06, 121.13, 114.78, 114.30, 84.07, 56.20, 30.81, 25.06. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{BBrNaO}_4$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 503.1004, found 503.1005.

1-(6-甲氧基-4-对甲氧基苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)乙-1-酮(**3i**): 红色固体, 产率 90%. m.p. 150~151 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, $\text{Chloroform-}d$) δ : 9.21 (d, $J=11.3$ Hz, 1H), 8.15 (d, $J=11.1$ Hz, 1H), 7.42 (d, $J=8.5$ Hz, 2H), 7.03 (dd, $J=11.3, 2.8$ Hz, 1H), 6.98 (d, $J=8.6$ Hz, 2H), 6.89 (dd, $J=11.1, 2.8$ Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 2.80 (s, 3H), 1.24 (s, 12H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 195.27, 168.65, 158.81, 137.83, 137.46, 137.10, 136.91, 135.55, 132.09, 130.65, 129.42, 114.34, 114.02, 113.40, 83.94, 56.11 (d, $J=3.1$ Hz), 55.39 (d, $J=2.7$ Hz), 30.81 (d, $J=1.9$ Hz), 25.05. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{26}\text{H}_{29}\text{B-}$

$\text{NaO}_5 [\text{M}+\text{Na}]^+$ 455.2005, found 455.2011.

1-(7-甲氧基-2-硼酸酯基-[1,1']-联萘)-3-基)乙-1-酮(**3j**): 黄色固体, 产率 70%. m.p. 178~179 °C; ^1H NMR (400 MHz, CHCl_3) δ : 8.42 (s, 1H), 7.98~7.84 (m, 3H), 7.57 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.49 (dd, $J=7.0, 1.3$ Hz, 1H), 7.47~7.38 (m, 1H), 7.35~7.21 (m, 2H), 7.16 (dd, $J=8.9, 2.5$ Hz, 1H), 6.47 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 3.44 (s, 3H), 2.75 (s, 3H), 0.91 (s, 6H), 0.64 (s, 6H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 199.29, 159.90, 141.97, 137.12, 136.99, 135.54, 133.43, 133.18, 131.12, 130.09, 129.01, 128.09, 127.89, 127.61, 127.05, 125.93, 125.72, 125.13, 119.10, 105.54, 83.02, 55.06, 25.12 (d, $J=1.9$ Hz), 24.71 (d, $J=9.7$ Hz). HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{29}\text{H}_{29}\text{BNaO}_4 [\text{M}+\text{Na}]^+$ 475.2056, found 475.2057.

1-(6-甲氧基-4-噻吩-3-硼酸酯基萘-2-基)乙-1-酮(**3k**): 红色固体, 产率 54%. m.p. 133~134 °C; ^1H NMR (400 MHz, CHCl_3) δ : 9.26 (d, $J=11.3$ Hz, 1H), 8.38 (d, $J=11.1$ Hz, 1H), 7.40 (dd, $J=5.1, 1.3$ Hz, 1H), 7.23~7.03 (m, 3H), 6.96 (dd, $J=11.1, 2.8$ Hz, 1H), 3.95 (s, 3H), 2.79 (s, 3H), 1.28 (s, 12H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 195.32, 169.02, 138.70, 137.75, 137.61, 137.11, 135.91, 130.54, 128.97, 128.37, 126.97, 125.85, 115.14, 114.55, 84.16, 56.21, 30.84, 25.06. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{23}\text{H}_{25}\text{BNaO}_4\text{S} [\text{M}+\text{Na}]^+$ 431.1463, found 431.1473.

(6-甲氧基-4-对甲氧基苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)(噻吩-2-基)甲酮(**3l**): 红色固体, 产率 76%. m.p. 73~74 °C; ^1H NMR (400 MHz, CHCl_3) δ : 8.80 (d, $J=11.1$ Hz, 1H), 8.21 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 7.63 (dd, $J=4.9, 1.2$ Hz, 1H), 7.49 (dd, $J=3.8, 1.2$ Hz, 1H), 7.43 (d, $J=8.6$ Hz, 2H), 7.08~7.05 (m, 1H), 6.98 (d, $J=8.6$ Hz, 2H), 6.92~6.82 (m, 2H), 3.92 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 0.97 (s, 12H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 186.14, 169.30, 158.67, 148.23, 137.67, 137.64, 136.16, 135.98, 135.00, 132.81, 132.27, 131.82, 129.38, 127.54, 113.28, 113.21, 113.15, 83.86, 56.16, 55.40, 24.63. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{29}\text{H}_{30}\text{BO}_5\text{S} [\text{M}+\text{Na}]^+$ 501.1907, found 501.1906.

环丙基(6-甲氧基-4-对甲氧基苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)甲酮(**3m**): 红色固体, 产率 71%. m.p. 101~102 °C; ^1H NMR (400 MHz, CHCl_3) δ : 9.22 (d, $J=11.2$ Hz, 1H), 8.16 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 7.44 (d, $J=8.6$ Hz, 2H), 7.01~6.94 (m, 3H), 6.85 (dd, $J=11.1, 2.7$ Hz, 1H), 3.92 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 2.74~2.67 (m, 1H), 1.39~1.34 (m, 2H), 1.22 (s, 12H), 1.05~0.98 (m, 2H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 198.34, 168.68, 158.72, 137.42, 137.35, 136.98, 136.94, 135.16, 132.36, 132.09, 129.60, 113.76,

113.38, 83.95, 56.09, 55.40, 25.01, 21.45, 11.42. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{28}\text{H}_{32}\text{BO}_5 [\text{M}+\text{Na}]^+$ 459.2342, found 459.2340.

环己基(6-甲氧基-4-对甲氧基苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)甲酮(**3n**): 红色固体, 产率 67%. m.p. 127~128 °C; ^1H NMR (400 MHz, CHCl_3) δ : 9.01 (d, $J=11.3$ Hz, 1H), 8.12 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 7.43~7.38 (m, 2H), 7.01~6.92 (m, 3H), 6.83 (dd, $J=11.1, 2.8$ Hz, 1H), 3.92 (s, 3H), 3.86 (s, 3H), 3.31~3.20 (m, 1H), 2.10~1.26 (m, 12H), 1.24 (s, 12H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 203.28, 168.70, 158.72, 137.60, 137.40, 137.13, 136.91, 135.38, 132.23, 131.34, 129.58, 113.66, 113.26, 83.91, 56.08, 55.39, 49.70, 29.56, 26.06, 25.93, 25.17. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{31}\text{H}_{38}\text{BO}_5 [\text{M}+\text{Na}]^+$ 501.2812, found 501.2818.

1-(6-甲氧基-4-对甲氧基苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)戊-1-酮(**3o**): 红色固体, 产率 91%. m.p. 180~181 °C; ^1H NMR (400 MHz, CHCl_3) δ : 9.29 (d, $J=11.3$ Hz, 1H), 8.14 (d, $J=11.1$ Hz, 1H), 7.46~7.38 (m, 2H), 7.08~6.94 (m, 3H), 6.88 (dd, $J=11.1, 2.8$ Hz, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 3.14 (t, 2H), 1.85~1.77 (m, 2H), 1.53~1.40 (m, 2H), 1.23 (s, 12H), 0.97 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 198.49, 168.65, 158.78, 137.66, 137.51, 137.45, 136.82, 135.42, 132.17, 130.52, 129.54, 114.12, 113.79, 113.34, 83.96, 56.09 (d, $J=2.3$ Hz), 55.39 (d, $J=2.1$ Hz), 42.28, 26.98, 25.08, 22.69, 14.22. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{29}\text{H}_{35}\text{BNaO}_5 [\text{M}+\text{Na}]^+$ 497.2475, found 497.2477.

苯基(4-苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)甲酮(**3p**): 白色固体, 产率 58%. m.p. 147~148 °C; ^1H NMR (400 MHz, CHCl_3) δ : 8.19 (s, 1H), 7.91~7.82 (m, 3H), 7.66~7.56 (m, 1H), 7.57~7.40 (m, 10H), 1.08 (s, 12H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 197.63, 145.81, 139.70, 137.91, 136.76, 134.47, 132.81, 132.13, 131.92, 131.00, 129.86, 129.53, 128.58, 128.35, 127.79, 127.56, 126.73, 126.57, 83.66, 25.03. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{30}\text{H}_{29}\text{BNaO}_3 [\text{M}+\text{Na}]^+$ 457.1951, found 457.1948.

1-(5-甲氧基-4-对甲氧基苯基-3-硼酸酯基萘-2-基)乙-1-酮(**3q**): 黄色固体, 产率 72%. m.p. 179~180 °C; ^1H NMR (400 MHz, CHCl_3) δ : 8.33 (s, 1H), 7.53 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.41 (t, $J=7.9$ Hz, 1H), 7.21 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 6.87 (d, $J=8.3$ Hz, 2H), 6.82 (d, $J=7.7$ Hz, 1H), 3.85 (s, 3H), 3.38 (s, 3H), 2.72 (s, 3H), 1.09 (s, 12H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 199.49, 158.27, 157.05, 143.63, 136.92, 136.57, 134.91, 130.69, 130.13, 127.04,

126.36, 122.35, 111.84, 109.23, 83.33, 77.44, 77.12, 76.80, 55.75, 55.53, 25.47, 25.37. HRMS (ESI) calcd for $C_{26}H_{29}BNaO_5 [M+Na]^+$ 455.2005, found 455.1995.

4.3 化合物 4a~4d 的合成

在带有搅拌子的 10 mL Schlenk 管中加入 **3i** (0.2 mmol)、溴化铜(0.6 mmol)、2.0 mL 甲醇以及 2 mL 水, 加热回流约 6 h. 通过薄层色谱(TLC)检测 **3i** 消失. 加入乙醚萃取, 有机相用饱和食盐水洗, 无水硫酸钠干燥, 旋干溶剂, 经柱色谱分离得到相应的产物, 洗脱剂 $V(\text{石油醚}):V(\text{乙酸乙酯})=2:1$, 得 1-(3-溴-6-甲氧基-4-对甲氧基苯基)-2-基)-1-酮(**4a**)^[18]: 红色固体, 产率 61%. m.p. 133~134 °C; ^1H NMR (400 MHz, Chloroform-*d*) δ : 9.41 (d, $J=11.3$ Hz, 1H), 8.10 (d, $J=11.2$ Hz, 1H), 7.35 (d, $J=8.1$ Hz, 2H), 7.13~7.03 (m, 3H), 6.96 (dd, $J=11.3$, 2.8 Hz, 1H), 3.97 (s, 3H), 3.90 (s, 3H), 2.89 (s, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 197.15, 168.85, 159.13, 137.96, 136.29, 135.12, 135.06, 132.39, 131.77, 127.09, 124.87, 124.31, 116.04, 114.77, 113.80, 56.23, 55.32, 32.47. HRMS (ESI) calcd for $C_{20}H_{17}BrNaO_3 [M+Na]^+$ 407.0253, found 407.0254.

在带有搅拌子的 20 mL Schlenk 管中加入 **3i** (0.2 mmol)、2-溴萘(0.24 mmol)、碳酸钾(1 mmol)和四三苯基膦钯(0.02 mmol, 10 mol%), 随后添加 4.5 mL *N,N*-二甲基甲酰胺以及 0.5 mL 水, 加热至 80 °C, 反应 8 h. 反应结束, 加入 20 mL 水淬灭, 加入氯仿萃取, 有机相用饱和食盐水洗, 无水硫酸钠干燥, 旋干溶剂, 经柱色谱分离得到相应的产物, 洗脱剂 $V(\text{石油醚}):V(\text{乙酸乙酯})=2:1$, 得 1-(7-甲氧基-1-对甲氧基苯基-[2,2'-联萘]-3-基)-2-基)-1-酮(**4b**)^[19]: 红色固体, 产率 59%. m.p. 287~288 °C; ^1H NMR (400 MHz, Chloroform-*d*) δ : 9.29 (d, $J=11.2$ Hz, 1H), 8.24 (d, $J=11.2$ Hz, 1H), 7.85~7.69 (m, 4H), 7.51~7.42 (m, 2H), 7.34 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.10 (d, $J=8.0$ Hz, 3H), 6.97 (dd, $J=11.2$, 2.7 Hz, 1H), 6.80 (d, $J=8.3$ Hz, 2H), 3.97 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 2.03 (s, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 199.65, 168.64, 158.30, 146.51, 137.99, 136.69, 135.47, 135.40, 135.09, 133.11, 132.39, 132.27, 131.23, 130.61, 130.00, 128.53, 128.14, 127.72, 127.49, 126.95, 126.19, 126.12, 115.09, 113.98, 113.64, 56.15, 55.16, 32.00. HRMS (ESI) calcd for $C_{30}H_{24}NaO_3 [M+Na]^+$ 455.1618, found 455.1615.

往 2 mL 甲醇溶液加入 **3i** (0.2 mmol)、四丁基氟化铵(0.24 mmol)、叠氮基三甲基硅烷(0.24 mmol)以及氯化亚铜(0.02 mmol, 10 mol%), 加热回流至原料消失, 经柱色谱分离得到相应的产物, 洗脱剂 $V(\text{石油醚}):V(\text{乙酸乙酯})=6:1$, 得 1-(3-叠氮基-6-甲氧基-4-对甲氧基苯基)-2-基)-1-酮(**4c**)^[20]: 橘黄色固体, 产率 67%. m.p. 158~159 °C; ^1H NMR (400 MHz, Chloroform-*d*) δ : 8.18 (d, $J=10.7$ Hz, 1H), 7.73 (d, $J=11.7$ Hz, 1H), 7.35 (d, $J=8.2$ Hz, 2H), 7.05 (d, $J=8.2$ Hz, 2H), 6.89 (dd, $J=11.8$, 2.8 Hz, 1H), 6.78 (dd, $J=10.8$, 2.9 Hz, 1H), 3.87 (s, 6H), 2.80 (s, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 194.27, 161.96, 158.96, 157.74, 138.10, 137.20, 131.20, 128.64, 126.10, 125.60, 120.87, 118.76, 114.74, 109.86, 108.76, 55.80, 55.37, 31.79. HRMS (ESI) calcd for $C_{20}H_{19}NNaO_3 [M+2H+Na-2N]^+$ 344.1262, found 344.1261.

往 2 mL 甲醇溶液加入 **3i** (0.2 mmol)以及甲醇钾(0.01 mmol, 5 mol%), 加热至 120 °C反应 12 h 至原料消失, 经柱色谱分离得到相应的产物, 洗脱剂 $V(\text{石油醚}):V(\text{乙酸乙酯})=4:1$, 得 1-(6-甲氧基-4-对甲氧基苯基)-2-基)-1-酮(**4d**)^[21]: 红色固体, 产率 61%. m.p. 180~181 °C; ^1H NMR (400 MHz, Chloroform-*d*) δ : 9.75 (d, $J=11.1$ Hz, 1H), 8.44 (d, $J=11.2$ Hz, 1H), 8.03 (s, 1H), 7.47 (d, $J=8.3$ Hz, 2H), 7.14~6.96 (m, 4H), 3.98 (s, 3H), 3.88 (s, 3H), 2.70 (s, 3H); ^{13}C NMR (101 MHz, CDCl_3) δ : 195.75, 169.16, 158.72, 139.49, 136.62, 136.27, 136.07, 135.94, 131.38, 130.59, 129.16, 124.51, 115.95, 114.23, 114.08, 77.36, 77.25, 77.05, 76.73, 56.17, 55.41, 29.12. HRMS (ESI) calcd for $C_{20}H_{18}NaO_3 [M+Na]^+$ 329.1148, found 329.1143.

辅助材料(Supporting Information) 化合物 **3a~3q** 和 **4a~4d** 的 ^1H NMR 以及 ^{13}C NMR 谱图. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] (a) Ward, R. S. *Nat. Prod. Rep.* **1995**, *12*, 183.
(b) Thomson, R. H. *Naturally Occurring Quinones IV. Recent Advances*, 4th ed. Chapman & Hall, London, **1997**.
(c) Liu, X. L.; Zhao, Y.; Wang, W. W.; Wang, M. A.; Zhou, L. G. *Chin. J. Org. Chem.* **2017**, *37*, 2883 (in Chinese).
(刘鑫磊, 赵宇, 王卫伟, 王明安, 周立刚, 有机化学, **2017**, *37*, 2883.)
- [2] (a) Anthony, J. E. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 452.
(b) Reddy, R. A.; Baumeister, U.; Keith, C.; Tschierske, C. *J. Mater. Chem.* **2007**, *17*, 62.
(c) Svoboda, J.; Novotna, V.; Kozmik, V.; Glogarova, M.; Weissflog, W.; Diele, S.; Pelzl, G. *J. Mater. Chem.* **2003**, *13*, 2104.
(d) Christian, J.; Susann, G.; Helmut, H.; Brigitte, S. *Naphthalene Compounds for Liquid-Crystalline Mixtures*, WO 2017097400 A1.
- [3] For selected reviews:
(a) Zhou, L.; Zhao, J.; Shan, T.; Cai, X.; Peng, Y. *Mini-Rev. Med. Chem.* **2010**, *10*, 977.
(b) Ammar, Y. A.; Salem, M. A.; Fayed, Eman A.; Helal, M. H.; El-Gaby, M. S. A.; Thabet, H. K. *Syn. Commun.* **2017**, *47*, 1341.
For selected examples:
(c) Zhao, H.; Neamati, N.; Mazumder, A.; Sunder, S.; Pommier, Y.; Burke, T. R. *J. Med. Chem.* **1997**, *40*, 1186.
(d) Ukita, T.; Nakamura, Y.; Kubo, A.; Yamamoto, Y.; Takahashi, M.;

- Kotera, J.; Ikeo, T. *J. Med. Chem.* **1999**, *42*, 1293.
- (e) Wang, Y. H.; Zhao, J. Y. *WO 2017202207*, **2017**.
- [4] For reviews:
- (a) Naphthalenes, Anthracenes, 9H-Fluorenes, and Other Acenens, Toyota, S.; Iwanaga, T. in *Science of Synthesis (Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations)*, Eds.: Siegel, J. S.; Tobe, Y., Vol. 45b, Thieme, Stuttgart, **2010**, pp. 745~854.
- (b) de Koning, C. B.; Rousseau, A. L.; van Otterlo, W. A. L. *Tetrahedron* **2003**, *59*, 7.
- (c) Hein, S. J.; Lehnher, D.; Arslan, H.; Uribe-Romo, F. J.; Dichtel, W. R. *Acc. Chem. Res.* **2017**, *50*, 2776.
- [5] (a) Miyaura, N.; Suzuki, A. *Chem. Rev.* **1995**, *95*, 2457.
- (b) Kotha, S.; Lahiri, K.; Kashinath, D. *Tetrahedron* **2002**, *58*, 9633.
- (c) Miyaura, N. *Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions of Organoboron Compounds with Organic Halides in Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions* (Eds. A. de Meijere, F. Diederich), WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, **2004**.
- (d) Li, Y.; Wang, Z. H. *Org. Lett.* **2009**, *11*, 1385.
- (e) Heffernan, G. D.; Jacobus, D. P.; Schiehs, G. A.; Shieh, H.-M.; Zhao, W. *Preparation of Aryl Derivatives as Antimalarial Agents*, *WO 2014074778A1*.
- (f) Kikuchi, Y.; Takahagi, H.; One, K.; Iwasawa, N. *Chem. Asian J.* **2014**, *9*, 1001.
- (g) Wang, Y. B.; Lin, Z. C.; Fan, H. L.; Peng, X. H. *Chem. Eur. J.* **2016**, *22*, 10382.
- [6] Hall, D. *Boronic Acids: Preparation and Applications*, Wiley-VCH, Weinheim, **2011**.
- [7] For reviews, see:
- (a) Ishiyama, T.; Miyaura, N. *J. Organomet. Chem.* **2003**, *680*, 3.
- (b) Mkhalid, I. A. I.; Barnard, J. H.; Marder, T. B.; Murphy, J. C.; Hartwig, J. F. *Chem. Rev.* **2010**, *110*, 890.
- [8] For recent selected examples:
- (c) Yamamoto, T.; Morita, T.; Takagi, J.; Yamakawa, T. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 5766.
- (d) Tang, W. J.; Keshipeddy, S.; Zhang, Y. D.; Wei, X. D.; Savoie, J. Patel, N. D.; Yee, N. K.; Senanayake, C. H. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 1366.
- (e) Ros, A.; Estepa, B.; López-Rodríguez, R.; Álvarez, E.; Fernández, R.; Lassaletta, J. M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 11724.
- (f) Kawamorita, S.; Ohmiya, H.; Iwai, T.; Sawamura, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 8363.
- (g) Kawamorita, S.; Miyazaki, T.; Ohmiya, H.; Iwai, T.; Sawamura, M. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 19310.
- (h) Dai, H.-X.; Yu, J.-Q. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 134.
- (i) Jiang, M.; Yang, H. J.; Fu, H. *Org. Lett.* **2016**, *18*, 5248.
- (j) Xu, Y. L.; Fang, H. *Chin. J. Org. Chem.* **2018**, *38*, 738 (in Chinese).
- (徐玉良, 方浩, 有机化学, **2018**, *38*, 738.)
- [9] (a) Yamamoto, E.; Izumi, K.; Horita, Y.; Ito, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 19997.
- (b) Yamamoto, E.; Ukigai, S.; Ito, H. *Chem. Sci.* **2015**, *6*, 2943.
- (c) Mo, F. Y.; Jiang, Y. B.; Qiu, D.; Zhang, Y.; Wang, J. B. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, *49*, 1846.
- [10] For reviews:
- (a) Wrackmeyer, B. *Heteroat. Chem.* **2006**, *17*, 188.
- (b) Melen, R. L. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 1161.
- (c) Buñuel, E.; Cárdenas, D. J. *Eur. J. Org. Chem.* **2016**, 5446.
- (d) Issaian, A.; Tu, K. N.; Blum, S. A. *Acc. Chem. Res.* **2017**, *50*, 2598.
- For selected recent examples:
- (e) Yang, C.-H.; Zhang, Y.-S.; Fan, W.-W.; Liu, G.-Q.; Li, Y.-M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, *54*, 12636.
- (f) Faizi, D. J.; Issaian, A.; Davis, A. J.; Blum, S. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, *138*, 2126.
- (g) Jiang, J. L.; Zhang, Z. Q.; Fu, Y. *Asian J. Org. Chem.* **2017**, *6*, 282.
- (h) Yuan, K.; Wang, S.-N. *Org. Lett.* **2017**, *19*, 1462.
- (i) Warner, A. J.; Churn, A.; McGough, J. S.; Ingleson, M. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2017**, *56*, 354.
- (j) Kubota, K.; Yamamoto, E.; Ito, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 2635.
- (k) Jiang, T.; Bartholomeyzik, T.; Mazuela, J.; Willersinn, J.; Bäckvall, J.-E. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, *54*, 6024.
- (l) Yu, S. J.; Wu, C. Z.; Ge, S. Z. *J. Am. Chem. Soc.* **2017**, *139*, 6526.
- (m) Zuo, Y.-J.; Chang, X.-T.; Hao, Z.-M.; Zhong, C.-M. *Org. Biomol. Chem.* **2017**, *15*, 6323.
- (n) Wang, H.-M.; Zhou, H.; Xu, Q.-S.; Liu, T.-S.; Zhuang, C.-L.; Shen, M.-H.; Xu, H.-D. *Org. Lett.* **2018**, *20*, 1777.
- (o) Lv, J. H.; Zhao, B. L.; Liu, L.; Han, Y.; Yuan, Y.; Shi, Z. Z. *Adv. Synth. Catal.* **2018**, *360*, 4054.
- [11] Liedtke, R.; Harhausen, M.; Fröhlich, R.; Kehr, G.; Erker, G. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 1448.
- [12] Warner, A. J.; Lawson, J. R.; Fasano, V.; Ingleson, M. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, *54*, 11245.
- [13] For selected examples from our group's work, please see:
- (a) Xiao, Y. J.; Zhang, J. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 1903.
- (b) Liu, F.; Yu, Y. H.; Zhang, J. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 5505.
- (c) Liu, F.; Qian, D. Y.; Li, L.; Zhao, X. L.; Zhang, J. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, *49*, 6669.
- (d) Zhou, L. J.; Zhang, M. R.; Li, W. B.; Zhang, J. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, *53*, 6542.
- (e) Zhang, Z.-M.; Chen, P.; Li, W. B.; Niu, Y. F.; Zhao, X. L.; Zhang, J. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, *53*, 4350.
- (f) Wang, Y. D.; Zhang, P. C.; Qian, D. Y.; Zhang, J. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, *54*, 14849.
- [14] For selected recent examples from other group's work, please see:
- (a) Pathipati, S. R.; van der Werf, A.; Eriksson, L.; Selander, N. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2016**, *55*, 11863.
- (b) Kumari, A. L. S.; Swamy, K. C. K. *J. Org. Chem.* **2016**, *81*, 1425.
- (c) Zhang, H.; Yao, Q.; Lin, L. L.; Xu, C. R.; Liu, X. H.; Feng, X. M. *Adv. Synth. Catal.* **2017**, *359*, 3454.
- (d) Pathipati, S. R.; Eriksson, L.; Selander, N. *Chem. Commun.* **2017**, *53*, 11353.
- (e) Liu, S. N.; Yang, P.; Peng, S. Y.; Zhu, C. H.; Cao, S. Y.; Li, J.; Sun, J.-T. *Chem. Commun.* **2017**, *53*, 1152.
- (f) Zheng, Y.; Chi, Y. J.; Bao, M.; Qiu, L. H.; Xu, X. F. *J. Org. Chem.* **2017**, *82*, 2129.
- (g) Du, Q. W.; Neudörfl, J.-M.; Schmalz, H.-G. *Chem. Eur. J.* **2018**, *24*, 2379.
- (h) Kardile, R. D.; Chao, T.-H.; Cheng, M.-J.; Liu, R.-S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2020**, *59*, 1.
- [15] X-ray data and ORTEP depiction for compounds **3b** (CCDC 1870210).
- [16] Zhou, H.; Moberg, C. J. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, *134*, 15992.
- [17] Lv, J. H.; Zhao, B. L.; Yuan, Y.; Han, Y.; Shi, Z. Z. *Nat. Commun.* **2020**, *11*, 1316.
- [18] (a) Yao, T. L.; Zhang, X. X.; Larock, R. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, *126*, 11164.
- (b) Yao, T. L.; Zhang, X. X.; Larock, R. C. *J. Org. Chem.* **2005**, *70*, 7679.
- (c) Liu, Y. H.; Zhou, S. L. *Org. Lett.* **2005**, *7*, 4609.
- [19] Thompson, A. L. S.; Kabalka, G. W.; Akula, M. R.; Huffman, J. W. *Synthesis* **2005**, *36*, 547.
- [20] Nakanishi, W.; Matsuyama, N.; Hara, D.; Saeki, A.; Hitosugi, S.; Seki, S.; Isobe, H. *Chem. Asian J.* **2014**, *9*, 1782.
- [21] Li, Y.; Gao, L. X.; Han, F. S. *Chem. Eru. J.* **2010**, *16*, 7969.
- [22] Yao, W. B. *CN 107188773*, **2017**.

(Li, L.; Fan, Y.)