一种合成羧酸及其衍生物有效且通用的方法: 炔基硼酸酯氧化

陆 熹 傅 尧*

(中国科学技术大学化学系 合肥 230026)

A General and Efficient Access to Carboxylic Acids and Derivatives through the Oxidation of Alkynyl Boronates

Lu, Xi Fu, Yao*

(Department of Chemistry, University of Science and Technology of China, Hefei 230026)

有机含硼化合物可以发生丰富的碳-硼键官能团转换, 形成碳-碳键或碳-杂键, 构建重要功能分子骨架, 在生物医药、合成化学等领域有广泛的应用^[1]. 在其转化形式中, 碳-硼键氧化有特殊的历史地位与合成价值. 烷基含硼化合物 $C(sp^3)-B$ 键氧化为 $C-O$ 键是最早被发现的硼官能团转化模式, 伴随烯烃氢硼化反应的发展, 已经成为教科书收录的经典反应^[2-3] (Scheme 1a). 同样, 烯基或芳基硼酸酯 $C(sp^2)-B$ 键氧化成羰基化合物或酚的方法也得到长足发展 (Scheme 1b)^[4]. 相比之下, $C(sp)-B$ 键氧化过程至今仍是硼化学研究领域一项空白.

图式 1 C-B 键氧化反应

Scheme 1 C-B bond oxidation reactions

最近, 湖南大学化学化工学院赵万祥课题组在前期

有机含硼化合物合成与转化研究的基础上^[5], 报道了首例 $C(sp)-B$ 键氧化反应, 以端炔为原料, 炔基硼酸酯为反应过程中间产物, 便利合成羧酸、酯和酰胺等 (Scheme 1c)^[6].

作者提出炔基硼酸酯的氧化过程可能涉及硼酸炔醇酯、烯酮等中间体 (Scheme 2). 炔基硼酸酯在氧化条件下发生炔基 $B \rightarrow O$ 迁移生成硼酸炔醇酯, 进一步水解形成炔醇, 互变异构为关键中间体烯酮, 烯酮亲核加成生成目标产物. 氧化剂 Oxone 的选择是反应成功的关键因素: (1) 由于存在竞争性的碳-碳三键氧化反应, 底物容易生成 1,2-二酮副产物, 并进一步氧化成酸酐导致三键裂解; (2) 炔基硼酸酯与水或醇等亲核试剂反应过程中, 可能发生脱硼质子化反应, 生成端炔并被氧化.

图式 2 $C(sp)-B$ 键氧化反应的可能机理Scheme 2 Possible mechanism of $C(sp)-B$ bond oxidation

反应具有广泛的底物适用范围和官能团兼容性 (Scheme 3, 1~8). 芳基乙炔和烷基端炔都能有效转化. 亲核试剂类型涵盖了水、伯醇、仲醇、伯胺、仲胺等, 分

* Corresponding author. E-mail: fuyao@ustc.edu.cn. Published online July 16, 2020.

别可以得到羧酸、酯和酰胺等产物, 展现出该方法的普适性. 反应虽然使用 Oxone 作为氧化剂, 仍然能够兼容烯基双键、苯并呋喃等氧化敏感官能团, 烷基卤素等具有重要合成化学价值的官能团也能保留.

图式 3 底物范围

Scheme 3 Substrate scope

该反应在药物分子合成和多肽后期修饰方面具有应用潜力, 充分证明了该方法的实用性. 作者使用该反应实现了多种氨基酸和多肽的酰基化修饰, 以高收率得到相应的酰胺和肽, 为多肽的合成与修饰提供了高效、便捷的方法(Scheme 3, 8, 9). 此外, 作者还展示了该反应在丙烯酸类非甾体抗炎药合成方面的应用和 ACAT 抑制剂(CI-1011)的关键中间体克级制备(Scheme 4).

总之, 廉价 Oxone 氧化炔基硼酸酯为合成羧酸、酯和酰胺提供了一种有效且通用的方法. 该方法底物适用

图式 4 药物分子合成

Scheme 4 Synthesis of drug molecules

范围广泛, 官能团兼容性优良, 能够应用于药物分子合成和多肽后期修饰. 同时, 作为首例 $\text{C}(\text{sp})-\text{B}$ 键氧化反应, 该研究有望为硼化学和烯酮化学发展发挥作用.

References

- [1] Hall, D. G. *Boronic Acids: Preparation and Applications in Organic Synthesis, Medicine and Materials*, Vols. 1 and 2, 2nd ed., Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2011.
- [2] Frankland, E.; Duppa, B. F. *Justus Liebigs Ann. Chem.* **1860**, 115, 319.
- [3] (a) Brown, H. C.; Rao, B. C. S. *J. Am. Chem. Soc.* **1956**, 78, 5694. (b) Brown, H. C. *Organic syntheses via boranes*, Wiley, New York, 1975.
- [4] (a) Zou, Y. Q.; Chen, J. R.; Liu, X. P.; Lu, L. Q.; Davis, R. L.; Jørgensen, K. A.; Xiao, W. J. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2012**, 51, 784. (b) Pitre, S. P.; McTiernan, C. D.; Ismaili, H.; Scaiano, J. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, 135, 13286.
- [5] (a) Li, J.; Qu, S.; Zhao, W. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, 59, 2360. (b) Li, S.; Li, J.; Xia, T.; Zhao, W. *Chin. J. Chem.* **2019**, 37, 462.
- [6] Li, C.; Zhao, P.; Li, R.; Zhang, B.; Zhao, W. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, 59, 10913.

(Li, L.)