微波辅助 α -重氮酯类化合物的快速合成易享炎^a 张志朋^a 黄 和^a Jonathan B. Baell^a
于 杨^{*,b} 黄 菲^{*,a}(^a 南京工业大学药学院 南京 211816)(^b 南京工业大学环境科学与工程学院 南京 211816)

摘要 近年来,微波辅助有机合成(Microwave-assisted organic synthesis, MAOS)作为新兴的绿色有机合成方法受到研究者的广泛关注.与传统加热方法相比,其反应时间更短,产物收率更高并具有良好的反应选择性.许多人名反应中,譬如 Diels-Alder 反应、Wittig 反应、Heck 反应和 Mannich 反应,均可利用该技术实现反应的快速进行.另外, α -重氮酯类化合物作为有机合成中一类重要的活性中间体,可以应用于 Wolff 重排反应以及 C—H, N—H, Si—H 等一系列插入反应.虽然关于 α -重氮酯的研究在 20 年前已经成为一个成熟的学科,但在一些领域仍激发着研究者浓厚的研究兴趣.基于此,借助微波技术实现了短时间内 α -重氮酯类化合物的克级制备,分离收率最高可达 90%,且具有良好的官能团兼容性.该方法操作简便,反应条件温和,原子利用效率高,符合绿色化学的要求,为 α -重氮酯类化合物的合成及进一步衍生化研究提供极大的便利.

关键词 微波辅助; α -重氮酯; 绿色化学

Microwave-Assisted Synthesis of α -DiazoestersYi, Xiangyan^a Zhang, Zhipeng^a Huang, He^a Baell, Jonathan B.^a
Yu, Yang^{*,b} Huang, Fei^{*,a}(^a College of Pharmaceutical Sciences, Nanjing Tech University, Nanjing 211816)(^b School of Environmental and Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 211816)

Abstract Shorter reaction times, higher product yields and enhanced selectivity are some of the outstanding advantages over conventional methods that the microwave-assisted organic synthesis possesses, which makes this methods develop into a significant mainstream both in industrial usages and academic researches. Microwave-assisted organic synthesis as a new protocol for green chemistry showcases the application of microwave heating in a number of areas of preparative chemistry as well as in the biosciences. Many name reactions can be performed by microwave-assisted, including the Diels-Alder reaction, the Wittig reaction, the Heck reaction and the Mannich reaction. Meanwhile, α -diazoester was already a mature science 20 years ago, some areas that continue to attract the most attention are preparation of diazoester substrates, such as the Wolff rearrangement, C—H insertion, N—H insertion, Si—H insertion and so on. Therefore, it is necessary to develop a green and efficient method for the preparation of α -diazoester. Herein a new method of microwave-assisted synthesis of α -diazoesters compounds from 2-phenylacetates and tosyl azide in 30 min is described. The protocol provides a quick, efficient and green approach to various α -diazoesters compounds with up to 90% isolated yields and a broad range of functional groups.

Keywords microwave-assisted; α -diazoester; green chemistry

自 1991 年“绿色化学”的概念被提出以来,有机合成的绿色化一直备受关注.在传统的有机合成中,通常需要维持较高的温度、较长的反应时间以及使用有毒且生物降解性差的有机试剂作为溶剂,这一过程无疑会给

能源和环境造成巨大的负担.近年来,传统的有机合成方法正在被一些绿色、快速、高效的合成方法所取代,譬如微波辅助有机合成、声化学合成技术、光催化、电催化、酶催化以及非传统溶剂有机合成^[1].其中,微波辅助

* Corresponding authors. E-mail: yuyang19880421@yeah.net; huangfei0208@yeah.net

Received July 20, 2018; revised September 7, 2018; published September 26, 2018.

Project supported by the Jiangsu Synergetic Innovation Center for Advanced Bio-manufacture (Nos. XTE1850, XTC1810) and the Program for Innovative Research Team in Universities of Jiangsu Province (2015).

江苏省先进生物制造创新中心(Nos. XTE1850, XTC1810)和江苏高校优秀科技创新团队计划(2015)资助项目.

有机合成(MAOS)由于其加热速率快、操作方便、产率高等特点被认为是一种极具应用前景的绿色合成方法^[2]。

微波应用于有机合成的研究始于 1986 年, Gedye 等^[3]通过比较常规条件与微波辐射条件下进行酯化、水解、氧化等反应, 发现在微波辐射下, 反应得到了不同程度的加快。微波加热的热量产生于物质内部是它区别于其他加热方法的最主要的特点^[4]。目前, 微波加快有机合成反应的类型众多^[5], 包括 Diels-Alder 反应、Witting 反应、Claisen 重排反应、Mannich 反应、Heck 反应、烯烃加成、酯化反应、烷基化反应、脱保护反应、成环反应、缩合反应、偶合反应、硝化反应、水解反应等, 反应类型几乎涉及了有机合成反应的各个主要领域, 基本上在传统加热条件下的能发生的有机反应都可以在微波下进行。

α -重氮酯类化合物是一种有机合成中应用极为广泛的活性中间体^[6], 此类化合物分解后失去 N_2 , 根据不同的反应体系形成高度活泼的自由基卡宾或金属卡宾, 可以用于 C—H, N—H, O—H, Si—H, B—H, C—C 或 C=C 插入反应构筑相应的 C—C, C—N, C—O, C—Si,

C—B 键等, 具有良好的化学反应活性及选择性^[7] (Scheme 1)。

传统借助重氮转移反应实现 α -重氮酯类化合物的合成, 通常需要持续加热^[8]或室温下搅拌过夜^[9]。

因此, 我们希望以此作为研究的切入点, 将微波技术应用于 α -重氮酯类化合物的合成, 这种方法可以在短时间内实现 α -重氮酯类化合物的克级制备, 且具有很好的底物普适性, 从而为 α -重氮酯类化合物的制备提供一种绿色、高效的合成路径 (Scheme 2)。

1 结果与讨论

为了筛选最佳反应条件, 以苯乙酸甲酯(**1a**)和对甲苯磺酰叠氮(**2a**)为原料, 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯(DBU)为催化剂, 以乙腈为溶剂, 在微波反应器中反应 30 min 为模型反应条件, 考察微波功率、温度、时间及物料投料比对产率的影响(表 1)。

实验结果表明微波功率对产率有一定的影响, 微波功率为 400 W 时产率最高, 加大微波功率产率反而下降, 这可能是由于功率过大, 升温速率太快导致部分原

图式 1 α -重氮酯的应用
Scheme 1 Application of α -diazoesters

Pervious work

This work

图式 2 α -重氮酯的合成途径
Scheme 2 Approach to α -diazoesters

料发生分解变质;在微波功率为 400 W 的条件下,又对微波加热的温度进行考察,实验结果表明,反应温度过低或过高都不利于反应的进行,30 °C 为最佳反应温度;对微波加热的时间进行考察,发现反应时间为 30 min 时,原料的产率即可达到 90%,且随着反应时间的延长,产率不再提高。

在此基础上,继续探究了不同物料比对反应产率的影响。发现当 **1a**/**2a** 物质的量之比为 1:1.1 时,产率最高。至此,该反应的最优条件为: **1a** (0.5 mmol), **2a** (0.55 mmol, 1.1 equiv.), DBU (0.75 mmol, 1.5 equiv.), MeCN (5 mL), 微波功率 400 W, 30 °C, 30 min, 气相收率为 95%, 分离收率为 90%。

表 1 条件筛选^a

Table 1 Conditions optimization

Entry	Power/W	Temp./°C	Time/min	Yield ^b /%
1	200	30	30	80
2	400	30	30	90
3	600	30	30	86
4	800	30	30	82
5	400	40	30	90
6	400	60	30	88
7	400	80	30	80
8	400	30	10	75
9	400	30	40	90
10	400	30	60	90
11 ^c	400	30	30	95 (90) ^d
12 ^e	400	30	30	88
13 ^f	400	30	30	85

^a Conditions: **1a** (0.5 mmol), **2a** (0.5 mmol), DBU (0.7 mmol), MeCN (5 mL), air. ^b GC yield with mesitylene as the internal standard. ^c **2a** (0.55 mmol).

^d Isolated yield given in parentheses. ^e **2a** (0.65 mmol). ^f **2a** (1.0 mmol).

得到最优的条件后,开始对该反应体系的底物适用范围进行了考察(表 2)。R¹ 选自以下基团: 乙酰基、乙基、苄基或卤素、三氟甲基、甲基、甲氧基、对甲苯磺酰基取代的苯环; R² 为甲基、乙基、烯丙基、异丁基和苄基。首先探究了苯环上的电子效应和位阻效应对收率的影响,发现含有吸电子基取代的 **3b**~**3f** 的收率在 80%~86%之间,供电子基取代的 **3g**, **3h** 收率可以达到 85%;不同位置取代 **3c**~**3e** 之间收率相差不明显,均可以中等至良好的收率得到目标产物,电子效应和位阻效应对目标产物收率影响不大。其次,对于不同类型的酯,例如乙酯(**3g**~**3i**)、烯丙基酯(**3j**)、异丁基酯(**3k**)、苄酯(**3l**),其目标产物的收率也可以达到 80%以上,均可实现克级规模产物制备,说明该反应体系具有较好的普适性。值得一提的是,产物 **3m** 能够在一步反应中完成两个位点的反应,在发生重氮转移反应的同时,对甲苯磺酰基会取代苯环羟基上的氢,实现对羟基的保护。当原料 **1** 中不含苄基,即乙酰乙酸乙酯(**1n**)作为原料时,反应也可以

很好地进行,以 85% 的分离收率得到目标产物 **3n**。当以羰基 α -位被乙基(**1o**)或苄基(**1p**)取代的酯为原料时,在标准条件下可实现乙酰基脱除进而得到目标产物 **3o** 和 **3p**。

表 2 α -重氮酯类化合物的底物拓展^aTable 2 Substrates scope of α -diazooesters compounds

^a The reaction condition: **1a** (10.0 mmol), **2a** (11.0 mmol, 1.1 equiv.), DBU (15.0 mmol, 1.5 equiv.), MeCN (20 mL), microwave 400 W, 30 °C, 30 min. Isolated yields.

此外,我们对产物 **3a** 做了进一步衍生化,重氮酯 **3a** 作为卡宾插入前体,与对三氟甲基苯胺反应,实现了卡宾插入 N—H 键,构筑了新的 C—N 键^[10],得到了 2-((4-(三氟甲基)苯基)氨基)苯乙酸甲酯(**5a**)。同样使用金属铈,可以实现产物 **3g** 与苯酚之间 O—H 插入反应^[11],得到了 2-苯氧基 2-苯基乙酸乙酯 **5b** (Scheme 3)。

苯乙酸甲酯(**1a**)和对甲苯磺酰叠氮(**2a**)的重氮转移反应可能的反应机理如 Scheme 4 所描述^[12]。首先,化合物 **1a** 中的 α -H 在碱的作用下脱去,形成碳负离子 **A**,继而碳负离子亲核进攻氮正离子,经历过渡态 **B** 后,发生分子内氢质子迁移,脱去 Tos-NH⁻ 后得到终产物 **3a**。

图式 3 N—H 和 O—H 插入反应
Scheme 3 N—H and O—H insertion reaction

图式 4 可能的反应机理
Scheme 4 Plausible mechanism

2 结论

将微波技术应用于 α -重氮酯类化合物的合成是一种绿色有机合成策略. 通过对微波功率、温度、时间及反应物料比的条件优化实现了 α -重氮酯类化合物的高效制备. 该方法不仅操作简单、绿色环保、官能团兼容性良好, 而且有机反应速率相比传统的加热方法快数倍, 能在短时间内进行克级规模产物制备, 为此类化合物的合成提供了一种高效、便捷的方法. 同时, 对于含有杂环、共轭结构更为复杂的 α -重氮酯微波合成的研究正在进行之中.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

选用南京信博仪器有限公司的 MC2-3A 常压微波反应器. ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 实验使用 Bruker DRX-400 核磁共振谱仪, 并以 CDCl_3 为溶剂, 以四甲基硅烷 (TMS) 为内标. 气质分析使用 Agilent 7890/5975C 气质联用仪. 薄层色谱 (TLC) 分析使用 Sigma-Aldrich silica gel 60F₂₀₀ 硅胶板, 柱层析使用 200~300 目硅胶. 实验

中所使用溶剂均做无水处理, 其他试剂未做进一步纯化或处理.

3.2 实验方法

将 100 mL 两口反应瓶置于 0 °C 冰浴中, 加入酯类化合物 **1** (10.0 mmol) 和 20 mL 乙腈, 搅拌均匀后加入对甲苯磺酰叠氮 (**2a**, 11.0 mmol), 缓慢加入 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯 (DBU) (15.0 mmol), 在冰浴下搅拌 5 min, 放入微波反应器, 设定功率 400 W, 加热温度 30 °C, 加热时间 30 min, 开启排风扇. 反应结束后, 将混合物冷却至室温, 加入 NH_4Cl 溶液进行淬灭, 二氯甲烷与水萃取, 收集有机相, 无水硫酸钠干燥, 过滤, 减压下除去挥发组份, 然后用硅胶柱层析分离 [洗脱液为石油醚 (60~90 °C)/乙酸乙酯, $V:V=100:1$] 得到目标产物 **3**.

2-重氮基-2-苯基乙酸甲酯 (**3a**)^[13]: 红色油状液体, 1.58 g, 产率 90%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.49 (dd, $J=8.5, 1.1$ Hz, 2H), 7.39 (t, $J=7.9$ Hz, 2H), 7.19 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 3.87 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 165.57, 128.96, 125.83, 125.49, 123.94, 51.99. 未在核磁谱中监测到与重氮基相连碳原子的峰.

2-重氮基-2-(2-氟苯基)乙酸甲酯 (**3b**)^[14]: 黄色油状液体, 1.55 g, 产率 80%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.70 (t, $J=8.7$ Hz, 1H), 7.29~7.14 (m, 2H), 7.13~7.001 (m, 1H), 3.86 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 165.66, 158.41 (d, $J=247.4$ Hz), 129.47 (d, $J=2.00$ Hz), 128.61 (d, $J=8.2$ Hz), 124.67 (d, $J=3.5$ Hz), 115.70 (d, $J=21.3$ Hz), 113.81 (d, $J=11.9$ Hz), 52.20. 未在核磁谱中监测到与重氮基相连碳原子的峰.

2-重氮基-2-(2-氯苯基)乙酸甲酯 (**3c**)^[15]: 黄色油状液体, 1.81 g, 产率 86%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.55 (dd, $J=7.7, 1.6$ Hz, 1H), 7.43 (dd, $J=7.8, 1.4$ Hz, 1H), 7.37~7.26 (m, 2H), 3.85 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 166.06, 133.84, 132.39, 130.17, 129.72, 127.25, 123.98, 52.38.

2-重氮基-2-(3-氯苯基)乙酸甲酯 (**3d**)^[15]: 黄色固体, 1.75 g, 产率 83%. m.p. 50~52 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.53 (s, 1H), 7.36~7.27 (m, 2H), 7.14 (dt, $J=7.1, 1.9$ Hz, 1H), 3.87 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 165.13, 135.13, 130.15, 127.81, 125.87, 123.76, 121.67, 63.33, 52.25.

2-重氮基-2-(4-氯苯基)乙酸甲酯 (**3e**)^[15]: 黄色固体, 1.68 g, 产率 80%. m.p. 50~53 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.42 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 7.35 (d, $J=8.9$ Hz, 2H), 3.87 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 165.42, 131.60, 129.23, 125.17, 124.24, 52.24. 未在核磁谱中监

测到与重氮基相连碳原子的峰。

2-重氮基-2-(4-三氟甲基苯基)乙酸乙酯(**3f**)^[16]: 黄色固体, 2.06 g, 产率 80%. m.p. 59~60 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.61 (s, 4H), 4.35 (q, $J=7.1$ Hz, 2H), 1.35 (t, $J=7.1$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 164.44, 130.25, 127.59 (d, $J=32.8$ Hz), 125.94 (q, $J=3.8$ Hz), 124.08 (q, $J=271.6$ Hz), 123.41, 61.33, 14.47.

2-重氮基-2-(4-甲基苯基)乙酸乙酯(**3g**)^[17]: 红色油状液体, 1.73 g, 产率 85%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.37 (d, $J=8.3$ Hz, 2H), 7.20 (d, $J=8.1$ Hz, 2H), 4.33 (q, $J=7.1$ Hz, 2H), 2.34 (s, 3H), 1.34 (t, $J=7.1$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 165.62, 135.76, 129.78, 124.23, 122.39, 61.04, 21.12, 14.64.

2-重氮基-2-(4-甲氧基苯基)乙酸甲酯(**3h**)^[15]: 红色固体, 1.75 g, 产率 85%. m.p. 45~48 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.38 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 6.94 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 3.85 (s, 3H), 3.80 (s, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 166.26, 158.17, 126.05, 116.94, 114.69, 55.43, 52.05. 未在核磁谱中监测到与重氮基相连碳原子的峰。

2-重氮基-2-(4-(对甲苯磺酰氧基)苯基)乙酸甲酯(**3i**)^[18]: 橙色固体, 2.60 g, 产率 75%. m.p. 101~102 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.69 (d, $J=8.3$ Hz, 2H), 7.39 (d, $J=8.9$ Hz, 2H), 7.30 (d, $J=8.1$ Hz, 2H), 6.98 (d, $J=8.9$ Hz, 2H), 3.84 (s, 3H), 2.44 (s, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 165.32, 147.39, 145.60, 132.28, 129.92, 128.65, 124.87, 123.10, 52.23, 21.85. 未在核磁谱中监测到与重氮基相连碳原子的峰。

2-重氮基-2-苯基乙酸乙酯(**3j**)^[19]: 红色油状液体, 1.62 g, 产率 85%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.50 (d, $J=7.5$ Hz, 2H), 7.39 (t, $J=7.9$ Hz, 2H), 7.19 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 4.34 (q, $J=7.1$ Hz, 2H), 1.35 (t, $J=7.1$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 165.25, 128.97, 125.79, 125.70, 124.00, 61.03, 14.56. 未在核磁谱中监测到与重氮基相连碳原子的峰。

2-重氮基-2-苯基乙酸异丁酯(**3k**)^[20]: 黄色油状液体, 1.73 g, 产率 80%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.49 (d, $J=7.5$ Hz, 2H), 7.39 (t, $J=7.9$ Hz, 2H), 7.18 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 4.07 (d, $J=6.6$ Hz, 2H), 2.02 (dt, $J=13.4, 6.7$ Hz, 1H), 0.98 (d, $J=6.7$ Hz, 6H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 165.37, 129.05, 125.88, 125.75, 124.06, 71.06, 28.04, 19.18.

2-重氮基-2-苯基乙酸烯丙酯(**3l**)^[20]: 红色油状液体, 1.62 g, 产率 80%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.51 (d, $J=8.5$ Hz, 2H), 7.40 (t, $J=7.9$ Hz, 2H), 7.20 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 6.00 (ddd, $J=22.8, 10.8, 5.6$ Hz, 1H), 5.34 (dd,

$J=35.3, 13.8$ Hz, 2H), 4.79 (d, $J=5.6$ Hz, 2H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 164.80, 132.15, 128.96, 125.86, 125.46, 123.97, 118.36, 65.44.

2-重氮基-2-苯基乙酸苄酯(**3m**)^[21]: 黄色固体, 2.02 g, 产率 80%. m.p. 53~55 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.51 (d, $J=7.5$ Hz, 2H), 7.44~7.33 (m, 7H), 7.200 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 5.33 (s, 2H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 165.11, 135.98, 129.06, 128.74, 128.45, 128.27, 125.99, 125.51, 124.10, 66.59. 未在核磁谱中监测到与重氮基相连碳原子的峰。

2-重氮基-乙酰乙酸乙酯(**3n**)^[22]: 黄色油状液体, 1.33 g, 产率 85%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 4.29 (q, $J=7.1$ Hz, 2H), 2.46 (s, 3H), 1.32 (t, $J=7.1$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 190.38, 161.55, 61.56, 28.37, 14.45.

2-重氮基丁酸乙酯(**3o**)^[23]: 黄色油状液体, 1.14 g, 产率 80%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 4.18 (q, $J=7.1$ Hz, 2H), 2.31 (q, $J=7.5$ Hz, 2H), 1.23 (t, $J=7.1$ Hz, 3H), 1.09 (t, $J=7.5$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 167.59, 60.70, 16.61, 14.55, 11.96.

2-重氮基-3-苯基丙酸乙酯(**3p**)^[24]: 黄色油状液体, 1.63 g, 产率 80%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.35~7.29 (m, 2H), 7.25 (d, $J=7.5$ Hz, 3H), 4.25 (q, $J=7.1$ Hz, 2H), 3.63 (s, 2H), 1.28 (t, $J=7.1$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 166.97, 137.23, 128.66, 128.23, 126.97, 60.79, 29.17, 14.17. 未在核磁谱中监测到与重氮基相连碳原子的峰。

2-苯基-2-((4-(三氟甲基)苯基)氨基)乙酸甲酯(**5a**)^[25]: 白色固体, 122 mg, 产率 79%. m.p. 88~89 °C; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.48 (d, $J=6.7$ Hz, 2H), 7.43~7.28 (m, 5H), 6.56 (d, $J=8.5$ Hz, 2H), 5.38 (s, 1H), 5.11 (s, 1H), 3.76 (s, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 171.87, 148.36, 136.88, 129.17, 128.73, 127.27, 126.72 (q, $J=3.7$ Hz), 124.92 (q, $J=270.3$ Hz), 112.74, 60.25, 53.17.

2-苯氧基-2-苯基乙酸乙酯(**5b**)^[26]: 无色油状液体, 25 mg, 产率 21%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.52 (dd, $J=7.8, 1.4$ Hz, 2H), 7.35~7.26 (m, 3H), 7.19 (dd, $J=8.7, 7.5$ Hz, 2H), 6.99~6.81 (m, 3H), 5.55 (s, 1H), 4.12 (dd, $J=14.0, 7.1$ Hz, 2H), 1.13 (t, $J=7.1$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 170.06, 157.40, 135.59, 129.65, 129.02, 128.86, 127.16, 121.87, 115.55, 78.71, 61.74, 14.13.

辅助材料(Supporting Information) 化合物 **3a**~**3p**, **5a**, **5b** 的 ¹H NMR 和 ¹³C NMR 谱图。这些材料可以免费

从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] (a) Feng, R.; Li, H. M. *Sonochemistry and Its Applications*, Anhui Science and Technology Press, Hefei, **1992** (in Chinese). (冯若, 李化茂, 声化学及其应用, 安徽科学技术出版社, 合肥, **1992**.)
(b) Romero, N. A.; Nicewicz, D. A. *Chem. Rev.* **2016**, *116*, 10075.
(c) Shaw, M. H.; Twilton, J.; Macmillan, D. W. J. *Org. Chem.* **2016**, *81*, 6898.
(d) Bockris, J. O.; Minevski, Z. S. *Electrochim. Acta* **1994**, *39*, 1471.
(e) Ming, Y.; Yu, K.; Baran, P. S. *Chem. Rev.* **2017**, *117*, 13230.
(f) Frank, R. A.; Leeper, F. J.; Luisi, B. F. *Cell. Mol. Life Sci.* **2007**, *64*, 892.
- [2] (a) Kappe, C. O. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2004**, *43*, 6250.
(b) Caddick, S. *Tetrahedron Lett.* **1995**, *51*, 10403.
(c) Pelle, L.; Jason, T.; Bernard, W.; Jacob, W. *Tetrahedron* **2001**, *57*, 9225.
(d) Enquist, P. A.; Nilsson, P.; Larhed, M. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 4875.
(e) Sandoval, W.; Pham, V. J. *Drug Discovery Today* **2008**, *13*, 1075.
(f) Appukkuttan, P.; Erik, V. D. E. *Eur. J. Org. Chem.* **2008**, *7*, 1133.
(g) Schmink, J. R.; Kormos, C. M.; Devine, W. G.; Leadbeater, N. E. *Org. Process Res. Dev.* **2010**, *14*, 205.
(h) Rodríguez, A. M.; Prieto, P.; De La Hoz, A.; Ángel Díaz Ortiz; Martín, D. R.; García, J. I. *ChemistryOpen* **2015**, *4*, 308.
(i) Frecentese, F.; Saccone, I.; Caliendo, G.; Corvino, A.; Fiorino, F.; Magli, E.; Perissutti, E.; Severino, B.; Santagada, V. *Med. Chem.* **2016**, *12*, 720.
(j) Lin, W.; Zheng, Y. X.; Xun, Z.; Huang, Z. B.; Shi, D. Q. *ACS Comb. Sci.* **2017**, *19*, 708.
(k) Kumar, A.; Jad, Y. E.; Collins, J. M.; Albericio, F.; De la Torre, B. G. *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2018**, *6*, 8034.
(l) Rieger, E.; Gleede, T.; Manhart, A.; Lamla, M.; Wurm, F. R. *ACS Macro Lett.* **2018**, *7*, 598.
(m) Verrier, C.; Carret, S.; Poisson, J. F. *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2018**, *6*, 8563.
(n) Lin, J.; Wang, Y. L.; Zhang, J. H.; Yang, J. S.; Mou, H. C.; Lin, J.; Yan, S. J. *ACS Omega* **2018**, *3*, 4534.
- [3] Gedye, R.; Smith, F.; Westaway, K. *Tetrahedron Lett.* **1986**, *27*, 279.
- [4] Zhao, K. Y.; Xu, F. Y. *The Principle and Technology of Microwave*, Higher Education Press, Beijing, **2006** (in Chinese). (赵克玉, 许福永, 微波原理与技术, 高等教育出版社, 北京, **2006**.)
- [5] Fan, X.; You, X.; Tan, G.; Yu, X.; Jiao, T. *Prog. Chem.* **1998**, *10*, 285 (in Chinese). (樊兴君, 尤进茂, 谭干祖, 俞贤达, 焦天权, 化学进展, **1998**, *10*, 285.)
- [6] (a) Ford, A.; Miel, H.; Ring, A.; Slattery, C. N.; Maguire, A. R.; Mckervy, M. A. *Chem. Rev.* **2015**, *115*, 9981.
(b) Orihara, K.; Kawagishi, F.; Yokoshima, S.; Fukuyama, T. *Synlett* **2018**, *29*, 769.
(c) Deepa, N.; Prashant, P.; Savita, K.; Irishi, N. N. N. *Tetrahedron Lett.* **2016**, *57*, 3146.
(d) Rajasekaran, T.; Sridhar, B.; Reddy, B. V. S. *Tetrahedron* **2016**, *72*, 2102.
- [7] (a) Ovalles, S. R.; Hansen, J. H.; Davies, H. M. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 4284.
(b) Lebel, H.; Marcoux, J. F.; Molinaro, C.; Charette, A. B. *Chem. Rev.* **2003**, *4*, 977.
(c) Nicolas, I.; Maux, P. L.; Simonneaux, G. *Coord. Chem. Rev.* **2008**, *252*, 727.
(e) Chen, D. Y.; Pouwer, R. H.; Richard, J. A. *Chem. Soc. Rev.* **2012**, *41*, 4631.
(f) Reisman, S. E.; Nani, R. R.; Levin, S. *Synlett* **2011**, 2437.
(g) Davies, H. M.; Morton, D. *Chem. Soc. Rev.* **2011**, *40*, 1857.
(h) Xia, Y.; Liu, Z.; Liu, Z.; Ge, R.; Ye, F.; Hossain, M.; Zhang, Y.; Wang, J. J. *Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 3031.
(i) Larsen, S. D.; Barf, T.; Liljebris, C.; May, P. D.; Ogg, D.; O'Sullivan, T. J.; Palazuk, B. J.; Schostarez, H. J.; Stevens, C. F.; Bleasdale, E. J. *J. Med. Chem.* **2002**, *45*, 598.
(j) Lepage, R. J.; White, J. M.; Coster, M. J. *Chem. Commun.* **2017**, 53, 4219.
(k) Huang, B.; Shen, Y.; Mao, Z.; Liu, Y.; Cui, S. *Org. Lett.* **2016**, *18*, 4888.
(l) Popp, B. V.; Ball, Z. T. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 6660.
- [8] Bartrum, H. E.; Blakemore, D. C.; Moody, C. J.; Hayes, C. J. *Chem.-Eur. J.* **2011**, *17*, 9586.
- [9] Keipour, H.; Jalba, A.; Delage-Laurin, L.; Ollevier, T. J. *Org. Chem.* **2017**, *82*, 3000.
- [10] Nicolle, S. M.; Hayes, C. J.; Moody, C. J. *Chemistry* **2015**, *21*, 4576.
- [11] Hazeldine, S. T.; Polin, L.; Kushner, J.; White, K.; Corbett, T. H.; Horwitz, J. P. *Bioorg. Med. Chem.* **2005**, *13*, 3910.
- [12] (a) Danheiser, R. L.; Miller, R. F.; Brisbois, R. G.; Park, S. Z. *J. Org. Chem.* **1990**, *55*, 1959.
(b) Abad, A.; Agulló, C.; Cuñat, A. C.; de Alfonso Marzal, I.; Navarro, I.; Gris, A. *Tetrahedron* **2006**, *62*, 3266.
(c) Arthuis, M.; Beaud, R.; Gandon, V.; Roulland, E. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 10510.
(d) Shibuya, G. M.; Enquist, J. A.; Stoltz, B. M. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 3480.
- [13] Starmans, W. A. J.; Thijs, L.; Zwanenburg, B. *Tetrahedron* **1998**, *54*, 629.
- [14] Maier, T. C.; Fu, G. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 4594.
- [15] Davies, H. M. L.; Hansen, T.; Churchill, M. R. *J. Am. Chem. Soc.* **2000**, *122*, 3063.
- [16] Ye, F.; Wang, C.; Zhang, Y.; Wang, J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, *53*, 11625.
- [17] Chen, G.; Song, J.; Yu, Y.; Luo, X.; Li, C.; Huang, X. *Chem. Sci.* **2016**, *7*, 1786.
- [18] Jason, T.; Richard, T.; Graham, K. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 16312.
- [19] Bachmann, S.; Fielenbach, D.; Jørgensen, K. A. *Org. Biomol. Chem.* **2004**, *2*, 3044.
- [20] Luo, X.; Chen, G.; He, L.; Huang, X. *J. Org. Chem.* **2016**, *81*, 2943.
- [21] Tayama, E.; Yanaki, T.; Iwamoto, H.; Hasegawa, E. *Eur. J. Org. Chem.* **2010**, *2010*, 6719.
- [22] Davies, J. R.; Kane, P. D.; Moody, C. J. *Tetrahedron* **2004**, *60*, 3967.
- [23] Li, W.; Liu, X.; Hao, X.; Hu, X.; Chu, Y.; Cao, W.; Qin, S.; Hu, C.; Lin, L.; Feng, X. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 15268.
- [24] Taber, D. F.; Sheth, R. B.; Joshi, P. V. *J. Org. Chem.* **2005**, *70*, 2851.
- [25] Wang, Y.; Zhu, Y.; Chen, Z.; Mi, A.; Hu, W.; Doyle, M. P. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 3923.
- [26] Zeineddine, A.; Rekhroukh, F.; Sosa Carrizo, E. D.; Mallet-Ladeira, S.; Miqueu, K.; Amgoune, A.; Bourissou, D. *Angew. Chem., Int. Ed.* **20018**, *57*, 1306.

(Zhao, C.)