N,N-二(2-吡啶甲基)胺基三聚茚衍生物的合成及对铜离子、镍离子的选择性识别

朱阳明^a 王忠龙^a 杨 剑^a 徐 徐^a 王石发^a
蔡正春^a 徐海军^{*,a,b}

(^a 南京林业大学化学工程学院 江苏生物质能源与化学品重点实验室 南京 210037)

(^b 江苏省生物质能源与材料重点实验室 南京 210042)

摘要 以二(2-吡啶甲基)胺(DPA)和三聚茚为原料,设计合成了一种“turn-off”型荧光探针化合物 **6**,表征了其结构,研究了它对不同金属离子的识别作用.结果表明,化合物 **6** 对 Cu^{2+} 和 Ni^{2+} 具有较高的灵敏性和选择性,在 *N,N*-二甲基甲酰胺(DMF)/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) 溶液中对 Cu^{2+} 、 Ni^{2+} 显示出荧光淬灭效应,且对 Cu^{2+} 检测几乎不受其他金属离子的干扰;高分辨质谱证明化合物 **6** 与 Cu^{2+} 、 Ni^{2+} 结合计量比为 1:1;化合物 **6** 对 Cu^{2+} 的检测极限可低至 28 nmol/L,对 Ni^{2+} 的检测极限可低至 41 nmol/L,检测极限均低于世界卫生组织(WHO)规定的饮用水中两种离子最大含量,有潜在的应用价值.

关键词 三聚茚; 二(2-吡啶甲基)胺; 荧光探针; Cu^{2+} ; Ni^{2+}

N,N-Bis(2-pyridylmethyl)amine-Based Truxene Derivative as a Highly Sensitive Fluorescence Sensor for Cu^{2+} and Ni^{2+} Ion

Zhu, Yangmin^a Wang, Zhonglong^a Yang, Jian^a Xu, Xu^a Wang, Shifa^a
Cai, Zhengchun^a Xu, Haijun^{*,a,b}

(^a College of Chemical Engineering, Jiangsu Key Laboratory of Biomass-Based Green Fuels and Chemicals, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037)

(^b Jiangsu Key Laboratory for Biomass Energy and Material of Jiangsu Province, Nanjing 210042)

Abstract A new turn-off probe **6** was synthesized from bis(pyridin-2-ylmethyl)amine and truxene derivatives, and its structure was confirmed by ^1H NMR and HRMS. The recognition behaviors of **6** to various metal ions were investigated and the results show that **6** exhibited good selectivity and high sensitivity to Cu^{2+} and Ni^{2+} with good anti-interference. The probe **6** presented apparent fluorescence quenching in DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) solution toward Cu^{2+} and Ni^{2+} . HRMS analysis showed a 1:1 binding stoichiometry between **6** and Cu^{2+} or Ni^{2+} . The detection limit for Cu^{2+} and Ni^{2+} was calculated to be 28 and 41 nmol/L, respectively. The detection limit of **6** for Cu^{2+} and Ni^{2+} was far lower than the maximum allowable level of World Health Organization (WHO) limit for drinking water.

Keywords truxene; bis(pyridin-2-ylmethyl)-amine (DPA); fluorescent sensor; Cu^{2+} ; Ni^{2+}

重金属和过渡金属污染已引起全世界越来越多的关注. 在各种过渡金属中, Cu^{2+} 由于其在生物系统中的生理作用以及其显著的环境影响而特别受关注^[1]. Cu^{2+}

是生物体内继铁和锌金属之后的第三种最丰富的必需的微量金属元素, 它在各种生理过程中起着至关重要的作用, 如能量产生和信号转输^[2]. 另外, Cu^{2+} 在超氧化物

* Corresponding author. E-mail: xuhaijun@njfu.edu.cn

Received July 23, 2018; revised September 25, 2018; published online October 12, 2018.

Project supported by the Natural Science Foundation of Jiangsu Province (No. BK20151513), the Fok Ying Tung Education Foundation (No. 141030), the Fund from Jiangsu Key Laboratory for Biomass Energy and Material (No. JSBEM201702) and the Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions (PAPD).

江苏省自然科学基金(No. BK20151513)、霍英东教育基金(No. 141030)、江苏省生物质能源与材料重点实验室(No. JSBGFC12002)及江苏高校优势学科建设工程(PAPD)资助项目.

歧化酶、细胞色素氧化酶和酪氨酸酶等金属酶中作为催化辅助因子也起着十分重要作用^[3,4]。但生物体内铜离子含量过高时也会产生严重的毒害作用, 可以导致严重的神经性退变型疾病, 例如缅甸斯综合症、威尔森氏综合症、家族性肌萎缩症和阿尔茨海默氏症等病症^[5~7]。另外, 过量的铜也会抑制植物的生长和矿营养物质摄取^[8]。同时, 由于其在日常生活中的广泛应用, 铜也是环境中主要的污染源之一。美国环境保护署(EPA)规定的饮用水中铜限量为 1.3 mg/L, 物质的量浓度约为 20 $\mu\text{mol/L}$ ^[10~12]。同样, Ni^{2+} 是人类生活中继 Cu^{2+} 金属离子之后的另一个重要离子, 它是生物体的重要金属营养物, 与酶代谢、呼吸作用和蛋白质生物合成等多种生物学功能息息相关^[13~16]。此外, 镍也是一种重要的环境污染物, 它在电镀、催化、合金生产、镍镉电池、超级电容器等行业中的较高使用量不可避免地导致环境污染并对人类健康产生危害^[17,18]。镍过量能导致肺炎、哮喘、肺纤维化、心血管和肾脏等疾病^[19~23]。因此, 对这两种离子的检测和识别具有非常重要的现实意义^[24~28]。

近年来, 荧光探针法因操作简便、响应时间短、高选择性和高灵敏度等优点被广泛地应用于金属离子的检测中^[29~32]。到目前为止, 能识别 Cu^{2+} 和 Ni^{2+} 的荧光探针已有大量报道^[33~39]。然而, 仍然不可避免地存在一些缺点, 例如灵敏度低、选择性差、水溶性不好等。因此设计和合成出灵敏度高、专一性好并可以在水溶液体系中进行检测 Cu^{2+} 和 Ni^{2+} 的荧光探针越来越受到人们的关注^[5,25,40~42]。另外, 二(2-吡啶甲基)胺(DPA)是有效的金属螯合剂, 广泛用于荧光探针中, 在金属离子化学传

感器方面具有重要的应用价值, 已成为近年来的研究热点^[43~46]。

基于上述因素, 本工作设计合成了一个基于三聚茚和 DPA 结构的荧光探针化合物 **6** (Scheme 1), 其中三聚茚作为荧光团、DPA 作为识别基团。光谱研究表明, 探针可通过络合机理以荧光淬灭现象识别 Cu^{2+} 和 Ni^{2+} , 其荧光强度与金属离子浓度呈现良好的线性关系。另外, 质谱测试结果表明金属离子与化合物 **6** 络合比为 1 : 1。

1 结果与讨论

1.1 合成目标化合物的研究

探针化合物 **6** 的合成路线如 Scheme 1 所示。以三聚茚为原料, 首先根据文献方法^[47]合成出 2-甲酰基三聚茚(**3**)。然后以硼氢化钠为还原剂在四氢呋喃(THF)溶液中将三聚茚中醛基还原为羟基, 再与二氯亚砷反应生成三聚茚氯亚甲基, 最后再与 DPA 反应得到探针化合物 **6**。目标产物通过 ^1H NMR, ^{13}C NMR, ESI-HRMS 及元素分析得到证实。在 ^1H NMR 中, 与吡啶相连的亚甲基上的氢位于 δ 3.97 (CDCl_3), 与相关文献一致^[46]。

1.2 化合物 **6** 对不同金属离子的选择性识别研究

化合物 **6** ($10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 的荧光光谱如图 1 及附图 1 所示。激发波长为 310 nm 时, 化合物 **6** 在 371 nm 有一个最大波长发射峰。在加入 10 equiv. 各种金属离子(K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} , Cr^{3+} , Cd^{2+} , Ag^+ , Sn^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} ,

图式 1 探针化合物 **6** 的合成路线
Scheme 1 Synthesis of compound **6**

La^{3+} , Bi^{3+} , Cu^{2+} , Ni^{2+} , Pb^{2+})时, 仅 Cu^{2+} 、 Ni^{2+} 对此荧光峰有显著的荧光淬灭效应, Ag^{+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 对化合物 **6** 也有一定的荧光减弱效应, 其余的金属离子都对化合物 **6** 的荧光光谱几乎没有影响. 根据文献报道^[43~46], Cu^{2+} 、 Ni^{2+} 很容易与识别基团 DPA 中吡啶环上的两个 N 原子形成双齿络合, 化合物 **6** 由于受到顺磁性的 Cu^{2+} 和 Ni^{2+} 的旋轨耦合作用强荧光淬灭效应影响^[48~49], 使得化合物 **6** 在 371 nm 处的荧光强度明显减弱, 荧光发生淬灭. 因此, 化合物 **6** 是对 Cu^{2+} 和 Ni^{2+} 具有高选择性识别的荧光淬灭(ON-OFF)型探针.

图1 化合物 **6** (1.0×10^{-5} mol/L) 的 DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) 溶液中添加 10 equiv. 不同金属离子的荧光光谱的变化 ($\lambda_{\text{ex}}=310$ nm)

Figure 1 Fluorescence spectra of **6** (1.0×10^{-5} mol/L) in DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) in the presence of 10 equiv. of various metal ions ($\lambda_{\text{ex}}=310$ nm)

1.2.1 常见金属离子的干扰性

为了考察其它金属离子对化合物 **6** 与目标离子络合后干扰性, 在化合物 **6** 的 DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) 溶液中分别加入 10 equiv. 的目标离子(Cu^{2+} 或 Ni^{2+})后, 再加入 10 equiv. 的其它金属离子(K^{+} , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} , Cr^{3+} , Cd^{2+} , Ag^{+} , Sn^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} , La^{3+} , Bi^{3+} , Pb^{2+}), 混合均匀后, 测试荧光强度变化, 如图 2 和图 3 所示. 从图 2 可看出 Cd^{2+} 会对化合物 **6** 对 Cu^{2+} 的识别有影响, 但因为 Cd^{2+} 在生命系统中含量很低, 它的存在对 Cu^{2+} 的检测几乎不存在影响. 其余的金属离子均对 Cu^{2+} 对化合物 **6** 的荧光淬灭作用影响很小. 说明此探针在专一性识别生物体中的 Cu^{2+} 时具有良好的抗干扰性, 化合物 **6** 对 Cu^{2+} 的专一淬灭也使得它在检测生物体金属离子有着广阔的应用前景. 从图 3 同样可看出 Cd^{2+} 在化合物 **6** 对 Ni^{2+} 的专一性识别有明显的干扰影响. 另外, 除 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Ag^{+} 以外的其它金属离子在化合物 **6** 对 Ni^{2+} 的检测均有较大的干扰, 研究结果表明化合物 **6** 在 Ni^{2+} 的检测专一性能没有对 Cu^{2+} 的性能优良.

图2 化合物 **6** (1.0×10^{-5} mol/L) 的 DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) 溶液中分别加入 10 equiv. Cu^{2+} 后再加入 10 equiv. 其它金属离子后于 371 nm 的荧光强度 ($\lambda_{\text{ex}}=310$ nm)

Figure 2 Fluorescence properties of compound **6** (1.0×10^{-5} mol/L) in DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) solution at 371 nm for Cu^{2+} (10 equiv.) in the presence of different metal ion (10 equiv.) ($\lambda_{\text{ex}}=310$ nm)

图3 化合物 **6** (1.0×10^{-5} mol/L) 的 DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) 溶液中分别加入 10 equiv. Ni^{2+} 后再加入 10 equiv. 其它金属离子后于 371 nm 的荧光强度 ($\lambda_{\text{ex}}=310$ nm)

Figure 3 Fluorescence properties of compound **6** (1.0×10^{-5} mol/L) in DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) solution at 371 nm for Ni^{2+} (10 equiv.) in the presence of different metal ion (10 equiv.) ($\lambda_{\text{ex}}=310$ nm)

1.2.2 化合物 **6** 与 Cu^{2+} 和 Ni^{2+} 离子的线性关系

如图 4 所示, 向化合物 **6** 的溶液中加入 Cu^{2+} ($0 \sim 1$ equiv.), 随着 Cu^{2+} 浓度逐渐增大, 化合物 **6** 在 371 nm 的荧光强度逐渐降低, 当 Cu^{2+} 浓度达到 1 equiv. 时, 此荧光峰完全消失, 化合物 **6** 的荧光完全淬灭. 化合物 **6** 的荧光强度与 Cu^{2+} 浓度在 $0.1 \sim 1$ equiv. 区间具有良好的线性关系. 经过拟合得到线性回归方程: $y = -821.492x + 790.693$, $R^2 = 0.9829$, 并计算得到 Cu^{2+} 检测极限为 28 nmol/L (图 5). 世界卫生组织(WHO)规定饮用水中铜含量的安全值为 2.0 mg/L ($\approx 30 \mu\text{mol/L}$)^[40]. 实验所得最低检测限远低于 WHO 所规定的浓度, 所以化合物 **6** 可以

用于定量检测饮用水中 Cu^{2+} 浓度。

图4 化合物 **6** (1.0×10^{-5} mol/L) 的 DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) 的溶液中加入不同浓度 Cu^{2+} ($0 \sim 1.0$ equiv.) 后的荧光发射光谱($\lambda_{\text{ex}}=310$ nm)

Figure 4 Fluorescence spectra of **6** (1.0×10^{-5} mol/L) in DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) solution upon the addition of different concentration of Cu^{2+} ($0 \sim 1.0$ equiv.) ($\lambda_{\text{ex}}=310$ nm)

图5 化合物 **6** (1.0×10^{-5} mol/L) 在 DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) 的溶液中加入不同 equiv. Cu^{2+} 时荧光强度(371 nm)的线性拟合

Figure 5 Photography of the linear range for compound **6** (1.0×10^{-5} mol/L) in DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) with different concentration of Cu^{2+} ($0 \sim 1.0$ equiv.) ($\lambda_{\text{ex}}=310$ nm)

如图 6 所示, 在同样条件下将 Ni^{2+} ($0 \sim 1$ equiv.) 加入到化合物 **6** 的溶液中, 随着 Ni^{2+} 浓度的增大, 化合物 **6** 在 371 nm 的荧光强度逐渐降低, 同样当 Ni^{2+} 浓度达到 1 equiv. 时, 化合物 **6** 的荧光完全淬灭. 与 Cu^{2+} 不同的是, 化合物 **6** 的荧光强度与 Ni^{2+} 浓度仅在 $0.3 \sim 0.9$ equiv. 区间有良好的线性关系. 经过拟合得到线性回归方程: $y = -554.137x + 1079.514$, $R^2 = 0.9971$, 并计算得到 Ni^{2+} 检测极限为 41 nmol/L (图 7), 同样低于世界卫生组织(WHO)规定饮用水中镍含量的安全值为 0.02 mg/L ($\approx 0.34 \mu\text{mol/L}$).

1.2.3 化合物 **6** 与 Cu^{2+} 、 Ni^{2+} 的络合方式

为了确定化合物 **6** 与 Cu^{2+} 、 Ni^{2+} 之间的络合比, 将

图6 化合物 **6** (1.0×10^{-5} mol/L) 的 DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) 的溶液中加入不同浓度 Ni^{2+} ($0 \sim 1.0$ equiv.) 后的荧光发射光谱($\lambda_{\text{ex}}=310$ nm)

Figure 6 Fluorescence spectra of **6** (1.0×10^{-5} mol/L) in DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) solution upon the addition of different concentration of Ni^{2+} ($0 \sim 1.0$ equiv.) ($\lambda_{\text{ex}}=310$ nm)

图7 化合物 **6** (1.0×10^{-5} mol/L) 在 DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) 的溶液中加入不同浓度的 Ni^{2+} 时荧光强度(371 nm)的线性拟合

Figure 7 Photography of the linear range for compound **6** (1.0×10^{-5} mol/L) in DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) with different concentration of Ni^{2+} ($0 \sim 1.0$ equiv.) ($\lambda_{\text{ex}}=310$ nm)

化合物 **6** 分别与氯化铜、乙酸镍的乙醇溶液进行高分辨电喷雾质谱分析检测. 阳离子质谱分别在 $m/z = 819.3416$ 和 838.3906 处显示一个峰, 各自归属为[化合物 **6** + $\text{Cu}^{2+} + \text{Cl}^-$] (计算值: $m/z = 819.3375$) 和 [化合物 **6** + $\text{Ni}^{2+} + \text{CH}_3\text{CO}_2^-$] (计算值: $m/z = 838.3877$), 结果表明化合物 **6** 与 Cu^{2+} 、 Ni^{2+} 均是 1 : 1 络合作用.

2 结论

以三聚茛和 DPA 为原料合成了一个以三聚茛为荧光团、DPA 为受体的化合物 **6**, 并研究了其对金属离子的识别能力. 结果表明, 在 DMF/ H_2O ($V/V=8/2$, $\text{pH}=7.0$) 溶液中, 化合物 **6** 可高效识别 Cu^{2+} 和 Ni^{2+} , 且对 Cu^{2+} 的识别基本上不受其他金属离子干扰, 其检测极限

可低至 28 nmol/L, 低于 WHO 规定的饮用水中 Cu^{2+} 的最大含量; 但对 Ni^{2+} 识别作用易受其他金属离子的干扰, 检测极限为 41 nmol/L. 高分辨电喷雾质谱分析表明, 化合物 **6** 与 Cu^{2+} 和 Ni^{2+} 形成 1:1 的配合物. 本研究为开发高灵敏度有应用前景的 Cu^{2+} 和 Ni^{2+} 荧光探针提供了实验基础.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

核磁共振谱仪(Bruker AVANCE III, 瑞士 Bruker 公司); 高分辨电喷雾质谱仪(LTQ Orbitrap XL, 美国赛默飞世尔科技公司); 荧光分光光度计(LS 55, 美国 PE 公司). 试剂和有机溶剂如未有特别说明, 均为购买后直接使用.

3.2 实验方法

3.2.1 5,5,10,10,15,15-六乙基三聚茛(**1**)的合成

在氮气保护及冰水浴(0 °C)中, 向三聚茛(6.36 g, 18.57 mmol)的四氢呋喃溶液(100 mL)中慢慢滴加 *n*-BuLi (30 mL, 2.5 mol/L in hexane, 75 mmol), 大约 0.5 h 滴加完毕, 溶液颜色变为深红色, 而后升至室温反应 0.5 h. 再将温度降至 0 °C, 逐滴加入溴乙烷(5.31 mL, 71.20 mmol)大约 15 min 滴加完毕. 升至室温搅拌 4 h. 再在冰浴(0 °C)下, 慢慢滴加 *n*-BuLi (30 mL, 2.5 mol/L in hexane, 75 mmol), 大约 0.5 h 滴加完毕, 而后升至室温反应 0.5 h. 再将温度降至 0 °C, 滴加溴乙烷(5.31 mL, 71.20 mmol)大约 15 min 滴加完毕. 室温反应 12 h. 用饱和 NH_4Cl 溶液淬灭反应, 二氯甲烷萃取, 以无水硫酸钠干燥并减压蒸馏浓缩后, 以硅胶柱进行分离(展开剂为石油醚)得到 8.20 g 淡黄色粉末固体^[50], 产率 86%. m.p. 209~210 (lit.^[50] m.p. 212~214). ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 0.21 (t, $J=7.20$ Hz, 18H), 2.18~2.12 (m, 6H), 3.05~2.99 (m, 6H), 7.42~7.37 (m, 6H), 7.46 (dd, $J=1.20, 7.20$ Hz, 3H), 8.36 (d, $J=7.80$ Hz, 3H).

3.2.2 2-溴-5,5,10,10,15,15-六乙基三聚茛(**2**)的合成

化合物 **1** (6.03 g, 11.81 mmol)溶于 80 mL 二氯甲烷, 在冰浴下避光搅拌, 在 0 °C 下逐滴加入溴(1.20 mL, 22.90 mmol)溶于 10 mL 的二氯甲烷, 60 min 滴完. 然后室温反应 24 h. 反应物用饱和硫代硫酸钠洗, 饱和碳酸氢钠洗, 然后浓盐水洗, 无水硫酸钠干燥, 减压蒸干, 硅胶柱层析, 以石油醚为淋洗剂, 得到淡黄色油状混合物, 即单溴化合物 **2** 及 2,7-双溴代化合物和 2,7,12-三溴代化合物(共计 6.20 g)^[51]. 由于混合物三个溴代化合物极性非常接近, 难以分离, 直接用于下一步反应.

3.2.3 2-甲醛基-5,5,10,10,15,15-六乙基三聚茛(**3**)的合成

将化合物 **2** (3.54 g, 6 mmol) 溶于 240 mL 的无水乙醚, 氩气环境中搅拌, 于 -78 °C 下逐滴加入正丁基锂 (4.80 mL, 2.50 mol/L in hexane, 12.00 mmol), 并在此温度下搅拌 0.5 h, 升至室温搅拌 0.5 h. 再冷至 -78 °C 下加入干燥的 *N,N*-二甲基甲酰胺(1.06 g, 1.10 mL, 14.60 mmol), 然后缓慢升至室温并搅拌过夜. 加入盐酸(2 mol/L, 200 mL)搅拌 2 h, 乙醚提取水层, 无水硫酸钠干燥, 减压蒸干, 硅胶柱层析[洗脱剂为 *V*(石油醚): *V*(二氯甲烷)=3:2]得到 6.05 g 白色固体 **3**^[47], 产率 62%. m.p. 161~163; ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 0.19~0.22 (m, 18H), 2.15~2.25 (m, 6H), 2.90~3.10 (m, 6H), 7.41~7.49 (m, 6H), 7.92 (d, $J=6.60$ Hz, 1H), 7.99 (s, 1H), 8.38 (t, $J=7.20$ Hz, 2H), 8.53 (d, $J=8.40$ Hz, 1H), 10.13 (s, 1H).

3.2.4 2-羟甲基-5,5,10,10,15,15-六乙基三聚茛(**4**)的合成

在氮气保护下, 在 50 mL 单颈圆底烧瓶中加入单醛三聚茛化合物 **3** (0.62 mmol, 335 mg)和 NaBH_4 (2.0 mmol, 378.3 mg), 用新干燥的四氢呋喃(25 mL)溶解反应物, 回流过夜. 反应结束后用冰水淬灭, 用二氯甲烷萃取, 水洗, 无水硫酸钠干燥, 减压蒸馏, 得到 310 mg 白色固体 **4**, 产率 92%. m.p. 83~84 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 0.22~0.25 (m, 18H), 1.79 (s, 1H), 2.16~2.19 (m, 6H), 3.01~3.05 (m, 6H), 4.86 (s, 2H), 7.39~7.43 (m, 5H), 7.48~7.49 (d, $J=6.0$ Hz, 3H), 8.36~8.38 (m, 3H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 125 MHz) δ : 153.44, 152.85, 143.96, 140.65, 140.61, 140.34, 139.17, 138.91, 138.53, 126.54, 126.14, 125.12, 124.62, 122.32, 120.90, 65.59, 56.77, 29.44, 8.55; IR (KBr) ν : 3363, 2964, 2932, 2872, 1457, 1374, 1335, 1033, 747. Anal. calcd for $\text{C}_{40}\text{H}_{44}\text{O}$: C 88.84, H 8.20; found C 88.79, H 8.27. ESI-HRMS calcd for $\text{C}_{40}\text{H}_{44}\text{ONa}$ [$\text{M}+\text{Na}$] $^+$ 563.3284, found 563.3294.

3.2.5 2-氯甲基-5,5,10,10,15,15-六乙基三聚茛(**5**)的合成

在 50 mL 单颈圆底烧瓶中加入苄醇三聚茛化合物 **4** (0.57 mmol, 310 mg)和干燥的甲苯 25 mL, 通氮气保护, 在冰浴下加入 SOCl_2 (20 mmol, 150 μL), 室温反应过夜. 反应结束后用饱和的碳酸氢钠溶液淬灭, 用二氯甲烷萃取三次, 合并有机层, 水洗, 饱和食盐水洗, 有机层用无水硫酸钠干燥, 减压蒸馏, 得粗产品白色固体 **5** 304.5 mg, 产率 95%. m.p. 83~84 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 0.20~0.24 (m, 18H), 2.13~2.20 (m, 6H), 2.96~

3.08 (m, 6H), 4.76 (s, 2H), 7.38~7.48 (m, 8H), 8.34~8.38 (m, 3H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 125 MHz) δ : 153.54, 152.85, 152.76, 144.29, 144.14, 144.05, 141.02, 140.57, 140.51, 139.02, 138.94, 138.23, 126.75, 126.62, 126.18, 124.78, 124.65, 124.58, 122.49, 122.35, 122.31, 56.81, 46.70, 29.43, 8.57; IR (KBr) ν : 2958, 2925, 2869, 1456, 1373, 1335, 1263, 1161, 1029, 748, 705. Anal. calcd for $\text{C}_{40}\text{H}_{43}\text{Cl}$: C 85.91, H 7.75; found C 85.79, H 7.82. ESI-HRMS calcd for $\text{C}_{40}\text{H}_{44}\text{Cl}$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 559.3126, found 559.3114.

3.2.6 1-(5,5,10,10,15,15-六-乙基三聚茛)-*N,N*-二(2-吡啶甲基)甲胺(6)的合成

在 50 mL 单颈圆底烧瓶中加入氯苄三聚茛化合物 5 (0.54 mmol, 304.5 mg), *N,N*-二吡啶甲基胺(0.65 mmol, 84 mg), 干燥的二氯甲烷 25 mL, 新蒸馏的三乙胺 5 mL, 通氮气保护, 室温反应过夜. 反应结束后用蒸馏水洗, 用二氯甲烷萃取三次, 合并有机层, 水洗, 有机层用无水硫酸干燥, 减压蒸馏除去有机溶剂得粗产品后, 用硅胶进行柱层析分离[洗脱剂为 $V(\text{乙酸乙酯})/V(\text{石油醚}) = 1:1$], 得 340 mg 淡黄色固体 6, 产率 87%. m.p. 93~94 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (CDCl_3 , 600 MHz) δ : 0.22~0.26 (t, $J = 7.2$ Hz, 18H), 2.16~2.23 (m, 6H), 3.03~3.10 (m, 6H), 3.90 (s, 2H), 3.97 (s, 4H), 7.12~7.15 (t, $J = 6.0$ Hz, 2H), 7.37~7.42 (m, 4H), 7.47~7.53 (m, 4H), 7.60~7.61 (d, $J = 3$ Hz, 1H), 7.62~7.64 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 7.66~7.68 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 7.66~7.71 (m, 4H), 8.34 (d, 2H), 8.39~8.41 (m, 2H), 8.57 (d, 2H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 125 MHz) δ : 153.09, 152.85, 148.97, 143.96, 140.69, 140.66, 139.81, 138.83, 138.66, 136.57, 126.91, 126.48, 126.09, 124.59, 124.47, 123.00, 122.81, 122.30, 122.10, 59.98, 58.68, 59.73, 29.43, 8.58; IR (KBr) ν : 3665, 2970, 2907, 1587, 1452, 1372, 1243, 1047, 893, 748. Anal. calcd for $\text{C}_{52}\text{H}_{55}\text{N}_3$: C 86.50, H 7.68, N 5.82; found C 86.45, H 7.74, N 5.79. ESI-HRMS calcd for $\text{C}_{52}\text{H}_{56}\text{N}_3$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 722.4469, found 722.4484.

3.3 检测极限计算

化合物 6 对 Cu^{2+} 和 Ni^{2+} 的检测极限是通过荧光滴定实验得到, 在相同条件下, 进行 10 组空白样, 计算出其在 371 nm 处的标准偏差, 以 Cu^{2+} 和 Ni^{2+} 的浓度与在 371 nm 处待测样的荧光强度进行拟合, 并根据所测数据和如下方程计算得到.

$$\text{检测极限} = 3\sigma/m$$

其中 σ 代表 10 次空白样的标准方差, m 代表校准直线的斜率.

3.4 光谱测定方法

配置化合物 6 ($10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 的 DMF/ H_2O ($V/V = 8/2$, pH=7.0) 溶液备用, 测试时稀释至 $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 以二次蒸馏水配置金属离子(Cu^{2+} , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} , Cr^{3+} , Cd^{2+} , Ag^+ , Sn^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} , La^{3+} , Bi^{3+} , Cu^{2+} , Ni^{2+} , Pb^{2+}) 的盐酸盐、硝酸盐或醋酸盐溶液($2.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 用于荧光光谱测定.

辅助材料(Supporting information) 化合物 1~6 的氢谱、红外光谱、高分辨电喷雾质谱. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] Priya, R. S.; Kunal, P.; Satish, K. *Coord. Chem. Rev.* **2018**, 357, 18.
- [2] Que, E. L.; Domaille, D. W.; Chang, C. J. *Chem. Rev.* **2008**, 108, 1517.
- [3] Sona, B. W.; Prashant, S. K. *J. Lumin.* **2018**, 199, 407.
- [4] Gaggelli, E.; Kozłowski, H.; Valensin, D.; Valensin, G. *Chem. Rev.* **2006**, 106, 1995.
- [5] Zhang, X.; Guo, X.; Yuan, H.; Jia, X.; Dai, B. *Dyes Pigm.* **2018**, 155, 100.
- [6] Yin, K.; Wu, Y.; Wang, S.; Chen, L. *Sens. Actuators, B* **2016**, 232, 257.
- [7] Qing, Z.; Zhu, L.; Yang, S.; Cao, Z.; He, X.; Wang, K.; Yang, R. *Biosens. Bioelectron* **2016**, 78, 471.
- [8] Manivasagaperumal, R.; Vijayarangan, P.; Balamurugan, S.; Thiyagarajan, G. *J. Phyto.* **2011**, 3, 53.
- [9] Cambrollé, J.; García, J. L.; Figueroa, M. E.; Cantos, M. *Chemosphere* **2015**, 120, 171.
- [10] Anupam, G.; Jahangir, M.; Amit, K. M.; Shubhamoy, C.; Goutam, K. P. *Anal. Methods* **2018**, 10, 1063.
- [11] Jiao, Y.; Zhou, L.; He, H.; Yin, J.; Gao, Q.; Wei, J.; Duan, C.; Peng X. *Talanta* **2018**, 184, 143.
- [12] Tian, M. Z.; Hu, M. M.; Fan, J. L.; Peng, X. J.; Wang, J. Y.; Sun, S. G.; Zhang, R. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2013**, 23, 2916.
- [13] Kumar, G. G. V.; Kesavan, M. P.; Sankarganesh, M.; Sakthipandi, K.; Rajesh, J.; Sivaraman, G. *New J. Chem.* **2018**, 42, 2865.
- [14] Bezerra, M. A.; dos Santos, W. N. L.; Lemos, V. A.; Korn, M.; Ferreira, S. L. C. *J. Hazard Mater.* **2007**, 148, 334.
- [15] Lee, Y.; Liu, H.; Lee, J.; Kim, S.; Sessler, J.; Kim, Y. *Chem.-Eur. J.* **2010**, 16, 5895.
- [16] Bandyopadhyay, P.; Ghosh, A. K. *J. Phys. Chem. B* **2010**, 114, 11462.
- [17] Peralta-Domínguez, D.; Rodríguez, M.; Ramos-Ortiz, G.; Maldonado, J. L.; Meneses-Nava, M. A.; Barbosa-García, O.; Santillan, R.; Farfán, N. *Sens. Actuators, B* **2015**, 207, 511.
- [18] Kumar, M.; Bhalla, M.; Dhir, A.; Babuet, J. N. *Dalton Trans.* **2010**, 39, 10116.
- [19] Liu, X. Q.; Zhou, X.; Shu, X.; Zhu, J. *Macromolecules* **2009**, 42, 7634.
- [20] Feng, L.; Zhang, Y.; Wen, L. Y.; Chen, L.; Shen, Z.; Guan, Y. F. *Analyst* **2011**, 136, 4197.
- [21] Wang, H. X.; Wang, D. L.; Wang, Q.; Li, X. Y.; Schalley, C. A. *Org. Biomol. Chem.* **2010**, 8, 1017.
- [22] Goodman, J. E. R.; Prueitt, L.; Dodge, D. G.; Thakali, S. *Crit. Rev. Toxicol.* **2009**, 39, 365.
- [23] Costa, M.; Davidson, T. L.; Chen, H.; Ke, Q.; Zhang, P.; Yan, Y.; Huang, C.; Kluz, T. *Mutat. Res.* **2005**, 592, 79.
- [24] Subashini, G.; Shankar, R.; Arasakumar, T.; Mohan, P. S. *Sens. Actuators, B* **2017**, 243, 549.
- [25] Chen, C.; Men, G.; Bu, W.; Liang, C.; Sun, H.; Jiang, S. *Sens. Actu-*

- ators, *B* **2015**, 220, 463.
- [26] Li, Y.; Zhang, N.; Jin, K.; Xu, Y.; Wang, S.; Zhou, X. *Chin. J. Org. Chem.* **2017**, 37, 2640 (in Chinese).
(李英俊, 张楠, 靳焜, 许永廷, 王思远, 周晓霞, 有机化学, **2017**, 37, 2640.)
- [27] Ren, A.; Zhu, D.; Xie, W.; He, X.; Duan, Z.; Luo, Y.; Zhong, X.; Song, M.; Yan, X. *Inorg. Chim. Acta* **2018**, 476, 136.
- [28] Khan, R. I.; Ramu, A.; Pitchumani, K. *Sens. Actuators, B* **2018**, 266, 429.
- [29] Yang, Y.; Cao, B.; Zhang, Y.; Dong, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2017**, 37, 3024 (in Chinese).
(杨云裳, 曹碧霞, 张应鹏, 董玉莹, 有机化学, **2017**, 37, 3024.)
- [30] Zhu, H.; Fan, J.; Wang, B.; Peng, X. *Chem. Soc. Rev.* **2015**, 44, 4337.
- [31] Sun, W.; Hu, D.; Wu, Z.; Song, B.; Yang, S. *Chin. J. Org. Chem.* **2011**, 31, 997 (in Chinese).
(孙伟, 胡德禹, 吴志兵, 宋宝安, 杨松, 有机化学, **2011**, 31, 997.)
- [32] Lu, G.; Wang, K.; Kong, X.; Pan, H.; Zhang, J.; Chen, Y.; Jiang, J. *ChemElectroChem* **2018**, 5, 605.
- [33] Goswami, S.; Sen, D.; Das, N. K. *Org. Lett.* **2010**, 12, 856.
- [34] Narayanaswamy, N.; Govindaraju, T. *Sens. Actuators, B* **2012**, 161, 304.
- [35] Kumar, R.; Bhalla, V.; Kumar, M. *Tetrahedron* **2008**, 64, 8095.
- [36] Devaraj, S.; Saravanakumar, D.; Kandaswamy, M. *Sens. Actuators, B* **2009**, 136, 13.
- [37] Swamy, K. M. K.; Ko, S.; Kwon, S. K.; Lee, H. N. *Chem. Commun.* **2008**, 5915.
- [38] Zhou, Y.; Wang, F.; Kim, Y.; Kim, S.; Yoon, J. *Org. Lett.* **2009**, 11, 4442.
- [39] Maity D.; Manna, A. K.; Karthigeyan, D.; Kundu, T. K.; Pati, S. K.; Govindaraju, T. *Chem.-Eur. J.* **2011**, 17, 11152.
- [40] Dolai, B.; Bhaumik, A.; Pramanik, N.; Ghosh, K. S.; Atta, A. K. *J. Mol. Struct.* **2018**, 1164, 370.
- [41] Li, T.; Yang, Z.; Li, Y.; Liu, Z.; Qi, G.; Wang, B. *Dyes Pigm.* **2011**, 88, 103.
- [42] Tang, R.; Lei, K.; Chen, K.; Zhao, H.; Chen, J. *J. Fluoresc.* **2011**, 21, 141.
- [43] Ma, Y.; Lai, G.; Li, Z.; Tan, W.; Shen, Y.; Wang, C. *Tetrahedron* **2015**, 71, 8717.
- [44] Jiang, Z.; Deng, R.; Tang, L.; Lu, P. *Sens. Actuators, B* **2008**, 135, 128.
- [45] Macias-Contreras, M.; Daykin, K. L.; Simmons, J. T.; Allen, J. R.; Hooper, Z. S.; Davidson, M. W.; Zhu, L. *Org. Biomol. Chem.* **2017**, 15, 9139.
- [46] Marydasan, B.; Nair, A. K.; Ramaiah, D. *RSC Adv.* **2013**, 3, 3815.
- [47] Xu, H.-J.; Du, B.; Gros, C. P.; Richard, P.; Barbe, J.-M.; Harvey, P. D. *J. Porphyrins Phthalocyanines* **2013**, 17, 44.
- [48] Chen, Y.; Jiang, J. *Org. Biomol. Chem.* **2012**, 10, 4782.
- [49] Zhao, B.; Xu, Y.; Deng, Q.; Kan, W.; Fang, Y.; Wang, L.; Gao, Y. *Tetrahedron Lett.* **2016**, 57, 953.
- [50] Yuan, M.-S.; Fang Q.; Liu, Z.-Q.; Guo, J.-P.; Chen, H.-Y.; Yu, W.-T.; Xue G.; Liu, D.-S. *J. Org. Chem.* **2006**, 71, 7858.
- [51] Yuan, M.-S.; Liu, Z.-Q.; Fang Q. *J. Org. Chem.* **2007**, 72, 7915.

(Zhao, X.)