铑/锌共催化苯酚对氧杂苯并降冰片烯的不对称开环反应研究

和振秀^a 周永云^{*,a} 孙蔚青^a 樊瑞峰^b 沈国礼^a 樊保敏^{*,a,b}^(a) 云南民族大学 云南民族大学-香港浸会大学传统天然药物研发联合实验室 昆明 650500^(b) 云南民族大学 民族药资源化学国家民委-教育部重点实验室 昆明 650500

摘要 通过研究发现[Rh(COD)Cl]₂/ZnI₂/(2*R*,4*R*)-(+) -2,4-bis(diphenylphosphino)pentane 作为共催化体系,能有效地催化酚类亲核试剂对氧杂苯并降冰片烯的不对称亲核开环反应,获得较好的收率和良好的对映选择性.在优化后的反应条件下,该共催化体系具有良好的催化活性和底物适应能力,能够实现各种取代的酚类亲核试剂对氧杂苯并降冰片烯的不对称开环,高效而又经济地合成不同取代的含手性四氢萘结构单元的化合物.

关键词 铑; 氧杂苯并降冰片烯; 共催化; 不对称开环反应; 路易斯酸

Asymmetric Ring Opening Reaction of Oxabenzonornbornadienes with Phenols Promoted by Rhodium/Zinc Complexes

He, Zhenxiu^a Zhou, Yongyun^{*,a} Sun, Weiqing^a Fan, Ruifeng^aShen, Guoli Fan, Baomin^{*,a,b}^(a) Yunnan Minzu University-Hong Kong Baptist University Joint Laboratory of Traditional Natural Medicine, Yunnan Minzu University, Kunming 650500^(b) Key Laboratory of Chemistry in Ethnic Medicinal Resources, Yunnan Minzu University, Kunming 650500

Abstract The complex of [Rh(COD)Cl]₂ and 2*R*,4*R*-(+) -2,4-bis(diphenylphosphino)pentane was used as an effective catalyst for the asymmetric ring opening reaction of oxabenzonornbornadienes with various phenols by employing ZnI₂ as the activator. Under the optimized reaction conditions, high enantioselectivities with good yields could be obtained from a wide scope of oxabenzonornbornadienes and phenols.

Keywords rhodium; oxabenzonornbornadienes; Co-catalysis; symmetric ring opening reaction; Lewis acid

氢化萘结构单元广泛存在于具有生物活性的天然产物及药物分子当中^[1],相应的合成研究也因此受到广泛关注^[2].过渡金属催化的杂原子亲核试剂对氧/氮杂苯并降冰片烯的开环反应是近年来发展起来的构筑氢化萘结构单元的重要方法之一^[3].而发展简单、有效的手性催化体系对此类反应显得尤为重要.自 Lautens 课题组^[4]首次开展这方面研究工作以来,氧/氮杂苯并降冰片烯的不对称开环反应已经取得很大进展.各种手性的过渡金属催化体系被发展,用于催化碳亲核试剂、杂原子亲核试剂对氧/氮杂苯并降冰片烯的不对称开环反应,构筑具有多功能团的手性氢化萘结构中间体.如铑催化的酚^[4]、醇^[5]、胺^[6]、硫醇^[7]、酸^[8]、水^[9]或其它一些杂

原子亲核试剂^[10]对氧/氮杂苯并降冰片烯的不对称开环反应.此外,杨定乔^[11]、汤文军课题组^[12]也发展了一些铱催化的杂原子亲核试剂对氧/氮杂苯并降冰片烯的不对称开环反应.

最近,我们课题组对过渡金属催化的杂原子亲核试剂与氧/氮杂苯并降冰片烯的不对称开环反应非常感兴趣,并取得很好的研究进展^[13].尤其是 Rh/BDPP [(*R*,*R*)-BDPP = (2*R*,4*R*)-(+) -2,4-bis(diphenylphosphino)pentane] 手性剂催化条件下,分别实现了胺^[13g]、羧酸^[13i]对氧杂苯并降冰片烯的不对称开环反应,并取得良好的收率和较高的对映选择性.为拓展此手性催化剂对其它杂原子亲核试剂的适用性,我们尝试将此催化条件应用于酚对

* Corresponding authors. E-mail: zhouyongyundf@163.com; adams.bmf@hotmail.com

Received August 23, 2018; revised October 9, 2018; published online November 11, 2018.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21572198) and the Applied Basic Research Project of Yunnan Province (No. 2017FA004).

国家自然科学基金(No. 21572198)和云南省应用基础研究计划重点(No. 2017FA004)资助项目.

氧杂苯并降冰片烯的不对称开环反应, 并取得了较好的收率和对映选择性.

1 结果与讨论

1.1 反应条件的优化

在前期研究的基础上, 采用 7-氧杂苯并降冰片烯 (**1a**) (0.3 mmol) 和苯酚 (**2a**) (0.9 mmol) 作为标准底物, 我们对二者间的不对称开环反应进行了系统的研究. 采用 $[\text{Rh}(\text{COD})\text{Cl}]_2$ 为催化剂前体、(*R,R*)-BDPP 为配体、1,2-二氯乙烷(DCE)为溶剂及 40 °C 的加热条件下, 7-氧杂苯并降冰片烯 (**1a**) 与苯酚 (**2a**) 只生成了微量的目标产物 **3aa** (表 1, Entry 1). 筛选了其他几种溶剂, 除了 1,2-二甲氧基乙烷(DME)和 *N,N*-二甲基甲酰胺(DMF)只能生成少量的开环产物外(Entries 2, 3), 1,4-二氧六环和四氢呋喃(THF)都能得到很好收率和不错的对映选择性(Entries 5, 6), 甲苯虽收率高但 *ee* 值偏低. 综合分析四氢呋喃在此不对称开环反应中比较适合. 在温度实验中, 降低温度不能有效改善对应选择性, 反而降低了收率; 升高温度能提高反应速率, 但 *ee* 值也随之降低(Entries 7~9).

表 1 溶剂和温度的筛选^a

Table 1 Optimization of solvent and temperature

Entry	Solvent	Time/h	Yield ^b /%	<i>ee</i> ^c /%
1	DCE	6	Trace	—
2	DME	21	37	82
3	DMF	21	Trace	—
4	Toluene	12	93	75
5	1,4-Dioxane	1	87	84
6	THF	0.5	94	82
7 ^d	THF	28	10	83
8 ^e	THF	4	84	83
9 ^f	THF	0.3	98	77

^a Reaction conditions: **1a** (0.30 mmol), **2a** (0.90 mmol), ZnI_2 (0.03mmol), solvent (2.0 mL), $[\text{Rh}(\text{COD})\text{Cl}]_2$ (2.5 mol%), (*R,R*)-BDPP (6.5 mol%). ^b Isolated yield. ^c Determined by HPLC with a Chiralcel AD-H column. ^d React at 0 °C. ^e React at room temperature. ^f React at 60 °C.

为提高其开环产物的对映选择性, 筛选了一些手性配体(图 1). 当使用手性配体(*R,R*)-Me-DUPHOS 和单膦配体(*R*)-Monophos 时只生成微量的目标开环产物 **3aa**(表 2, Entries 1, 2). 采用(*R*)-Difluorophos 时 7-氧杂苯并降冰片烯 (**1a**) 异构化成萘酚(Entry 3), (*R*)-BINAPh 和 (*R,R*)-Chiraphos 也只得到少量 **2a** 的开环产物(Entry 4, 8). 当使用(*R,R*)-DIOP 时, 可得到高收率的开环产物, 但对映选择性降低; 使用配体(*R,R*)-BDPP 时, 收率为

94%, 对映选择性为 82% (Entry 7).

图 1 几种手性配体的结构

Figure 1 Several structures of chiral ligands

表 2 配体筛选^a

Table 2 Screening of chiral ligands

Entry	Ligand	Time/h	Yield ^b /%	<i>ee</i> ^c /%
1	(<i>R,R</i>)-Me-DUPHOS	10	Trace	—
2	(<i>R</i>)-Monophos	8	Trace	—
3	<i>R</i> -DIFLUORPHOS	5	Naphthol	—
4	(<i>R</i>)-BINAP	10	Trace	—
5	<i>R</i> -SEGPHOS	14	83	10
6	(<i>R,R</i>)-DIOP	1	95	56
7	(<i>R,R</i>)-BDPP	0.5	94	82
8	(<i>R,R</i>)-Chiraphos	10	Trace	—

^a Reaction conditions: **1a** (0.30 mmol), **2a** (0.9 mmol), ZnI_2 (0.03mmol), THF (2.0 mL), $[\text{Rh}(\text{COD})\text{Cl}]_2$ (2.5 mol%) and a bidentate ligand (6.5 mol%) or monodentate ligand (11.0 mol%). ^b Isolated yield. ^c Determined by HPLC with a Chiralcel AD-H column.

同时也对不同的添加剂进行了筛选, 结果见表 3. 结果表明, 添加剂的筛选有助于提高产物的对映选择性. 不添加路易斯酸时, 有 95% 的收率和 66% 的 *ee* 值 (Entry 9), 加入三氟甲磺酸盐如 CuOTf , AgOTf , $\text{Zn}(\text{OTf})_2$ 和 AgBF_4 时只能得到极少量的开环产物 (Entries 3~6). 可能是三氟甲磺酸根负离子和四氟硼酸根负离子和 $[\text{Rh}(\text{COD})\text{Cl}]_2$ 中的氯离子发生交换, 抑制了其催化活性. 当把路易斯酸换成 CuI , CuBr , ZnI_2 时, 开环产物的对映选择性提高到 80% 以上 (Entries 1, 2, 7), (*n*-Bu)₄NI 同样可以作为路易斯酸, 获得 77% 的对映选

择性, 分析是亚铜离子、锌离子或四丁基胺离子和 **1a** 上氧络合, 活化了其反应活性, 其中 ZnI_2 效果最好. 综合权衡, 选择 ZnI_2 为添加剂.

表 3 添加剂筛选^a
Table 3 Screening of additives

Entry	Additive	Time/h	Yield ^b /%	ee ^c /%
1	CuI	1.4	67	81
2	CuBr	2.3	98	80
3	CuOTf	26	Trace	—
4	AgBF ₄	13	Trace	—
5	AgOTf	13	Trace	—
6	Zn(OTf) ₂	13	Trace	—
7	ZnI ₂	0.5	94	82
8	(<i>n</i> -Bu) ₄ NI	2	96	77
9	—	1	95	66

^a Reaction conditions: **1a** (0.30 mmol), **2a** (0.9 mmol), additives (0.03 mmol), THF (2.0 mL), $[\text{Rh}(\text{COD})\text{Cl}]_2$ (2.5 mol%), (*R,R*)-BDPP (6.5% mol). ^b Isolated yield. ^c Determined by HPLC with a Chiralcel AD-H column.

2.2 适用底物范围研究

在最佳反应条件下, 对催化苯酚与氧杂苯并降冰片烯不对称开环反应的底物适用范围进行了研究. 首先对具有不同取代基的苯酚进行考察, 结果见表 4, 可以看出, 具有吸电子基团的苯酚(Entries 2~5), 除了吸电子能力很强的 4-氟苯酚需要通过升温来提高反应活性外, 其余的都能够以很好的收率和较高的对映选择性得到相对应的开环产物. 具有供电子基团的苯酚(Entries 6, 9)与带有吸电子基团的苯酚相比, 其收率和 *ee* 值略有降低, 但影响不大, 说明该催化体系对不同电子效应的苯酚类底物有良好的耐受性. 我们对空间位阻效应也进行了考察(Entries 6~8, 10), 可以看出, 不同位置有取代基时都能得到较好的结果, 换成大位阻取代基(Entry 10)时, 也得到了 72% 的产率和 76% 的 *ee* 值.

随后, 我们以结果最好而又最简单的苯酚 **1a** 为亲核试剂, 对一系列不同取代基的氧杂苯并降冰片烯进行了研究, 结果见表 5. 可以看出, 不同电性和不同位阻的氧杂苯并降冰片烯均能与苯酚进行不对称开环反应, 达到 84%~95% 的产率和不错的对映选择性, 除了 **1d** 得到中等产率 62% 的开环产物(Entry 3).

2 结论

我们发展了 $[\text{Rh}(\text{COD})\text{Cl}]_2/\text{ZnI}_2/(\text{R,R})\text{-BDPP}$ 作为共催化体系, 能有效地催化酚类亲核试剂对氧杂苯并降冰片烯的不对称亲核开环反应, 获得较好的收率和良好的

表 4 苯酚类底物适用性研究^a

Table 4 Scope of phenols

Entry	Phenol	Time/h	Yield ^b /%	ee ^c /%
1	2a	0.5	94	82
2 ^d	2b	39	80	69
3	2c	1.5	92	82
4	2d	3.5	92	74
5	2e	2	96	81
6	2f	3	89	78
7	2g	12	84	78
8	2h	6	54	78
9	2i	0.5	72	76
10	2j	3	78	82

^a Reaction conditions: **1a** (0.30 mmol), **2a~2j** (0.9 mmol), additives (0.03 mmol), THF (2.0 mL), $[\text{Rh}(\text{COD})\text{Cl}]_2$ (2.5 mol%), (*R,R*)-BDPP (6.5% mol). ^b Isolated yield. ^c Determined by HPLC with a Chiralcel AD-H column. ^d React at 60 °C.

ee 值. 一系列不同取代的氧杂苯并降冰片烯及酚类亲核试剂底物应用于此反应体系中, 表明在温和的条件下,

表5 氧杂苯并冰片烯类底物适用性研究^a
Table 5 Scope of oxabenzonorbornadiene derivatives

Entry	Oxabenzonorbornadiene	Time/h	Yield ^b /%	ee ^c /%
1		2	84	75
2		31	90	80
3		48	62	78
4		29	88	85
5 ^d		27	95	78
6		2	85	80

^a Reaction conditions: **1b**~**1g** (0.30 mmol), **2a** (0.9 mmol), additives (0.03 mmol), THF (2.0 mL), [Rh(COD)Cl]₂ (2.5 mol%), (*R,R*)-BDPP (6.5% mol).
^b Isolated yield. ^c Determined by HPLC with a Chiralcel AD-H column. ^d React at 60 °C.

能够高效而又经济地合成不同取代的含手性四氢萘结构单元的化合物。

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

¹H NMR 和 ¹³C NMR 用 Bruker 400 MHz 核磁共振仪测定(CDCl₃ 为溶剂, TMS 为内标); HPLC 用 Agilent 1260 高效液相色谱仪测定, 使用 AD-H, AS-H, OD-H, OJ-H 手性柱, 洗脱剂为异丙醇和正己烷。反应所用的金属、配体、反应原料及添加剂均在 Mikrouna, Supper 1220/750 手套箱中称量并操作, 无水溶剂 THF、甲苯、二氧六环经钠-二甲苯酮处理, 重蒸后氩气氛围保存并使用; 无水 DCE、DMF 经氢化钙处理, 重蒸后氩气氛围保存并使用。所用到的铑金属前体和手性配体均从

Stream、Aldrich 或 Acros 公司购买。

3.2 实验方法

3.2.1 苯酚对氧杂苯并降冰片烯不对称开环反应

于氩气氛围的手套箱内准确称取[Rh(COD)Cl]₂ (1.8 mg, 0.0037 mmol), (*R,R*)-BDPP (4.3 mg, 0.0097 mmol)于反应管中, 加入 1.0 mL THF, 室温下搅拌 30 min, 然后加入 ZnI₂ (9.6 mg, 0.03 mmol)搅拌 10 min, 加入氧杂苯并降冰片烯 **1a** (43.2 mg, 0.3 mmol)搅拌 10 min 后加入苯酚 **2a** (86.7 mg, 0.9 mmol)和 1.0 mL THF, 封口后取出手套箱, 于 40 °C 油浴下搅拌, 直至底物 **1a** 反应完全(TLC 检测)。反应液浓缩后经中性氧化铝柱层析纯化, 得到产物 **3aa** (67.2 mg, 94% yield), ee 值(82%)由 HPLC 测定。

(1*S*,2*S*)-2-苯氧基-1,2-二氢萘酚(**3aa**)^[4b]: 白色固体, 产率 94%, 82% ee。HPLC: Daicel Chiralcel AD-H column (25 cm × 0.46 cm ID), conditions: *V*(*n*-hexane)/*V*(*i*-PrOH)=80/20, 1.0 mL/min, 254 nm; *t*_{minor}=7.54 min, *t*_{major}=10.11 min. m.p. 109~110 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ: 7.64 (d, *J*=6.9 Hz, 1H), 7.35~7.21 (m, 4H), 7.16~7.08 (m, 1H), 7.03~6.92 (m, 3H), 6.51 (d, *J*=9.8 Hz, 1H), 6.02 (d, *J*=9.8 Hz, 1H), 5.23~5.07 (m, 2H), 2.68 (d, *J*=3.4 Hz, 1H)。

(1*S*,2*S*)-(4-氟苯氧基)-1,2-二氢萘酚(**3ab**)^[4b]: 白色固体, 产率 80%, 69% ee。HPLC: Daicel Chiralcel AD-H column (25 cm × 0.46 cm ID), conditions: *V*(*n*-hexane)/*V*(*i*-PrOH)=80/20, 1.0 mL/min, 254 nm; *t*_{minor}=8.48 min, *t*_{major}=10.10 min. m.p. 127~129 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ: 7.56 (d, *J*=6.8 Hz, 1H), 7.26~7.16 (m, 3H), 7.05 (d, *J*=6.9 Hz, 1H), 6.92 (t, *J*=8.4 Hz, 2H), 6.84 (dd, *J*=9.2, 4.4 Hz, 2H), 6.45 (d, *J*=9.9 Hz, 1H), 5.92 (d, *J*=9.9 Hz, 1H), 5.09 (d, *J*=10.1 Hz, 1H), 4.95 (d, *J*=10.1 Hz, 1H), 2.53 (s, 1H)。

(1*S*,2*S*)-2-(4-氯苯氧基)-1,2-二氢萘酚(**3ac**)^[4b]: 白色固体, 产率 92%, 82% ee。HPLC: Daicel Chiralcel AD-H column (25 cm × 0.46 cm ID), conditions: *V*(*n*-hexane)/*V*(*i*-PrOH)=80/20, 1.0 mL/min, 254 nm; *t*_{minor}=9.61 min, *t*_{major}=12.46 min. m.p. 125~125.5 °C; ¹H NMR (CDCl₃, 400 MHz) δ: 7.54 (d, *J*=6.7 Hz, 1H), 7.27~7.13 (m, 4H), 7.04 (d, *J*=6.7 Hz, 1H), 6.80 (d, *J*=8.4 Hz, 2H), 6.44 (d, *J*=9.9 Hz, 1H), 5.89 (d, *J*=9.9 Hz, 1H), 5.08 (d, *J*=10.1 Hz, 1H), 4.97 (d, *J*=10.1 Hz, 1H), 2.57 (d, *J*=3.8 Hz, 1H)。

(1*S*,2*S*)-2-(4-溴苯氧基)-1,2-二氢萘酚(**3ad**)^[4b]: 白色固体, 产率 92%, 74% ee。HPLC: Daicel Chiralcel AD-H column (25 cm × 0.46 cm ID), conditions: *V*(*n*-hexane)/

$V(i\text{-PrOH})=80/20$, 1.0 mL/min, 254 nm; $t_{\text{minor}}=10.06$ min, $t_{\text{major}}=13.86$ min. m.p. 145~146 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.62 (d, $J=6.7$ Hz, 1H), 7.38 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.34~7.25 (m, 2H), 7.12 (d, $J=6.6$ Hz, 1H), 6.83 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 6.52 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 5.96 (d, $J=9.8$ Hz, 1H), 5.16 (d, $J=10.1$ Hz, 1H), 5.05 (d, $J=10.1$ Hz, 1H), 2.63 (s, 1H).

(1*S*,2*S*)-2-(4-碘苯氧基)-1,2-二氢萘酚(**3ae**)^[4b]: 白色固体, 产率 96%, 81% ee. HPLC: Daicel Chiralcel AD-H column (25 cm×0.46 cm ID), conditions: $V(n\text{-hexane})/V(i\text{-PrOH})=80/20$, 1.0 mL/min, 254 nm; $t_{\text{minor}}=10.84$ min, $t_{\text{major}}=15.64$ min. m.p. 160~162 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.60 (dd, $J=19.8, 7.7$ Hz, 3H), 7.30 (q, $J=6.2, 5.3$ Hz, 2H), 7.13 (d, $J=6.2$ Hz, 1H), 6.74 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 6.53 (d, $J=9.8$ Hz, 1H), 5.97 (d, $J=9.8$ Hz, 1H), 5.17 (d, $J=9.4$ Hz, 1H), 5.06 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 2.56 (d, $J=3.9$ Hz, 1H).

(1*S*,2*S*)-2-(4-甲基苯氧基)-1,2-二氢萘酚(**3af**)^[4b]: 白色固体, 产率 89%, 78% ee. HPLC: Daicel Chiralcel AD-H column (25 cm×0.46 cm ID), conditions: $V(n\text{-hexane})/V(i\text{-PrOH})=80/20$, 1.0 mL/min, 254 nm; $t_{\text{minor}}=9.12$ min, $t_{\text{major}}=13.29$ min. m.p. 80~81 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.62 (d, $J=6.7$ Hz, 1H), 7.31~7.18 (m, 2H), 7.08 (t, $J=6.7$ Hz, 3H), 6.87~6.80 (m, 2H), 6.47 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 5.99 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 5.15 (d, $J=10.3$ Hz, 1H), 5.04 (d, $J=10.3$ Hz, 1H), 2.78 (s, 1H), 2.28 (s, 3H).

(1*S*,2*S*)-2-(2-甲基苯氧基)-1,2-二氢萘酚(**3ag**): 白色固体, 产率 84%, 78% ee. HPLC: Daicel Chiralcel AD-H column (25 cm×0.46 cm ID), conditions: $V(n\text{-hexane})/V(i\text{-PrOH})=80/20$, 1.0 mL/min, 254 nm; $t_{\text{minor}}=32.5$ min, $t_{\text{major}}=34.64$ min. m.p. 101~102 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.57 (d, $J=6.9$ Hz, 1H), 7.27~7.15 (m, 2H), 7.14~7.01 (m, 3H), 6.87~6.75 (m, 2H), 6.43 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 5.94 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 5.15 (d, $J=10.4$ Hz, 1H), 5.04 (d, $J=10.3$ Hz, 1H), 2.52 (s, 1H), 2.19 (s, 2H).

(1*S*,2*S*)-2-(2,5-二甲基苯氧基)-1,2-二氢萘酚(**3ah**): 白色固体, 产率 54%, 78% ee. HPLC: Daicel Chiralcel AD-H column (25 cm×0.46 cm ID), conditions: $V(n\text{-hexane})/V(i\text{-PrOH})=70/30$, 1.0 mL/min, 254 nm; $t_{\text{minor}}=6.39$ min, $t_{\text{major}}=5.09$ min. m.p. 78~80 °C. ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.65 (d, $J=6.9$ Hz, 1H), 7.28 (dd, $J=13.6, 7.6$ Hz, 2H), 7.09 (dd, $J=25.3, 7.2$ Hz, 2H), 6.76~6.66 (m, 2H), 6.50 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 6.02 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 5.22 (d, $J=10.4$ Hz, 1H), 5.11 (d, $J=10.6$

Hz, 1H), 2.58 (d, $J=3.5$ Hz, 1H), 2.29 (s, 3H), 2.22 (s, 3H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 155.30, 136.76, 135.62, 131.98, 130.92, 128.76, 128.16, 127.97, 126.72, 126.40, 125.11, 124.60, 121.81, 113.91, 79.40, 72.62, 21.44, 16.17; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_2$: 266.1313; found 266.1307.

(1*S*,2*S*)-2-(4-甲氧基苯氧基)-1,2-二氢萘酚(**3ai**)^[4b]: 白色固体, 产率 72%, 76% ee. HPLC: Daicel Chiralcel AD-H column (25 cm×0.46 cm ID), conditions: $V(n\text{-hexane})/V(i\text{-PrOH})=80/20$, 1.0 mL/min, 254 nm; $t_{\text{minor}}=13.51$ min, $t_{\text{major}}=19.55$ min. m.p. 91~92 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.62 (d, $J=6.8$ Hz, 1H), 7.32~7.20 (m, 2H), 7.09 (d, $J=6.7$ Hz, 1H), 6.92~6.78 (m, 4H), 6.47 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 5.99 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 5.14 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 4.98 (d, $J=10.2$ Hz, 1H), 3.75 (s, 3H).

(1*S*,2*S*)-2-(萘氧基)-1,2-二氢萘酚(**3aj**): 白色固体, 产率 78%, 82% ee. HPLC: Daicel Chiralcel AD-H column (25 cm×0.46 cm ID), conditions: $V(n\text{-hexane})/V(i\text{-PrOH})=80/20$, 1.0 mL/min, 254 nm; $t_{\text{minor}}=7.73$ min, $t_{\text{major}}=11.32$ min. m.p. 139~141 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 8.21 (d, $J=7.5$ Hz, 1H), 7.73 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.59 (d, $J=6.9$ Hz, 1H), 7.47~7.35 (m, 3H), 7.32~7.13 (m, 3H), 7.06 (d, $J=6.5$ Hz, 1H), 6.79 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.45 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 6.01 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 5.27 (q, $J=10.4$ Hz, 2H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 152.98, 135.53, 134.82, 131.94, 129.12, 128.25, 128.08, 127.66, 126.57, 126.52, 126.24, 126.03, 125.79, 125.45, 125.30, 121.96, 121.10, 106.74, 79.65, 72.55; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_2$: 288.1141, found 288.1150.

(1*S*,2*S*)-6,7-二甲基-2-苯氧基-1,2-二氢萘酚(**3ba**): 白色固体, 产率 84%, 75% ee. HPLC: Daicel Chiralcel OJ-H column (25 cm×0.46 cm ID), conditions: $V(n\text{-hexane})/V(i\text{-PrOH})=80/20$, 1.0 mL/min, 254 nm, $t_{\text{minor}}=11.86$ min, $t_{\text{major}}=10.63$ min. m.p. 181~183 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.33 (s, 1H), 7.28~7.16 (m, 2H), 6.97~6.83 (m, 4H), 6.41 (d, $J=9.8$ Hz, 1H), 5.90 (d, $J=9.8$ Hz, 1H), 5.09~4.98 (m, 2H), 2.53 (s, 1H), 2.21 (d, $J=14.3$ Hz, 6H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 156.41, 135.67, 135.11, 131.76, 128.64, 128.46, 127.95, 126.96, 125.76, 123.81, 120.31, 114.79, 77.96, 71.15, 18.69, 18.35. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_2$: 266.1311, found 266.1307.

(1*S*,2*S*)-5,8-二甲基-2-苯氧基-1,2-二氢萘酚(**3ca**): 无色油, 90%, 80% ee. HPLC: Daicel Chiralcel OJ-H column (25 cm×0.46 cm ID), conditions: $V(n\text{-hexane})/V(i\text{-PrOH})=80/20$, 1.0 mL/min, 254 nm; $t_{\text{minor}}=11.86$ min, $t_{\text{major}}=10.63$ min. m.p. 181~183 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.33 (s, 1H), 7.28~7.16 (m, 2H), 6.97~6.83 (m, 4H), 6.41 (d, $J=9.8$ Hz, 1H), 5.90 (d, $J=9.8$ Hz, 1H), 5.09~4.98 (m, 2H), 2.53 (s, 1H), 2.21 (d, $J=14.3$ Hz, 6H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 156.41, 135.67, 135.11, 131.76, 128.64, 128.46, 127.95, 126.96, 125.76, 123.81, 120.31, 114.79, 77.96, 71.15, 18.69, 18.35. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_2$: 266.1311, found 266.1307.

PrOH)=60/40, 1.0 mL/min, 254 nm; $t_{\text{minor}}=14.22$ min, $t_{\text{major}}=22.20$ min. ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.29 (t, $J=7.4$ Hz, 2H), 7.12 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 7.06~6.92 (m, 3H), 6.79 (s, 2H), 6.13 (dd, $J=10.1$, 4.8 Hz, 1H), 5.30 (s, 1H), 5.06 (s, 1H), 3.79 (s, 6H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 157.51, 151.57, 150.04, 129.59, 124.20, 123.51, 122.86, 121.14, 121.07, 115.88, 111.59, 111.16, 73.81, 65.00, 56.21, 55.92.

(1*S*,2*S*)-6,7-二甲氧基-2-苯氧基-1,2-二氢萘酚(**3da**): 白色固体, 产率 62%, 78% *ee*. HPLC: Daicel Chiralcel AD-H column (25 cm $\times$ 0.46 cm ID), conditions: $V(n\text{-hexane})/V(i\text{-PrOH})=70/30$, 1.0 mL/min, 254 nm, $t_{\text{minor}}=8.30$ min, $t_{\text{major}}=20.18$ min. m.p. 58~59 °C; ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.22 (t, $J=7.8$ Hz, 2H), 7.12 (s, 1H), 6.89 (t, $J=7.0$ Hz, 3H), 6.59 (s, 1H), 6.35 (d, $J=9.8$ Hz, 1H), 5.86 (d, $J=9.8$ Hz, 1H), 5.02 (q, $J=10.3$ Hz, 2H), 3.85 (s, 3H), 3.80 (s, 3H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 156.35, 147.75, 147.35, 128.65, 127.60, 127.34, 123.66, 123.07, 120.35, 114.79, 109.12, 108.09, 78.04, 71.24, 55.02.

(6*S*,7*S*)-6,7-二噁烷-2-苯氧基-1,2-二氢萘酚(**3ea**): 无色油, 88%, 85% *ee*. HPLC: Daicel Chiralcel OJ-H column (25 cm $\times$ 0.46 cm ID), conditions: $V(n\text{-hexane})/V(i\text{-PrOH})=80/20$, 1.0 mL/min, 254 nm, $t_{\text{minor}}=29.31$ min, $t_{\text{major}}=44.09$ min. m.p. 242~244 °C. ^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) δ : 7.27~7.16 (m, 2H), 7.07 (s, 1H), 6.95~6.85 (m, 3H), 6.59 (s, 1H), 6.33 (d, $J=9.8$ Hz, 1H), 5.85 (d, $J=9.6$ Hz, 1H), 4.97 (s, 2H), 4.19 (s, 4H), 2.43 (s, 1H); ^{13}C NMR (CDCl_3 , 100 MHz) δ : 157.44, 143.34, 129.68, 128.44, 125.65, 124.31, 121.38, 115.84, 115.64, 115.27, 115.18, 78.81, 71.93, 64.49, 64.42.

(5*S*,6*S*)-6,7-亚甲二氧基-2-苯氧基-1,2-二氢萘酚(**3fa**): 白色固体, 产率 95%, 78% *ee*. HPLC: Daicel Chiralcel OJ-H column (25 cm $\times$ 0.46 cm ID), conditions: $V(n\text{-hexane})/V(i\text{-PrOH})=80/20$, 1.0 mL/min, 254 nm; $t_{\text{minor}}=20.56$ min, $t_{\text{major}}=33.54$ min. m.p. 110~112 °C; ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 7.32 (t, $J=7.8$ Hz, 2H), 7.09 (s, 1H), 6.99 (dd, $J=20.3$, 7.8 Hz, 3H), 6.85 (s, 1H), 6.51 (d, $J=9.8$ Hz, 1H), 6.04 (d, $J=7.1$ Hz, 2H), 5.93 (d, $J=9.8$ Hz, 1H), 5.02 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 4.82 (t, $J=7.1$ Hz, 1H), 3.41 (s, 1H); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 100 MHz) δ : 157.51, 146.67, 146.48, 131.65, 129.55, 128.59, 125.88, 124.29, 120.71, 115.62, 107.41, 107.03, 100.94, 77.52, 70.28, 70.18. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_4$: 282.0890, found 282.0892.

(1*S*,2*S*)-6,7-二溴-2-苯氧基-1,2-二氢萘酚(**3ga**): 无色油, 85%, 80% *ee*. HPLC: Daicel Chiralcel AD-H column (25 cm $\times$ 0.46 cm ID), conditions: $V(n\text{-hexane})/V(i\text{-PrOH})=90/10$, 1.0 mL/min, 254 nm; $t_{\text{minor}}=11.21$ min, $t_{\text{major}}=24.50$ min. ^1H NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz) δ : 7.72 (s, 1H), 7.57 (s, 1H), 7.23 (t, $J=7.7$ Hz, 2H), 6.96~6.85 (m, 3H), 6.52 (d, $J=9.8$ Hz, 1H), 6.08~5.94 (m, 2H), 5.02 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 4.86~4.76 (m, 1H); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 100 MHz) δ : 156.37, 137.78, 132.26, 130.28, 129.96, 128.61, 128.05, 125.69, 124.45, 121.87, 121.47, 119.97, 114.69, 80.11, 76.09, 68.61. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{O}_2\text{Br}_2$: 393.9215, found 393.9204.

辅助材料(Supporting Information) 不对称开环产物核磁谱图和高效液相谱图. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] (a) Jeffs, P. W.; Lynn, D. G. *J. Org. Chem.* **1975**, *40*, 2958.
(b) Okuno, T.; Natsume, I.; Sawai, K.; Sawamura, K.; Furusaki, A.; Matsumoto, T. *Tetrahedron Lett.* **1983**, *24*, 5653.
(c) Snyder, S. E.; Aviles-Garay, F. A.; Chakraborti, R.; Nichols, D. E.; Watts, V. J.; Mailman, R. B. *J. Med. Chem.* **1995**, *38*, 2395.
(d) Hsieh, T. J.; Chang, F. R.; Chia, Y. C.; Chen, C. Y.; Lin, H. C.; Chiu, H. F.; Wu, Y. C. *J. Nat. Prod.* **2001**, *64*, 1157.
(e) Idris, A.; Tantry, M. A.; Ganai, B. A.; Kamili, A. N.; Williamson, J. S. *Phytochem. Lett.* **2015**, *11*, 264.
- [2] (a) Lautens, M.; Fagnou, K.; Hiebert, S. *Acc. Chem. Res.* **2003**, *36*, 48.
(b) Rayabarapu, D. K.; Cheng, C. H. *Acc. Chem. Res.* **2007**, *40*, 971.
- [3] (a) Yang, D.-Q.; Han, Y.-F. *Chin. J. Org. Chem.* **2006**, *26*, 1613 (in Chinese).
(杨定乔, 韩英峰, 有机化学, **2006**, *26*, 1613.)
(b) Cho, Y. H.; Tseng, N. W.; Senboku, H.; Lautens, M. *Synthesis* **2008**, 2467.
(c) Dockendorff, C.; Jin, S. J.; Olsen, M.; Lautens, M.; Coupal, M.; Hodzic, L.; Spear, N.; Payza, K.; Walpole, C.; Tomaszewski, M. J. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2009**, *19*, 1228.
(d) Liébert, C.; Brinks, M. K.; Capacci, A. G.; Fleming, M. J.; Lautens, M. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 3000.
- [4] (a) Lautens, M.; Fang, Y. Q. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 3679.
(b) Lautens, M.; Fagnou, K.; Taylor, M. *Org. Lett.* **2000**, *2*, 1677.
- [5] (a) Fagnou, M. K.; Taylor, M.; Rovis, T. *J. Organomet. Chem.* **2001**, *624*, 259.
(b) Tsui, G. C.; Dougan, P.; Lautens, M. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 2652.
- [6] (a) Lautens, M.; Fagnou, K.; Rovis, T. *J. Am. Chem. Soc.* **2000**, *122*, 5650.
(b) Lautens, M.; Fagnou, K. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, *123*, 7170.
(c) Lautens, M.; Fagnou, K.; Yang, D. Q. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, *125*, 14884.
(d) Cho, Y. H.; Zunic, V.; Senboku, H.; Olsen, M.; Lautens, M. J. *Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 6837.
- [7] Leong, P.; Lautens, M. J. *Org. Chem.* **2004**, *69*, 2194.
- [8] Lautens, M.; Fagnou, K. *Tetrahedron* **2001**, *57*, 5067.
- [9] Tsui, G. C.; Lautens, M. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2012**, *51*, 1.
- [10] (a) Tsui, G. C.; Tsoung, J.; Dougan, P.; Lautens, M. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 5542.
(b) Murakami, M.; Igawa, H. *Chem. Commun.* **2002**, *4*, 390.

- (c) Preetz, A.; Kohrt, C.; Drexler, H.; Torrens, A.; Buschmann, H.; Lopez, M.; Heller, D. *Adv. Synth. Catal.* **2010**, 352, 2073.
- [11] (a) Yang, D.-Q.; Long, Y.-H.; Wang, H.; Zhang, Z.-M. *Org. Lett.* **2008**, 10, 4723.
(b) Yang, D.-Q.; Long, Y.-H.; Zhang, J.-F.; Zeng, H.-P.; Wang, S.-Y.; Li, C.-R. *Organometallics* **2010**, 29, 3477.
(c) Cheng, H.-C.; Yang, D.-Q. *J. Org. Chem.* **2012**, 77, 9756.
(d) Long, Y.-H.; Wang, W.-L.; Yang, D.-Q.; Jiang, H.; Chen, K.-X.; Fang, Y.-L. *Mol. Diversity* **2014**, 18, 101.
- [12] Luo, R.-S.; Liao, J.-H.; Xie, L.; Tang, W.-J.; Chan, A. S. C. *Chem. Commun.* **2013**, 49, 9959.
- [13] (a) Li, S.-F.; Chen, H.-L.; Yang, Q.-J.; Yu, L.; Fan, C.-L.; Zhou, Y.-Y.; Wang, J.; Fan, B.-M. *Asian J. Org. Chem.* **2013**, 2, 494.
(b) Yu, L.; Zhou, Y.-Y.; Xu, X.; Li, S.-F.; Xu, J.-B.; Fan, B.-M.; Lin, C.-Y.; Bian, Z.-X.; Chan, A. S. C. *Tetrahedron Lett.* **2014**, 55, 6315.
(c) Lu, Z.-W.; Wang, J.; Han, B.-Q.; Li, S.-F.; Zhou, Y.-Y.; Fan, B.-M. *Adv. Synth. Catal.* **2015**, 357, 3121.
(d) Zeng, C. Y.; Yang, F.; Chen, J. C.; Wang, J.; Fan, B. M. *Org. Biomol. Chem.* **2015**, 13, 8425.
(e) Zhou, Y.-Y.; Lu, Z.-W.; Han, B.-Q.; Zeng, C. Y.; Zhang, Z.-H.; Fan, B.-M. *Tetrahedron: Asymmetry* **2015**, 26, 1354.
(f) Li, S.-F.; Xu, J.-B.; Fan, B.-M.; Lu, Z.-W.; Zeng, C.-Y.; Bian, Z.-X.; Zhou, Y.-Y.; Wang, J. *Chem.-Eur. J.* **2015**, 21, 9003.
(g) Xu, X.; Chen, J.-C.; He, Z.-X.; Zhou, Y.-Y.; Fan, B.-M. *Org. Biomol. Chem.* **2016**, 14, 2480.
(h) Zhou, Y.-Y.; Gu, C.-P.; Chen, J.-C.; Zhu, M.-N.; Yang, F.; Jianbin Xu, J.-B.; Fan, B.-M. *Adv. Synth. Catal.* **2016**, 358, 3167.
(i) He, X.-B.; Chen, J.-C.; Xu, X.; Yang, F.; Gu, C.-P.; Zhou, Y.-Y.; Fan, B.-M. *Tetrahedron: Asymmetry* **2017**, 28, 62.

(Li, L.; Fan, Y.)