有机化学

Chinese Journal of Organic Chemistry

金属有机化学专辑

第 39 卷 第 6 期 Vol. 39 No. 6 2019

ISSN 0253-2786

中国化学会主办
中国科学院上海有机化学研究所

Strem Chemicals, Inc., established in 1964, is a privately held manufacturer & marketer of high purity specialty chemicals. Strem's products are used for R&D and commercial scale applications, especially in the pharmaceutical, microelectronics, chemicals & petrochemicals industries. Some key products include catalysts, ligands, organometallics, CVD/ALD precursors and nanomaterials. For more information, visit strem.com. Strem is an ISO 9001:2015 certified company.

STREM'S KEY PRODUCT LINES

- METAL CATALYSTS
- LIGANDS
- INORGANICS
- ORGANOMETALLICS
- PHOTOCATALYSTS
- SCREENING KITS

11-0575

27-0400

78-1350

77-0425

15-8021

15-1053

15-1060

46-2150

29-6720

15-0067

77-0410

15-0126

中国高端 均相催化剂领军者

- 10年研发经验
- 国际市场认可
- 无水无氧封装存储

贵金属催化剂：

Pd Rh Ru Ir Au Cu Ni Zr

有机配体：

P N O

MIT专利授权：

BUCHWALD LIGAND & PRECATALYST

手性膦配体：

BINAP SEGPPOS PHOSPHORAMIDITE
JOSIPHOS PHOX SPIRO

手性氮配体：

BOX BINAM DACH TROST DPEN SALEN

手性催化剂：

PHOSPHORIC ACIDS NHC THIUREA
CINCHONA ALKALOID

光催化剂：

Ir Ru ACRI. SALTS

OTHER: RAFT SILANE PORPHYRIN MOF
ALD PRECURSOR

媲美进口品质的催化剂尽在

WWW.LAAJOO.COM

TEL: 021-60702684

QQ: 3004302861

MAIL: REAGENT@SINOCOMPOUND.COM

理想的实验室伴侣！

中国人都用得起的隔膜真空泵！

旋转蒸发仪/隔膜真空泵

® 上海豫康科教仪器设备有限公司

Shanghai Yukang Science teaching Instrument equipment Co.,Ltd

地址：上海市和桥路470号

电话：021-36338262 56470425
56470426

传真：021-56470425

手机：13701684908

邮编：200435

网址：www.sh-yukang.com

Tel: 021-36338262 56470425
56470426

Fax: 021-56470425

Mobil: 13701684908

Zip Code: 200435

Web: www.sh-yukang.com

钌催化下吡唑基导向的 1-苄基-1*H*-吡唑的 C(sp²)—H 键 烯基化和烷基化反应

徐文韬 王 宁 张梦烨 史达清*

(苏州大学材料与化学化工学部 苏州 215123)

摘要 发展了一种吡唑基导向的钌催化的 1-苄基-1*H*-吡唑与烯烃或 α,β -不饱和酮的 C(sp²)—H 键烯基化和烷基化反应. 该反应具有较好的选择性, 烯基化和烷基化选择性地发生在苄基的邻位. 为 1-苄基-1*H*-吡唑的官能团化提供了一种有效方法.

关键词 1-苄基-1*H*-吡唑; 烯基化; 烷基化; C(sp²)—H 键

Ruthenium-Catalyzed C(sp²)—H Alkenylation and Alkylation of 1-Benzyl-1*H*-pyrazole under Assistance of Pyrazole Group

Xu, Wentao Wang, Ning Zhang, Mengye Shi, Daqing*

(College of Chemistry, Chemical Engineering and Materials Science, Soochow University, Suzhou 215123)

Abstract A practical ruthenium-catalyzed C(sp²)—H alkenylation and alkylation of 1-benzyl-1*H*-pyrazole with alkene or α,β -unsaturated ketones under the assistance of pyrazole group were developed. This method has the advantages of high selectivity, providing only the *ortho*-alkenylation or *ortho*-alkylation products in high yields. This protocol provides an efficient and new method for the functionalization of 1-benzyl-1*H*-pyrazoles.

Keywords 1-benzyl-1*H*-pyrazole; alkenylation; alkylation; C(sp²)—H bond

过渡金属催化的 C—H 键直接官能团化反应是有机合成研究领域的一个重要课题^[1~13]. 烯基化反应作为一种常见的 C—H 键官能团化反应是被研究得较充分的反应之一, 早在 2002 年, Leeuwen 课题组^[14]就通过钌催化在室温下实现了乙酰苯胺的邻位烯基化; 2012 年, Lygin 课题组^[15]实现了钌催化剂下的苯甲酰胺、乙酰苯胺的邻位烯基化, 值得一提的是, 该反应在六氟磷酸钾的协助下可以实现水相中反应; 2013 年, 陆熙炎课题组^[16]通过铑催化剂实现了保护的苯酚的邻位烯基化. 2015 年, Jeganmohan 课题组^[17]在室温条件下通过钌催化剂实现了无氧化剂情况下的乙酰苯胺的邻位烯基化反应, 有趣的是, 该反应进行的过程中会伴随着氢气的生成; 2016 年, 赵应声课题组^[18]通过使用钌催化剂, 实现了特戊酰胺保护的吡啶的 C-7 位的烯基化反应. 这些工作为烯基化反应的发展提供了重要思路.

吡唑作为一种常见的杂环化合物, 其骨架广泛存在于自然界^[19]. 吡唑衍生物具有广泛的生物和药理活性, 例如抗菌、抗炎、抗肿瘤、抗病毒、抗氧化、抗惊厥、抗抑郁、抗糖尿病和降血压等^[20~24], 所以其衍生物的修饰也就变得尤为重要, 吡唑衍生物的直接官能团化是进行结构修饰的简单、有效方法. 尽管吡唑导向下的 C—H 键官能团化已经有不少文献报道, 过渡金属铑^[25~28]、钌^[29~30]、钇^[31~32]已经被证实为高效的催化剂, 然而上述文献中所用的底物均为常见的 1-苄基吡唑, 这些官能团化反应是通过过渡金属催化的五元环中间体进行的. 而吡唑导向下通过六元环中间体实现的 C(sp²)—H 活化却很少被报道. 2016 年, 赵应声课题组^[33]报道了在铑催化下三甲基吡唑导向的 C(sp³)—H 芳基化, 该反应通过六元环中间体实现了 β 、 γ 位 C(sp³)—H 的选择性单芳基化. 基于吡唑杂环骨架的重要性, 在

* Corresponding author. E-mail: dqshi@suda.edu.cn

Received January 5, 2019; revised February 27, 2019; published online March 21, 2019.

Project supported by the Major Basic Research Project of the Natural Science Foundation of the Jiangsu Higher Education Institutions (No. 15KJA150006).
江苏省高校自然科学重大研究(No. 15KJA150006)资助项目.

前期 C—H 键官能团化研究的基础上^[34~39], 我们设计了 1-苄基-1*H*-吡唑, 利用钌催化剂通过六元环中间体, 实现了苯环邻位的选择性烯基化和烷基化。

1 结果与讨论

1.1 反应条件的筛选

首先, 以 1-苄基-1*H*-吡唑(**1a**)和丙烯酸乙酯(**2a**)的反应为模板, 以 $[\text{RuCl}_2(p\text{-cymene})]_2$ 为催化剂, $\text{Cu}(\text{OAc})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 为氧化剂, AgSbF_6 为添加剂, 考察了催化剂、溶剂、添加剂、反应温度、反应时间等因素对该反应的影响, 结果见表 1。从表 1 数据可知当用 $[\text{RuCl}_2(p\text{-cymene})]_2$ (5 mol%), AgSbF_6 (20 mol%) 和 $\text{Cu}(\text{OAc})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (1 equiv.), 并以二氯甲烷作为溶剂, 100 °C 条件下反应 14 h, 只得到了 37% 的烯基化产物(表 1, Entry 1)。接下来对反应的溶剂进行筛选, 用二氯甲烷、甲苯、1,4-二氧六环、乙腈、水和四氢呋喃(THF)等作溶剂(表 1, Entries 1~6), 发现使用四氢呋喃时, 能以 87% 的气相收率和 79% 的分离收率获得烯基化产物。考察反应温度对该反应的影响发现, 当反应温度降低至 80 °C 时, 反应收率降低至 67%, 而当温度升到 120 °C 时, 反应收率也降为 82% (表 1, Entry 7~8), 所以最佳的反应温度为 100 °C。进一步考察了添加剂 AgSbF_6 对该反应的影响, 发现不加入添加剂 AgSbF_6 , 该反应基本不能发生; 当加入 10 mol%、15 mol%、25 mol% 的 AgSbF_6 时, 反应的产率分别为 71%、84%、77% (表 1, Entry 9~12), 所以最佳的添加剂的用量为底物 **1** 的 20 mol%。考察反应时间的影响时发现, 最佳的反应时间为 14 h(表 1, Entries 6 and 13~15)。在反应中不添加钌催化剂反应则不进行, 说明确实进行了碳氢键活化过程(表 1, Entry 16), 如果催化剂的用量为 3 mol%, 产率也仅有 72%, 因此, 催化剂的用量应控制在 5 mol% (表 1, Entry 17)。同时溶剂四氢呋喃量的减少也使反应的收率下降(表 1, Entry 18)。最后考察了氧化剂对于反应的影响。醋酸银、醋酸碘苯作为氧化剂时, 反应收率较醋酸铜低, 这表明醋酸铜是该反应较好的氧化剂(表 1, Entries 19~20)。根据以上条件筛选, 最终确定该模板反应最佳的反应条件是: 以 5 mol% 的 $[\text{RuCl}_2(p\text{-cymene})]_2$ 作催化剂, $\text{Cu}(\text{OAc})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 为氧化剂, 四氢呋喃作溶剂, 20 mol% 的 AgSbF_6 作添加剂, 在 100 °C 反应 14 h。

1.2 底物的拓宽

在上述最优的反应条件下, 对该体系的底物普适性进行了考察。首先, 对 1-苄基-1*H*-吡唑结构中苯基及吡唑环上取代基对反应的影响进行了考察, 结果见表 2。从表 2 可以看出: 苯环的邻位取代基团无论是给电子的甲氧基(**3b**)、甲基(**3c**), 还是吸电子的氰基(**3f**), 反应

表 1 反应条件的优化^a

Table 1 Optimization of the reaction conditions

Entry	Additive (mol%)	Solvent	T/°C	Time/h	Yield ^b /%
1	AgSbF_6 (20)	CH_2Cl_2	100	14	37
2	AgSbF_6 (20)	Toluene	100	14	<5
3	AgSbF_6 (20)	Dioxane	100	14	17
4	AgSbF_6 (20)	MeCN	100	14	14
5	AgSbF_6 (20)	H_2O	100	14	11
6	AgSbF_6 (20)	THF	100	14	87 (79) ^c
7	AgSbF_6 (20)	THF	80	14	67
8	AgSbF_6 (20)	THF	120	14	82
9	No	THF	100	14	<6
10	AgSbF_6 (10)	THF	100	14	71
11	AgSbF_6 (15)	THF	100	14	84
12	AgSbF_6 (25)	THF	100	14	77
13	AgSbF_6 (20)	THF	100	10	75
14	AgSbF_6 (20)	THF	100	12	80
15	AgSbF_6 (20)	THF	100	16	86
16 ^d	AgSbF_6 (20)	THF	100	14	0
17 ^e	AgSbF_6 (20)	THF	100	14	72
18 ^f	AgSbF_6 (20)	THF	100	14	68
19 ^g	AgSbF_6 (20)	THF	100	14	33
20 ^h	AgSbF_6 (20)	THF	100	14	41

^a Reaction conditions: **1a** (0.2 mmol), **2a** (0.4 mmol), $[\text{RuCl}_2(p\text{-cymene})]_2$ (5 mol%), $\text{Cu}(\text{OAc})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (1 equiv), additive (20 mol%), solvent (1 mL), 100 °C, 14 h; ^b GC yield of **3a** was determined using tridecane as internal standard; ^c isolated yield; ^d no catalyst; ^e 3 mol% catalyst was added; ^f 0.5 mL THF was added; ^g replaced $\text{Cu}(\text{OAc})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ with AgOAc ; ^h replaced $\text{Cu}(\text{OAc})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ with $\text{PhI}(\text{OAc})_2$.

都能以较为优秀的收率获得相应的产物。遗憾的是, 当邻位被卤素取代时, 延长反应时间至 24 h, 反应产率也不理想(**3d**、**3e**)。对于间位和对位上有甲基取代的底物进行了考察, 发现取代基的影响不大(**3g**、**3h**)。对于稠环骨架和联苯类底物进行了适用性的考察, 发现反应都能以高达 90% 以上的收率获得烯基化产物(**3i**~**3k**)。最后考察了吡唑上的取代基对于反应的影响, 发现无论是 4-甲基吡唑还是吡唑, 都能获得高产率的目标产物(**3l**、**3m**)。

接着, 又对底物烯烃进行了适用性的探究, 结果见表 3。首先对于各类丙烯酸酯进行了研究, 发现无论是丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯, 都可以以优秀的产率获得烯基化产物(**3m**、**3n**)。当尝试选择使用位阻稍大的丙烯酸叔丁酯、丙烯酸环己酯、丙烯酸苯酯、丙烯酸苄酯时, 发现反应也能够顺利地进行, 并且以较为不错的收率获得相应的烯基化产物(**3o**~**3r**)。同时尝试了丙烯酸烯丙酯, 发现也能够得到预期的产物(**3s**)。最后又对甲基乙烯砜和乙烯基磷酸二乙酯这两种含有杂原子的烯烃进行了

表 2 底物 1 中取代基的适应性^a

Table 2 Scope of the substituted groups for substrate 1

^a Reaction conditions: **1** (0.2 mmol), **2a** (0.4 mmol), [RuCl₂(*p*-cymene)]₂ (5 mol%), Cu(OAc)₂·H₂O (1 equiv.), additive (20 mol%), solvent (1 mL), 100 °C, 14 h; ^b reaction was performed for 24 h; ^c 1.5 mL THF was added; ^d 0.3 mmol **2a** was added.

表 3 底物烯烃 2 的适应性^a

Table 3 Scope of the olefins 2

^a Reaction conditions: **1a** (0.2 mmol), **2** (0.4 mmol), [RuCl₂(*p*-cymene)]₂ (5 mol%), Cu(OAc)₂·H₂O (1 equiv.), additive (20 mol%), solvent (1 mL), 100 °C, 14 h; ^b 0.25 mmol olefin was added; ^c reaction was performed for 20 h.

适用性的考察, 结果表明, 该烯基化反应对这类杂原子烯烃也有较好的容忍性, 并能够分别以 83%、85% 的分

离收率获得相应的目标产物(**3t**, **3u**).

1.3 烷基化反应研究

在烯基化反应的过程中, 在标准条件下将 1-戊烯-3-酮代替丙烯酸乙酯与 1-苄基-1*H*-吡唑进行反应时, 试图获得双键保留的烯基化产物, 令人意外的是生成了烷基化产物. 根据可能的烷基化反应机理, 我们认为醋酸铜在这一反应中可能不是必须的. 在不加醋酸铜的条件下, 对这一反应进行了简单的底物适用性考察, 结果见表 4. 当两个联苯类底物 **1j**, **1k** 与 1-戊烯-3-酮反应时, 获得双键打开后的烷基化产物(**5a**, **5b**). 当将含有稠环骨架的 **1l**, **1m** 与 α,β -不饱和酮反应时, 同样生成了烷基化的产物(**5c**, **5d**).

1.4 控制实验

为了进一步确认烷基化反应的机理, 我们进行了控制实验, 结果见 Scheme 1. 首先, 对比 Eq. 1 与 Eq. 2 可以发现, 在没有醋酸铜的条件下, 反应收率并没有影响, 说明醋酸铜并不是这个反应的必要条件. 接下来, 将六氟锑酸银从反应中剔除, 没有检测到烷基化产物的生成, 说明了六氟锑酸银是这个反应的必须添加剂 Eq. 3. 最后, 尝试着在反应体系中加入碱醋酸钾, 检测不到烷基化产物. 该结果也表明, 烷基化反应可能是进行质子解这一过程, 而醋酸钾的加入终止了反应的进行(Eq. 4).

1.5 可能的反应机理

根据文献报道的钌催化的 C—H 官能团化反应机理^[40~44], 我们推测反应的可能机理如 Scheme 2 所示. 首先, 在该反应中钌催化剂被六氟锑酸银活化进入催化

表4 烷基化反应适用性考察^a
Table 4 Scope of the alkylation

^a Reaction conditions: **1** (0.2 mmol), **4a** (0.4 mmol), $[\text{RuCl}_2(p\text{-cymene})]_2$ (5 mol%), additive (20 mol%), solvent (1 mL), 100 °C, 14 h.

循环. **1** 邻位金属化后, 钌催化剂被导向基团吡唑螯合形成了一个六元环中间体环状化合物 **I**, 烯烃插入钌催

化剂中形成金属络合物 **II**, 在醋酸铜的氧化下, 通过 $\beta\text{-H}$ 消除这一过程生成了烯基化产物 **3**. 与此同时, 当底物为不饱和酮时, 反应则会质子解, 形成烷基化产物 **5**.

2 结论

用易得的 1-苄基-1H-吡唑为底物, 在吡唑基导向下通过钌催化的六元环中间体实现了苯环的邻位烯基化和烷基化, 高效地构建了一系列含有烯烃官能团的吡唑衍生物. 该反应具有产率高、选择性好、反应条件温和、底物适应性好、原料易得等优点. 为吡唑类杂环化合物的结构修饰提供了一种简单有效的方法.

3 实验部分

3.1 试剂与仪器

核磁共振氢谱和核磁共振碳谱在 Bruker Avance III HD-400 MHz 核磁共振仪上测定, CDCl_3 为溶剂, TMS 为内标; 气相色谱在 Thermo Trace 1300 上测定; 高分辨质谱(HRMS)在 Bruker MicrOTOF-QII 上测定. 所用试剂均为分析纯或化学纯, 使用前未经纯化. 底物取代 1-苄基-1H-吡唑参考文献[45]的方法进行合成.

3.2 化合物 3 的合成通法

在 15 mL 干燥的螺口反应管中加入 1-苄基-1H-吡唑 (**1**) (0.2 mmol)、烯烃类化合物(**2**) (0.4 mmol)、4-甲基异

图式1 烷基化控制实验
Scheme 1 Control experiments of alkylation

图式 2 可能的反应机理
Scheme 2 Proposed reaction mechanism

丙基苯基二氯化钌(0.01 mmol)、一水合醋酸铜(0.2 mmol)、六氟锑酸银(0.04 mmol)及 1 mL 四氢呋喃, 反应混合物在 100 °C 下搅拌反应 14 h, 用薄层色谱(TLC)检测反应进程. 反应结束后, 将反应体系冷却到室温, 加水并用乙酸乙酯(5 mL×3)萃取, 有机层无水硫酸钠干燥后, 滤去干燥剂, 减压蒸馏除去溶剂后, 用石油醚/乙酸乙酯(*V*:*V*=12:1)作为洗脱剂通过柱层析色谱分离得纯化合物 **3**.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡唑-1-基)甲基)苯基)丙烯酸乙酯 (**3a**): 40.4 mg 无色液体, 产率 79%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.96 (d, *J*=15.8 Hz, 1H), 7.62~7.57 (m, 1H), 7.56 (d, *J*=1.5 Hz, 1H), 7.35~7.33 (m, 3H), 7.05~7.03 (m, 1H), 6.35 (d, *J*=15.8 Hz, 1H), 6.27 (t, *J*=2.0 Hz, 1H), 5.47 (s, 2H), 4.26 (q, *J*=7.1 Hz, 2H), 1.33 (t, *J*=7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 166.6, 140.6, 139.9, 135.6, 133.4, 130.5, 129.5, 129.3, 128.7, 127.1, 121.4, 106.2, 60.8, 53.4, 14.4. HRMS (ESI) calcd for C₁₅H₁₆N₂-NaO₂ [M+Na]⁺ 279.1109, found 279.1116.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡唑-1-基)甲基)-3-甲氧基苯基)丙烯酸乙酯 (**3b**): 46.3 mg 无色液体, 产率 81%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 8.17 (d, *J*=15.8 Hz, 1H), 7.48 (d, *J*=1.4 Hz, 1H), 7.36~7.28 (m, 2H), 7.21 (d, *J*=7.6 Hz, 1H), 6.96 (d, *J*=8.1 Hz, 1H), 6.35 (d, *J*=15.8 Hz, 1H), 6.16 (t, *J*=2.1 Hz, 1H), 5.48 (s, 2H), 4.25 (q, *J*=7.1 Hz, 2H), 3.86 (s, 3H), 1.32 (t, *J*=7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 166.6, 158.4, 141.6, 139.2, 136.5, 130.0, 129.0, 123.3, 122.1, 119.5, 112.2, 105.2, 60.7, 56.0, 46.2, 14.4. HRMS (ESI) calcd for C₁₆H₁₈N₂NaO₃ [M+Na]⁺ 309.1215, found 309.1225.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡唑-1-基)甲基)-3-甲基苯基)丙烯酸

乙酯 (**3c**): 43.2 mg 无色液体, 产率 80%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 8.05 (d, *J*=15.7 Hz, 1H), 7.52 (d, *J*=1.4 Hz, 1H), 7.46 (d, *J*=7.1 Hz, 1H), 7.29 (dd, *J*=12.8, 5.2 Hz, 2H), 7.10 (d, *J*=2.2 Hz, 1H), 6.33 (d, *J*=15.7 Hz, 1H), 6.19 (t, *J*=2.1 Hz, 1H), 5.45 (s, 2H), 4.24 (q, *J*=7.1 Hz, 2H), 2.34 (s, 3H), 1.32 (t, *J*=7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 166.6, 142.0, 139.5, 139.2, 135.6, 132.6, 132.4, 129.1, 128.5, 125.4, 122.0, 105.7, 60.8, 49.4, 19.8, 14.4. HRMS (ESI) calcd for C₁₆H₁₈N₂NaO₂ [M+Na]⁺ 293.1266, found 293.1279.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡唑-1-基)甲基)-3-氟苯基)丙烯酸乙酯 (**3d**): 33.9 mg 无色液体, 产率 62%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 8.11 (d, *J*=15.8 Hz, 1H), 7.49 (d, *J*=1.5 Hz, 1H), 7.42~7.31 (m, 3H), 7.17~7.10 (m, 1H), 6.37 (d, *J*=15.8 Hz, 1H), 6.21 (t, *J*=2.1 Hz, 1H), 5.47 (d, *J*=1.6 Hz, 2H), 4.26 (q, *J*=7.1 Hz, 2H), 1.33 (t, *J*=7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 166.3, 163.0, 160.5, 140.2 (d, *J*=3.3 Hz), 139.8, 137.1, 130.4 (d, *J*=9.3 Hz), 129.1, 123.0 (d, *J*=3.3 Hz), 122.8, 122.4, 122.2, 117.0, 116.8, 105.9, 60.9, 45.4 (d, *J*=5.6 Hz), 14.4; ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ: -116.3. HRMS (ESI) calcd for C₁₅H₁₆F-N₂O₂ [M+H]⁺ 275.1196, found 275.1213.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡唑-1-基)甲基)-3-溴苯基)丙烯酸乙酯 (**3e**): 24.7 mg 无色液体, 产率 62%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 7.96 (d, *J*=15.8 Hz, 1H), 7.61~7.57 (m, 1H), 7.56 (d, *J*=0.9 Hz, 1H), 7.35~7.33 (m, 3H), 7.06~7.01 (m, 1H), 6.35 (d, *J*=15.7 Hz, 1H), 6.28 (t, *J*=1.9 Hz, 1H), 5.47 (s, 2H), 4.26 (q, *J*=7.1 Hz, 2H), 1.34 (t, *J*=7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 166.6, 140.7, 139.9, 135.6, 133.4, 130.5, 129.5, 129.4, 128.8, 127.2, 121.4, 106.2, 60.8, 53.4, 14.4. HRMS (ESI) calcd for C₁₅H₁₅BrN₂NaO₂ [M+Na]⁺ 357.0215, found 357.0229.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡唑-1-基)甲基)-3-氰基苯基)丙烯酸乙酯 (**3f**): 49.4 mg 无色液体, 产率 88%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ: 8.20 (d, *J*=15.8 Hz, 1H), 7.79 (d, *J*=7.9 Hz, 1H), 7.72 (dd, *J*=7.7, 1.2 Hz, 1H), 7.54 (d, *J*=2.3 Hz, 1H), 7.51~7.47 (m, 2H), 6.35 (d, *J*=15.8 Hz, 1H), 6.25 (t, *J*=2.1 Hz, 1H), 5.61 (s, 2H), 4.27 (q, *J*=7.1 Hz, 2H), 1.34 (t, *J*=7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ: 165.7, 140.4, 140.0, 137.6, 137.0, 134.2, 131.8, 130.0, 129.6, 123.9, 117.4, 115.0, 106.2, 61.1, 50.7, 14.4. HRMS (ESI) calcd for C₁₆H₁₅N₃NaO₂ [M+Na]⁺ 304.1062, found 304.1072.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡唑-1-基)甲基)-4-甲基苯基)丙烯酸乙酯 (**3g**): 45.3 mg 无色液体, 产率 84%. ¹H NMR (400

MHz, CDCl₃) δ : 7.95 (d, J =15.7 Hz, 1H), 7.56 (d, J =1.5 Hz, 1H), 7.51 (d, J =8.0 Hz, 1H), 7.36 (d, J =2.2 Hz, 1H), 7.15 (d, J =7.9 Hz, 1H), 6.89 (s, 1H), 6.33 (d, J =15.7 Hz, 1H), 6.28 (t, J =2.1 Hz, 1H), 5.44 (s, 2H), 4.26 (q, J =7.1 Hz, 2H), 2.33 (s, 3H), 1.34 (t, J =7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 166.7, 140.9, 140.5, 139.8, 135.3, 130.5, 130.2, 129.5, 129.4, 127.0, 120.1, 106.0, 60.6, 53.3, 21.4, 14.4. HRMS (ESI) calcd for C₁₆H₁₈N₂NaO₂ [M+Na]⁺ 293.1266, found 293.1278.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)-5-甲基苯基)丙烯酸乙酯(**3h**): 48.6 mg 无色液体, 产率 90%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.95 (d, J =15.8 Hz, 1H), 7.55 (d, J =1.5 Hz, 1H), 7.42 (s, 1H), 7.33 (d, J =2.2 Hz, 1H), 7.18 (dd, J =7.8 Hz, 0.9 Hz, 1H), 7.00 (d, J =7.8 Hz, 1H), 6.35 (d, J =15.8 Hz, 1H), 6.26 (t, J =2.1 Hz, 1H), 5.43 (s, 2H), 4.27 (q, J =7.1 Hz, 2H), 2.36 (s, 3H), 1.34 (t, J =7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 166.6, 140.8, 139.7, 138.5, 133.3, 132.5, 131.2, 129.6, 129.3, 127.7, 121.0, 106.0, 60.7, 53.1, 21.2, 14.4. HRMS (ESI) calcd for C₁₆H₁₈N₂NaO₂ [M+Na]⁺ 293.1266, found 293.1276.

(*E*)-3-(3-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)萘-2-基)丙烯酸乙酯(**3i**): 58.1 mg 无色液体, 产率 95%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.07 (s, 1H), 8.00 (d, J =15.7 Hz, 1H), 7.86~7.82 (m, 1H), 7.78~7.74 (m, 1H), 7.59 (s, 1H), 7.53~7.48 (m, 3H), 7.39 (d, J =1.6 Hz, 1H), 6.45 (d, J =15.7 Hz, 1H), 6.29 (s, 1H), 5.61 (s, 2H), 4.28 (q, J =7.1 Hz, 2H), 1.35 (t, J =7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 166.5, 141.0, 139.8, 133.8, 132.9, 132.5, 131.6, 129.5, 128.6, 128.2, 127.8, 127.4, 127.2, 127.0, 121.4, 106.1, 60.7, 54.0, 14.3. HRMS (ESI) calcd for C₁₉H₁₈N₂NaO₂ [M+Na]⁺ 329.1266, found 329.1282.

(*E*)-3-(3-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)-[1,1'-联苯]-4-基)丙烯酸乙酯(**3j**): 61.7 mg 无色液体, 产率 93%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.00 (d, J =15.7 Hz, 1H), 7.69 (d, J =8.1 Hz, 1H), 7.60~7.56 (m, 2H), 7.55~7.52 (m, 2H), 7.43~7.36 (m, 4H), 7.28 (d, J =1.5 Hz, 1H), 6.41 (d, J =15.7 Hz, 1H), 6.29 (t, J =2.0 Hz, 1H), 5.54 (s, 2H), 4.28 (q, J =7.1 Hz, 2H), 1.35 (t, J =7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 166.7, 143.3, 140.2, 139.9, 139.8, 136.0, 132.2, 129.6, 129.0, 128.1, 128.0, 127.7, 127.4, 127.1, 121.1, 106.4, 60.8, 53.5, 14.4. HRMS (ESI) calcd for C₂₁H₂₁N₂O₂ [M+H]⁺ 333.1603, found 333.1612.

(*E*)-3-(4-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)-[1,1'-联苯]-3-基)丙烯酸乙酯(**3k**): 60.4 mg 无色液体, 产率 91%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.01 (d, J =15.8 Hz, 1H), 7.79 (s,

1H), 7.57 (d, J =7.4 Hz, 4H), 7.47~7.38(m, 4H), 7.14 (d, J =8.0 Hz, 1H), 6.44 (d, J =15.7 Hz, 1H), 6.30 (s, 1H), 5.51 (s, 2H), 4.28 (q, J =7.1 Hz, 2H), 1.35 (t, J =7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 166.6, 141.8, 140.7, 140.0, 139.9, 134.3, 133.9, 130.0, 129.6, 129.2, 129.0, 128.0, 127.2, 125.9, 121.7, 106.3, 60.9, 53.2, 14.4. HRMS (ESI) calcd for C₂₁H₂₀N₂NaO₂ [M+Na]⁺ 355.1422, found 355.1432.

(*E*)-3-(2-((4-甲基-1*H*-吡啶-1-基)甲基)苯基)丙烯酸乙酯(**3l**): 46.4 mg 无色液体, 产率 86%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.97 (d, J =15.8 Hz, 1H), 7.62~7.55 (m, 1H), 7.37~7.29 (m, 3H), 7.10 (s, 1H), 7.06~6.99 (m, 1H), 6.35 (d, J =15.8 Hz, 1H), 5.39 (s, 2H), 4.26 (q, J =7.1 Hz, 2H), 2.05 (s, 3H), 1.34 (t, J =7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 166.7, 140.8, 140.3, 135.8, 133.4, 130.5, 129.3, 128.6, 128.3, 127.1, 121.3, 116.8, 60.8, 53.3, 14.4, 9.0. HRMS (ESI) calcd for C₁₆H₁₈N₂NaO₂ [M+Na]⁺ 293.1266, found 293.1275.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)苯基)丙烯酸乙酯(**3m**): 54.4 mg 无色液体, 产率 89%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.09 (d, J =15.7 Hz, 1H), 8.04 (s, 1H), 7.72 (d, J =8.1 Hz, 1H), 7.55 (d, J =7.4 Hz, 1H), 7.33~7.18 (m, 4H), 7.15~7.10 (m, 1H), 6.81 (d, J =7.4 Hz, 1H), 6.33 (d, J =15.7 Hz, 1H), 5.71 (s, 2H), 4.24 (q, J =7.1 Hz, 2H), 1.31 (t, J =7.1 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 166.6, 140.9, 139.8, 135.8, 133.9, 133.1, 130.4, 128.3, 127.1, 126.7, 124.4, 121.3, 120.9, 109.2, 60.8, 50.5, 14.4. HRMS (ESI) calcd for C₁₉H₁₈N₂NaO₂ [M+Na]⁺ 329.1266, found 329.1282.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)苯基)丙烯酸甲酯(**3n**): 44.0 mg 无色液体, 产率 91%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 8.00 (d, J =15.8 Hz, 1H), 7.62~7.60 (m, 1H), 7.58 (d, J =1.5 Hz, 1H), 7.40~7.34 (m, 3H), 7.07~7.05 (m, 1H), 6.38 (d, J =15.8 Hz, 1H), 6.29 (t, J =2.1 Hz, 1H), 5.49 (s, 2H), 3.82 (s, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 167.0, 141.0, 139.9, 135.6, 133.4, 130.6, 129.5, 129.4, 128.8, 127.2, 120.9, 106.2, 53.4, 51.9. HRMS (ESI) calcd for C₁₄H₁₄N₂NaO₂ [M+Na]⁺ 265.0953, found 265.0964.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)苯基)丙烯酸叔丁酯(**3o**): 46.5 mg 无色液体, 产率 82%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.86 (d, J =15.7 Hz, 1H), 7.61~7.54 (m, 2H), 7.35~7.32 (m, 1H), 7.05~7.00 (m, 1H), 6.31~6.24 (m, 2H), 5.46 (s, 2H), 1.53 (s, 9H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 165.9, 139.9, 139.6, 135.4, 133.7, 130.23, 129.5, 129.3, 128.7, 127.1, 123.4, 106.2, 80.9, 53.5, 28.3. HRMS

(ESI) calcd for $C_{17}H_{21}N_2O_2$ $[M+H]^+$ 285.1603, found 285.1590.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)苯基)丙烯酸环己酯 (**3p**): 44.6 mg 无色液体, 产率 72%. ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.94 (d, $J=15.7$ Hz, 1H), 7.62~7.58 (m, 1H), 7.55 (d, $J=1.5$ Hz, 1H), 7.35~7.33 (m, 3H), 7.05~7.03 (m, 1H), 6.34 (d, $J=15.7$ Hz, 1H), 6.27 (t, $J=2.0$ Hz, 1H), 5.47 (s, 2H), 4.92~4.85 (m, 1H), 1.93~1.87 (m, 2H), 1.78~1.75 (m, 2H), 1.59~1.25 (m, 6H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 166.1, 140.3, 139.9, 135.5, 133.6, 130.4, 129.5, 129.4, 128.7, 127.2, 122.0, 106.2, 73.0, 53.5, 31.8, 25.6, 23.9. HRMS (ESI) calcd for $C_{19}H_{22}N_2NaO_2$ $[M+Na]^+$ 333.1579, found 333.1595.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)苯基)丙烯酸苯酯 (**3q**): 55.9 mg 无色液体, 产率 92%. ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 8.16 (d, $J=15.8$ Hz, 1H), 7.69~7.67 (m, 1H), 7.57 (d, $J=1.6$ Hz, 1H), 7.44~7.37 (m, 5H), 7.28~7.24 (m, 1H), 7.19~7.17 (m, 2H), 7.10~7.08 (m, 1H), 6.55 (d, $J=15.7$ Hz, 1H), 6.29 (t, $J=2.1$ Hz, 1H), 5.51 (s, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 165.0, 150.8, 142.6, 140.0, 135.8, 133.1, 130.9, 129.54, 129.52, 129.51, 128.8, 127.3, 126.0, 121.7, 120.3, 106.2, 53.4. HRMS (ESI) calcd for $C_{19}H_{17}N_2O_2$ $[M+H]^+$ 305.1290, found 305.1304.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)苯基)丙烯酸苄酯 (**3r**): 55.9 mg 无色液体, 产率 88%. ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 8.01 (d, $J=15.8$ Hz, 1H), 7.60~7.57 (m, 1H), 7.53 (d, $J=1.6$ Hz, 1H), 7.45~7.31 (m, 8H), 7.06~7.03 (m, 1H), 6.40 (d, $J=15.7$ Hz, 1H), 6.25 (t, $J=2.0$ Hz, 1H), 5.46 (s, 2H), 5.25 (s, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 166.4, 141.2, 139.9, 136.0, 135.6, 133.4, 130.6, 129.5, 129.4, 128.8, 128.7, 128.4, 128.4, 127.2, 121.0, 106.2, 66.6, 53.4. HRMS (ESI) calcd for $C_{20}H_{19}N_2O_2$ $[M+H]^+$ 319.1447, found 319.1451.

(*E*)-3-(2-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)苯基)丙烯酸烯丙酯 (**3s**): 37.5 mg 无色液体, 产率 70%. ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 8.00 (d, $J=15.8$ Hz, 1H), 7.61~7.58 (m, 1H), 7.55 (s, 1H), 7.39~7.31 (m, 3H), 7.09~7.00 (m, 1H), 6.38 (d, $J=15.8$ Hz, 1H), 6.27 (s, 1H), 6.03~5.94 (m, 1H), 5.47 (s, 2H), 5.37 (d, $J=17.2$ Hz, 1H), 5.28 (d, $J=10.4$ Hz, 1H), 4.71 (d, $J=5.7$ Hz, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 166.2, 141.1, 139.9, 135.6, 133.4, 132.3, 130.6, 129.5, 129.4, 128.8, 127.2, 121.0, 118.5, 106.2, 65.4, 53.4. HRMS (ESI) calcd for $C_{16}H_{16}N_2NaO_2$ $[M+Na]^+$ 291.1109, found 291.1120.

(*E*)-1-(2-(2-甲基砜基)乙烯基)苄基)-1*H*-吡啶 (**3t**):

43.4 mg 无色液体, 产率 83%. ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.91 (d, $J=15.3$ Hz, 1H), 7.55~7.52 (m, 2H), 7.45~7.38 (m, 3H), 7.21~7.16 (m, 1H), 6.80 (d, $J=15.3$ Hz, 1H), 6.28 (t, $J=2.1$ Hz, 1H), 5.46 (s, 2H), 2.98 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 140.6, 140.1, 136.0, 131.6, 131.4, 130.1, 129.6, 129.2, 129.1, 127.8, 106.4, 53.6, 43.2. HRMS (ESI) calcd for $C_{13}H_{14}N_2NaO_2S$ $[M+Na]^+$ 285.0674, found 285.0685.

(*E*)-2-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)苯乙烯膦酸二乙酯 (**3u**): 54.4 mg 无色液体, 产率 85%. ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.79~7.69 (m, 1H), 7.58~7.54 (m, 2H), 7.36~7.34 (m, 3H), 7.08~7.06 (m, 1H), 6.29~6.13 (m, 2H), 5.45 (s, 2H), 4.12~4.07 (m, 4H), 1.34 (t, $J=7.1$ Hz, 6H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 144.71 (d, $J=6.7$ Hz), 139.9, 135.0, 134.3, 134.1, 130.5, 129.6, 128.9, 127.0, 118.8, 116.9, 62.1 (d, $J=5.5$ Hz), 53.5 (s), 16.5 (d, $J=6.4$ Hz); ^{31}P NMR (162 MHz, $CDCl_3$) δ : 18.2. HRMS (ESI) calcd for $C_{16}H_{21}N_2NaO_3P$ $[M+Na]^+$ 343.1187, found 343.1199.

3.3 化合物 5 的合成通法

在 15 mL 干燥的螺口反应管中加入 1-苄基-1*H*-吡啶 (**1**) (0.2 mmol)、1-戊烯-3-酮 (**4**) (0.4 mmol)、4-甲基异丙基苯基二氯化钨 (0.01 mmol)、六氟锑酸银 (0.04 mmol) 及 1 mL 四氢呋喃, 反应混合物在 100 °C 下搅拌反应 14 h, 用薄层色谱 (TLC) 检测反应进程. 反应结束后, 将反应体系冷却到室温, 加水并用乙酸乙酯 (5 mL $\times$ 3) 萃取, 有机层无水硫酸钠干燥后, 滤去干燥剂, 减压蒸馏除去溶剂后, 用石油醚/乙酸乙酯 ($V:V=10:1$) 作为洗脱剂通过柱层析色谱分离得纯化合物 **5**.

1-(3-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)-[1,1'-联苯]-4-基)戊-3-酮 (**5a**): 36.8 mg 无色液体, 产率 58%. ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.56~7.48 (m, 4H), 7.44~7.25 (m, 7H), 6.27 (d, $J=1.8$ Hz, 1H), 5.44 (s, 2H), 2.94 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 2.50 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 2.36 (q, $J=7.3$ Hz, 2H), 1.03 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 210.4, 140.5, 139.8, 139.6, 139.0, 134.6, 130.3, 129.4, 128.9, 128.5, 127.5, 127.4, 127.1, 106.1, 54.1, 42.9, 36.1, 26.1, 7.9. HRMS (ESI) calcd for $C_{21}H_{22}N_2NaO$ $[M+Na]^+$ 341.1630, found 341.1644.

1-(4-((1*H*-吡啶-1-基)甲基)-[1,1'-联苯]-3-基)戊-3-酮 (**5b**): 39.4 mg 无色液体, 产率 62%. ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.58~7.54 (m, 3H), 7.45~7.42 (m, 4H), 7.38~7.33 (m, 2H), 7.16 (d, $J=8.5$ Hz, 1H), 6.28 (t, $J=2.1$ Hz, 1H), 5.41 (s, 2H), 2.97 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 2.50 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 2.35 (q, $J=7.3$ Hz, 2H), 1.03 (t, $J=7.3$

Hz, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 210.4, 141.6, 140.6, 140.3, 139.6, 133.2, 130.3, 129.4, 128.9, 128.6, 127.6, 127.2, 125.6, 106.0, 53.7, 43.0, 36.1, 26.5, 7.9. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{NaO}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 341.1630, found 341.1646.

1-(3-((1*H*-吡唑-1-基)甲基)萘-2-基)戊-3-酮(**5c**): 32.1 mg 无色液体, 产率 55%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.76 (d, $J=7.9$ Hz, 2H), 7.64 (s, 1H), 7.57 (d, $J=3.5$ Hz, 2H), 7.48~7.41 (m, 2H), 7.34 (d, $J=1.9$ Hz, 1H), 6.28 (s, 1H), 5.53 (s, 2H), 3.02 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 2.52 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 2.35 (q, $J=7.3$ Hz, 2H), 1.03 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 210.4, 139.6, 137.5, 133.5, 132.8, 132.2, 129.4, 129.1, 128.3, 127.8, 127.2, 126.6, 126.0, 106.1, 54.5, 42.9, 36.1, 26.4, 7.9. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{NaO}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 315.1473, found 315.1486.

1-(2-((1*H*-吡唑-1-基)甲基)苯基)戊-3-酮(**5d**): 38.5 mg 无色液体, 产率 66%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.04 (s, 1H), 7.75 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.37~7.30 (m, 2H), 7.24~7.10 (m, 4H), 6.93 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 5.65 (s, 2H), 2.98 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 2.47 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 2.26 (q, $J=7.3$ Hz, 2H), 0.99 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 210.4, 139.8, 139.4, 134.6, 133.5, 129.6, 128.8, 128.3, 126.8, 126.6, 124.4, 121.2, 120.8, 109.5, 51.0, 43.0, 36.0, 26.4, 7.8. HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{NaO}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 315.1473, found 315.1484.

辅助材料(Supporting Information) 所有目标化合物的核磁共振氢谱和碳谱。这些材料可以免费从本刊网站 (<http://sioc-journal.cn/>) 上下载。

References

- [1] Kakiuchi, F.; Murai, S. *Acc. Chem. Res.* **2002**, *35*, 826.
- [2] Giri, R.; Shi, B. F.; Yu, J. Q. *Chem. Soc. Rev.* **2009**, *38*, 3242.
- [3] Lyons, T. W.; Sanford, M. S. *Chem. Rev.* **2010**, *110*, 1147.
- [4] Engle, K. M.; Mei, T. S.; Wasa, M.; Yu, J. Q. *Acc. Chem. Res.* **2011**, *45*, 788.
- [5] Bariwal, J.; Van der Eycken, E. *Chem. Soc. Rev.* **2013**, *42*, 9283.
- [6] Louillat, M. L.; Patureau, F. W. *Chem. Soc. Rev.* **2014**, *43*, 901.
- [7] Ni, C. F.; Zhu, L. G.; Hu, J. B. *Acta Chim. Sinica* **2015**, *73*, 90 (in Chinese). (倪传法, 朱林桂, 胡金波, 化学学报, **2015**, *73*, 90.)
- [8] Li, T. T.; Yu, P.; Lin, J. S.; Zhi, Y. G.; Liu, X. Y. *Chin. J. Chem.* **2016**, *34*, 490.
- [9] Wang, S.; Yan, F.; Wang, L. S.; Zhu, L. *Chin. J. Org. Chem.* **2018**, *38*, 291 (in Chinese). (王珊, 严沅, 汪连生, 朱磊, 有机化学, **2018**, *38*, 291.)
- [10] Wang, K.; Hu, F.; Zhang, Y.; Wang, J. *Sci. China Chem.* **2015**, *58*, 1252.
- [11] Zhang, D.; Huang, Z.; Lei, A. *Sci. China Chem.* **2018**, *61*, 1274.
- [12] Guan, H.; Chen, L.; Liu, L. *Acta Chim. Sinica* **2018**, *76*, 440.
- [13] Luo, F.; Long, Y.; Li, Z.; Zhou, X. *Acta Chim. Sinica* **2016**, *74*, 805.
- [14] Boele, M. D. K.; van Strijdonck, G. P. F.; de Vries, A. H. M.; Kamer, P. C. J.; de Vries, J. G.; van Leeuwen, P. W. N. M. *J. Am. Chem. Soc.* **2002**, *124*, 1586.
- [15] Anilides: Ackermann, L.; Lygin, A. V. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 764.
- [16] Shen, Y. Y.; Liu, G. X.; Zhou, Z.; Lu, X. Y. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 3366.
- [17] Manikandan, R.; Madasamy, P.; Jeganmohan, M. *ACS Catal.* **2016**, *6*, 230.
- [18] Zhang, L. L.; Chen, C. P.; Han, J.; Huang, Z. B.; Zhao, Y. S. *Org. Chem. Front.* **2016**, *3*, 1271.
- [19] Fustero, S.; Sanchez-Rosello, M.; Barrio, P.; Simon-Fuentes, A. *Chem. Rev.* **2011**, *111*, 6984.
- [20] Orth, R. E. *J. Pharm. Sci.* **1968**, *57*, 537.
- [21] Elnagdi, M. H.; Elmoghayar, M. R. H.; Elgemeie, G. E. H. *Adv. Heterocycl. Chem.* **1987**, *41*, 319.
- [22] Hardy, C. R. *Adv. Heterocycl. Chem.* **1984**, *36*, 343.
- [23] Kumar, V.; Kaur, K.; Gupta, G. K.; Sharma, A. K. *Eur. J. Med. Chem.* **2013**, *69*, 735.
- [24] Kucukguzel, S. G.; Senkardes, S. *Eur. J. Med. Chem.* **2015**, *97*, 786.
- [25] Zhou, B.; Chen, Z. Q.; Li, Y. C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, *54*, 12121.
- [26] Xie, F.; Li, X. W. *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 4780.
- [27] Asaumi, T.; Chatani, N. *J. Org. Chem.* **2004**, *69*, 4433.
- [28] Wang, H.; Glorius, F. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 5386.
- [29] Dick, A. R.; Sanford, M. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2004**, *126*, 2300.
- [30] Testa, C.; Hierso, J. *Adv. Synth. Catal.* **2015**, *357*, 2913.
- [31] Hashimoto, Y.; Miura, M. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 638.
- [32] Schinkel, D. M.; Ackermann, L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 3977.
- [33] Yuan, C. C.; Tu, G. L.; Zhao, Y. S. *Org. Lett.* **2017**, *19*, 356.
- [34] Wang, Q.; Han, J.; Wang, C.; Zhang, J. Y.; Huang, Z. B.; Shi, D. Q.; Zhao, Y. S. *Chem. Sci.* **2014**, *5*, 4962.
- [35] Hu, J. D.; Guan, M. Y.; Han, J.; Huang, Z. B.; Shi, D. Q.; Zhao, Y. S. *J. Org. Chem.* **2015**, *80*, 7896.
- [36] Li, G. B.; Liu, P.; Zhang, J. Y.; Shi, D. Q.; Zhao, Y. S. *Org. Chem. Front.* **2017**, *4*, 1931.
- [37] Hu, J. D.; Li, G. B.; Huang, Z. B.; Zhang, J. Y.; Shi, D. Q.; Zhao, Y. S. *Org. Chem. Front.* **2017**, *4*, 1503.
- [38] Zheng, Y. X.; Han, J.; Huang, Z. B.; Shi, D. Q.; Zhao, Y. S. *Chin. J. Org. Chem.* **2017**, *37*, 2066 (in Chinese). (郑永祥, 韩健, 黄志斌, 史达清, 赵应声, 有机化学, **2017**, *37*, 2066.)
- [39] Li, G. B.; Hu, J. D.; Zeng, R. S.; Shi, D. Q.; Zhao, Y. S. *Org. Lett.* **2018**, *20*, 2454.
- [40] Li, H.; Xie, X.; Wang, L. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 4218.
- [41] Zheng, Q. Z.; Liang, Y. F.; Qin, C.; Jiao, N. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 5654.
- [42] Padala, K.; Jeganmohan, M. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 6144.
- [43] Pan, C.; Abdokader, A.; Han, J.; Cheng, Y.; Zhu, C. *Chem.-Eur. J.* **2014**, *20*, 3606.
- [44] Kommagalla, Y.; Mullapudi, V. B.; Francis, F.; Ramana, C. V. *Catal. Sci. Technol.* **2015**, *5*, 114.
- [45] Olsen, K. L.; Jensen, M. R.; Mackay, J. A. *Tetrahedron Lett.* **2017**, *58*, 4111.

(Li, L.; Fan, Y.)