有机化学

Chinese Journal of Organic Chemistry

金属有机化学专辑

第 39 卷 第 6 期 Vol. 39 No. 6 2019

ISSN 0253-2786

中国化学会主办
中国科学院上海有机化学研究所

- METAL CATALYSTS
- LIGANDS
- INORGANICS
- ORGANOMETALLICS
- PHOTOCATALYSTS
- SCREENING KITS

Chemical structure of a Pt complex: A platinum (Pt) atom is coordinated to a cyclopentadienyl ring (represented by a pentagon with an inscribed circle) and three methyl (Me) groups. The Pt atom is bonded to the ring and one Me group with solid lines, and to the other two Me groups with dashed lines.

77-0425

Pd(PPh3)4

46-2150

15-0126

中国高端 均相催化剂领军者

- 10年研发经验
- 国际市场认可
- 无水无氧封装存储

贵金属催化剂：

Pd Rh Ru Ir Au Cu Ni Zr

有机配体：

P N O

MIT专利授权：

BUCHWALD LIGAND & PRECATALYST

手性膦配体：

BINAP SEGPPOS PHOSPHORAMIDITE
JOSIPHOS PHOX SPIRO

手性氮配体：

BOX BINAM DACH TROST DPEN SALEN

手性催化剂：

PHOSPHORIC ACIDS NHC THIOUREA
CINCHONA ALKALOID

光催化剂：

Ir Ru ACRI. SALTS

OTHER: RAFT SILANE PORPHYRIN MOF
ALD PRECURSOR

媲美进口品质的催化剂尽在

WWW.LAAJOO.COM

TEL: 021-60702684

QQ: 3004302861

MAIL: REAGENT@SINOCOMPOUND.COM

理想的实验室伴侣！

中国人都用得起的隔膜真空泵！

旋转蒸发仪/隔膜真空泵

® 上海豫康科教仪器设备有限公司

Shanghai Yukang Science teaching Instrument equipment Co.,Ltd

地址：上海市和桥路470号

电话：021-36338262 56470425
56470426

传真：021-56470425

手机：13701684908

邮编：200435

网址：www.sh-yukang.com

Tel: 021-36338262 56470425
56470426

Fax: 021-56470425

Mobil: 13701684908

Zip Code: 200435

Web: www.sh-yukang.com

基于 I₂ 催化的 C—H 键功能团化的研究进展

施兆江 王连会* 崔秀灵*

(华侨大学生物医学学院 分子药物教育部工程研究中心 福建省分子医学重点实验室
厦门市海洋与基因药物重点实验室 厦门 361021)

摘要 杂环化合物在医药、精细化工等领域具有广泛的应用价值。因此, 开发高效的杂环构筑策略在有机合成中仍然具有强大的吸引力。近年来, 基于 I₂ 催化的直接 C—H 功能团化反应已发展成为构筑杂环化合物的重要方法之一。在此, 按化合物的成键类型(C—C、C—N/O/S), 综述近年来该领域的重要研究进展, 并做总结与展望。

关键词 碘催化; 碳氢键活化; 杂环化合物

Recent Advances in the I₂-Catalyzed C—H Bond Functionalizations

Shi, Zhaojiang Wang, Lianhui* Cui, Xiuling*

(Engineering Research Center of Molecular Medicine, Ministry of Education, Key Laboratory of Fujian Molecular Medicine, Key Laboratory of Xiamen Marine and Gene Drugs, School of Biomedical Sciences, Huaqiao University, Xiamen 361021)

Abstract Heterocyclic compounds are widely applied in medicine, fine chemical engineering and the related industrial fields. Consequently, the development of efficient strategies for heterocycle constructions continues to be of great appeal in organic synthesis. In recent years, the I₂-catalyzed direct C—H bond functionalizations have emerged as one of the most efficient synthetic protocols to construct diverse heterocycles. In this review, the recent advances in I₂-catalyzed C—H bond functionalizations by the types of C—C and C—N/O/S bond formations are summarized, and an outlook of this research filed is given.

Keywords I₂-catalysis; C—H bond activation; heterocycles

近年来, 直接 C—H 键功能团化反应已成为构筑 C—C 键以及 C—杂原子键的最有效和最直接的方法之一, 引起科学家们越来越多的兴趣^[1]。目前, 相关研究主要基于过渡金属催化来实现 C—H 键的直接功能团化^[2]。金属催化剂往往价格昂贵, 且在反应后较难回收, 势必对环境造成一定污染, 不符合绿色化学的要求^[3]。因此, 基于非金属催化的直接 C—H 功能团化反应引起化学家越来越多的关注, 取得了较快进展^[4]。

I₂ 具有多层电子结构和较大的原子半径, 使其显示出一定的特殊化学性质^[5]。此外, I₂ 价格低廉且绿色环保, 在催化合成领域获得越来越多的应用^[6]。特别地, I₂ 作为催化剂与特定氧化剂结合, 通过交叉脱氢偶联(cross-dehydrogenation-coupling, CDC)反应成功构筑了 C—C^[7], C—O^[8], C—N^[9], C—S^[10]等多种化学键, 合成

了一系列具有重要功能的杂环分子^[11]。在此, 本文将从 I₂ 催化的 C—C 键以及 C—杂原子键构筑反应对该研究领域进行综述。

1 构筑 C—N 键的反应

2010 年, Wang 课题组^[12]报道了一种合成喹啉类化合物的方法(Eq. 1)。该方法利用易得的 2-氨基二苯甲酮和苄胺化合物为原料, 通过 I₂ 催化 sp³-C—H 功能团化反应成功构筑双重 C—N 键。该方法简单高效, 避免使用危险试剂和金属催化剂, 为喹啉类化合物的合成提供了新思路。

同时, 作者给出了可能的反应机理, 如 Scheme 1 所示。首先, 2-氨基二苯甲酮(**1a**)和苄胺(**2a**)发生亲核加成反应生成中间体 **4**。随后, 通过 I₂ 催化下化合物 **4** 氧化

* Corresponding authors. E-mail: lianhui.wang@hqu.edu.cn; cuixl@hqu.edu.cn

Received April 10, 2019; revised April 24, 2019; published online May 6, 2019.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21602064, 21572072), the Science and Technology Project of Quanzhou City (No. 2018C073R), and the Postgraduates Innovative Fund in Scientific Research of Huaqiao University.

国家自然科学基金(Nos. 21602064, 21572072)、泉州市科技计划项目(No. 2018C073R)、华侨大学研究生科研创新基金资助项目。

图式 1 基于 I_2 催化 C—H 功能团化合成 2-苯基喹啉
Scheme 1 Synthesis of 2-phenylquinazoline via I_2 -catalyzed C—H functionalization

生成阳离子自由基中间体 **5**。中间体 **5** 在 I_2 作用下脱氢自由基得到阳离子中间体 **6**。随后, 通过 N 原子亲核进攻 C=N 键发生分子内环化反应生成 **7**, 并进一步氧化生成喹啉产物 **3a**。

随后, 该课题组^[13]使用邻羰基取代苯胺, 氨以及 *N,N*-二甲基乙酰胺(DMA)、醚和醇等溶剂三组分合成喹啉类化合物(Eq. 2)。

2011 年, Prabhu 课题组^[14]以苯并噁唑和仲胺/伯胺为底物, 在水溶液中采用 I_2 催化交叉脱氢偶联反应合成 2-氨基苯并噁唑类化合物(Eq. 3)。该方法对含有供电子以及吸电子取代基的苯并噁唑底物具有普适性, 且只产生醇和水副产物, 是一条绿色高效的合成路线。

2013 年, Wu 课题组^[15]以芳基乙酮和 2-氨基吡啶为起始原料, 通过 I_2 催化芳香酮的 α - sp^3 -C—H 键功能团化, 合成了一系列 2-芳基-3-(吡啶-2-基氨基)咪唑并[1,2-

a]吡啶化合物(Eq. 4)。该方法避免了使用金属催化剂、碱和配体。同时, 咪唑并[1,2-*a*]吡啶是吡唑坦、阿立哌唑、佐利米定等多种药物的核心骨架^[15], 因此该方法对该类药物的合成具有重要指导意义。

同时, 作者对该反应的历程进行了探究, 给出了可能的反应机理, 如 Scheme 2 所示。首先, 苯乙酮(**13a**)碘化形成 α -碘代酮(**16**)。化合物 **16** 进一步被二甲基亚砷(DMSO)氧化生成 2-氧代-2-苯基乙醛(**17**)。之后, 化合物 **17** 经历两种可能反应途径。途径 A 中, 化合物 **14a** 的胺基 N 原子分子间亲核进攻 **17** 醛基得到中间体 **18**。随后, **18** 被另一分子 **14a** 的吡啶 N 原子亲核进攻得到中间体 **20**。途径 B 中, 化合物 **14a** 与化合物 **17** 发生分子间亲核反应得到中间体 **19**。随后, 另一分子 **14a** 与 **19** 发生亲核加成反应, 得到中间体 **20**。最后, 中间体 **20** 经历分子内缩合给出咪唑并[1,2-*a*]吡啶产物 **15a**。

图式 2 基于 I_2 催化 sp^3 -C—H 功能团化合成咪唑并[1,2-*a*]吡啶类化合物

Scheme 2 Synthesis of imidazo[1,2-*a*]pyridines via I_2 -catalyzed sp^3 -C—H functionalization

2015 年, Liu 课题组^[17]报道了基于 I_2 催化的 sp^3 -C—H 胺化和 C—N 键裂解合成喹啉和喹啉酮类化合物的方法(Scheme 3)。该反应在 O_2 气氛中进行, 引入杂环的 C 原子来自叔胺的 *N*-甲基。该方法在非金属催化条件

下通过级联反应形成双重 C—N 键, 操作简单, 适用于多种底物. 需要提及的是, 该反应过程中产生一分子仲胺副产物, 且在较高温度下使用 O_2 作为氧化剂易引发爆炸, 在大规模生产时需特别注意.

图式 3 基于 I_2 催化 C—H 官能合成喹唑啉和喹唑啉酮类化合物

Scheme 3 Synthesis of quinazolines and quinazolinones via I_2 -catalyzed C—H functionalization

Bharate 课题组^[18]也利用 I_2 催化氧化 sp^3 -C—H 键的胺化方法, 合成了喹唑啉酮和吡唑并嘧啶酮类化合物 (Eq. 5). 该体系未引入金属和配体添加剂, 且催化产物可用作合成西地那非的重要中间体^[19].

Yotphan 课题组^[20]通过 I_2 催化吲哚和吡咯间的 C—H/N—H 氧化交叉偶联反应, 实现了 *N*-吲哚衍生物的区域选择性合成 (Eq. 6). 该反应条件温和, 在室温下即可进行, 底物具有普适性, 以廉价易得的 I_2 作为催化剂, 避免了金属催化体系, 具有良好的经济和环境效益, 可用于合成具有潜在药用价值的 *N*-吲哚衍生物.

同时, 作者对该反应历程进行了探讨, 提出了可能的反应机理, 如 Scheme 4 所示. 首先, I_2 原位碘化产生

图式 4 基于 I_2 催化 C—H 功能团合成吲哚衍生物

Scheme 4 Synthesis of indoles via I_2 -catalyzed C—H functionalization

亲电碘物种“ I^+ ”. 随后, “ I^+ ”与 1-甲基吲哚(29a)发生亲电加成反应生成碘鎓离子 32, 32 可异构为 3-碘亚胺鎓中间体 33. 33 与吡唑(30a)发生分子间亲核加成形成中间体 34 消除一分子 HI 给出吲哚产物 31a. 最后, TBHP 氧化 HI 再现“ I^+ ”物种以完成催化循环.

2016 年, Wang 课题组^[21]实现了 I_2 催化下烷基氮杂芳烃 sp^3 -C—H 键的功能团化反应 (Eq. 7). 该方法利用烷基氮杂芳烃如 2-甲基喹啉、吡啶、喹啉、吡嗪和喹喔啉等起始原料, 以 O_2 为终端氧化剂, 较之前的报道更为环保^[22].

Al-Mourabit 小组^[23]利用 I_2 作催化剂, 实现了环己酮与 2-氨基吡啶/嘧啶间的脱氢偶联反应, 成功合成了 α,β -二胺类化合物 (Eq. 8). 相比于传统的共轭环己烯酮

参与的二胺化反应, 该方法采用易得的环己酮类化合物, 具有显著优势. 2018 年, Pan 课题组^[24]以 DMSO 和 O₂ 为终端氧化剂, 实现了 I₂ 催化下环己酮与苯胺间的交叉脱氢偶联及芳构化反应, 成功合成二芳基邻苯二胺类化合物.

此外, Al-Mourabit 提出了可能的机理, 如 Scheme 5 所示. 首先, 环己酮(38)发生 α -碘化反应生成 α -碘代环己酮(42). 氨基吡啶 39a 与化合物 42 进行亲核取代反应生成胺化产物 43. 随后, 43 氧化生成亚胺中间体 44, 并可自动异构化为烯胺化合物 45. 45 进行分子内 C—H 功能团化和氧化反应, 得到 α,β -二胺取代产物 46, 进而氧化为最终产物. 同时, 作者发现亚胺中间体 44 可水解生成 39a 和 1,2-环己二酮(47), 47 发生烯醇互变可产生异构体 48.

图式 5 基于 I₂ 催化 C—H 功能团化合成 α,β -二胺化合物
Scheme 5 Synthesis of α,β -diamination compounds via I₂-catalyzed C—H functionalization

随后, Ren 课题组^[25]报道了一种 1,3,5-三取代-1,2,4-三唑化合物的合成方法(Eq. 9). 该方法以脒和甲胺化合物为起始原料, 在 I₂ 催化下发生直接 C—H 功能团化反应构筑 C—N 键. 反应原料简单易得, 操作方便, 底物适用范围较广, 可扩大至克级, 有利于促进三氮唑类

化合物的规模化生产.

2017 年, Wang 课题组^[26]以色氨酸酯为底物, 通过 I₂ 催化分子内 C—H 胺化反应成功制备吡咯并[2,3-*b*]吡啶化合物(Eq. 10). 底物易得, 反应条件较为温和, 操作简单, 克级反应亦可顺利进行. 同时, 该方法可应用于吡咯毒素类化合物的结构修饰, 在药物合成中具有一定应用价值^[27].

该反应机理如 Scheme 6 所示. 首先, 氧化条件下 I₂ 与吡啶形成碘鎓离子 54. 随后, 分子内亲核取代反应给出 3-碘吡咯并二氢吡啶化合物 55. 化合物 55 消除 HI 生成 2,3-二氢吡咯并[2,3-*b*]吡啶-2-羧酸甲酯(56), 进而氧化生成吡咯并[2,3-*b*]吡啶产物 53a.

图式 6 基于 I₂ 碘催化 C—H 功能团化合成吡咯并[2,3-*b*]吡啶类化合物

Scheme 6 Synthesis of pyrrolo[2,3-*b*]indoles via I₂-catalyzed C—H functionalization

Kamal 小组^[28]以喹啉和邻苯二胺或 2-氨基苯硫酚

为反应底物, 利用 I_2 催化下直接 sp^3 -C—H 键功能团化反应, 合成唑类化合物(Eq. 11). 该反应条件温和, 直接在空气气氛中进行, 产率较好, 合成的部分化合物对 A-549 癌细胞系的 IC_{50} 有着显著细胞毒性.

Xi 课题组^[29]以邻烷基偶氮芳烃为底物, CuI 为添加剂, 在 I_2 催化下成功构筑了吡唑环合成 2H-吡唑类化合物(Eq. 12). 该催化体系适用于富电子以及缺电子的偶氮芳烃, 并可用于克级反应.

Jain 课题组^[30]以 I_2 为催化剂, 通过喹啉酮和胺之间的 sp^2 -C—H/N—H 脱氢偶联反应, 成功合成了 3-氨基喹啉酮类化合物(Eq. 13). 该体系对伯胺和仲胺均具有良好适用性, 无需配体或添加剂, 副产物为醇和水, 可用于合成具有药理学活性醛缩酶的还原酶抑制剂等^[31].

Ma 课题组^[32]利用 I_2 催化合成了异喹啉-1,3,4-(2H)-三酮化合物(Eq. 14). 该反应以异喹啉和甲基芳烃为原

料, 通过级联 C—H 键功能化直接合成 *N*-苄基异喹啉-1,3,4-三酮.

通过实验探究, 作者提出了可能的反应机制, 如 Scheme 7 所示. 首先, 在 TBHP 氧化下甲苯与 I_2 生成苄基碘. 苄基碘与异喹啉(**65**)反应生成铵盐 **68**, 并在 TBHP 作用下脱去 HI 生成过氧化物 **69**. **69** 经历 O—O 键断裂得到 *N*-苄基异喹啉-1-(2H)-酮(**70**). **70** 质子化生成亚胺化合物 **71**. 随后, TBHP 或 H_2O 对 **71** 进行亲核加成, 分别产生中间体 **72** 或 **73**. **72** 和 **73** 在 TBHP 作用下脱 $^t\text{BuOH}$ 或 H_2O 转化为 **74**. 最后, 化合物 **74** 发生 C(4)—H 碘化反应, 经 TBHP 或 H_2O 亲核取代等转化得到 *N*-苄基异喹啉-1,3,4-三酮产物 **67a**.

最近, Wang 课题组^[33]开发了一种新型合成取代苯并恶嗪酮和喹啉酮的方法(Scheme 8). 该方法利用 I_2 催化剂, 通过 sp^3 -C—H 键活化、分子内交叉脱氢偶联构筑 C—O 或 C—N 键, 避免了使用过渡金属, 原子利用率高, 对环境友好.

图式 7 基于 I_2 催化 C—H 功能团化合成异喹啉衍生物
 Scheme 7 Synthesis of isoquinolines via I_2 -catalyzed C—H functionalization

图式 8 基于 I_2 催化 C—H 功能团化合成苯并恶嗪酮和喹唑啉酮

Scheme 8 Synthesis of benzoxazinones and quinazolinones via I_2 -catalyzed C—H functionalization

2 构筑 C—S 键的反应

2014 年, Chang 课题组^[34]利用 I_2 催化 β -二羰基化合物 sp^3 C—H 键的磺化反应合成 β -二羰基砜类化合物(Eq. 15). 该反应以磺酸钠作为磺化来源, 原料易得, 底物适用范围广. β -羰基砜化合物为许多药物中间体, 也是构建磺酰基芳杂环化合物的重要单元. 因此, 该方法在构建具有生物活性的 β -二羰基砜衍生物中具有重要应用价值.

Zhao 课题组^[35]利用吡唑啉酮与芳基磺酰肼为反应底物, 在 I_2 催化下通过直接 C—H 功能化反应合成了芳基吡唑啉酮磺醚化合物(Eq. 16). 控制实验证明, TsOH 在 I_2 的催化下可分解磺酰肼, 促进该反应的进行. 该方法拓展了磺酰肼作为新型亲电磺化试剂在有机合成中的应用.

Deng 课题组^[36]报道了基于 I_2 催化直接制备 2-芳基磺酰基吡啶的方法(Eq. 17). 该方法以吡啶和亚磺酸钠为反应底物, 通过 TBHP 氧化亚磺酸盐产生磺酰基自由基, 在 I_2 催化下发生加成和消除反应, 室温数小时即可实现吡啶环 C-2 磺酰化, 获得良好的区域选择性.

随后, 该课题组^[37]发展了从吡啶和亚磺酸钠制备 3-硫基吡啶的方法(Eq. 18). 与上述机理不同, 该反应先生成 1,2-二苯基二硫烷, 然后与 I_2 形成亲电物种 $PhSI$, 故而硫化优先发生在吡啶环 C-3 位.

2014 年, Huang 课题组^[38]报道了一种 I_2 作用下芳基硫醚化合物的合成方法(Eq. 19). 该方法以 β -萘酚/萘胺和磺酰肼为底物, 在 I_2 催化下通过 C—H 键活化直接合成硫醚化合物, 具有良好适用性, 产率较高.

通过一系列控制实验, 作者提出了可能的反应机理, 如 Scheme 9 所示. 首先, I_2 作用下磺酰肼 94 转化为化合物 95, 释放出 N_2 , HOI 和 HI . 随后, 95 经还原产生二硫化物 96. 化合物 96 与 HI 发生分子间亲核取代得到亚磺酰碘 97. 最后, 97 与萘酚/胺 92 发生亲电取代反应获得硫醚化合物 93.

图式 9 基于 I_2 催化 C—H 功能团化合成硫醚类化合物
Scheme 9 Synthesis of thioethers via I_2 -catalyzed C—H functionalization

2015 年, Lei 课题组^[39]利用 1,3-二酮化合物和苯硫酚为底物, 通过 I_2 催化下的 C—H/S—H 氧化偶联反应合成了二羰基硫醚化合物(Eq. 20), 而采用传统方法构建该类 C—S 键往往较为困难^[40]. 该方法经过自由基取代历程, 未引入碱和过渡金属, 操作简单, 有利于构建具有生物活性的 β -羰基硫醚类化合物.

2016 年, Prabhu 小组^[41]首次实现了咪唑杂环上的 C(2)—H 磺酰化反应(Eq. 21). 该反应以易得的杂环硫醇或硫酮为起始原料, I_2 作为催化剂, DMSO 作为氧化剂和溶剂, 通过交叉脱氢偶联完成了咪唑环上的区域选择性 C—S 键构筑.

Yan 课题组^[42]以芳香胺和磺酰肼为起始原料, 通过 I_2 作用下的芳香胺 sp^2 -C—H 活化, 选择性地合成了芳香硫醚类化合物(Eq. 22). 由于氮原子的供电子共轭效应, 反应以对位硫化产物为主.

2016 年, Wang 课题组^[43]利用 I_2 催化下吡唑和硫醇间的交叉脱氢偶联反应, 成功实现了 4-磺酰吡唑化合物的合成(Eq. 23). 该方法高效实用, 原料简单易得, 为构筑巯基取代的吡唑化合物提供了新思路.

最近, Ma 课题组^[44]通过 I_2 催化下的区域选择性 C—H 硫醇化反应合成了 3-磺酰基咪唑并[1,5-a]喹啉类化合物(Eq. 24). 此方法使用市售的二硫化物或苯硫酚为亚磺酰化剂, 底物适用范围较广.

同时, 作者提出了可能的反应机理, 如 Scheme 10 所示. 首先, 咪唑 111a 在 I_2 -DMSO 体系下通过碘化反应生成 3-碘代咪唑并[1,5-a]喹啉(114). 同时, 二苯基二硫化物 112a 在加热条件下产生自由基 115. 115 与 3-碘代咪唑并[1,5-a]喹啉(114)发生取代反应, 生成芳基自由基 117 和亚磺酰碘化合物(116). 随后, 自由基 117 与 115 结合得到 3-磺酰基咪唑并[1,5-a]喹啉产物 113a. 另外, 亚磺酰碘化合物(116)对咪唑并[1,5-a]喹啉 111a 亲电进攻亦可产生 3-磺酰基咪唑并[1,5-a]喹啉产物 113a, DMSO 将 HI 氧化为 I_2 完成催化循环.

图式 10 基于 I_2 催化 C—H 功能团化合成 3-磺酰基咪唑并[1,5-a]喹啉类化合物
Scheme 10 Synthesis of 3-sulfonylimidazo[1,5-a]quinolones via I_2 -catalyzed C—H functionalization

随后, Cui 和 Wu 课题组^[45]通过碘催化实现了喹啉氮氧化合物的 2-位区域选择性磺酰化反应. 该方法操作简单, 效能高, 对环境友好, 且脂肪和芳香磺酰肼均能以较好收率得到 2-磺酰化喹啉化合物(Eq. 25).

3 构筑 C—C 键的反应

2012 年, Lee 课题组^[46]采用靛红与甲基吡啶作为底物, 在 I_2 催化下通过 sp^3 -C—H 键功能团化反应, 合成 3-羟基-2-羟吲哚衍生物(Eq. 26). 3-羟基-2-羟吲哚骨架广泛存在于自然界和药物中, 具有多种生物和药物活性, 如抗癌, 抗艾滋病病毒(HIV), 抗氧化等作用^[47].

同时, 作者对该反应历程进行了探究, 提出了可能的反应机理, 如 Scheme 11 所示. 首先, 2,6-二甲基吡啶(121)与 I_2 配位, 得到 *N*-碘吡啶鎓离子(123), 进而消除 HI 生成中间体 124. 124 与 1-甲基靛红(120)在 HI 作用下发生亲核加成得到 3-羟基-2-羟吲哚产物 122.

图式 11 基于 I_2 催化 C—H 功能团化合成 3-羟基-2-羟吲哚衍生物

Scheme 11 Synthesis of 3-hydroxy-2-oxindoles via I_2 -catalyzed C—H functionalization

Wu 课题组^[48]采用简单易得的芳基乙酮和 *N*-甲基吲哚为起始物, 通过 I_2 催化的 sp^3 -C—H 双芳基化多米诺反应合成了 2,2-双吲哚基-1-芳基乙酮化合物(Eq. 27).

2013 年, Itoh 课题组^[49]首次利用 I_2 催化剂, 实现了双 sp^3 -C—H 键之间的交叉脱氢偶联反应(Eq. 28). 该方法以叔胺为底物, *N*-苯基四氢异喹啉和硝基烷烃等为亲核试剂, H_2O_2 为终端氧化剂, 为 sp^3 -C— sp^3 -C 键构筑提供了新思路.

同样, Prabhu 课题组^[50]利用 I_2 催化 *N*-芳基四氢异喹啉的 C(1)—H 功能团化反应合成其衍生物(Eq. 29). 该反应在 O_2 氛围中进行, 适用于多种亲核试剂, 获得了较好收率.

2014 年, Meshram 课题组^[51]以 I_2 -DMSO 为体系, 利用廉价易得的芳基乙酮和甲氧基苯化合物为底物, 通过 I_2 促进的 sp^3 -C—H 键活化合成了 1,2,2-三芳基酮(Eq. 30). 该反应条件温和, 时间短, 一步即可实现 sp^3 -C—H 双芳基化反应. 随后, Cui 课题组^[52]采用 KI 催化苯并噻唑与芳基醛的偶联反应, 合成了 2-芳基苯并噻唑类化合物.

2015 年, Liu 课题组^[53]利用 2-羰基吲哚与苯乙烯化合物, 通过 I_2 催化下的 sp^3 -C—H/ sp^2 -C—H 交叉脱氢偶

联反应合成 3-芳基-3-烷基-3-烯基-2-噻吩(Eq. 31). 该方法具有广泛的底物适用性和高效的原子经济性, 且偶联产物可进一步转化为含噻吩环的稠环或螺环化合物, 具有潜在应用价值.

2017 年, Cui 和 Wu 课题组^[54]通过喹啉 *N*-氧化物与烯烃间的脱氢偶联反应, 合成了 (*E*)-2-烯基杂环化合物 (Eq. 32). 与之前报道相比^[55], 该方法避免了贵金属催化剂, 反应在空气气氛中即可进行, 条件温和, 操作简单有效. 同时, 喹啉 *N*-氧化物既用作导向基又作为“内置氧化剂”, 发挥了双重作用.

2018 年, Li 课题组^[56]以 TBHP 为氧化剂, 通过 I₂ 催化邻炔基烯酮化合物的分子内自由基环化反应, 合成了环丙基二酮类化合物 (Eq. 33).

4 构筑其它 C—X 键的反应

2014 年, Tian 课题组^[57]利用 I₂ 催化下烯烃, 磺酰肼和醇三组分反应, 合成了一系列 β-烷氧基硫化物 (Eq. 34). 随后, Mal 课题组^[58]利用 I₂ 催化磺酰肼和未活化烯烃反应合成 β-羟基酮类化合物.

同时, 作者对其反应历程进行了探究, 提出了可能的反应机理, 如 Scheme 12 所示. 首先, 磺酰肼 142 与 I₂ 反应生成亚硫酸酯 146. 146 与烯烃 143a 发生亲电加成反应生成硫杂环丙正离子 147. 随后, 醇化合物 144 进攻硫杂环丙正离子 147 (R⁴=H) 发生开环反应生成烷氧基硫化物 148. 反应的区域选择性由 R² 和 R³ 基团的空间位阻和电子性质决定. 当 1,1-二取代烯烃为底物时, 硫杂环丙正离子 147 (R³=H) 更容易消除 HI, 得到烯基硫醚化合物 149.

图式 12 基于 I₂ 催化 C—H 功能团化合成 β-烷氧基硫化物
Scheme 12 Synthesis of β-alkoxy sulfides via I₂-catalyzed C—H functionalization

2014 年, Wu 课题组^[59]以甲基酮和硫脲为反应底物, 在 I₂ 促进下成功构建氨基噻唑化合物. 反应中加入催化量 TsOH 可明显提高反应效率 (Eq. 35). 该反应同时涉及 C—H、C—O 以及 C—S 键的裂解以及 C—N、C—O、C—S 键的构筑, 为噻唑化合物的合成提供了新途径.

通过实验探究, 作者提出了可能的反应机制, 如 Scheme 13 所示. 首先, 底物 150a 发生碘化反应生成中

图式 13 基于 I_2 促进的 C—H 功能团化合成噻唑类化合物Scheme 13 Synthesis of aminothiazole via I_2 -promoted C—H functionalization

间体 α -碘代苯乙酮(153). 随后, 153 被 DMSO 氧化得到中间体 154 或 155. 同时, 153 可与硫脲 151 反应生成 2-氨基硫代唑 154, 然后在 I_2 -DMSO 作用下转化为 157. 155 与硫脲 157 发生脱水缩合得到中间体 158, 进而通过 Kornblum 氧化反应得到产物 152a.

2015 年, Adimurthy 课题组^[60]首次通过分子内 sp^3 -C—H 功能团化反应合成 2,5-二取代噻唑化合物. 该反应以 I_2 为催化剂, TBHP 为氧化剂, N -芳基乙酰胺为反应底物, 原子利用率高(Eq. 36).

Jiao 课题组^[61]利用芳基/烷基酮与 DMSO 为反应底物, 通过 sp^3 -C—H 羟基化反应合成了 α -羟基酮类化合物(Eq. 37). 该方法使用简单易得的 I_2 或 NBS 作为催化剂, DMSO 同时作为氧化剂、氧源和溶剂, 反应条件温和, 便于操作.

2018 年, Quan 课题组^[62]利用 I_2 促进磷甲酰胺和醇的 P—H 烷氧化反应, 快速构建氨基磷酸酯类化合物(Eq. 38). 该转化表现出良好的底物适应性和功能团容忍性.

2018 年, Yang 课题组^[63]通过 I_2 /KI 体系, 利用烷基酮和磺酰肼为起始原料合成了 β -碘代烯基硫化物(Eq. 39). 该反应具有高的区域选择性和立体选择性. 同时, 该研究揭示了酮类化合物可作为乙烯基碘化物的合成前体.

同时, 作者对该反应历程进行了探究, 提出了可能的反应机理, 如 Scheme 14 所示. 首先, 烷基酮 166a 与磺酰肼 167 反应得到磺酰肼 170, 进而在 I_2 作用下发生单电子转移得到中间体 171. 171 去质子化得到自由基 172, 再与碘作用生成中间体 173. 然后, 173 释放 N_2 和苯磺酰自由基得到 174, 随后通过自由基途径生成 175. 在加热条件下, 175 发生消除反应得到化合物 176. 177 和 176 为互变异构. 177 与亚磺酰碘 169 反应通过途径 A 得到目标产物 E -170a, 而 177 在途径 B 的作用下的到 179, 并进一步获得 E -170a 和 Z -170b.

2018 年, Cui 和 Wu 课题组^[64]通过 I_2 介导的串联环化反应, 合成了含有呋喃喹啉和马来酰亚胺的多杂环化合物(Eq. 40).

图式 14 基于 I_2 促进的 C—H 功能团化合成 β -碘代烯基硫化物

Scheme 14 Synthesis of β -Iodoalkenyl Sulfides via I_2 -promoted C—H functionalization

6 同时构筑多重 C—X (X=N, O, S) 键的反应

6.1 构筑 C—O/C—N 键的反应

2010 年, Jiang 课题组^[65]报道了通过 I_2 促进的氧化环化合成多取代噁唑化合物的方法(Eq. 41). 该方法采用

I_2 /TBHP 氧化环化体系, 在温和条件下芳基烯烃和苄胺化合物即可完成反应. 噁唑是一类重要的药物合成中间体^[66], 该体系从简单易得的烯烃和苄胺实现合成, 具有良好的应用价值.

同时, 作者对该反应历程进行了探究, 提出了可能的反应机理, 如 Scheme 15 所示. 首先, 芳基烯烃 185a 在 I_2 /TBHP 的作用下生成 α -碘代苯乙酮(188), 并经 Kornblum 氧化转化为羰基化合物 189. 随后, 189 与苄胺亲核加成形成亚胺 190, 其烯醇异构体 191 通过分子内亲核加成形成中间体 192. 最后, 193 经过去质子化和氧化作用形成噁唑产物 187a.

图式 15 基于 I_2 催化 C—H 功能团化合成多取代噁唑类化合物

Scheme 15 Synthesis of polysubstituted oxazoles via I_2 -catalyzed C—H functionalization

2013 年, Nachtsheim 课题组^[67]利用芳基烷基酮和 α -氨基酸为反应底物, 过硫酸氢钾(oxone)为氧化剂, 在 I_2 催化下通过 Kornblum 氧化/分子内氧化脱羧的多米诺反应直接合成 2,5-二取代噁唑化合物(Eq. 42), 收率可达 80%.

同时, Wu 课题组^[68]开发了类似的 2,5-二取代噁唑化合物的合成方法(Eq. 43). 该方法利用甲基酮和苄胺为反应底物, I_2 作为催化剂, 通过甲基酮 sp^3 -C—H 胺化反应直接合成该类化合物.

2014 年, Wu 课题组^[69]以苯乙酮和盐酸苯甲脒为起始底物, 通过 I_2 催化的 sp^3 -C—H/N—H 氧化偶联反应, 合成了 *N*-(2-氧代-2-苯乙酰基)芳甲酰胺化合物(Eq. 44).

同样, Sun 课题组^[70]以 I_2 为催化剂, TBHP 为氧化剂, 在质子溶液中通过活化多重 sp^3 -C—H 键, 实现了甲苯及其衍生物与 *N,N*-二烷基甲酰胺间的氧化偶联反应, 合成苯甲酰胺类化合物(Eq. 47).

随后, Sekar 小组^[71]报道一种合成靛红化合物的新方法(Eq. 46). 该方法在氧化条件下利用 I_2 催化 2-氨基苯乙酮化合物的直接分子内 sp^3 -C—H 胺化, 成功构筑 C—N 键. 靛红可用作染料和医药中间体^[72], 该方法适用于克级合成, 因此具有良好的应用价值.

2015 年, Ahmed 小组^[73]利用芳基乙酮和仲胺为反应底物, 在 I_2 -DMSO 作用下发生氧化偶联反应, 生成 α -酮酰胺类化合物(Eq. 47). α -酮酰胺是重要的结构单元, 在天然产物和生物医药中广泛存在, 其结构单元在功能团转化中用途广泛^[74]. 相比于之前的报道^[75], 该方法采

用的芳基甲基酮底物廉价易得, 且操作简单, 利于工业化生产, 具有重要合成意义.

2016 年, Yang 课题组^[76]以 I_2 为催化剂, TBHP 为氧化剂, 通过甲基芳香烃的直接 sp^3 -C—H 键活化, 与 2-甲基异喹啉化合物发生 *N*-烷基化反应, 并经 TBHP 氧化酰胺化合成异喹啉-1-(2*H*)-酮类化合物(Eq. 48).

2018 年, Ji 课题组^[77]利用异氰酸酯和基于氨基的双亲核底物, 在 I_2 /TBHP 作用下发生氧化偶联反应, 合成了 2-氨基苯并噁嗪酮和 2-氨基喹唑啉类化合物(Scheme 16).

图式 16 基于 I_2 催化 C—H 功能团化合成 2-氨基苯并噁嗪酮和 2-氨基喹唑啉

Scheme 16 Synthesis of 2-aminobenzoxazinones, and 2-aminoquinazolines via I_2 -catalyzed C—H functionalization

5.2 构筑 C—S/C—N 键的反应

2012 年, Wu 课题组^[78]通过 I₂-DMSO 促进的芳基乙酰酮直接 sp³-C—H 活化, 和邻氨基苯硫醇成功构建了 2-酰基苯并噻唑化合物(Eq. 49).

2014 年, 该课题组^[79]同样采用 I₂-DMSO 体系, 实现了 α -酮硫代酰胺的合成(Eq. 50). 该方法利用芳基乙酰酮、胺和硫氢化钠三组分直接构筑 C—S 和 C—N 键. 底物简单易得, 适用性好, 为 α -酮硫代酰胺的合成提供了新的研究思路.

同时, 作者对该反应历程进行了研究, 提出了可能的反应机理, 如 Scheme 17 所示. 首先, 222a 与 I₂ 作用生成碘化物 226. 随后可能经历两种反应途径. 在途径 A

中, 226 通过 Kornblum 氧化生成 227, 随后 227 和 228 缩合得到亚胺化合物 230. 在途径 B 中, 226 和 228 发生亲核取代反应生成中间体 229, 进而碘化得到 230. 然后 230 进行消除生成亚胺 231. 随后, HS[−] 与中间体 231 亲核加成得到中间体 232, 进而在酸性环境下质子化生成 233. 最后, 233 在 I₂ 作用下生成产物 225a. 在该过程中, 先前形成的 HI 可被 DMSO 氧化重生 I₂.

最近, 该课题组^[80]利用 I₂-DMSO 体系, 在 NaSH·nH₂O 诱导下由芳基甲基酮和 2-氨基苯甲腈合成了 2-酰基-3-氨基吡唑(Eq. 51).

2015 年, Tu 课题组^[81]报道了一种全取代吡唑的合成方法(Scheme 18). 该方法在 I₂ 催化下, 芳基肼、芳基磺酰肼和 β -酮腈(戊烷-2,4-二酮)三组分进行[3+2]环化, 再经过原位 sp²-C—H 磺酰化得以实现. 该反应底物廉价易得, 适用范围较广, 条件温和, 具有较好的应用前景.

同时, 作者通过实验探究, 提出了可能的反应机理, 如 Scheme 19 所示. 首先, 在 I₂ 作用下芳基磺酰肼 238 连续释放 HI 和 HOI, 同时产生硫代重氮化合物 243, 随后释放 N₂ 得到中间体 244. 同时, I₂ 催化下 β -酮腈与芳基肼原位生成富电子吡唑-5-胺 246. 中间体 243 或 244 与吡唑-5-胺 246 发生 Friedel-Crafts 型反应, 生成磺酰化吡唑-5-胺化合物 242.

Wang 课题组^[82]开发了一种绿色高效的 C-4 亚磺酰化吡唑化合物的合成方法(Eq. 52). 该方法通过 I₂ 催化下 1,3-二酮、肼和硫醇三组分的连续环化缩合和直接 C—H 键磺化反应, 成功构筑 C—N 和 C—S 键.

图式 17 基于 I₂ 催化 C—H 功能团化合成 α -酮硫代酰胺化合物
Scheme 17 Synthesis of α -ketothioamides via I₂-catalyzed C—H functionalization

图式 18 基于 I_2 催化 C—H 功能团化合成全取代的吡唑
Scheme 18 Synthesis of fully substituted pyrazoles via I_2 -catalyzed C—H functionalization

图式 19 基于 I_2 催化 C—H 功能团化合成全取代吡唑及其磺酰化反应

Scheme 19 Synthesis of fully substituted pyrazoles and its sulphenylation via I_2 -catalyzed C—H functionalization

5.3 构筑 C—C/C—N 键的反应

2013 年, Kumar 课题组^[85]以查尔酮、吡啶和喹啉为底物, 首次实现了 I_2 作用下二芳基吡啶鎓氮杂芳烃两性离子盐的合成(Eq. 54).

通过实验探究,作者给出了可能的反应机理,如 Scheme 20 所示. 首先, 2-甲基喹啉(**254a**)与 I_2 配位, 实现甲基 sp^3 -C—H 活化, 生成 1-碘-2-亚甲基-1,2-二氢喹啉(**258**). 随后, 吡啶对中间体 **258** 进行亲核加成形成 1-(喹啉-2-基甲基)吡啶-1-碘鎓化物(**259**), 再经过去质子化形成吡啶鎓叶立德 **260**. 最后, 叶立德 **260** 亲核进攻

α,β -不饱和羰基化合物 **256**, 生成两性离子盐产物 **257a**.

图式 20 基于 I_2 催化 C—H 功能团化成两性离子盐化合物
Scheme 20 Synthesis of zwitterionic salts via I_2 -catalyzed C—H functionalization

2015 年, Ma 课题组^[86]以芳基乙酮和色胺化合物为底物, 经 sp^3C-H/sp^2C-H 交叉脱氢偶联反应, 合成吡咯并[1,2-*a*]喹啉衍生物(Eq. 55). 该方法采用 I_2 -DMSO 体系, 底物具有广泛适用性, 获得了较好收率.

2016 年, Adimurthy 课题组^[87]开发了一种吡啶-1-羧酸酯化化合物的合成方法(Eq. 56). 该方法以 2-吡啶基乙酸酯与炔烃或烯烃为反应底物, 在无氧化剂和无碱条件下, 通过 I_2 催化 2-吡啶基乙酸酯的 sp^3C-H 键活化, 同时构筑 C—C 和 C—N 键. 炔烃和炔烃均可很好地应用于该反应体系, 具有良好的底物适用性. 吡啶化合物具有有效的荧光和发光性质^[88], 且具有良好的药理活性^[89], 发展该类化合物的新型合成方法具有重要意义.

2017 年, Kamal 小组^[90]在 I_2 催化下利用 2-氨基喹、氮杂芳烃和异氰化物三组分“一锅法”合成咪唑并[1,2-*a*]

吡啶化合物(Eq. 57). 该方法具有底物适用广、反应条件温和、环境友好、原子经济性高以及清洁简单等优点.

2018 年, Gao 和 Wu 课题组^[91]利用芳基酮肟乙酸酯和靛红化合物在 I_2 的作用下合成了喹啉衍生物(Eq. 58).

随后, Gao 课题组^[92]利用芳基酮肟和 3-甲酰基吲哚通过[3+2+1]环化反应得到吡啶衍生物(Eq. 59).

6 结论与展望

近年来, 基于 I_2 催化的直接 C—H 功能团化反应在构筑杂环化合物的研究得到了快速发展. I_2 廉价易得, 具有多层电子结构和较大的原子半径, 显示出一定的特殊性质. 本文按照杂环化合物的成键类型(C—C、C—N/O/S 等), 综述了 I_2 催化下的直接 C—H 键功能团化反应. 基于 I_2 催化的直接 C—H 功能团化反应条件温和, 原子经济性高, 后处理方便, 成功构筑了喹啉、喹啉酮、吡啶、噻唑、吡啶等多种杂环化合物, 拓展了杂环化合物在医药、精细化工等领域的应用. 然而, 目前基于 I_2 催化构筑杂环化合物的效率较低, 且一些转化仍需等物质的量 I_2 化合物. 因此, 进一步提高 I_2 催化效率, 开发更为绿色环保的 I_2 催化体系, 使之更好地应用于药物合成中, 是该领域研究的重要内容.

References

- [1] (a) Yang, L.; Huang, H.-M. *Chem. Rev.* **2015**, *115*, 3468.
(b) Huang, Z.; Lim, H. N.; Mo, F.; Young, M. C.; Dong, G. *Chem. Soc. Rev.* **2015**, *44*, 7764.
(c) Yang, Q.; Wang, Q.; Yu, Z. *Chem. Soc. Rev.* **2015**, *44*, 2305.
(d) Gensch, T.; Hopkinson, M. N.; Glorius, F.; Wencel-Delord, J. *Chem. Soc. Rev.* **2016**, *45*, 2900.
- [2] (a) Seregin, I. V.; Gevorgyan, V. *Chem. Soc. Rev.* **2007**, *36*, 1173.
(b) Wang, D.; Yu, X.; Ge, B.; Miao, H.; Ding, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2015**, *35*, 676 (in Chinese).
(王大伟, 余晓丽, 葛冰洋, 苗红艳, 丁玉强, 有机化学, **2015**, *35*, 676).
(c) Hu, X.; Yang, B.; Yao, W.; Wang, D. *Chin. J. Org. Chem.* **2018**, *38*, 3296 (in Chinese).
(胡昕宇, 杨伯斌, 姚玮, 王大伟, 有机化学, **2018**, *38*, 3296.)
(d) Wang, D.; Yu, X.; Yao, W.; Hu, W.; Ge, C. *Chem. Eur. J.* **2016**, *22*, 5543.
(e) Yu, X.; Wang, D.-S.; Xu, Z.; Yang, B.; Wang, D. *Org. Chem. Front.* **2017**, *4*, 1011.
(f) Wang, D.; Yu, X.; Xu, X.; Ge, B.; Wang, X.; Zhang, Y. *Chem. Eur. J.* **2016**, *22*, 8663.
- [3] (a) Wang, D.; Zhao, K.; Xu, C.; Miao, H.; Ding, Y. *ACS Catal.* **2014**, *4*, 3910.
(b) Xu, Z.; Wang, D.-S.; Yu, X.; Yang, Y.; Wang, D. *Adv. Synth. Catal.* **2017**, *359*, 3332.
(c) Ye, D.; Huang, R.; Zhu, H.; Zou, L.-H.; Wang, D. *Org. Chem. Front.* **2019**, *6*, 62.
(d) Ge, C.; Sang, X.; Yao, W.; Zhang, L.; Wang, D. *Green Chem.* **2018**, *20*, 1805.
(e) Wu, Q.; Pan, L.; Du, G.; Zhang, C.; Wang, D. *Org. Chem. Front.* **2018**, *5*, 2668.
(f) Hu, X.; Zhu, H.; Sang, X.; Wang, D. *Adv. Synth. Catal.* **2018**, *360*, 4293.
(g) Xu, Z.; Yu, X.; Sang, X.; Wang, D. *Green Chem.* **2018**, *20*, 2571.
- [4] (a) Uyanik, M.; Okamoto, H.; Yasui, T.; Ishihara, K. *Science* **2010**, *328*, 1376.
(b) Yan, Y.; Xu, K.; Fang, Y.; Wang, Z.-Y. *J. Org. Chem.* **2011**, *76*, 6849.
(c) Wang, D.; Ge, B.; Li, L.; Shan, J.; Ding, Y. *J. Org. Chem.* **2014**, *79*, 8607.
- [5] Zhang, Z.; Liu, Q. *Prog. Chem.* **2006**, *18*, 270 (in Chinese).
(张占辉, 刘庆彬, 化学进展, **2006**, *18*, 270.)
- [6] (a) Von Der Heiden, D.; Bozkus, S.; Klusmann, M.; Breugst, M. *J. Org. Chem.* **2017**, *82*, 4037.
(b) Hao, W.-J.; Wang, S.-Y.; Ji, S.-J. *ACS Catal.* **2013**, *3*, 2501.
- [7] Yasui, K.; Kato, T.; Kojima, K.; Nagasawa, K. *Chem. Commun.* **2015**, *51*, 2290.
- [8] Uyanik, M.; Suzuki, D.; Yasui, T.; Ishihara, K. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 5331.
- [9] Varszegi, C.; Ernst, M.; Van Laar, F.; Sels, B. F.; Schwab, E.; De Vos, D. E. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 1477.
- [10] Siddaraju, Y.; Prabhu, K. R. *J. Org. Chem.* **2017**, *82*, 3084.
- [11] Wu, W.; An, Y.; Li, J.; Yang, S.; Zhu, Z.; Jiang, H. *Org. Chem. Front.* **2017**, *4*, 1751.
- [12] Zhang, J.; Zhu, D.; Yu, C.; Wan, C.; Wang, Z. *Org. Lett.* **2010**, *12*, 2841.
- [13] Yan, Y.; Zhang, Y.; Feng, C.; Zha, Z.; Wang, Z. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 8077.
- [14] Lamani, M.; Prabhu, K. R. *J. Org. Chem.* **2011**, *76*, 7938.
- [15] Fei, Z.; Zhu, Y.-P.; Liu, M.-C.; Jia, F.-C.; Wu, A.-X. *Tetrahedron Lett.* **2013**, *54*, 1222.
- [16] Harrison, T. S.; Keating, G. M. *CNS Drugs* **2005**, *19*, 65.
- [17] Yan, Y.; Xu, Y.; Niu, B.; Xie, H.-F.; Liu, Y. *J. Org. Chem.* **2015**, *80*, 5581.
- [18] Mohammed, S.; Vishwakarma, R. A.; Bharate, S. B. *J. Org. Chem.* **2015**, *80*, 6915.
- [19] Mhaske, S. B.; Argade, N. P. *Tetrahedron* **2006**, *62*, 9787.
- [20] Beukeaw, D.; Udomsasporn, K.; Yotphan, S. *J. Org. Chem.* **2015**, *80*, 3447.
- [21] Yang, L.; Shi, X.; Hu, B.-Q.; Wang, L.-X. *Asian J. Org. Chem.* **2016**, *5*, 494.
- [22] (a) Khan, I.; Ibrar, A.; Ahmed, W.; Saeed, A. *Eur. J. Med. Chem.* **2015**, *90*, 124;
(b) He, L.; Li, H.; Chen, J.; Wu, X.-F. *RSC Adv.* **2014**, *4*, 12065;
(c) Connolly, D. J.; Cusack, D.; O'sullivan, T. P.; Guiry, P. J. *Tetrahedron* **2005**, *61*, 10153.
- [23] Nguyen, T. B.; Ermolenko, L.; Retailleau, P.; Al-Mourabit, A. *Org. Lett.* **2016**, *18*, 2177.
- [24] Xiong, M.; Gao, Z.; Liang, X.; Cai, P.; Zhu, H.; Pan, Y. *Chem. Commun.* **2018**, *54*, 9679.
- [25] Chen, Z.; Li, H.; Dong, W.; Miao, M.; Ren, H. *Org. Lett.* **2016**, *18*, 1334.
- [26] Yang, Z.-Y.; Tian, T.; Du, Y.-F.; Li, S. Y.; Chu, C.-C.; Chen, L.-Y.; Li, D.; Liu, J.-Y.; Wang, B. *Chem. Commun.* **2017**, *53*, 8050.
- [27] (a) Crich, D.; Banerjee, A. *Acc. Chem. Res.* **2007**, *40*, 151.
(b) Ruiz-Sanchis, P.; Savina, S. A.; Albericio, F.; Alvarez, M. *Chem. Eur. J.* **2011**, *17*, 1388.
- [28] Baig, M. F.; Shaik, S. P.; Nayak, V. L.; Alarifi, A.; Kamal, A. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2017**, *27*, 4039.
- [29] Yi, X.; Xi, C. *Tetrahedron* **2017**, *73*, 1311.
- [30] Gupta, A.; Deshmukh, M. S.; Jain, N. *J. Org. Chem.* **2017**, *82*, 4784.
- [31] Hussain, S.; Parveen, S.; Hao, X.; Zhang, S.; Wang, W.; Qin, X.; Yang, Y.; Chen, X.; Zhu, S.; Zhu, C.; Ma, B. *Eur. J. Med. Chem.* **2014**, *80*, 383.
- [32] Zhu, D.; Luo, W.-K.; Yang, L.; Ma, D.-Y. *Org. Biomol. Chem.* **2017**, *15*, 7112.
- [33] Chen, K.; Gao, B.; Shang, Y.; Du, J.; Gu, Q.; Wang, J. *Org. Biomol. Chem.* **2017**, *15*, 8770.
- [34] Gao, W.-C.; Zhao, J.-J.; Chang, H.-H.; Li, X.; Liu, Q.; Wei, W.-L. *RSC Adv.* **2014**, *4*, 49329.
- [35] Zhao, X.; Zhang, L.; Li, T.; Liu, G.; Wang, H.; Lu, K. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 13121.
- [36] Xiao, F.; Chen, H.; Xie, H.; Chen, S.; Yang, L.; Deng, G.-J. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 50.
- [37] Xiao, F.; Xie, H.; Liu, S.; Deng, G.-J. *Adv. Synth. Catal.* **2014**, *356*, 364.
- [38] Kang, X.; Yan, R.; Yu, G.; Pang, X.; Liu, X.; Li, X.; Xiang, L.; Huang, G. *J. Org. Chem.* **2014**, *79*, 10605.
- [39] Cao, H.; Yuan, J.; Liu, C.; Hu, X.; Lei, A. *RSC Adv.* **2015**, *5*, 41493.
- [40] (a) Jereb, M.; Togni, A. *Org. Lett.* **2005**, *7*, 4041.
(b) Wang, W.; Li, H.; Wang, J.; Liao, L. *Tetrahedron Lett.* **2004**, *45*, 8229.
- [41] Siddaraju, Y.; Prabhu, K. R. *J. Org. Chem.* **2016**, *81*, 7838.
- [42] Pang, X.; Xiang, L.; Yang, X.; Yan, R. *Adv. Synth. Catal.* **2016**, *358*, 321.
- [43] Yang, D.; Sun, P.; Wei, W.; Meng, L.; He, L.; Fang, B.; Jiang, W.; Wang, H. *Org. Chem. Front.* **2016**, *3*, 1457.
- [44] Wu, S.-S.; Feng, C.-T.; Hu, D.; Huang, Y.-K.; Li, Z.; Luo, Z.-G.; Ma, S.-T. *Org. Biomol. Chem.* **2017**, *15*, 1680.
- [45] Yu, H.; Pi, C.; Wang, Y.; Cui, X.; Wu, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2018**, *38*, 124 (in Chinese).
(余海洋, 皮超, 王勇, 崔秀灵, 吴养洁, 有机化学, **2018**, *38*, 124.)
- [46] Vuppallapati, S. V. N.; Lee, Y. R. *Tetrahedron* **2012**, *68*, 8286.
- [47] (a) Galliford, C. V.; Scheidt, K. A. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2007**, *46*, 8748.
(b) Marti, C.; Carreira, E. M. *Eur. J. Org. Chem.* **2003**, *2003*, 2209.
- [48] Zhu, Y.-P.; Liu, M.-C.; Jia, F.-C.; Yuan, J.-J.; Gao, Q.-H.; Lian, M.; Wu, A.-X. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 3392.
- [49] Nobuta, T.; Tada, N.; Fujiya, A.; Kariya, A.; Miura, T.; Itoh, A. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 574.
- [50] Dhineshkumar, J.; Lamani, M.; Alagiri, K.; Prabhu, K. R. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 1092.

- [51] Raghavender Reddy, M.; Nageswara Rao, N.; Ramakrishna, K.; Meshram, H. M. *Tetrahedron Lett.* **2014**, *55*, 1898.
- [52] Gao, Y.; Song, Q.; Cheng, G.; Cui, X. *Org. Biomol. Chem.* **2014**, *12*, 1044.
- [53] Huang, H.-Y.; Wu, H.-R.; Wei, F.; Wang, D.; Liu, L. *Org. Lett.* **2015**, *17*, 3702.
- [54] Zhang, Z.; Pi, C.; Tong, H.; Cui, X.; Wu, Y. *Org. Lett.* **2017**, *19*, 440.
- [55] Wu, J.; Cui, X.; Chen, L.; Jiang, G.; Wu, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 13888.
- [56] Liu, B.; Cheng, J.; Li, Y.; Li, J.-H. *Chem. Commun.* **2019**, *55*, 667.
- [57] Yang, F.; Wang, F.; Wang, T.; Wang, Y.; Tian, S. *Chem. Commun.* **2014**, *50*, 2111.
- [58] Choudhuri, K.; Achar, T. K.; Mal, P. *Adv. Synth. Catal.* **2017**, *359*, 3566.
- [59] Xue, W.-J.; Zheng, K.-L.; Li, H.-Z.; Gao, F.-F.; Wu, A.-X. *Tetrahedron Lett.* **2014**, *55*, 4212.
- [60] Samanta, S.; Donthiri, R. R.; Dinda, M.; Adimurthy, S. *RSC Adv.* **2015**, *5*, 66718.
- [61] Liang, Y.; Wu, K.; Song, S.; Li, X.; Huang, X.; Jiao, N. *Org. Lett.* **2015**, *17*, 876.
- [62] Wu, Y.-H.; Wu, Q.-L.; Wang, W.-P.; Wang, X.-C.; Quan, Z.-J. *Adv. Synth. Catal.* **2018**, *360*, 2382.
- [63] Bao, Y.; Yang, X.; Zhou, Q.; Yang, F. *Org. Lett.* **2018**, *20*, 1966.
- [64] Du, S.; Pi, C.; Wan, T.; Wu, Y.; Cui, X. *Adv. Synth. Catal.* **2019**, *361*, 1766.
- [65] Jiang, H.; Huang, H.; Cao, H.; Qi, C. *Org. Lett.* **2010**, *12*, 5561.
- [66] (a) Jin, Z. *Nat. Prod. Rep.* **2006**, *23*, 464.
(b) Searle, P. A.; Molinski, T. F. *J. Am. Chem. Soc.* **1995**, *117*, 8126.
(c) Wipf, P. *Chem. Rev.* **1995**, *95*, 2115.
- [67] Xu, W.; Kloeckner, U.; Nachtsheim, B. J. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 6065.
- [68] Gao, Q.-H.; Fei, Z.; Zhu, Y.-P.; Lian, M.; Jia, F.-C.; Liu, M.-C.; She, N.-F.; Wu, A.-X. *Tetrahedron* **2013**, *69*, 22.
- [69] Wu, X.; Gao, Q.; Liu, S.; Wu, A. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 2888.
- [70] Du, B.; Sun, P.-P. *Sci. China Chem.* **2014**, *57*, 1176.
- [71] Rajeshkumar, V.; Chandrasekar, S.; Sekar, G. *Org. Biomol. Chem.* **2014**, *12*, 8512.
- [72] (a) Millemaggi, A.; Taylor, R. J. K. *Eur. J. Org. Chem.* **2010**, *2010*, 4527.
(b) Silva, J. F. M. D.; Garden, S. J.; Pinto, A. C. *J. Braz. Chem. Soc.* **2001**, *12*, 273.
(c) Sumpter, W. C. *Chem. Rev.* **1944**, *34*, 393.
- [73] Mupparapu, N.; Vishwakarma, R. A.; Ahmed, Q. N. *Tetrahedron* **2015**, *71*, 3417.
- [74] (a) Kim, Y. H.; Kim, S. H. *Tetrahedron Lett.* **1995**, *36*, 6895.
(b) Pansare, S. V.; Gnana Ravi, R. *Tetrahedron Lett.* **1995**, *36*, 5959.
(c) Sai, K. K.; Esteves, P. M.; Da Penha, E. T.; Klumpp, D. A. *J. Org. Chem.* **2008**, *73*, 6506.
- [75] Nachtsheim, B.; Finkbeiner, P. *Synthesis* **2013**, *45*, 979.
- [76] Luo, W.; Shi, X.; Zhou, W.; Yang, L. *Org. Lett.* **2016**, *18*, 2036.
- [77] Wang, H.-X.; Wei, T.-Q.; Xu, P.; Wang, S.-Y.; Ji, S.-J. *J. Org. Chem.* **2018**, *83*, 13491.
- [78] Zhu, Y.-P.; Lian, M.; Jia, F.-C.; Liu, M.-C.; Yuan, J.-J.; Gao, Q.-H.; Wu, A.-X. *Chem. Commun.* **2012**, *48*, 9086.
- [79] Li, H.-Z.; Xue, W.-J.; Wu, A.-X. *Tetrahedron* **2014**, *70*, 4645.
- [80] Geng, X.; Wu, X.; Wang, C.; Zhao, P.; Zhou, Y.; Sun, X.; Wang, L. J.; Guan, W. J.; Wu, Y. D.; Wu, A. X. *Chem. Commun.* **2018**, *54*, 12730.
- [81] Sun, J.; Qiu, J.-K.; Zhu, Y.-L.; Guo, C.; Hao, W.-J.; Jiang, B.; Tu, S.-J. *J. Org. Chem.* **2015**, *80*, 8217.
- [82] Sun, P.; Yang, D.; Wei, W.; Sun, X.; Zhang, W.; Zhang, H.; Wang, Y.; Wang, H. *Tetrahedron* **2017**, *73*, 2022.
- [83] Xu, Y.; Li, B.; Zhang, X.; Fan, X. *J. Org. Chem.* **2017**, *82*, 9637.
- [84] Zhao, J.; Huang, H.; Wu, W.; Chen, H.; Jiang, H. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 2604.
- [85] Kumar, A.; Gupta, L. P.; Kumar, M. *RSC Adv.* **2013**, *3*, 18771.
- [86] Zhang, Z.; Xie, C.; Tan, X.; Song, G.; Wen, L.; Gao, H.; Ma, C. *Org. Chem. Front.* **2015**, *2*, 942.
- [87] Reddy, N. N. K.; Mohan, D. C.; Adimurthy, S. *Tetrahedron Lett.* **2016**, *57*, 1074.
- [88] (a) Henry, J. B.; Macdonald, R. J.; Gibbad, H. S.; Menab, H.; Mount, A. R. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2011**, *13*, 5235.
(b) Liu, B.; Wang, Z.; Wu, N.; Li, M.; You, J.; Lan, J. *Chem. Eur. J.* **2012**, *18*, 1599.
- [89] (a) Michael, J. P. *Nat. Prod. Rep.* **2008**, *25*, 139.
(b) Hazra, A.; Mondal, S.; Maity, A.; Naskar, S.; Saha, P.; Paira, R.; Sahu, K. B.; Paira, P.; Ghosh, S.; Sinha, C.; Samanta, A.; Banerjee, S.; Mondal, N. B. *Eur. J. Med. Chem.* **2011**, *46*, 2132.
(c) Wang, H.; Guo, S.; Qian, D.; Qian, Y.; Duan, J. A. *J. Pharm. Biomed. Anal.* **2012**, *67*~68, 16.
- [90] Mani, G. S.; Shaik, S. P.; Tangella, Y.; Bale, S.; Godugu, C.; Kamal, A. *Org. Biomol. Chem.* **2017**, *15*, 6780.
- [91] Gao, Q.; Liu, Z.; Wang, Y.; Wu, X.; Zhang, J.; Wu, A. *Adv. Synth. Catal.* **2018**, *360*, 1364.
- [92] Gao, Q.; Wang, Y.; Wang, Q.; Zhu, Y.; Liu, Z.; Zhang, J. *Org. Biomol. Chem.* **2018**, *16*, 9030.

(Cheng, F.)