3-芳基-7-羟基喹啉类拓扑异构酶 II α 抑制剂的合成及抗肿瘤活性研究

胡 园^a 李震宇^b 丁艳娇^b 李志颖^a
 刘志勇^a 沈月毛^{*,a}

(^a 山东大学药学院 天然产物化学教育部重点实验室 济南 250012)

(^b 山东大学附属省立医院药剂科 济南 250021)

摘要 人脱氧核糖核酸(DNA)拓扑异构酶 II α (topoisomerase II α , Topo II α)是重要的抗肿瘤药物靶标之一。为发现高效、低毒的 Topo II α 抑制剂,通过对先导化合物 6-(3,4-二羟基苯基)萘酚(CS1)进行骨架跃迁,设计合成了 21 个 3-芳基-7-羟基喹啉衍生物。采用 DNA 松弛实验评价体外 Topo II α 抑制活性,结果显示大部分化合物对 Topo II α 活性有抑制作用;采用人三阴乳腺癌 MDA-MB-231 细胞和人宫颈癌 HeLa 细胞生长抑制实验体外评价抗肿瘤活性,结果表明 3-(2,4-二甲氧基苯基)-7-羟基喹啉(**4j**)对 HeLa 细胞有明显毒性(IC₅₀=0.8 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$), 3-(4-羟基苯基)-7-羟基喹啉(**4e**)对 MDA-MB-231 (IC₅₀=1.1 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)和 HeLa (IC₅₀=4.2 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)细胞均有明显毒性,阳性对照 CS1 对 MDA-MB-231 和 HeLa 细胞的 IC₅₀ 值分别为 3.8 和 2.5 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。研究结果为设计合成新的喹啉类高效拓扑异构酶 II α 抑制剂提供了新思路。

关键词 拓扑异构酶 II α ; 设计合成; 结构优化; 抗肿瘤活性

Antitumor and Topoisomerase II α Inhibitory Activities of 3-Aryl-7-hydroxyquinolines

Hu, Yuan^a Li, Zhenyu^b Ding, Yanjiao^b Li, Zhiying^a
 Liu, Zhiyong^a Shen, Yuemao^{*,a}

(^a Key Laboratory of Chemical Biology (Ministry of Education), School of Pharmaceutical Sciences, Shandong University, Jinan 250012)

(^b Department of Pharmacy, Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong University, Jinan 250021)

Abstract Human deoxyribonucleic acid (DNA) topoisomerase II α (Topo II α) is one of the important therapeutic targets for the treatment of cancers. To further discover Topo II α inhibitors with high efficiency and low toxicity, twenty-one 3-aryl-7-hydroxyquinolines were designed and synthesized by scaffold hopping of the lead compound 4-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)benzene-1,2-diol (CS1). These compounds were evaluated for their inhibitory activity against Topo II α activity in DNA relaxation assays, and evaluated for the antitumor activity in *in vitro* growth inhibition assays against human triple negative breast cancer MDA-MB-231 cells and human cervical cancer HeLa cells. DNA relaxation assays showed that most compounds have inhibitory activity against Topo II α . *In vitro* growth inhibition assays showed that 3-(2,4-dimethoxyphenyl)-7-hydroxyquinoline (**4j**) has obvious cytotoxicity against HeLa cells (IC₅₀=0.8 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$), and 3-(4-hydroxyphenyl)-7-hydroxyquinoline (**4e**) has evident cytotoxicity against both MDA-MB-231 (IC₅₀=1.1 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) and HeLa cell lines (IC₅₀=4.2 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$). These results provide insight into the development of novel quinoline topoisomerase II α inhibitors.

Keywords topoisomerase II α ; design and synthesis; structure optimization; antitumor activity

恶性肿瘤严重危害人类健康。据统计, 2018 年全球约有 960 万人死于癌症^[1]。乳腺癌是最常见的肿瘤之一,

其中三阴性乳腺癌恶性程度较高^[2]。三阴乳腺癌因为缺乏雌激素受体、孕激素受体和人表皮因子受体-2 (HER-

* Corresponding author. E-mail: yshen@sdu.edu.cn

Received May 8, 2019; revised June 6, 2019; published online June 24, 2019.

Project supported by the National Basic Research Program of China (973 Program, No. 2010CB833802), the National Natural Science Foundation of China (Nos. 81273384, 90913024, 91313303), the National Science Foundation for Distinguished Young Scholars of China (No. 30325044) and the Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Team in University (No. IRT_17R68).

国家重点基础研究发展计划(973 计划, No. 2010CB833802)、国家自然科学基金(Nos. 81273384, 90913024, 91313303)、国家杰出青年科学基金(No. 30325044)和长江学者与创新团队发展计划(No. IRT_17R68)资助项目。

2), 对激素治疗或靶向 HER2 的抗体治疗反应不佳. 目前三阴性乳腺癌的治疗手段仍然是手术、化疗、放射治疗, 以化疗为主, 极易复发和转移, 预后较差.

拓扑异构酶 II (topoisomerase II, Topo II) 通过催化双链 DNA 的解旋和重连, 参与复制、转录、染色体重组和分离等重要的细胞过程, 已经成为抗肿瘤药物的重要靶标之一^[3-5]. 临床上常见的药物有阿霉素、依托泊苷(VP16)、双(2,6-二噁哌嗪)衍生物 ICRF-193 和米托蒽醌等(图 1). Topo II 在人类细胞中有 Topo II α 和 β 两种亚型^[6]. Topo II β 在正常细胞和肿瘤细胞都有表达, 而且无细胞周期特异性. Topo II α 在无限增殖的细胞中高度表达, 其蛋白水平呈现明显的细胞周期特异性^[7-9]. 长期使用现有 Topo II α 抑制剂类抗肿瘤药可能产生不可忽视的副作用, 包括心脏毒性、继发性恶性肿瘤的发展和多重耐药性^[10,11]. 因此, 发现高选择性和高敏感性的新型 Topo II α 抑制剂迫在眉睫.

图 1 代表性 Topo II 抑制剂结构
Figure 1 Structures of representative Topo II inhibitors

本课题组前期以天然联三苯为先导化合物, 合成了系列联三苯、萘联苯、苯并呋喃、苯并吡咯和木脂素等骨架拟天然产物, 其中具有萘联苯骨架的 6-(3,4-二羟基苯基)萘酚(CS1)的 Topo II α 抑制活性较好^[12]. CS1 通过与 Topo II-DNA 形成可切割三元复合物抑制 Topo II α , 是一个新型的 Topo II 毒剂; 还能抑制 p-糖蛋白过表达的多药耐药细胞, 有潜在的抗多药耐药活性^[13].

近几年, 研究者们合成了结构多样的含氮杂环化合物作为 Topo II 抑制剂以对抗恶性肿瘤. Tseng 等^[14]设计合成的喹啉类化合物, 对多种肿瘤细胞(MDA-MB231, PC-3 和 Huh-7)有明显的抑制作用($0.45 \sim 0.82 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$). 除此之外, Khadka 等^[15]研究的异喹啉类 Topo II 抑制剂对人乳腺导管癌 T47D 细胞有显著抑制作

用($0.05 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$). 喹啉是一类重要的杂环, 被广泛用于新药研发设计. 具有代表性且对本文有重要启发意义的是从喜树中分离得到的广谱肿瘤化合物喜树碱[(+)-camptothecin].

本研究对先导物 CS1 进行骨架跃迁^[16], 以喹啉环替代其萘环, 以杂环或萘环代替苯环, 设计合成了 21 个 3-芳基-7-羟基喹啉衍生物(Eq. 1), 并筛选了其体外抑制 Topo II α 和抑制 MDA-MB-231 和 HeLa 细胞增殖的活性.

1 结果与讨论

1.1 化合物的合成

3-甲氧基苯胺(1)与溴马来醛环合得到中间体 3-溴-7-甲氧基喹啉(2), 中间体 2 通过脱甲基反应得到中间体 3-溴-7-羟基喹啉(3), 将中间体 3 与各种取代的芳基硼酸酯反应, 得到目标化合物 4a~4u (Scheme 1). 测定了目标化合物的熔点, 并通过核磁共振波谱和高分辨质谱分析确证了其结构.

1.2 体外抑制 Topo II α 活性测定

采用 pBR322 DNA 松弛实验, 以 CS1 为阳性对照 ($200 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$), 评价化合物在 $200 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 浓度下对 Topo II α 的抑制作用. $0.25 \mu\text{g}$ 的超螺旋 DNA 在 1 U Topo II α 的作用下, 由超螺旋型全部变为松弛型. 药物溶媒质量分数为 1% 的二甲基亚砜(DMSO)对 Topo II α 介导的 DNA 松弛作用没有任何影响. CS1 显著抑制 Topo II α 介导的 DNA 松弛作用^[17], pBR322 DNA 仍然完全保持超螺旋结构; 化合物 4r, 4s, 4t 和 4u 在 $200 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时能够部分抑制 Topo II α 介导的 DAN 松弛, 化合物 4q, 4e, 4j, 4n 和 4p 有潜在的抑制作用(图 2).

1.3 细胞毒性实验结果

以 CS1 和 VP16 为阳性对照, 采用噻唑蓝(MTT)法检测体外实验中抑制 Topo II α 的 9 个化合物对人三阴乳腺癌 MDA-MB-231 和人宫颈癌 HeLa 细胞的生长抑制作用. 结果表明, 大部分化合物表现出中等至强活性(表 1). 其中, 4j 对 HeLa 细胞毒性最强, $\text{IC}_{50} = 0.8 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$; 4e 对 MDA-MB-231 和 HeLa 细胞均有明显毒性, IC_{50} 值分别为 1.1 和 $4.2 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

1.4 讨论

本课题组前期设计合成了一系列 6-芳基-2-甲氧基

Reagents and conditions: (i) 2-bromomalonate, ethanol, r.t., overnight; ethanoic acid, 100 °C, reflux, 10 d; (ii) methanesulfonic acid, methionine, 130 °C, 23 h; (iii) substituted-aryl boronic acid/borate, potassium acetate, PdCl₂(dppf), dioxane, 90 °C, overnight

图式 1 化合物 4a~4u 的合成路线
Scheme 1 Synthesis of compounds 4a~4u

图 2 3-芳基-7-甲氧基喹啉体外抑制 Topo IIα 的活性
Figure 2 Inhibitory activity of 3-aryl-7-hydroxyquinolines against DNA topoisomerase IIα *in vitro*

表 1 抑制 Topo IIα 的化合物对人乳腺癌 MDA-MB-231 和人宫颈癌 HeLa 细胞的生长抑制作用[IC₅₀/(μmol·L⁻¹)]

Table 1 Inhibitory activity of the anti-Topo IIα compounds against the human triple negative breast cancer MDA-MB-231 cells and human cervical cancer HeLa cells

Compd.	MDA-MB-231	HeLa
4e	1.1	4.2
4j	7.3	0.8
4n	10.6	25.3
4p	9.0	13.7
4q	11.4	17.1
4r	20.5	15.9
4s	16.7	>50
4t	>50	5.2
4u	18.4	>50
CS1	3.8	2.5
VP16	2.7	2.1

喹啉衍生物, 整体抗肿瘤活性效果一般, 其中活性最好的化合物对 MDA-MB-231 的 IC₅₀ 仅为 9.9 μmol·L⁻¹[18],

我们猜想可能是由于未脱甲基所致. 基于以上考虑, 本研究设计合成了一系列 3-芳基-7-羟基喹啉衍生物. 21 个化合物中 9 个对 Topo IIα 有抑制作用, 其中 4r, 4s, 4t 和 4u 的抑制作用强于阳性对照 CS1(图 2). 4r 和 4s 相比于 4a~4s, 无论是苯环上的单取代还是多取代, 引入吸电子基团对 Topo IIα 的抑制作用加强. 对于 4u 和 4t, 在喹啉的 3 位引入萘环对 Topo IIα 有潜在抑制作用, 在萘环 6-位引入甲氧基, 活性明显加强. 9 个代表性化合物中, 4e, 4j 和 4t 对人宫颈癌 HeLa 细胞有较好的细胞毒性, 化合物 4e, 4j 和 4p 对人三阴乳腺癌 MDA-MB-231 细胞有较好的毒性, 其中 4e 对 MDA-MB-231 细胞毒性最强, 4j 对 HeLa 细胞毒性最强(表 1). Topo IIα 抑制实验和体外抗肿瘤细胞增殖活性结果可以看出, 对 Topo IIα 抑制活性较好的化合物 4t, 同时对 HeLa 细胞有显著的细胞毒性, 而对 Topo IIα 抑制活性较弱的化合物 4e 和 4j 却具有较强的细胞毒性, 说明这些化合物在细胞内可能还

有其它作用靶点,与 Topo II α 协同作用,具有进一步探究的价值。

2 结论

以 7-羟基喹啉为母核,在其 3-位引入不同取代的芳基,包括取代苯基、氮硫杂环和萘环等,合成了 21 个 3-芳基-7-羟基喹啉类衍生物,其中 18 个化合物未见文献报道。虽然化合物 **4a**, **4d** 和 **4e** 的合成已有文献报道,但其制备方法与本文不同,抗肿瘤活性评价未见文献报道^[19,20]。体外 pBR322 DNA 松弛实验结果显示,化合物 **4r**, **4s**, **4t** 和 **4u** 在 200 $\mu\text{mol/L}$ 时能够部分抑制 Topo II α 介导的 DAN 松弛,化合物 **4q**, **4e**, **4j**, **4n** 和 **4p** 有潜在抑制作用;体外人乳腺癌 MDA-MB-231 细胞和人宫颈癌 HeLa 细胞生长抑制实验表明,3-(2,4-二甲氧基苯基)-7-羟基喹啉(**4j**)对 HeLa 有明显细胞毒性($\text{IC}_{50}=0.8 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$),3-(4-羟基苯基)-7-羟基喹啉(**4e**)对 MDA-MB-231 ($\text{IC}_{50}=1.1 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)和 HeLa 均有明显细胞毒性($\text{IC}_{50}=4.2 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$),为研发新型 Topo II α 抑制剂提供了新方向,对肿瘤的预防和治疗有重要借鉴意义。

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

柱色谱使用 200~300 目硅胶购自青岛海洋化工厂;核磁共振仪为 Bruker Avance-400 型, TMS 为内参;质谱仪为 LTQ-Orbitrap XL 型(Thermo Fisher),离子源采用电喷雾离子化(ESI);熔点用 X4 型显微熔点仪测定(温度未校正);ChemDoc XRS⁺凝胶成像仪(美国 Bio-Rad 公司);薄层色谱使用 Silica Gel GF254 (购自青岛海洋化工厂)。所有试剂均为国产或进口分析纯,无水溶剂用常规方法干燥处理。

3.2 化学合成

3.2.1 中间体 **2** 的制备

称取溴马来醛(8.40 g, 55.6 mmol)溶解至 250 mL 圆底烧瓶中的乙醇(90 mL)中,再加入 3-甲氧基苯胺(7.8 mL, 46.0 mmol)。混合物于室温搅拌过夜后,加入乙酸(60 mL),然后于 100 $^{\circ}\text{C}$ 回流 10 d,薄层色谱(TLC)监控反应进程。反应完成后,冷却至室温,减压蒸除溶剂,加适量水,用等体积乙酸乙酯萃取 3 次,合并有机相,饱和食盐水洗 3 遍,无水硫酸钠干燥。粗产物经硅胶柱层析分离,石油醚-乙酸乙酯($V:V=120:1$)洗脱得到 3-溴-7-甲氧基喹啉(**2**),白色粉末,收率 19.8%。m.p. 164~165 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 8.85 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, H-2), 8.60 (d, $J=2.3$ Hz, 1H, H-4), 7.86 (d, $J=9.0$ Hz, 1H, H-5), 7.39 (d, $J=2.5$ Hz, 1H, H-8), 7.31 (dd, $J=9.0, 2.5$ Hz, 1H, H-6), 3.92 (s, 3H, MeO-7);

^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 160.6 (C-2), 150.9 (C-9), 147.6 (C-7), 137.0 (C-4), 128.6 (C-5), 124.1 (C-10), 120.5 (C-6), 114.0 (C-3), 107.2 (C-8), 55.6 (MeO-7); HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{BrNO}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 237.9868, found 237.9864.

3.2.2 中间体 **3** 的制备

将化合物 **2** (119 mg, 0.5 mmol, 1.0 equiv.)和甲磺氨酸(596 mg, 4.0 mmol, 4.0 equiv.)混悬于的甲磺酸(10 mL)中,氩气保护。反应液于 130 $^{\circ}\text{C}$ 搅拌 23 h, TLC 检测反应进程。反应完成后,冷却至室温,加入大量的水,乙酸乙酯萃取(25 mL $\times$ 3)。合并有机层,无水硫酸钠干燥、过滤后蒸干,粗产物经硅胶柱层析分离,石油醚-乙酸乙酯($V:V=2:1$)洗脱得到 3-溴-7-羟基喹啉(**3**),黄色粉末,收率 47.7%。m.p. 198~200 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.36 (s, 1H, HO-7), 8.77 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, H-4), 8.54 (d, $J=2.3$ Hz, 1H, H-2), 7.81 (d, $J=8.7$ Hz, 1H, H-5), 7.24 (d, $J=2.3$ Hz, 1H, H-5), 7.22 (dd, $J=8.7, 2.4$ Hz, 1H, H-6); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 159.0 (C-7), 150.8 (C-2), 147.6 (C-9), 137.0 (C-4), 128.8 (C-5), 123.2 (C-10), 120.5 (C-6), 113.0 (C-3), 109.9 (C-8); HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_9\text{H}_8\text{BrNO}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 223.9711, found 223.9707.

3.2.3 化合物 **4a**~**4u** 的制备

以 **4a** 的合成例,将化合物 **3** (112 mg, 0.5 mmol, 1.0 equiv.)、苯硼酸(91 mg, 0.75 mmol, 1.5 equiv.)、碳酸铯(489 mg, 1.5 mmol, 3 equiv.)和 $\text{PdCl}_2(\text{dppf})$ (41 mg, 0.05 mmol, 0.1 equiv.)混悬于二氧六环(10 mL)中,氩气保护。反应液于 90 $^{\circ}\text{C}$ 搅拌反应过夜, TLC 检测反应进程。反应完全后,冷却至室温,加入大量的水,乙酸乙酯萃取 3 次(25 mL $\times$ 3)。合并有机层,无水硫酸钠干燥、过滤后蒸干,粗产物经硅胶柱层析分离,石油醚-乙酸乙酯($V:V=4:1$)洗脱得到 3-苯基-7-羟基喹啉(**4a**),黄色粉末,收率 61.8%。m.p. 248~250 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.22 (s, 1H, HO-7), 9.09 (d, $J=2.3$ Hz, 1H, H-2), 8.49 (d, $J=2.1$ Hz, 1H, H-4), 7.90 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, H-5), 7.82 (d, $J=7.5$ Hz, 2H, H-2', H-6'), 7.53 (t, $J=7.6$ Hz, 2H, H-3', H-5'), 7.42 (t, $J=7.4$ Hz, 1H, H-4'), 7.27 (d, $J=2.1$ Hz, 1H, H-8), 7.20 (dd, $J=8.8, 2.3$ Hz, 1H, H-6); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 158.6 (C-7), 149.3 (C-2), 148.6 (C-9), 137.5 (C-1'), 132.6 (C-4), 130.0 (C-5), 129.7 (C-3), 129.1 (C-10), 127.6 (C-3'), 126.8 (C-2'), 119.7 (C-6), 109.7 (C-8); HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{13}\text{NO}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 222.0919, found 222.0912.

3-(2-氨基苯基)-7-羟基喹啉(**4b**):黄色粉末,收率 49.5%。m.p. 242~244 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, DMSO-

d_6) δ : 10.14 (s, 1H), 8.77 (d, $J=2.2$ Hz, 1H), 8.22 (d, $J=2.2$ Hz, 1H), 7.84 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.27 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.18 (dd, $J=8.8$, 2.4 Hz, 1H), 7.09 (t, $J=7.4$ Hz, 2H), 6.80 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.67 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 4.97 (s, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 158.4, 151.1, 148.2, 145.8, 134.6, 130.5, 129.8, 129.4, 128.6, 122.6, 122.0, 119.3, 116.8, 115.4, 109.7; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{13}\text{N}_2\text{O}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 237.1028, found 237.1025.

3-(3-氨基苯基)-7-羟基喹啉(**4c**): 黄色粉末, 收率 62.2%. m.p. 243~245 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.19 (s, 1H), 8.98 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 8.35 (d, $J=2.2$ Hz, 1H), 7.88 (d, $J=8.9$ Hz, 1H), 7.26 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.22~7.11 (m, 2H), 6.96 (t, $J=2.0$ Hz, 1H), 6.91 (d, $J=7.5$ Hz, 1H), 6.61 (dd, $J=8.0$, 2.1 Hz, 1H), 5.28 (s, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 158.5, 149.3, 149.2, 148.5, 138.0, 132.2, 130.8, 129.6, 129.6, 122.0, 119.6, 114.4, 113.4, 112.0, 109.7; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{13}\text{N}_2\text{O}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 237.1028, found 237.1025.

3-(4-氨基苯基)-7-羟基喹啉(**4d**): 黄色粉末, 收率 54.8%. m.p. 232~234 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.08 (s, 1H), 9.01 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 8.30 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.83 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.52 (d, $J=8.2$ Hz, 2H), 7.24 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.16 (dd, $J=8.8$, 2.4 Hz, 1H), 6.72 (s, 1H), 6.70 (s, 1H), 5.33 (s, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 157.8, 149.0, 148.6, 147.7, 130.6, 130.2, 129.2, 127.3, 124.4, 122.2, 119.4, 114.4, 109.8; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{13}\text{N}_2\text{O}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 237.1028, found 237.1025.

3-(4-羟基苯基)-7-羟基喹啉(**4e**): 黄色粉末, 收率 34.8%. m.p. 214~216 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.12 (s, 1H), 9.62 (s, 1H), 9.02 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 8.35 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.84 (d, $J=8.9$ Hz, 1H), 7.63 (d, $J=8.2$ Hz, 2H), 7.25 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.17 (dd, $J=8.8$, 2.3 Hz, 1H), 6.91 (d, $J=8.3$ Hz, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 158.1, 157.3, 149.1, 148.1, 131.2, 130.1, 129.3, 128.5, 128.1, 127.9, 122.05, 119.5, 115.9, 109.7; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{12}\text{NO}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 238.0868, found 238.0865.

3-(4-羟甲基苯基)-7-羟基喹啉(**4f**): 黄色粉末, 收率 45.5%. m.p. 256~258 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.20 (s, 1H), 9.08 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 8.48 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.89 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.78 (d, $J=7.9$ Hz, 2H), 7.46 (d, $J=7.9$ Hz, 2H), 7.27 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.20 (dd, $J=8.8$, 2.4 Hz, 1H), 5.25 (t, $J=5.7$ Hz, 1H), 4.57 (d, $J=5.7$ Hz, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 152.2,

149.3, 148.6, 145.9, 142.1, 135.8, 132.3, 129.6, 127.2, 126.4, 122.0, 119.7, 109.7, 62.6; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{NO}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 252.1025, found 252.1019.

3-(2-甲氧基苯基)-7-羟基喹啉(**4g**): 黄色晶体, 收率 40.8%. m.p. 213~215 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.18 (s, 1H), 8.88 (d, $J=2.2$ Hz, 1H), 8.27 (d, $J=2.1$ Hz, 1H), 7.87 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.44 (ddd, $J=15.2$, 7.5, 1.7 Hz, 2H), 7.28 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.19 (dd, $J=8.7$, 2.5 Hz, 2H), 7.11 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 3.82 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 158.5, 156.4, 151.4, 148.1, 134.9, 130.6, 129.5, 129.4, 128.3, 126.8, 121.8, 121.0, 119.3, 111.8, 109.7, 55.6; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{NO}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 252.1025, found 252.1019.

3-(3-甲氧基苯基)-7-羟基喹啉(**4h**): 黄色粉末, 收率 91.0%. m.p. 201~203 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.24 (s, 1H), 9.09 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 8.50 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.89 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.44 (t, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.40~7.31 (m, 2H), 7.27 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.20 (dd, $J=8.8$, 2.4 Hz, 1H), 6.98 (dd, $J=8.3$, 2.4 Hz, 1H), 3.86 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 159.9, 158.7, 149.4, 148.7, 138.9, 132.8, 130.2, 129.8, 129.7, 121.9, 119.7, 119.1, 113.3, 112.2, 109.8, 55.2; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{NO}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 252.1025, found 252.1022.

3-(4-甲氧基苯基)-7-羟基喹啉(**4i**): 黄色粉末, 收率 56.8%. m.p. 239~241 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.16 (s, 1H), 9.05 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 8.41 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.86 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.81~7.70 (m, 2H), 7.26 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.18 (dd, $J=8.8$, 2.4 Hz, 1H), 7.13~7.01 (m, 2H), 3.82 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 159.1, 158.3, 149.2, 148.3, 131.7, 129.8, 129.7, 129.5, 127.9, 122.0, 119.6, 114.6, 109.7, 55.2; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{NO}_2$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 252.1025, found 252.1021.

3-(2,4-二甲氧基苯基)-7-羟基喹啉(**4j**): 黄色粉末, 收率 96.5%. m.p. 211~213 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.11 (s, 1H), 8.82 (d, $J=2.2$ Hz, 1H), 8.19 (d, $J=2.2$ Hz, 1H), 7.82 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.36 (d, $J=8.3$ Hz, 1H), 7.24 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.16 (dd, $J=8.7$, 2.4 Hz, 1H), 6.72 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 6.67 (dd, $J=8.3$, 2.4 Hz, 1H), 3.83 (s, 3H), 3.80 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 160.5, 158.2, 157.4, 151.5, 147.8, 134.4, 131.1, 129.3, 128.2, 121.9, 119.4, 119.2, 109.7, 105.6, 99.0, 55.7, 55.4; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{NO}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 282.1130, found 282.1130.

3-(2,6-二甲氧基苯基)-7-羟基喹啉(**4k**): 黄色粉末,

收率 66.7%. m.p. 249~250 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.12 (s, 1H), 8.55 (d, $J=1.9$ Hz, 1H), 8.08~8.02 (m, 1H), 7.80 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.38 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.27~7.23 (m, 1H), 7.15 (dd, $J=8.7, 2.2$ Hz, 1H), 6.80 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 3.70 (s, 6H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 158.3, 157.4, 152.6, 147.9, 136.6, 129.9, 129.6, 129.2, 124.3, 121.8, 119.0, 115.3, 109.8, 106.1, 104.4, 55.8, 55.1; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{NO}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 282.1130, found 282.1125.

3-(3,4-二甲氧基苯基)-7-羟基喹啉(**4l**): 白色粉末, 收率 35.5%. m.p. 240~241 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.16 (s, 1H), 9.09 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 8.45 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.86 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.38 (d, $J=2.1$ Hz, 1H), 7.35 (dd, $J=8.3, 2.1$ Hz, 1H), 7.26 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.18 (dd, $J=8.8, 2.4$ Hz, 1H), 7.09 (d, $J=8.3$ Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 3.81 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 159.3, 150.4, 150.3, 149.7, 149.3, 132.8, 131.1, 131.0, 130.5, 123.0, 120.6, 120.0, 113.4, 111.5, 110.8, 56.7, 56.6; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{NO}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 282.1130, found 282.1126.

3-(噻吩-2-基)-7-羟基喹啉(**4m**): 黄色针晶, 收率 59.0%. m.p. 208~210 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.25 (s, 1H), 9.10 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 8.43 (d, $J=2.2$ Hz, 1H), 7.88 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.68 (d, $J=3.5$ Hz, 1H), 7.62 (d, $J=5.1$ Hz, 1H), 7.25 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 7.21 (d, $J=4.3$ Hz, 1H), 7.19 (dd, $J=6.6, 2.3$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 158.7, 148.5, 148.1, 140.5, 130.8, 129.5, 128.6, 126.1, 124.3, 124.2, 121.8, 120.0, 110.0; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{NOS}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 228.0483, found 228.0477.

3-(噻吩-3-基)-7-羟基喹啉(**4n**): 黄色粉末, 收率 89.1%. m.p. 210~212 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 9.16~9.07 (m, 1H), 8.49~8.40 (m, 1H), 8.07~8.00 (m, 1H), 7.79 (t, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.71 (s, 1H), 7.71 (s, 1H), 7.64~7.41 (m, 1H), 7.20 (d, $J=10.4$ Hz, 1H), 7.17 (s, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 149.5, 149.4, 139.4, 139.3, 131.8, 129.7, 128.9, 127.9, 126.5, 125.5, 121.4, 120.9, 110.4; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{NOS}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 228.0483, found 228.0480.

3-(嘧啶-5-基)-7-羟基喹啉(**4o**): 黄色粉末, 收率 64.5%. m.p. 237~239 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.38 (s, 1H), 9.30 (s, 2H), 9.23 (s, 1H), 9.19 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 8.70 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.90 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.30 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.25 (dd, $J=8.8, 2.4$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 159.3, 157.3,

154.8, 149.5, 149.2, 148.8, 133.6, 131.1, 129.9, 123.9, 121.7, 120.1, 109.8; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 224.0824, found 228.0817.

3-(3-硝基苯基)-7-羟基喹啉(**4p**): 黄色粉末, 收率 84.5%. m.p. 261~263 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.34 (s, 1H), 9.18 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 8.69 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 8.63 (d, $J=2.1$ Hz, 1H), 8.32 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 8.26 (dd, $J=8.2, 2.2$ Hz, 1H), 7.94 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.82 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.30 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.24 (dd, $J=8.8, 2.4$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 159.2, 149.1, 149.1, 148.6, 139.2, 133.6, 133.3, 130.6, 130.0, 127.7, 122.3, 121.7, 121.2, 120.0, 109.8; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{11}\text{N}_2\text{O}_3$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 267.0770, found 267.0764.

4-(7-羟基喹啉-3-基)-2-苯甲酸甲酯(**4q**): 黄色粉末, 收率 51.7%. m.p. 213~215 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.43 (s, 1H), 9.21 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 8.75 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 8.52 (d, $J=1.8$ Hz, 1H), 8.32 (dd, $J=8.2, 1.8$ Hz, 1H), 8.03 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 7.93 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.30 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.25 (dd, $J=8.8, 2.4$ Hz, 1H), 3.89 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 164.6, 159.6, 149.4, 148.9, 142.2, 134.1, 130.9, 130.6, 130.2, 126.6, 123.8, 121.7, 121.6, 120.2, 109.8, 53.2; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{13}\text{N}_2\text{O}_5$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 325.0824, found 325.0818.

3-(3,5-二氟甲基苯基)-7-羟基喹啉(**4r**): 白色粉末, 收率 44.8%. m.p. 200~202 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.38 (s, 1H), 9.25 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 8.78 (d, $J=2.4$ Hz, 1H), 8.54 (s, 2H), 8.13 (s, 1H), 7.94 (d, $J=8.9$ Hz, 1H), 7.31 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.25 (dd, $J=8.8, 2.4$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 159.4, 149.3, 149.2, 140.3, 134.2, 131.1 ($J=32.7$ Hz), 130.6, 130.1, 127.5, 127.5, 126.9, 123.4 ($J=271.4$ Hz), 120.9~122.4 (m), 120.0, 109.8; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{10}\text{F}_2\text{NO}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 358.0667, found 358.0662.

3-(2,4-二氯苯基)-7-羟基喹啉(**4s**): 黄色粉末, 收率 42.7%. m.p. 231~233 °C; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 10.37 (d, $J=5.0$ Hz, 1H), 8.80 (s, 1H), 8.32 (s, 1H), 7.91 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.86~7.79 (m, 1H), 7.62 (d, $J=8.3$ Hz, 1H), 7.60 (d, $J=1.6$ Hz, 1H), 7.30 (s, 1H), 7.23 (dd, $J=8.8, 1.9$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, DMSO- d_6) δ : 159.3, 150.4, 148.5, 135.9, 133.4, 133.1, 132.9, 129.8, 129.4, 127.9, 127.8, 121.4, 119.9, 109.7; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{Cl}_2\text{NO}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 290.0139, found 290.0139.

3-(1-萘基)-7-羟基喹啉(**4t**): 白色粉末, 收率 45.0%. m.p. 244~245 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 10.26 (s, 1H), 8.85 (d, $J=2.2$ Hz, 1H), 8.35 (d, $J=2.2$ Hz, 1H), 8.04 (t, $J=9.3$ Hz, 2H), 7.92 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.82 (d, $J=8.3$ Hz, 1H), 7.64 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.58 (td, $J=7.4, 6.9, 1.3$ Hz, 2H), 7.53 (ddd, $J=8.2, 6.8, 1.4$ Hz, 1H), 7.35 (d, $J=2.3$ Hz, 1H), 7.24 (dd, $J=8.8, 2.4$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 158.8, 151.4, 148.6, 136.3, 135.9, 133.5, 131.1, 129.9, 129.6, 128.5, 128.1, 127.7, 126.8, 126.1, 125.7, 125.0, 121.7, 119.8, 109.8; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{NO}$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 272.1075, found 272.1069.

3-(6-甲氧基萘-2-基)-7-羟基喹啉(**4u**): 黄色粉末, 收率 31.3%. m.p. 215~217 °C; ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 10.22 (s, 1H), 9.23 (s, 1H), 8.60 (s, 1H), 8.33 (s, 1H), 8.04~7.84 (m, 4H), 7.38 (s, 1H), 7.29 (s, 1H), 7.25~7.18 (m, 2H), 3.91 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 158.6, 157.5, 149.4, 148.5, 137.8, 133.6, 132.4, 129.9, 129.7, 129.6, 128.8, 127.6, 125.3, 125.2, 122.1, 119.7, 119.1, 109.8, 105.8, 55.2; HR-ESI-MS calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{NO}_2$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 302.1181, found 302.1177.

3.3 化合物体外抑制 Topo II α 试验

采用超螺旋 DNA (pBR322) 松弛实验检测化合物对 DNA 拓扑异构酶 Topo II α 活性的影响. 实验方法详细过程见参考文献[12,17,21]. 在 20 μL 的反应体系中加入 2 μL 10 $\times$ 反应缓冲液(500 $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaCl, 500 $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ KCl, 50 $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ MgCl_2 , 150 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 牛血清白蛋白(BSA), 1 $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 乙二胺四乙酸(EDTA), 10 $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 三磷酸腺苷(ATP) 100 $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$, Tris-HCl pH 7.9)、0.25 μg 超螺旋 DNA (pBR322 DNA)、1 μL 不同浓度的待测化合物或者阳性对照 CS1, 加蒸馏水至 19 μL , 最后加入 1 μL Topo II α (稀释至 1 $\text{unit}\cdot\mu\text{L}^{-1}$), 37 °C 反应 30 min. 然后加 1 μL 体积分数 10% SDS 终止反应, 体积分数 0.8% 琼脂糖凝胶、1 $\times$ TAE 缓冲液、4 V/cm 室温条件下电泳 1 h. 电泳完毕, 0.5 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 溴化乙锭(EB)避光染色 20 min, 去离子水漂洗 20 min, 然后用 Bio-Rad 凝胶成像系统拍照观察.

3.4 体外抗肿瘤活性试验

体外抗肿瘤活性测定采用 MTT 法, 具体实验方法和实验数据处理方法见相应参考文献[22,23]. 体外抗肿瘤活性测定以 CS1 和 VP16 为阳性对照. MDA-MB-231 细胞和 HeLa 细胞分别接种于含完全培养基的 96 孔细胞培养板中, 每孔细胞密度为 3×10^3 个/孔. 37 °C 恒温培养 12 h 后, 各孔分别加入不同浓度的目标化合物.

37 °C, 体积分数 5% 的 CO_2 培养箱继续恒温培养 72 h 后, 每孔加入 5 $\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 3-(4,5-二甲基-2-噻唑)-2,5-二苯基四氮唑溴化物(MTT)溶液, 继续培养 4 h, 移除培养基和 MTT. 加入 200 μL 二甲基亚砜(DMSO)溶解结晶. 用酶标仪(Bio-Rad680, USA) OD_{570 nm} 处测量各孔的吸光值并计算抑制率. MDA-MB-231 细胞和 HeLa 细胞抑制率用 IC₅₀ 表示.

辅助材料(Supporting Information) 中间体 **2**、**3** 和化合物 **4a**~**4u** 的 ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 谱图. 这些材料可以免费从本刊网站 (<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] World Health Organization (WHO), WHO cancer 2018, Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/>, 2018.
- [2] Costa, R.; Shah, A. N.; Santa-Maria, C. A.; Cruz, M. R.; Mahalingam, D.; Carneiro, B. A.; Chae, Y. K.; Cristofanilli, M.; Gradishar, W. J.; Giles, F. J. *Cancer Treat Rev.* **2017**, *53*, 111.
- [3] Wang, Y.; Sun, H.; Xiao, Z.; Zhang, G.; Zhang, D.; Bao, X.; Li, F.; Wu, S.; Gao, Y.; Wei, N. *Cell Commun. Signal* **2018**, *16*, 52.
- [4] Infante Lara, L.; Sledge, A.; Laradji, A.; Okoro, C. O.; Osheroff, N. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2017**, *27*, 586.
- [5] Ortega, J. A.; Riccardi, L.; Minniti, E.; Borgogno, M.; Arencibia, J. M.; Greco, M. L.; Minarini, A.; Sissi, C.; De Vivo, M. *J. Med. Chem.* **2018**, *61*, 1375.
- [6] Shapiro, A. B.; Austin, C. A. *Anal. Biochem.* **2014**, *448*, 23.
- [7] Guan, M.; Qiu, J.; Lu, C.; Zhao, B.; Shen, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2018**, *38*, 3039 (in Chinese). (关梦佳, 邱进, 鲁春华, 赵保兵, 沈月毛, 有机化学, **2018**, *38*, 3039.)
- [8] Park, S.; Hong, E.; Kwak, S. Y.; Jun, K. Y.; Lee, E. S.; Kwon, Y.; Na, Y. *Eur. J. Med. Chem.* **2016**, *123*, 211.
- [9] Wu, X.; Yalowich, J. C.; Hasinoff, B. B. *J. Inorg. Biochem.* **2011**, *105*, 833.
- [10] Coustry, F.; Maity, S. N.; de Crombrughe, B. *J. Biol. Chem.* **1995**, *270*, 468.
- [11] McClendon, A. K.; Osheroff, N. *Mutat. Res.* **2007**, *623*, 83.
- [12] Chen, W.; Shen, Y.; Li, Z.; Zhang, M.; Lu, C.; Shen, Y. *Eur. J. Med. Chem.* **2014**, *86*, 782.
- [13] Hao, H.; Chen, W.; Zhu, J.; Lu, C.; Shen, Y. *Eur. J. Med. Chem.* **2015**, *102*, 277.
- [14] Tseng, C. H.; Chen, Y. R.; Tzeng, C. C.; Liu, W.; Chou, C. K.; Chiu, C. C.; Chen, Y. L. *Eur. J. Med. Chem.* **2016**, *108*, 258.
- [15] Khadka, D. B.; Woo, H.; Yang, S. H.; Zhao, C.; Jin, Y.; Le, T. N.; Kwon, Y.; Cho, W.-J. *Eur. J. Med. Chem.* **2015**, *92*, 583.
- [16] Zhao, H. *Drug Discovery Today* **2007**, *12*, 149.
- [17] Shen, Y.; Chen, W.; Zhao, B.; Hao, H.; Li, Z.; Lu, C.; Shen, Y. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* **2014**, *453*, 302.
- [18] Li, Z.; Ding, Y.; Bu, H.; Shen, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2018**, *38*, 3204 (in Chinese). (李志颖, 丁艳娇, 卜华港, 沈月毛, 有机化学, **2018**, *38*, 3204.)
- [19] Frotscher, M.; Ziegler, E.; Marchais-Oberwinkler, S.; Kruchten, P.; Neugebauer, A.; Fetzer, L.; Scherer, C.; Mueller-Vieira, U.; Messinger, J.; Thole, H.; Hartmann, R. W. *J. Med. Chem.* **2008**, *51*, 2158.
- [20] Krishnan, R.; Seshadri, S. *Dyes Pigm.* **1986**, *7*, 69.
- [21] Xiao, X.; Cushman, M. J. *Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 9960.
- [22] Huang, Y.; Wang, J.; Li, G.; Zheng, Z.; Su, W. *FEMS Immunol. Med. Microbiol.* **2001**, *31*, 163.
- [23] Carmichael, J.; DeGraff, W. G.; Gazdar, A. F.; Minna, J. D.; Mitchell, J. B. *Cancer Res.* **1987**, *47*, 943.

(Cheng, F.)