小连翘化学成分的研究

李 竣^{†,a} 徐晓诗^{†,a} 滕海达^b 陈 玉^b 梅之南^{*,a} 杨光忠^{*,a}(^a 中南民族大学药学院 武汉 430074)(^b 中南民族大学化学与材料科学学院 武汉 430074)

摘要 采用溶剂提取法和正、反相硅胶柱色谱及高效液相等多种色谱技术对小连翘化学成分进行分离纯化,并根据理化性质和现代波谱技术对其进行结构鉴定. 从其氯仿提取物分离 3 个结构类型分别属于吡喃酮、黄酮和脂肪醇的新化合物以及 15 个已知化合物. 以脂多糖(LPS)诱导 RAW264.7 细胞建立炎症模型,采用 Griess 法测定 NO 的分泌量,其中 hyperflavone (2)、isocudranianthone B (5) 和 2-deprenylrheediaanthone B (6) 对 NO 分泌表现出一定的抑制活性,其 IC₅₀ 分别为 12.90, 16.24 和 9.86 μmol·L⁻¹.

关键词 金丝桃属; 小连翘; 吡喃酮; 抗炎活性

Chemical Constituents from *Hypericum Erectum* ThunbLi, Jun^{†,a} Xu, Xiaoshi^{†,a} Teng, Haida^b Chen, Yu^bMei, Zhinan^{*,a} Yang, Guangzhong^{*,a}(^a School of Pharmaceutical Sciences, South-Central University for Nationalities, Wuhan 430074)(^b College of Chemistry and Materials Sciences, South-Central University for Nationalities, Wuhan 430074)

Abstract The chemical constituents of *Hypericum erectum* Thunb were isolated and purified by solvent extraction method, the normal and reverse phase silica gel column chromatography and semi-preparative high performance liquid chromatography. Their structures were elucidated by their physicochemical property and extensive analysis of spectroscopic data. Three new compounds which belong to α-pyrone, flavonoid and aliphatic alcohol respectively, together with 15 known compounds, were isolated from the chloroform extract of *H. erectum*. Inflammatory cell model was constructed by lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW264.7 cell line. NO production inhibitory effects of all tested compounds were measured by Griess method. Hyperflavone (2), isocudranianthone B (5) and 2-deprenylrheediaanthone B (6) exhibited moderate NO production inhibitory activities with the IC₅₀ values of 16.24, 9.86 and 12.90 μmol·L⁻¹, respectively.

Keywords *Hypericum* Linn; *Hypericum erectum* Thunb; xanthone; anti-inflammatory activity

小连翘 *Hypericum erectum* Thunb 为藤黄科金丝桃属植物,该属植物在全球约有 500 种,我国约有 50 种,主要分布在华东和台湾地区. 小连翘性苦,味平,具有抗菌消炎和收敛止血等功效,用于治疗外伤出血、疔疮肿毒、毒蛇咬伤等^[1,2]. 前期国内外学者对小连翘化学成分进行了研究,发现其主要的化学成分包括间苯三酚、黄酮和吡喃酮等多种结构类型^[3~5]. 药理活性的研究发现,部分化合物具有抗幽门螺旋杆菌^[6]和抗疟原虫^[7]等生物活性.

为了进一步从金丝桃属植物中寻找结构新颖的天然产物^[8],本工作对小连翘的化学成分进行了系统的研究. 从其地上部分的氯仿提取物中分离得到 18 个化合物,其中 hyperipyone (1), hyperflavone (2) 和 hyperalcohol (3) (图 1) 为新化合物,分别属于吡喃酮、黄酮和脂肪醇类. 另外,还分离得到了 15 个已知化合物,包括 8 个吡喃酮、1 个芳香酸、3 个间苯三酚、2 个呋喃酮和 1 个倍半萜. 本文报道这些化合物的提取分离、结构鉴定以及抗炎活性的筛选.

* Corresponding authors. E-mail: meizhinan@163.com; yanggz888@126.com

Received April 26, 2019; revised June 17, 2019; published online July 17, 2019.

Project supported by the National Major New Drugs Innovation and Development (No. 2017ZX09301060) and the Special Fund for Basic Scientific Research of Central Colleges, South-Central University for Nationalities (No. CZP18004).

国家重大新药创制科技重大专项(No. 2017Z09301060)和中央高校基本科研业务费(No. CZP18004)资助项目.

[†] 共同第一作者(These authors contributed equally to this work).

图1 化合物1~3结构式
Figure 1 Structures of compounds 1~3

1 结果与讨论

1.1 化合物的结构鉴定

化合物 **1**, 黄色粉末, m.p. 197~201 °C; 比旋光度 $[\alpha]_D^{20} +226.42$ (c 0.74, MeOH). 由 HR-ESI-MS 得到准分子离子峰 m/z : 273.11203 $[M+H]^+$ (计算值 273.11214), 推断化合物的分子式为 $C_{16}H_{16}O_4$, 不饱和度为 9. 1H NMR 显示 **1** 存在 1 个苯环的 AA'XX' 自旋系统 [δ_H 7.73 (d, $J=9.0$ Hz, 2H), 6.86 (d, $J=9.0$ Hz, 2H)], 1 个双键质子信号 [δ_H 6.67 (s, 1H)], 1 个连氧次甲基信号 [δ_H 4.61 (q, $J=6.6$ Hz, 1H)] 和 3 个甲基信号 [δ_H 1.40 (d, $J=6.6$ Hz, 3H), 1.38 (s, 3H), 1.20 (s, 3H)]. ^{13}C NMR 谱显示该化合物有 16 个碳原子, 结合 DEPT 谱, 说明该化合物含有 1 个共轭酯羰基的信号 [δ_C 163.6 (s)], 3 个 sp^2 杂化的季碳 [δ_C 109.1 (s), 172.9 (s), 165.3 (s)], 1 个 sp^2 杂化的次甲基信号 [δ_C 92.7 (d)] 和 1 个 sp^3 杂化的次甲基信号 [δ_C 93.8 (d)], 同时还有 1 个对羟基苯基 [δ_C 2×116.9 (d), 2×128.9 (d), 162.0 (s), 123.9 (s)] 和 3 个甲基 [δ_C 14.9 (q), 20.6 (q), 25.9 (q)] 信号. 将该化合物的 1H NMR, ^{13}C NMR 数据和文献[9]报道的化合物 Japopyrone A 对比, 发现二者具有相同的 6-取代-2,3,3-三甲基-2H-2,3-二氢呋喃并[3,2-*c*]吡喃-4-酮母核, 差别仅仅在于 C-2 的构型和苯环的取代方式不同. HMBC 谱(图 2)中, H-2',6' (δ_H 7.73)与 C-6 (δ_C 165.3), C-4' (δ_C 162.0) 相关, 说明对羟基苯基连接在 α -吡喃酮的 C-6 位. H₃-9 (δ_H 1.38), H₃-10 (δ_H 1.20) 和 H₃-8 (δ_H 1.40) 分别与 C-3 (δ_C 43.8) 相关, H-2 (δ_H 4.61) 与 C-3, C-3a (δ_C 109.1), C-7a (δ_C 172.9), C-8 (δ_C 14.9), C-9 和 C-10 相关, 说明 2,3,3-三甲基二氢呋喃环在 C-3a 和 C-7a 位同吡喃酮母核稠和, 同时在 C-2 和 C-7a 位形成醚键, 可确定该化合物的平面结构如图 1 所示. 将化合物 **1** 的 CD 图谱与文献所报道的 japopyrone A^[9] 比较, 发现 **1** 在 210, 260 和 351 nm 处均出现正的 cotton 效应, 与文献报道的 japopyrone A [211 ($\Delta\epsilon$ -0.79), 252 ($\Delta\epsilon$ -0.10), 355 ($\Delta\epsilon$ -0.18) nm] 相反, 因此确定 C-2 的绝对构型为 *R*. 综上所述, 推断化合物 **1** 为 (2*R*)-6-(4-羟基苯

基)-2,3,3-三甲基-2H-2,3-二氢呋喃并[3,2-*c*]吡喃-4-酮, 将其命名为 hyperipyone.

化合物 **2**, 黄色粉末, m.p. 210~212 °C. 由 HR-ESI-MS 得到准分子离子峰 m/z : 383.11295 $[M+H]^+$ (计算值 383.11253), 推断化合物的分子式为 $C_{21}H_{18}O_7$, 不饱和度为 13. 1H NMR 显示存在 1 个苯环的 AMX 系统 [δ_H 8.21 (d, $J=1.8$ Hz, 1H), 7.38 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.82 (dd, $J=1.8, 8.4$ Hz, 1H)], 1 个芳香质子 [δ_H 6.52 (s, 1H)], 1 个 2,2-二甲基-2H-吡喃环 [δ_H 5.66 (d, $J=10.2$ Hz, 1H), 6.92 (d, $J=10.2$ Hz, 1H), 1.45 (s, 6H)] 和 1 个甲氧基 [δ_H 3.89 (s, 3H)]. ^{13}C NMR 显示该化合物有 21 个碳原子, 结合 DEPT 谱, 有 1 个共轭羰基的信号 [δ_C 179.5 (s)], 10 个 sp^2 杂化的季碳 [δ_C 160.0 (s), 157.2 (s), 156.8 (s), 151.4 (s), 156.8 (s), 147.7 (s), 139.2 (s), 122.4 (s), 106.7 (s), 105.8 (s)] 和 4 个 sp^2 杂化的次甲基信号 [δ_C 95.6 (d), 117.2 (d), 117.2 (d), 122.1 (d)]. 综合文献[10]报道的数据, 可知存在一个黄酮骨架, 除去黄酮骨架上的 15 个碳原子外, 还存在一个 2,2-二甲基-2H-吡喃环 [δ_C 129.1 (d), 116.2 (d), 78.6 (s), 2×28.6 (q)] 和一个甲氧基 [δ_C 60.3 (q)]. HMBC 图谱(图 2)显示, H-3 (δ_H 5.66) 与 C-4a (δ_C 105.8) 相关, H-4 (δ_H 6.92) 与 C-4a 和 C-10a (δ_C 160.0) 相关, 说明 2,2-二甲基-2H-吡喃环在 C-4a 和 C-10a 位同黄酮母核稠和, 同时在 C-10a 和 C-2 位形成醚键. MeO (δ_H 3.89) 与 C-7 (δ_C 139.2) 相关, 可知在 C-7 位上有一个甲氧基, 根据 C 环存在一个 AMX 自旋系统以及相关的 HMBC, 推测两个羟基分别位于 C-3' 和 C-4' 位, 综上所述, 推断化合物 **2** 的结构为 8-(3,4-二羟基苯基)-5-羟基-7-甲氧基-2,2-二甲基-2H,6H-吡喃并[3,2-*g*]色烯-6-酮, 命名为 hyperiflavone.

化合物 **3**, 无色油状物, 比旋光度 $[\alpha]_D^{20} -24.44$ (c 0.15, MeOH). 由 HR-ESI-MS 得到准分子离子峰 m/z : 199.16939 $[M+H]^+$ (计算值: 199.16926), 推断化合物的分子式为 $C_{12}H_{22}O_2$, 不饱和度为 2. ^{13}C NMR 显示 6 个碳信号, 说明 **3** 为对称结构, 根据对称结构的特点, 我们以其结构的一半为例进行讨论, NMR 的数据显示该化合物有 1 个乙烯基 [δ_H 5.91 (dd, $J=10.8, 17.4$ Hz), 5.21 (dd, $J=1.8, 17.4$ Hz), 5.04 (dd, $J=1.8, 10.8$ Hz); δ_C 146.2 (d), 112.4 (t)], 1 个甲基信号 [δ_H 1.25 (s); δ_C 27.8 (q)], 1 个连氧季碳 [δ_C 73.8 (s)] 以及两个亚甲基信号 [δ_H 2.18 (m), 1.59 (m); δ_C 24.5 (t), 42.3 (t)], 由 1H - 1H COSY 和 HSQC 推测存在 CH_2CH_2 结构片段. 结合 HMBC 谱(图 2)显示的信息, H-1 (δ_H 5.21, 5.04), H-2 (δ_H 5.91), H₃-11 (δ_H 1.25) 和 H₂-4 (δ_H 1.59) 分别与 C-3 (δ_C 73.8) 相关, 说明甲基, 乙烯基和 CH_2CH_2 分别与季碳原子 C-3 相连, 由于 C-3 的化学位移在低场, 结合分子式, C-3 位必然连接 1 个羟

基。综上所述, 该化合物的平面结构如图 1 所示。由于该化合物具有光学活性, 进一步推测化合物 **3** 为苏式-3,8-二甲基癸烷-1,9-二烯-3,8-二醇, 命名为 hyperalcohol。其余已知化合物的结构, 通过与文献的 NMR 数据对照, 分别鉴定为 isocudranixanthone A (**4**)^[11], isocudranixanthone B (**5**)^[11], 2-deprenyl-rheedia-xanthone B (**6**)^[12], 5-O-methyl-2-deprenylrheediaxanthone B (**7**)^[12], 6-脱氧异巴西红厚壳素(**8**)^[13], 异巴西红厚壳素(**9**)^[12], hyperireflexin (**10**)^[14], 4-羟基咕吨酮(**11**)^[15], 3-乙氧基-4-羟基苯甲酸(**12**)^[16], 1-[5,7-dihydroxy-2-methyl-2-(4-methylpent-3-enyl)chroman-8-yl]-2-methylpropan-1-one (**13**)^[17], empetrikarinol (**14**)^[17], 3-geranyl-1-(2'-methanpropanoyl)phloroglucinol (**15**)^[18], (4*S*,5*S*)-5-(4'-methyl-3'-pentenyl)-4-hydroxy-5-methyldihydrofuran-2-one (**16**)^[19], (4*S*,5*R*)-5-(4'-methyl-3'-pentenyl)-4-hydroxy-5-methyldihydrofuran-2-one (**17**)^[19], 3-羟基- β -紫罗兰酮(**18**)(图 3)^[20]。

1.2 化合物的生物活性

以脂多糖(LPS)诱导体外培养的小鼠巨噬细胞株 RAW264.7 为体外炎症模型, 通过 Griess 法检测细胞培养上清液中一氧化氮(NO)量, 测试了化合物 **1~17** 的抗炎活性。结果表明, hyperiflavone (**2**)、isocudranixanthone B (**5**)和 2-deprenylrheediaxanthone B (**6**)表现出对

NO 分泌的抑制活性, 其 IC₅₀ 分别为 12.90, 16.24 和 9.86 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

表 1 化合物 **1~17** 对 LPS 诱导的 RAW264.7 细胞产生 NO 的抑制作用

Table 1 Inhibitory effects of compounds **1~17** against LPS-induced NO production in RAW264.7 cells

Compd.	IC ₅₀ /($\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	Cell viability ^a /%
1	>20	88.14
2	12.90	85.90
3	>20	95.77
4	>20	66.08
5	16.24	86.15
6	9.86	89.75
7	>20	112.54
8	>20	90.15
9	>20	93.90
10	>20	90.58
11	>20	83.45
12	>20	90.80
13	>20	98.75
14	>20	89.75
15	>20	97.38
16	>20	102.81
17	>20	101.61
地塞米松	9.58	96.35

^a $c=20 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。

图 2 化合物 **1~3** 的关键 HMBC 与 ^1H - ^1H COSY 相关
Figure 2 Key HMBC and ^1H - ^1H COSY correlations of compounds **1~3**

图 3 化合物 **4~18** 结构式
Figure 3 Structures of compounds **4~18**

2 结论

利用各种现代分离技术,从小连翘乙醇提取物中分离得到 18 个化合物,其中以吡喃酮和间苯三酚类成分为其主要的结构类型,三个新化合物分别属于 α -吡喃酮、黄酮醇和脂肪醇类化合物,化合物 hyperiflavone (2)、isocudranianthone B (5) 和 2-deprenylrheediaanthone B (6) 表现出一定的抗炎活性,说明该植物发挥抗炎活性的物质基础可能是黄酮类化合物,为后续开发该药用植物提供科学依据。

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

核磁共振仪(BrukerAM-600 型);质谱仪(Thermo/Q Exactive 型);高效液相色谱仪(Ultimate 3000 HPLC 系统);半制备型色谱柱(YMC-Pack ODS-A (250 mm $\times$ 10 mm, 5 μ m));薄层色谱硅胶(青岛海洋化工厂产品);RP-18 反相硅胶(日本 YMC 公司, 50 μ m);电子天平(JA2103 型,上海明桥精密科学仪器有限公司);X-4 数字显示显微熔点测定仪(北京泰克仪器有限公司);净化工作台(SW-CJ-2FD 型苏州博莱尔净化设备有限公司);二氧化碳培养箱(MCO-5AC 型日本三洋公司);全波长酶标仪(Multiskan GO 型美国 Thermo Fisher 公司);倒置显微镜(E200 型日本 Nikon 公司)。石油醚、乙酸乙酯、正丁醇、乙醇、甲醇(分析纯),国药集团;甲醇(色谱级),Sigma 公司;乙腈(色谱级),中国昌泰兴业有限公司;LPS、地塞米松、二甲亚砜,美国 sigma 公司;高糖 DMEM 培养基、青霉素-链霉素溶液,美国 GE 公司;胰酶(质量分数为 0.25%),胎牛血清,美国 Gibco 公司;一氧化氮检测试剂盒、CCK-8 试剂盒,上海碧云天生物技术有限公司。

3.2 植物材料

小连翘 2016 年 7 月采于湖北宣恩七姊妹山国家级自然保护区(N 30°02'07.51"; E 109°43'42.77"),经中南民族大学生命科学学院刘虹副教授鉴定为藤黄科金丝桃属植物小连翘(*Hypericum erectum* Thunb),植物标本现保存于中南民族大学生命科学学院标本室,编号为 20160709。

3.3 提取与分离

取小连翘地上部分 3.0 kg,粉碎后用体积分数为 95%乙醇冷浸提取,减压浓缩提取液,得乙醇提取物 410 g,将乙醇提取物溶于水后,然后用氯仿萃取三次,减压浓缩,得氯仿提取物。将得到的氯仿提取物(147.9 g)进行正相硅胶柱层析,用石油醚-乙酸乙酯(体积比 19:1, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 1:1, 3:7, 2:8, 0:1)

梯度洗脱,薄层色谱(TLC)检测合并,得到 13 个组分(记作 Fr.A~Fr.M),将 Fr.F (8.18 g)进行反相硅胶色谱柱层析,依次用甲醇-水(体积比 3:7, 1:1, 7:3, 8:2, 1:0)梯度洗脱, TLC 检测合并,得到 12 个组分(Fr.F-1~Fr.F-12)。Fr.F-12 重结晶得到 8 (2.17 mg)。Fr.H (4.20 g)进行反相硅胶色谱柱层析,依次用水-甲醇(体积比 7:3, 1:1, 3:7, 2:8, 0:1)梯度洗脱, TLC 检测合并,得到 11 个组分(Fr.H-1~Fr.H-11), Fr.H-5 (31.3 mg)经 HPLC(甲醇-水体积比为 71:29)制备得到 11 (2.0 mg, t_R =12.4 min), Fr.H-9 (90.1 mg)经 HPLC(甲醇-水体积比为 75:25)制备得到化合物 5 (8.0 mg, t_R =26.0 min)和 7 (2.0 mg, t_R =33.0 min), Fr.H-11 (463.6 mg)经半制备 HPLC(乙腈-水体积比为 74:26, 检测波长 220 nm)得到化合物 13 (1.0 mg, t_R =12.1 min)、14 (2.7 mg, t_R =29.7 min)和 15 (4.7 mg, t_R =19.4 min)。Fr.I (4.54 g)进行反相硅胶色谱柱层析,依次用水-甲醇(体积比为 7:3, 1:1, 3:7, 2:8, 0:1)梯度洗脱, TLC 检测合并,得到 7 个组分(Fr.I-1~Fr.I-7), Fr.I-1 (50.0 mg)经 HPLC(甲醇-水体积比为 35:65, 检测波长 220 nm)得到化合物 3 (1.7 mg, t_R =50.4 min)和 12 (1.9 mg, t_R =33.7 min), Fr.I-3 (30.0 mg)经 HPLC(甲醇-水体积比为 49.5:50.5)得到化合物 18 (4.0 mg, t_R =19.1 min), Fr.I-4 (210.0 mg)经 HPLC(甲醇-水 50:50, 检测波长 220 nm)得到化合物 16 (9.0 mg, t_R =26.2 min)和 17 (24.1 mg, t_R =27.0 min), Fr.I-6 (230.0 mg)经 HPLC(甲醇-水体积比为 65:35)得到化合物 1 (8.7 mg, t_R =20.2 min)、4 (3.8 mg, t_R =26.4 min)和 10 (1.9 mg, t_R =19.4 min), Fr.I-7 (960.0 mg)经 HPLC(甲醇-水体积比为 79.5:20.5, 检测波长 220 nm)得到化合物 2 (14.1 mg, t_R =18.3 min)、6 (6.3 mg, t_R =12.8 min)和 9 (2.5 mg, t_R =13.5 min)。

Hyperipyone (1): 黄色粉末, m.p. 197~201 $^{\circ}$ C; $[\alpha]_D^{20}$ +226.42 (c 0.07, MeOH); UV (MeOH) λ [log ϵ /(L $\cdot$ mol $^{-1}$ $\cdot$ cm $^{-1}$)]: 235 (3.16), 290 (3.85), 350 (4.18) nm; ECD (c 2.7×10^{-3} mol $\cdot$ L $^{-1}$, MeOH) [[θ]/(deg $\cdot$ cm 2 $\cdot$ dmol $^{-1}$)]: 344 (+3.90), 257 (+4.24), 208 (+27.56) nm; 1 H NMR (600 MHz, CD $_3$ OD) δ : 4.61 (q, J =6.6 Hz, 1H, H-2), 6.67 (s, 1H, H-7), 7.73 (d, J =9.0 Hz, 2H, H-2',6'), 6.86 (d, J =9.0 Hz, 2H, H-3',5'), 1.40 (d, J =6.6 Hz, 3H, H $_3$ -8), 1.38 (s, 3H, H $_3$ -9), 1.20 (s, 3H, H $_3$ -10); 13 C NMR (150 MHz, CD $_3$ OD) δ : 93.8 (C-2), 43.8 (C-3), 109.1 (C-3a), 163.6 (C-4), 165.3 (C-6), 92.7 (C-7), 172.9 (C-7a), 14.9 (C-8), 25.9 (C-9), 20.6 (C-10), 123.9 (C-1'), 128.9 (C-2', 6'), 116.9 (C-3',5'), 162.0 (C-4'); HRESIMS calcd for C $_{16}$ H $_{17}$ O $_4$ [M+H] $^{+}$ 273.11214, found 273.11203。

Hyperiflavone (2): 黄色粉末, m.p. 210~212 $^{\circ}$ C;

UV (MeOH) λ [$\log \varepsilon/(\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1})$]: 210 (2.88), 255 (3.01), 345 (3.09) nm; ^1H NMR (600 MHz, $\text{C}_5\text{D}_5\text{N}$) δ : 6.52 (s, 1H, H-10), 1.45 (s, 6H, $2\times\text{CH}_3$), 5.66 (d, $J=10.2$ Hz, 1H, H-3), 6.92 (d, $J=10.2$ Hz, 1H, H-4), 3.89 (s, 3H, 7-OCH₃), 8.21 (d, $J=1.8$ Hz, 1H, H-2'), 7.38 (d, $J=8.4$ Hz, 1H, H-5'), 7.82 (d, $J=8.4$, 1.8 Hz, 1H, H-6'); ^{13}C NMR (150 MHz, $\text{C}_5\text{D}_5\text{N}$) δ : 157.2 (C-8), 139.2 (C-7), 179.5 (C-6), 156.8 (C-5), 105.8 (C-4a), 160.0 (C-10a), 95.6 (C-10), 156.8 (C-9a), 106.7 (C-6a), 78.6 (C-2), 28.6 (2-CH₃), 129.1 (C-3), 116.2 (C-4), 60.3 (7-OCH₃), 122.4 (C-1'), 117.2 (C-2',5'), 147.7 (C-3'), 151.4 (C-4'), 122.1 (C-6'); HRESIMS calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{19}\text{O}_7$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 383.11253, found 383.11295.

Hyperalcohol (3): 无色油状物. UV (MeOH) λ : 220 (3.43) nm; $[\alpha]_{\text{D}}^{20} -24.44$ (c 0.15, MeOH); ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ : 5.21 (dd, $J=1.8$, 17.4 Hz, 2H, H-1,10), 5.04 (dd, $J=1.8$, 10.8 Hz, 2H, H-1, 10), 5.91 (dd, $J=10.8$, 17.4 Hz, 2H, H-2,9), 1.56~1.64 (m, 2H, H-4,7), 2.12~2.25 (m, 2H, H-5,6), 1.25 (s, 3H, H₃-11,12); ^{13}C NMR (150 MHz, CD_3OD) δ : 112.4 (C-1,10), 146.2 (C-2,9), 73.8 (C-3,8), 42.3 (C-4,7), 24.5 (C-5,6), 27.8 (C-11,12); HRESIMS calcd for $\text{C}_{12}\text{H}_{23}\text{O}_2$ $[\text{M} + \text{H}]^+$ 199.16926, found 199.16939.

3.4 生物活性测试

以 LPS 诱导体外培养的小鼠巨噬细胞株 RAW264.7 为体外炎症模型, 采用 CCK-8 法对化合物进行体外细胞毒性测试. 采用 Griess 法检测细胞培养上清液中 NO 的含量, 计算抑制率. CCK-8^[21]法: 将处于对数生长期的 RAW264.7 巨噬细胞调整密度至 5×10^3 个/mL, 每孔 100 μL 接种于 96 孔板. 在 37 $^{\circ}\text{C}$, 体积分数为 5% CO_2 的培养条件下培养过夜后, 吸出 96 孔中的培养液, 然后每孔加入 200 μL 含有不同浓度梯度化合物(20, 10, 5, 2.5, 1.25 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)的培养液, 设置空白孔和对照孔. 24 h 后, 吸出培养液, 加入含体积分数为 10% 的 CCK-8 溶液的培养液 100 μL . 37 $^{\circ}\text{C}$ 孵育 1 h, 在 450 nm 波长下检测吸光度, 计算细胞存活率. 细胞存活率大于 80% 展开抗炎活性研究. Griess^[22]法: 将 RAW264.7 细胞按照上述实验的条件接种于 96 孔板中. 12 h 后吸出培养液, 加入 1 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ LPS 以及不同浓度的单体化合物共同作用, 单独加入 LPS 的为模型组. 37 $^{\circ}\text{C}$, 体积分数为 5% CO_2 孵育 24 h. 吸取 50 μL 的细胞培养上清液, 与反应试剂混合, 用酶标仪检测 540 nm 处的吸光度, 空白对照组为等量 DMEM 培养液. 通过标准曲线将吸光度换算成浓度, 计算 NO 抑制率, 抑制率大于 50% 视为有活性,

用 graphpad prism 5.0 计算 IC_{50} , 选择地塞米松为阳性药.

辅助材料(Supporting Information) 化合物 1~3 的 ^1H NMR, ^{13}C NMR, HSQC, HMBC, ^1H - ^1H COSY 谱和 HR-ESIMS 谱图. 这些材料可以免费从本刊网站 (<http://sioc-journal.cn/>) 上下载.

References

- [1] Pan, Y.-H.; Cuo, B.-L. *J. Chin. Med. Mater.* **1993**, *16*, 14 (in Chinese). (潘映红, 郭宝林, 中药材, **1993**, *16*, 14.)
- [2] Duan, J.-Y.; Ruan, J.-L. *Chin. Tradit. Herb. Drugs* **2005**, *36*, 1461 (in Chinese). (段静雨, 阮金兰, 中草药, **2005**, *36*, 1461.)
- [3] Bridi, H.; Meirelles, G. D. C.; Poser, G. L. V. *Phytochemistry* **2018**, *155*, 203.
- [4] Matsuoka, E.; Machida, K.; Kikuchi, M. *J. Nat. Med.* **2008**, *62*, 467.
- [5] An, R. B.; Jeong, G. S.; Beom, J. S.; Sohn, D. H.; Kim, Y. C. *Arch. Pharm. Res.* **2009**, *32*, 1933.
- [6] Moon, H. I.; Lee, Y. C.; Lee, J. H. *Phytother. Res.* **2011**, *25*, 1389.
- [7] Moon, H. I. *Phytother. Res.* **2010**, *24*, 941.
- [8] Xu, X.-S.; Teng, H.-D.; Fu, Y.-Z.; Li, Q.-Q.; Li, J.; Yang, G.-Z. *Chin. Tradit. Herb. Drugs* **2019**, *50*, 798 (in Chinese). (徐晓诗, 滕海达, 符元泽, 李庆庆, 李峻, 杨光忠, 中草药, **2019**, *50*, 798.)
- [9] Hu, L. Z.; Wang, Z. Z.; Zhang, J. W.; Lu, Y. Y.; Wang, K. P.; Xue, Y. B.; Zhang, Y.; Zhang, Y. H. *Molecules* **2016**, *21*, 515.
- [10] Lôbo, L. T.; Silva, G. A. D.; Ferreira, M.; Silva, M. N. D.; Santos, A. S.; Arruda, A. C.; Guilhon, G. M. S. P.; Santos, L. S.; Borges, R. D. S.; Arruda, M. S. P. *J. Braz. Chem. Soc.* **2009**, *20*, 1082.
- [11] Kobayashi, M.; Mahmud, T.; Yoshioka, N.; Shibuya, H.; Kitagawa, I. *Chem. Pharm. Bull.* **1997**, *45*, 1615.
- [12] Rath, G.; Potterat, O.; Mavi, S.; Hostettmann, K. *Phytochemistry* **1996**, *43*, 513.
- [13] Zhou, G. S.; Yang, X. J.; Jiang, Y.; Tu, P. F. *J. Chin. Pharm. Sci.* **2013**, *22*, 286.
- [14] Cardona, M. L.; Fernandez, I.; Pedro, J. R.; Serrano, A. *Phytochemistry* **1990**, *29*, 3003.
- [15] Fernandes, E. G. R.; Silva, A. M. S.; Cavaleiro, J. A. S.; Silva, F. M.; Borges, M. F. M.; Pinto, M. M. M. *Magn. Reson. Chem.* **1998**, *36*, 305.
- [16] Rong, G.-Q.; Geng, C.-A.; Ma, Y.-B.; Huang, X.-Y.; Wang, H.-L.; Zhao, Y.; Zhang, X.-M.; Chen, J.-J. *China J. Chin. Mater. Med.* **2014**, *39*, 1845 (in Chinese). (荣光庆, 耿长安, 马云保, 黄晓燕, 王洪玲, 赵勇, 张雪梅, 陈纪军, 中国中药杂志, **2014**, *39*, 1845.)
- [17] Schmidt, S.; Jürgenliemk, G.; Schmidt, T. J.; Skaltsa, H.; Heilmann, J. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 1697.
- [18] Schmidt, S.; Jürgenliemk, G.; Skaltsa, H.; Heilmann, J. *Phytochemistry* **2012**, *77*, 218.
- [19] Viturro, C. I.; Maier, M. S.; Stortz, C. A.; Fuente, J. R. D. L. *Tetrahedron: Asymmetry* **2001**, *12*, 991.
- [20] DellaGreca, M.; Marino, C. D.; Zarrelli, A.; D'Ambrosia, B. *J. Nat. Prod.* **2004**, *67*, 1492.
- [21] Xiong, J.-W.; Xiao, H.; Zhang, Z.-X. *Acta Laser Biol. Sin.* **2007**, *16*, 559 (in Chinese). (熊建文, 肖华, 张镇西, 激光生物学报, **2007**, *16*, 559.)
- [22] Fang, Z. J.; Zhang, T.; Chen, S. X.; Wang, Y. L.; Zhou, C. X.; Mo, J. X.; Wu, Y. J.; Xu, Y. K.; Lin, L. G.; Gan, L. S. *Phytochemistry* **2019**, *160*, 1.

(Zhao, C.)