基于咔唑的单-/双-硫代碳酰肼衍生物的合成及 Cdc25B/PTP1B 抑制活性评价

李英俊^{*,a} 杨凯栋^a 靳焜^b 高立信^c 盛丽^c
刘雪洁^a 杨鸿境^a 林乐弟^a 李佳^{*,c}

(^a 辽宁师范大学化学化工学院 辽宁大连 116029)

(^b 大连理工大学精细化工国家重点实验室 辽宁大连 116012)

(^c 中国科学院上海药物研究所 国家新药筛选中心 药物研究国家重点实验室 上海 201203)

摘要 合成了一系列新型的基于咔唑的单-/双-硫代碳酰肼衍生物. 利用 IR、¹H NMR、¹³C NMR 和元素分析对其进行结构表征. 评价了目标化合物对 Cdc25B 和 PTP1B 的抑制活性, 讨论了其结构与活性的关系. 实验结果显示, 大部分目标化合物对 Cdc25B 和 PTP1B 表现出良好的抑制活性. 其中, 1,5-双[(9-戊基-3-咔唑基)亚甲基]硫代碳酰肼(**4d**)对 Cdc25B 的抑制活性最高, IC₅₀ 为(0.23±0.02) μg/mL. 1,5-双[(9-乙基-3-咔唑基)亚甲基]硫代碳酰肼(**4a**)对 PTP1B 的抑制活性最高, IC₅₀ 为(1.00±0.16) μg/mL. 对目标化合物 **4a** 和 **4d** 进行分子对接研究和密度泛函理论(DFT)计算, 结果表明, 目标化合物 **4d** 和 **4a** 分别进入到了 Cdc25B 和 PTP1B 酶的活性位点区域, 有活性作用的主要是硫代碳酰肼和咔唑基团.
关键词 硫代碳酰肼; 咔唑; 合成; Cdc25B 和 PTP1B 抑制剂; 分子对接; DFT 计算

Synthesis and Cdc25B/PTP1B Inhibitory Activity Evaluation of Novel Carbazole-Based Mono-/Bis-thiocarbohydrazone Derivatives

Li, Yingjun^{*,a} Yang, Kaidong^a Jin, Kun^b Gao, Lixin^c Sheng, Li^c
Liu, Xuejie^a Yang, Hongjing^a Lin, Ledi^a Li, Jia^{*,c}

(^a College of Chemistry and Chemical Engineering, Liaoning Normal University, Dalian, Liaoning 116029)

(^b State Key Laboratory of Fine Chemicals, Dalian University of Technology, Dalian, Liaoning 116012)

(^c National Center for Drug Screening, State Key Laboratory of Drug Research, Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201203)

Abstract A series of novel carbazole-based mono-/bis-thiocarbohydrazone derivatives were synthesized. Their structures were characterized by IR, ¹H NMR, ¹³C NMR spectra and elemental analysis. The inhibitory activities of the target compounds against Cdc25B/PTP1B were evaluated, and the relationship between structure and activity was discussed. The results showed that most of the target compounds had good inhibitory activity against Cdc25B and PTP1B. Among them, 1,5-bis[(9-pentyl-3-carbazolyl)methylene]thiocarbohydrazone (**4d**) had the highest inhibitory activity against Cdc25B with IC₅₀ = (0.23±0.02) μg/mL, and 1,5-bis[(9-ethyl-3-carbazolyl)methylene]thiocarbohydrazone (**4a**) had the highest inhibitory activity against PTP1B with IC₅₀ = (1.00±0.16) μg/mL. Molecular docking and density functional theory (DFT) calculations of the target compounds **4a** and **4d** were performed. Molecular docking results indicated that the target compounds **4d** and **4a** entered the active sites of Cdc25B and PTP1B enzymes, respectively, and thiocarbohydrazone and carbazole groups play the important role of activity.

Keywords thiocarbohydrazone; carbazole; synthesis; Cdc25B and PTP1B inhibitor; molecular docking; DFT calculations

硫代碳酰肼(TCHs)是一类具有[C=NNHC(=S)- NHNH₂]骨架的药效团, 该骨架是构建各种生物活性杂

* Corresponding authors. E-mail: chemlab.lnnu@163.com; jli@simm.ac.cn

Received May 21, 2019; revised August 2, 2019; published online September 12, 2019.

Project supported by the Natural Science Foundation of Liaoning Province (No. 20102126).

辽宁省自然科学基金(No. 20102126)资助项目.

环化合物的结构单元^[1,2]。近年来的研究表明,硫代碳酰肼衍生物具有抗癌^[3~7]、抗糖尿病^[8]、抗病毒^[4]、抗菌^[9~13]和抗氧化^[9]等多种生物活性,因而引起了人们的关注。

大量研究显示,咔唑(Cz)及其衍生物具有抗癌^[14~16]、抗糖尿病^[17]、抗血栓^[18,19]、抗 HIV^[20]、抗炎^[21]、抗结核^[22]、抗菌^[23,24]、抗焦虑^[25]、抗惊厥^[26]、杀虫^[27]等生物活性,已成为研究热点。

癌症是导致世界上数百万人发病和死亡的主要原因之一。2017 年,我国最新癌症数据统计结果显示,全国每分钟大约有 7 人被确诊为癌症,全年新增癌症病例为 368 万,占同年世界新发癌症病例数的 1/4^[28]。糖尿病是一种以高血糖为主要特征的慢性疾病,有许多严重的并发症。2-型糖尿病更为常见,约占全世界糖尿病病例总数的 90%^[29],目前世界上有 4.22 亿患者,预计到 2035 年将增加到 5.9 亿以上^[30]。因此,开发新型抗癌和抗糖尿病药物十分必要。

蛋白酪氨酸磷酸酶(PTPs)是一个大家族的酶,它通过催化从酪氨酸残基中除去磷酸基团,在哺乳动物和其它生物体中广泛表达。在 PTPs 家族中,细胞分裂周期为 25 磷酸酶(Cdc25A、Cdc25B 和 Cdc25C 亚型),是人体细胞中细胞周期的中枢调节剂,驱动和调整细胞周期进展。这些酶的表达和活性在生理条件下受到严格调控^[31]。大量研究证明,Cdc25B 在人类多种癌症中是过度表达的,Cdc25B 已成为一个重要癌症治疗靶点^[32,33]。虽然近年来开发了一些 Cdc25B 抑制剂^[34,35],其中一些被证明是有效的,但由于生物毒性问题,这些化合物均未被进一步开发^[31]。因此迫切需要开发各种类别的新型、有效的 Cdc25B 抑制剂,以进一步开发抗癌剂。

蛋白酪氨酸磷酸酶 1B (PTP1B)是 PTPs 家族中的一员,是胰岛素和瘦素信号通路的负调节因子,参与胰岛

素受体、胰岛素受体底物(IRS-1 和 IRS-2)和瘦素受体的去磷酸化^[36]。PTP1B 是 2 型糖尿病和肥胖的有效治疗靶点^[37,38]。虽然已经通过高通量筛选和基于结构和片段的药物设计鉴定了多种有效的 PTP1B 抑制剂,然而,临床相关的 PTP1B 抑制剂的开发仍然存在问题,通常表现出差的选择性和不利的药代动力学^[36]。因此,开发高效、毒副作用小的 PTP1B 抑制剂,以便进一步开发 2 型糖尿病和肥胖的治疗药物。

基于上述事实,为了寻找在抗癌和抗糖尿病方面具有潜在应用价值的高选择性、高活性和低毒性的新型 Cdc25B 和 PTP1B 抑制剂,在前期研究工作基础上^[39~41],我们根据活性子叠加原理,将咔唑与 1,3-二氨基硫脲基团杂交形成基于咔唑的单-/双-硫代碳酰肼衍生物,并评价目标化合物对 Cdc25B 和 PTP1B 的抑制活性。目标化合物的设计思想如图 1 所示,合成路线见 Scheme 1。

1 结果与讨论

1.1 目标化合物的合成

以咔唑和正溴代烷烃为原料,经 *N*-烷基化和甲酰化合成出了中间体 9-烷基咔唑(**1**)和 9-烷基咔唑-3-甲醛(**2**)。1,3-二氨基硫脲与适量的 **2** 进行缩合反应,得到了目标化合物 **3** 和 **4** (Scheme 1)。

1.2 目标化合物 3 和 4 的结构确定

1.2.1 IR 谱

由目标化合物 **3** 的 IR 数据可知,在 3391~3398, 3283~3294, 3207~3245 和 3136~3186 cm^{-1} 处出现的峰为 N—H 的伸缩振动吸收峰;在 3048~3051 cm^{-1} 处出现的峰为不饱和 C—H 的伸缩振动吸收峰;在 2850~2895 和 2954~2975 cm^{-1} 处出现的峰为饱和 C—H 的伸缩振动吸收峰;在 1626~1672 cm^{-1} 处出现的强峰为

图 1 目标化合物 **3** 和 **4** 的设计思想
Figure 1 Design strategy of target compounds **3** and **4**

图式 1 目标化合物 3 和 4 的合成路线

Scheme 1 Synthetic routes of target compounds 3 and 4

C=N 的伸缩振动吸收峰; 在 1600, 1500, 1470 cm⁻¹ 左右出现的强峰为苯环骨架伸缩振动吸收峰; 在 1528 ~ 1542 cm⁻¹ 处出现的宽的强峰为 N—H 的弯曲振动吸收峰; 在 1272 cm⁻¹ 处出现的中等强度的吸收峰为 C—N 伸缩振动吸收峰; 在 1235 ~ 1249 cm⁻¹ 处出现的强峰为 C=S 的伸缩振动吸收峰。

由目标化合物 4 的 IR 数据可知, 在 3246 ~ 3289 和 3131 ~ 3188 cm⁻¹ 处出现的峰为 N—H 的伸缩振动吸收峰; 在 3046 ~ 3050 cm⁻¹ 处出现的峰为不饱和 C—H 的伸缩振动吸收峰; 在 2853 ~ 2868 和 2923 ~ 2973 cm⁻¹ 处出现的峰为饱和 C—H 的伸缩振动吸收峰; 在 1626 ~ 1670 cm⁻¹ 处出现的峰为 C=N 的伸缩振动吸收峰; 在 1600, 1490, 1470 cm⁻¹ 左右出现的强峰为苯环骨架伸缩振动吸收峰; 在 1529 ~ 1536 cm⁻¹ 处出现的宽强峰为 N—H 的弯曲振动吸收峰; 在 1213 ~ 1271 cm⁻¹ 处出现的强峰为 C—N 伸缩振动吸收峰; 在 1235 ~ 1246 cm⁻¹ 处出现的强峰为 C=S 伸缩振动吸收峰。

N—H, C=N, C=S 伸缩振动吸收峰以及 N—H 弯曲振动吸收峰的出现, 原料醛的 C=O 伸缩振动吸收峰的消失, 初步证明目标化合物 3 和 4 的结构正确。

1.2.2 ¹H NMR 谱

目标化合物 3 可能存在链状和环状(A 和 B)两种构型(Scheme 2), 观察目标化合物 3 的 ¹H NMR 谱可知, H_c 和 H_d 的化学位移值相同, 所以, 目标化合物 3 是以链状(A 构型)异构体存在。这一结果与文献[42]报道的一致。

由目标化合物 3 的 ¹H NMR 谱可知, 在低场 δ

图式 2 目标化合物 3 的结构确定

Scheme 2 Structural determination of target compound 3

11.41 ~ 11.43 出现的单峰为 NH_a 的质子吸收峰; 在 δ 9.75 ~ 9.77 出现的单峰为 NH_b 的质子吸收峰; 在 δ 8.62 ~ 8.63 出现的单峰为 CH=N 的质子吸收峰; 在 δ 7.24 ~ 8.21 出现的峰为咪唑环上的质子吸收峰, 在 δ 4.89 ~ 4.90 出现的单峰为 NH₂ 的质子吸收峰; 在 δ 0.79 ~ 4.46 出现的峰为咪唑环上烷基链的质子吸收峰。证明目标化合物 3 结构正确。

根据文献[43, 44]可知, 双-硫代碳酰肼衍生物是以对称结构形式存在的, 即 Scheme 3 中的结构 A, 两个 N—H 化学位移一致。观察目标化合物 4 的 ¹H NMR 谱发现, 出现的峰组数大于理论值, 两个 N—H、CH=N 以及咪唑环上的质子出峰数目增多, 这说明目标化合物 4 的结构是不对称的。根据文献[45, 46]可知, 在双-硫代碳酰肼类化合物中, 关于亚胺键(C=N)是以 E 几何异构体形式存在的。因此, 目标化合物 4 是以 E 几何异构体形式存在的, 但由于 N—C(S) 键的旋转, 导致两个 N—H 相对于 C=S 双键不在同一侧(Scheme 3 中的结构 B), 其中 NH_a 中的 H_a 因形成了分子内氢键, 使得 NH_a 较 NH_b

图式 3 目标化合物 4 的结构确定

Scheme 3 Structural determination of target compound 4

在低场出峰. 由于分子内氢键的形成, 使得 $\text{CH}=\text{N}$ 以及咪唑环上质子的出峰数目增加.

为了进一步确定化合物 4 的构型, 即两个咪唑环的取向, 选择化合物 4a 做 2D NOESY 实验. 由 2D NOESY 谱可知, NH_a 与 $\text{H}_{b'}$ ($\text{CH}=\text{N}$), $\text{H}_{b'}$ 与 $\text{H}-4'$, NH_b 与 $\text{H}-4$ 存在着相关峰. 由此可以得出, 目标化合物 4 的结构如 Scheme 3 中结构 B 所示. 在化合物 4 的 ^1H NMR 谱中未观察到 $\text{H}-2$ 与 $\text{H}-2'$, $\text{H}-5$ 与 $\text{H}-5'$, $\text{H}-6$ 与 $\text{H}-6'$, $\text{H}-7$ 与 $\text{H}-7'$ 以及 $\text{H}-8$ 与 $\text{H}-8'$ 的差别, 说明它们的核外电子云密度相同.

对目标化合物 4 的 ^1H NMR 谱的信号峰进行了归属. 在 δ 11.76~11.83 和 11.54~11.57 出现的两个宽单峰分别为 NH_a 和 NH_b 的质子吸收峰; 在 δ 8.82~8.84 和 8.66~8.69 出现的两个宽单峰分别为 $\text{CH}=\text{N}(\text{H}_b)$ 和 $\text{CH}=\text{N}(\text{H}_b')$ 的质子吸收峰; 在 δ 8.47~8.48 和 8.34~8.36 出现的两个宽单峰分别为咪唑(Cz)环上的 $\text{Cz}-\text{H}_4$ 和 $\text{Cz}-\text{H}_4'$ 质子吸收峰; 在 δ 8.25~8.26 出现的双峰为 $\text{Cz}-\text{H}_2$ 的质子吸收峰; 在 δ 8.00~8.07 和 7.97~8.00 出现的两个宽单峰分别为 $\text{Cz}-\text{H}_1$ 和 $\text{Cz}-\text{H}_1'$ 质子吸收峰; 在 δ 7.70~7.73 出现的双峰为 $\text{Cz}-\text{H}_5$ 的质子吸收峰; 在 δ 7.64~7.67 出现的双峰为 $\text{Cz}-\text{H}_8$ 的质子吸收峰; 在 δ 7.50~7.51 出现的三重峰为 $\text{Cz}-\text{H}_7$ 的质子吸收峰; 在 δ 7.27~7.28 出现的三重峰为 $\text{Cz}-\text{H}_6$ 的质子吸收峰; 在 δ 0.81~4.50 出现的峰为咪唑环上烷基链的质子吸收峰. 证明目标化合物 4 的结构正确.

1.2.3 ^{13}C NMR 谱

由目标化合物 3 的 ^{13}C NMR 谱可知, 在低场 δ_{C} 176.43~177.93 出现的峰为 $\text{C}=\text{S}$ 的碳吸收峰; 在次低场 δ_{C} 143.93~145.53 出现的峰为 $\text{CH}=\text{N}$ 的碳吸收峰; 在 δ_{C} 109.97~142.91 处出现的峰为咪唑环上的碳吸收峰; 在 δ_{C} 11.81~44.29 之间出现的峰为咪唑环上烷基链的碳吸收峰.

观察目标化合物 4 的 ^{13}C NMR 谱发现, 碳的信号峰数目小于理论值, 且还出现一些弱的宽单峰或弱的宽包

峰, 这是由于 N 原子的四极矩用所致, 弛豫时间增大, 峰变宽或消失. 由目标化合物 4 的 ^{13}C NMR 谱可知, 在低场 δ_{C} 173.95~175.91 出现的峰为 $\text{C}=\text{S}$ 的碳吸收峰; 在 δ_{C} 141.23~151.79 和 140.57~146.72 出现的弱的宽单峰分别为 $\text{CH}=\text{N}$ 和 $\text{CH}=\text{N}$ 的碳吸收峰; 在 δ_{C} 109.70~143.07 出现的峰为咪唑环上的碳吸收峰, 在此区间, 在 δ_{C} 124.15~127.81 和 119.81~123.01 出现两个弱的宽包峰; 在 δ_{C} 11.32~44.33 出现的峰为咪唑环上烷基链的碳吸收峰.

根据上述 IR、 ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 数据分析可知, 目标化合物 3 和 4 已成功合成出来, 结构正确.

1.3 目标化合物 3 和 4 的生物活性研究

通过改变咪唑环中 N 原子上烷基链的长度以及咪唑环的数目, 合成了一系列基于咪唑的单-/双-硫代碳酰肼衍生物 3 和 4, 以便评价其对 Cdc25B/PTP1B 的抑制活性以及构效关系. 目标化合物 3 和 4 对 Cdc25B 和 PTP1B 抑制活性的筛选结果见表 1.

由表 1 的实验结果可知, 在所测试的目标化合物 3 和 4 中, 除了 3a、3d 和 3e 外, 均对 Cdc25B 具有较高的抑制活性, 抑制率为 79.87%~99.46%, 其中化合物 4d 对 Cdc25B 的抑制活性最高, IC_{50} 值为 (0.23 ± 0.02) $\mu\text{g/mL}$. 所测试的目标化合物均对 PTP1B 具有较高的抑制活性, 抑制率为 53.09%~93.33%, 其中化合物 4a 对 PTP1B 的抑制活性最高, $\text{IC}_{50} = (1.00 \pm 0.16)$ $\mu\text{g/mL}$. 化合物 4a 和 4g 的活性 [$\text{IC}_{50} = (1.02 \pm 0.11)$ $\mu\text{g/mL}$] 均高于阳性对照药物齐墩果酸 [$\text{IC}_{50} = (1.13 \pm 0.07)$ $\mu\text{g/mL}$], 化合物 4d 的活性 [$\text{IC}_{50} = (1.26 \pm 0.02)$ $\mu\text{g/mL}$] 与阳性对照药物相当. 值得注意的是, 化合物 3c、3f、3g、4a 及 4c~4g 对 Cdc25B 和 PTP1B 均具有较高的抑制活性, 其中化合物 4d 的活性最高.

研究结构与活性的关系发现, 咪唑环中 N 原子上烷基链的长度对 Cdc25B 抑制活性有影响. 在单-硫代碳酰肼衍生物 3a~3g 中, 长链化合物的活性高于短链的活性(3g 和 3f). 而在双-硫代碳酰肼衍生物 4a~4g 中, 中等长度链的化合物活性较高(4d 和 4e).

另外还发现目标化合物中咪唑环的数目影响 PTP1B 的抑制活性. 双咪唑-硫代碳酰肼衍生物 4 的活性高于单咪唑-硫代碳酰肼衍生物 3. 咪唑环中 N 原子上烷基链的长度也影响 PTP1B 的抑制活性. 在化合物 3a~3g 中, 短链化合物的活性(3a)高于长链化合物的活性(3b~3g). 在化合物 4a~4g 中, 具有短链和长链的化合物活性较高(4a, 4d).

上述结构与活性关系的初步研究结果将为此类化合物的结构修饰提供参考依据. 由文献调查可知, 基于咪唑的单-/双-硫代碳酰肼衍生物的合成及对 Cdc25B/

表 1 目标化合物 3 和 4 对 Cdc25B 和 PTP1B 的抑制活性
Table 1 Inhibitory activities of target compounds 3 and 4 against Cdc25B and PTP1B

Compd.	R	Cdc25B ^a		PTP1B ^b	
		Inhibition/% at 20 $\mu\text{g/mL}$	IC ₅₀ /($\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)	Inhibition/% at 20 $\mu\text{g/mL}$	IC ₅₀ /($\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)
3a	C ₂ H ₅	33.41 $\pm$ 2.72	— ^c	82.52 $\pm$ 8.84	3.09 $\pm$ 0.03
3b	<i>n</i> -C ₃ H ₇	ND ^d	ND	ND	ND
3c	<i>n</i> -C ₄ H ₉	79.87 $\pm$ 2.04	0.78 $\pm$ 0.13	92.62 $\pm$ 2.79	3.48 $\pm$ 0.21
3d	<i>n</i> -C ₅ H ₁₁	14.86 $\pm$ 9.81	—	53.09 $\pm$ 5.47	7.22 $\pm$ 1.41
3e	<i>n</i> -C ₆ H ₁₃	17.81 $\pm$ 2.27	—	75.49 $\pm$ 3.45	4.25 $\pm$ 0.38
3f	<i>n</i> -C ₇ H ₁₅	94.58 $\pm$ 0.61	1.46 $\pm$ 0.16	90.54 $\pm$ 0.12	5.75 $\pm$ 0.26
3g	<i>n</i> -C ₈ H ₁₇	99.46 $\pm$ 0.12	0.63 $\pm$ 0.04	93.05 $\pm$ 0.97	4.23 $\pm$ 0.77
4a	C ₂ H ₅	93.00 $\pm$ 1.18	1.91 $\pm$ 0.08	78.02 $\pm$ 0.50	1.00 $\pm$ 0.16
4b	<i>n</i> -C ₃ H ₇	ND	ND	ND	ND
4c	<i>n</i> -C ₄ H ₉	86.47 $\pm$ 2.54	2.13 $\pm$ 0.87	74.81 $\pm$ 5.90	1.58 $\pm$ 0.07
4d	<i>n</i> -C ₅ H ₁₁	96.97 $\pm$ 1.20	0.23 $\pm$ 0.02	90.87 $\pm$ 1.07	1.26 $\pm$ 0.02
4e	<i>n</i> -C ₆ H ₁₃	89.51 $\pm$ 3.56	0.26 $\pm$ 0.00	93.33 $\pm$ 1.89	1.52 $\pm$ 0.32
4f	<i>n</i> -C ₇ H ₁₅	95.45 $\pm$ 0.01	0.77 $\pm$ 0.05	82.29 $\pm$ 1.56	2.93 $\pm$ 0.16
4g	<i>n</i> -C ₈ H ₁₇	98.01 $\pm$ 0.09	0.64 $\pm$ 0.02	83.63 $\pm$ 3.41	1.02 $\pm$ 0.11

^a Positive control: Na₃VO₄, IC₅₀=(0.57 $\pm$ 0.11) $\mu\text{mol/L}$. ^b Positive control: oleanolic acid, IC₅₀=(1.13 $\pm$ 0.07) $\mu\text{g/mL}$. ^c—: Not calculated, because the inhibition rate is less than 50%. ^d·ND': Not tested.

PTP1B 抑制活性的研究目前尚未见文献报道。

1.4 理论计算

1.4.1 分子对接研究

为了研究目标化合物与 Cdc25B/PTP1B 酶的结合模式, 利用 Dockingserver 软件, 选择对 Cdc25B/PTP1B 抑制活性最好的目标化合物 4d 和 4a 进行了分子对接研究。目标化合物 4d 和 4a 与 Cdc25B (PDB ID: 1QB0) 和 PTP1B (PDB ID: 1NNY) 的分子对接结果见图 2, 3 和表 2, 3。

由图 2 和表 2 可以看出, 目标化合物 4d 以 U 型进入到了 Cdc25B 酶活性位点 II 的区域, 与 Cdc25B 酶形成稳定的复合物, 具有较高的结合能(−15.25 kJ/mol)。在 4d 中, 硫代碳酰脲基团的四个氮原子以及一个咪唑环中的氮原子分别与氨基酸残基 ASN422, ASP448 和 GLU433 形成了 5 个氢键, 其中 NHC(S)NH 骨架中的两个氮原子与氨基酸残基形成的氢键强度最大(0.269 和 0.292 nm)。此外, C=S 中的碳原子、咪唑环及其烷基链的碳原子还存在着疏水作用; NHC(S)NH 骨架中的氢原子还存在着极性作用; 咪唑环还存在着 π - π 作用(表 2)。由此可以看出, 起活性作用的主要是硫代碳酰脲和咪唑基团。

由图 3 和表 3 可以看出, 目标化合物 4a 以 U 型进入到了 PTP1B 酶活性位点中心部位, 与 PTP1B 酶形成稳定的复合物, 具有较高的结合能(−22.09 kJ/mol)。在 4a 中, 硫代碳酰脲基团中的 3 个氮原子和 1 个氢原子分别与氨基酸残基 LEU204, SER205, PRO206 形成了 5 个氢键, 其中 NHC(S)NH 骨架中的一个氮原子[N(1)]与氨基酸残基形成的氢键强度最大(0.253 nm)。此外, 咪唑环及希夫碱的碳原子还存在着疏水作用(表 3)。由此可以看出, 起活性作用的主要是硫代碳酰脲基团。

1.4.2 Mulliken 原子电荷分析

在分子电荷分布的量子理论计算中, Mulliken 原子电荷(MAC)起着至关重要的作用, 因为 MAC 可以直观提供与分子有关的电子性质^[47,48]。为了进一步阐明对 Cdc25B/PTP1B 具有最佳抑制活性的目标化合物 4d 和 4a 与靶蛋白酶的结合模式, 利用 Gaussian 09 软件, 在 HF/3-21G 基组上计算了 4d 和 4a 的 Mulliken 原子电荷(MAC)分布, 计算结果见图 4 和 5。

由图 4 可知, 4d 的负电荷主要集中在硫代碳酰脲基团中的 N(23)和 N(27)以及咪唑环的 N(51)和 N(58)上, 电荷分别为 N(23) −0.650e, N(27) −0.656e, N(51)

图2 化合物 4d 与 Cdc25B 酶的对接结果(A)及 4d 附近结合位点的关键残基(B)

Figure 2 Docking result of compound 4d with Cdc25B enzyme (A) and key residues in binding site surrounding 4d (B)

表2 目标化合物 4d 与 Cdc25B 的分子对接结果

Table 2 Molecular docking result of compound 4d with Cdc25B (PDB ID:1QB0)

Est. free energy of binding/ (kJ·mol ⁻¹)	No. of H-bond	H-bond		Hydrophobic		Polar		Pi—Pi	
		Bond	Length/nm	Bond	Length/nm	Bond	Length/nm	Bond	Length/nm
-15.27	5	N(5)—GLU433	0.316	C(30)—PRO429	0.385				
		N(1)—ASN422	0.269	C(31)—PRO429	0.353				
		N(4)—ASN422	0.326	C(32)—PRO429	0.378				
		N(2)—ASP448	0.292	C(16)—PRO429	0.332	H(2)—ASP448	0.220	C(8)—TYR432	0.341
		N(3)—ASP448	0.329	C(21)—PRO429	0.335			C(9)—TYR432	0.364
				C(1)—LEU443	0.384

图3 化合物 4a 与 PTP1B 酶的对接结果(A)及 4a 附近结合位点的关键残基(B)

Figure 3 Docking result of compound 4a with PTP1B enzyme (A) and key residues in binding site surrounding 4a (B)

表3 目标化合物 4a 与 PTP1B 的分子对接结果

Table 3 Molecular docking result of compound 4a with PTP1B (PDB ID:1NNY)

Est. free energy of binding/(kJ·mol ⁻¹)	No. of H-bond	H-bond		Hydrophobic	
		Bond	Length/nm	Bond	Length/nm
-22.09	5	N(2)—LEU204	0.272		
		N(1)—SER205	0.253	C(18)—PRO206	0.342
		N(1)—HIS208	0.299	C(2)—PRO206	0.375
		N(4)—HIS208	0.285	C(9)—PRO210	0.345
		H(2)—PRO206	0.338

Figure 4 Optimized structure and Mulliken charge distribution of compound **4d**

Figure 5 Optimized structure and Mulliken charge distribution of compound **4a**

-0.902e 和 N(58) -0.737e; 正电荷主要集中在硫代碳酸酐基团的 H(24)和 H(28)上, 电荷分别为 H(24) +0.335e 和 H(28) +0.435e, 它们均可能与氨基酸残基形成稳定的氢键, 这与实验观察结果(表 1)及分子对接结果(表 2)一致.

由图 5 可知, **4a** 的负电荷主要集中在硫代碳酰脲基

团中的 N(23)和上 N(27)以及咪唑环的 N(51)和 N(59)原子上, 电荷分别为 N(23) $-0.371e$, N(27) $-0.360e$, N(51) $-0.638e$ 和 N(59) $-0.638e$; 正电荷主要集中在硫代碳酰脲基团的 H(24)和 H(28)原子上, 电荷分别为 H(24) $+0.278e$ 和 H(28) $+0.277e$, 它们均可能与氨基酸残基形成稳定的氢键, 这与实验观察结果(表 1)和分

子对接结果(表 3)一致.

1.4.3 MEP 计算

分子静电势(MEP)图可体现化合物的亲核和亲电位置,从而确定化合物中氢键相互作用的优选位置^[49].在 MEP 图中,红色点区为正电性集中区域,蓝色点区为负电性集中区域^[50].利用 Multiwfn 软件,在 HF/3-21G 基组上计算了目标化合物 **4d** 和 **4a** 的 MEP.由图 6 和图 7 的计算结果可知,目标化合物 **4d** 和 **4a** 的静电势最大负值区域主要集中在 C=S 旁的氮原子附近,其值分别为 -2.41 和 -2.16 eV,这表明该区域优选与氢原子相互作用形成氢键.这一结果与分子对接(表 2, 3)、Mulliken 电荷(图 4, 5)计算结果以及实验结果(表 1)一致.

2 结论

合成了 14 个新型基于咪唑的单-/双-硫代碳酰脲衍

生物 **3a~3g** 和 **4a~4g**. 评价了其对 Cdc25B/PTP1B 的抑制活性,讨论了结构与活性的关系.实验结果表明,大部分目标化合物对 Cdc25B 和 PTP1B 表现出良好的抑制活性,其中化合物 **4d** 对 Cdc25B 的抑制活性最高, IC_{50} 为 (0.23 ± 0.02) $\mu\text{g/mL}$; 化合物 **4a** 对 PTP1B 的抑制活性最高, $IC_{50} = (1.00 \pm 0.16)$ $\mu\text{g/mL}$. 选择对 Cdc25B/PTP1B 抑制活性最高的目标化合物 **4d** 和 **4a** 进行分子对接研究及 DFT 计算.分子对接研究结果表明,目标化合物 **4d** 和 **4a** 分别进入到了 Cdc25B 和 PTP1B 酶的活性位点区域,通过与靶标蛋白酶的氢键、疏水和 π - π 等相互作用形成了稳定的复合物,起活性作用的主要是硫代碳酰脲和咪唑基团.设计合成的目标化合物是潜在的 Cdc25B/PTP1B 抑制剂,在抗糖尿病和抗癌方面具有潜在的应用价值.

图 6 **4d** 的分子静电势

Figure 6 Molecular electrostatic potential of compound **4d**

图 7 **4a** 的分子静电势

Figure 7 Molecular electrostatic potential of compound **4a**

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

X-5 显微熔点测定仪(温度计未经校正); 德国 TENSOR 27 型 FT-IR 红外光谱仪, KBr 压片; 德国 BRUKER 500 MHz/Varian INOVA 400 MHz 核磁共振仪, DMSO- d_6 为溶剂, TMS 为内标; 德国 Elementar 公司 Vario EL 型元素分析仪. 所用试剂均为分析纯.

3.2 中间体化合物的合成

中间体化合物 **1** 和 **2** 的合成方法按参考文献[51]的方法合成.

3.3 目标化合物 **3** 的合成

向干燥的 50 mL 三口瓶中加入 1 mmol 中间体化合物 **2** 和 10 mL 乙醇. 室温下搅拌, 待固体全部溶解后, 向反应瓶中滴加两滴冰醋酸继续搅拌 0.5 h, 然后再向瓶中加入 1 mmol 1,3-二氨基硫脲, 在 110 °C 下加热回流 5 h. 反应结束后, 水浴蒸出部分溶剂, 抽滤, 粗产品用 DMF 重结晶, 空气中晾干即得到目标化合物 **3**.

1-[(9-乙基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**3a**): 灰绿色粒状晶体, 产率 88.3%. m.p. 218.7~219.2 °C; ^1H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.42 (s, 1H, NH_a), 9.77 (s, 1H, NH_b), 8.63 (s, 1H, $\text{CH}=\text{N}$), 8.21 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, Cz-H_2), 8.205 (s, 1H, Cz-H_4), 7.99 (dd, $J=8.5, 1.0$ Hz, 1H, Cz-H_5), 7.63 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_1, \text{H}_8$), 7.48 (td, $J=7.5, 0.5$ Hz, 1H, Cz-H_7), 7.25 (t, $J=7.5$ Hz, 1H, Cz-H_6), 4.89 (s, 2H, NH_2), 4.46 (q, $J=7.2$ Hz, 2H, NCH_2), 1.32 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 125 MHz) δ : 177.90 (C=S), 145.50 ($\text{CH}=\text{N}$), 142.40, 141.90, 128.02, 127.16, 127.11, 124.31, 124.15, 122.45, 122.01, 121.14, 111.28, 111.12, 39.01 (NCH_2), 15.57 (CH_3); IR (KBr) ν : 3397, 3283, 3221, 3051, 2954, 2872, 1626, 1598, 1532, 1494, 1477, 1272, 1249 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{N}_5\text{S}$: C 61.71, H 5.50, N 22.49; found C 61.94, H 5.68, N 22.24.

1-[(9-丙基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**3b**): 灰色粒状晶体, 产率 84.5%. m.p. 224.7~225.1 °C; ^1H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.41 (s, 1H, NH_a), 9.76 (s, 1H, NH_b), 8.62 (s, 1H, $\text{CH}=\text{N}$), 8.21 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, Cz-H_2), 8.18 (s, 1H, Cz-H_4), 7.97 (d, $J=9.0, 1.0$ Hz, 1H, Cz-H_5), 7.63 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_1, \text{H}_8$), 7.48 (t, $J=7.5$ Hz, 1H, Cz-H_7), 7.24 (t, $J=7.5$ Hz, 1H, Cz-H_6), 4.88 (s, 2H, NH_2), 4.39 (t, $J=6.8$ Hz, 2H, NCH_2), 1.75~1.89 (m, 2H, NCH_2CH_2), 1.32 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 100 MHz) δ : 176.43 (C=S), 143.93 ($\text{CH}=\text{N}$), 141.55, 141.03, 126.55, 125.71, 125.68, 122.73, 122.60, 120.99, 120.57, 119.68, 110.14, 109.97, 44.29 (NCH_2),

22.36, 11.81 (CH_3); IR (KBr) ν : 3285, 3136, 3050, 2973, 2850, 1630, 1598, 1540, 1498, 1475, 1235 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{N}_5\text{S}$: C 62.74, H 5.88, N 21.52; found C 62.55, H 5.67, N 21.67.

1-[(9-丁基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**3c**): 灰绿色粒状晶体, 产率 86.6%. m.p. 223.9~224.2 °C; ^1H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.42 (s, 1H, NH_a), 9.76 (s, 1H, NH_b), 8.63 (s, 1H, $\text{CH}=\text{N}$), 8.21 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, Cz-H_2), 8.20 (s, 1H, Cz-H_4), 7.98 (dd, $J=8.5, 1.5$ Hz, 1H, Cz-H_5), 7.62 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_1, \text{H}_8$), 7.48 (td, $J=7.8, 1.0$ Hz, 1H, Cz-H_7), 7.24 (t, $J=7.5$ Hz, 1H, Cz-H_6), 4.90 (s, 2H, NH_2), 4.41 (t, $J=7.0$ Hz, 2H, NCH_2), 1.64~1.87 (m, 2H, NCH_2CH_2), 1.18~1.41 (m, 2H, $\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2$), 0.87 (t, $J=7.5$ Hz, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 125 MHz) δ : 177.93 (C=S), 145.39 ($\text{CH}=\text{N}$), 142.90, 142.38, 127.96, 127.14, 127.11, 124.20, 124.06, 122.40, 121.95, 121.09, 111.48, 111.31, 44.05 (NCH_2), 32.59, 21.63, 15.57 (CH_3); IR (KBr) ν : 3394, 3294, 3245, 3186, 3048, 2975, 2895, 1672, 1626, 1598, 1542, 1501, 1491, 1473, 1272, 1236 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{N}_5\text{S}$: C 63.69, H 6.24, N 20.63; found C 63.45, H 6.07, N 20.37.

1-[(9-戊基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**3d**): 灰绿色粒状晶体, 产率 85.8%. m.p. 222.5~222.9 °C; ^1H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.42 (s, 1H, NH_a), 9.77 (s, 1H, NH_b), 8.63 (s, 1H, $\text{CH}=\text{N}$), 8.21 (d, $J=7.0$ Hz, 1H, Cz-H_2), 8.205 (s, 1H, Cz-H_4), 7.98 (dd, $J=8.5, 1.0$ Hz, 1H, Cz-H_5), 7.61 (d, $J=9.0$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_1, \text{H}_8$), 7.48 (td, $J=7.8, 1.0$ Hz, 1H, Cz-H_7), 7.24 (t, $J=7.3$ Hz, 1H, Cz-H_6), 4.90 (s, 2H, NH_2), 4.40 (t, $J=7.0$ Hz, 2H, NCH_2), 1.63~1.92 (m, 2H, NCH_2CH_2), 1.13~1.38 (m, 4H, $\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2$), 0.80 (t, $J=6.8$ Hz, 3H, CH_3); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 125 MHz) δ : 177.91 (C=S), 145.53 ($\text{CH}=\text{N}$), 142.90, 142.37, 127.99, 127.13, 127.05, 124.20, 124.03, 122.38, 121.93, 121.11, 111.43, 111.28, 44.22 (NCH_2), 30.47, 30.09, 23.74, 15.66 (CH_3); IR (KBr) ν : 3391, 3290, 3242, 3186, 3142, 3048, 2972, 2872, 1670, 1629, 1598, 1542, 1501, 1491, 1473, 1272, 1235 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{N}_5\text{S}$: C 64.56, H 6.56, N 19.81; found C 64.76, H 6.70, N 19.93.

1-[(9-己基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**3e**): 浅绿色粒状晶体, 产率 86.2%. m.p. 214.4~215.0 °C; ^1H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.43 (s, 1H, NH_a), 9.77 (s, 1H, NH_b), 8.63 (s, 1H, $\text{CH}=\text{N}$), 8.21 (d, $J=7.0$ Hz, 1H, Cz-H_2), 8.205 (s, 1H, Cz-H_4), 7.98 (dd, $J=8.5, 1.0$ Hz, 1H, Cz-H_5), 7.61 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, Cz-H_1), 7.60 (d, $J=8.5$

Hz, 1H, Cz-H₈), 7.48 (td, $J=7.6, 0.8$ Hz, 1H, Cz-H₇), 7.24 (t, $J=7.5$ Hz, 1H, Cz-H₆), 4.90 (s, 2H, NH₂), 4.39 (t, $J=7.0$ Hz, 2H, NCH₂), 1.57~1.91 (m, 2H, NCH₂CH₂), 1.10~1.35 (m, 6H, NCH₂CH₂(CH₂)₃), 0.79 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ : 177.93 (C=S), 145.52 (CH=N), 142.91, 142.37, 127.96, 127.11, 127.07, 124.20, 124.05, 122.39, 121.97, 121.09, 111.44, 111.29, 44.25 (NCH₂), 32.80, 30.34, 27.95, 23.84, 15.65 (CH₃); IR (KBr) ν : 3391, 3287, 3172, 3048, 2954, 2858, 1639, 1598, 1528, 1491, 1473, 1272, 1241 cm⁻¹. Anal. calcd for C₂₀H₂₅N₅S: C 65.36, H 6.86, N 19.06; found C 65.64, H 6.61, N 19.25.

1-[(9-庚基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**3f**): 浅绿色粒状晶体, 产率 84.9%. m.p. 212.7~213.2 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 11.41 (s, 1H, NH_a), 9.76 (s, 1H, NH_b), 8.62 (s, 1H, CH=N), 8.21 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, Cz-H₂), 8.20 (s, 1H, Cz-H₄), 7.98 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, Cz-H₅), 7.61 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, Cz-H₁, H₈), 7.47 (t, $J=7.8$ Hz, 1H, Cz-H₇), 7.24 (t, $J=7.3$ Hz, 1H, Cz-H₆), 4.89 (s, 2H, NH₂), 4.40 (t, $J=6.8$ Hz, 2H, NCH₂), 1.62~1.91 (m, 2H, NCH₂CH₂), 1.00~1.40 (m, 8H, NCH₂CH₂(CH₂)₄), 0.80 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ : 177.87 (C=S), 145.53 (CH=N), 142.90, 142.36, 127.98, 127.11, 127.04, 124.18, 124.03, 122.37, 121.93, 121.10, 111.45, 111.29, 44.24 (NCH₂), 33.02, 30.37, 30.26, 28.27, 23.80, 15.70 (CH₃); IR (KBr) ν : 3398, 3290, 3242, 3186, 3153, 3048, 2972, 2870, 1671, 1626, 1595, 1542, 1501, 1491, 1470, 1460, 1272, 1235 cm⁻¹. Anal. calcd for C₂₁H₂₇N₅S: C 66.11, H 7.13, N 18.36; found C 66.37, H 6.90, N 18.20.

1-[(9-辛基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**3g**): 浅绿色粒状晶体, 产率 87.7%. m.p. 213.1~213.8 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 11.41 (s, 1H, NH_a), 9.75 (s, 1H, NH_b), 8.62 (s, 1H, CH=N), 8.21 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, Cz-H₂), 8.20 (s, 1H, Cz-H₄), 7.98 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, Cz-H₅), 7.61 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, Cz-H₁, H₈), 7.47 (t, $J=7.8$ Hz, 1H, Cz-H₇), 7.24 (t, $J=7.3$ Hz, 1H, Cz-H₆), 4.89 (s, 2H, NH₂), 4.40 (t, $J=7.0$ Hz, 2H, NCH₂), 1.62~1.91 (m, 2H, NCH₂CH₂), 1.00~1.40 (m, 10H, NCH₂CH₂(CH₂)₅), 0.80 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, CH₃); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ : 177.91 (C=S), 145.45 (CH=N), 142.90, 142.37, 127.95, 127.11, 127.08, 124.20, 124.06, 122.38, 121.94, 121.08, 111.44, 111.28, 44.25 (NCH₂), 33.00, 30.57, 30.43, 30.36, 28.36, 23.85, 15.73 (CH₃); IR (KBr) ν : 3397, 3283, 3207, 3165, 3048, 2954, 2854, 1629, 1598, 1539, 1505,

1491, 1477, 1272, 1249 cm⁻¹. Anal. calcd for C₂₂H₂₉N₅S: C 66.80, H 7.39, N 17.70; found C 66.93, H 7.59, N 17.53.

3.4 目标化合物 4 的合成

向干燥的 50 mL 三口瓶中加入 1 mmol 中间体化合物 **2** 和 10 mL 乙醇. 室温下搅拌, 待固体全部溶解后, 向反应瓶中滴加两滴冰醋酸继续搅拌 0.5 h, 然后再向瓶中加入 0.5 mmol 1,3-二氨基硫脲, 在 110 °C 的温度下加热回流 5 h. 反应结束后, 水浴蒸出部分溶剂, 抽滤, 用 EtOH/H₂O ($V:V=3:1$) 混合液洗涤滤饼, 空气中晾干即得到目标化合物 **4**.

1,5-双[(9-乙基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**4a**): 橙黄色固体粉末, 产率 89.1%. m.p. 206.9~207.3 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 11.80 (s, 1H, NH_a), 11.55 (s, 1H, NH_b), 8.83 (s, 1H, CH=N), 8.68 (s, 1H, CH=N), 8.47 (s, 1H, Cz-H₄), 8.34 (s, 1H, Cz-H₄), 8.26 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, Cz-H₂×2), 8.07 (d, $J=7.5$ Hz, 1H, Cz-H₁), 7.98 (d, $J=7.5$ Hz, 1H, Cz-H₁), 7.72 (d, $J=7.0$ Hz, 2H, Cz-H₅×2), 7.67 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, Cz-H₈×2), 7.51 (t, $J=7.5$ Hz, 2H, Cz-H₇×2), 7.28 (t, $J=7.5$ Hz, 2H, Cz-H₆×2), 4.50 (q, $J=7.0$ Hz, 4H, NCH₂×2), 1.36 (t, $J=7.0$ Hz, 6H, CH₃×2); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ : 175.90 (C=S), 151.79 (CH=N), 146.72 (CH=N), 142.57, 141.93, 128.12, 126.00~127.73 (broad peak), 124.31, 124.07, 122.52, 121.74~122.83 (broad peak), 121.27, 111.36, 39.07 (NCH₂), 15.61 (CH₃); IR (KBr) ν : 3283, 3151, 3048, 2923, 2854, 1626, 1595, 1532, 1492, 1470, 1245, 1235 cm⁻¹. Anal. calcd for C₃₁H₂₈N₆S: C 72.07, H 5.46, N 16.27; found C 71.89, H 5.67, N 16.12.

1,5-双[(9-丙基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**4b**): 黄色固体粉末, 产率 88.2%. m.p. 202.4~203.0 °C; ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 11.83 (s, 1H, NH_a), 11.57 (s, 1H, NH_b), 8.84 (s, 1H, CH=N), 8.69 (s, 1H, CH=N), 8.47 (s, 1H, Cz-H₄), 8.35 (s, 1H, Cz-H₄), 8.26 (d, $J=7.5$ Hz, 2H, Cz-H₂×2), 8.06 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, Cz-H₁), 7.97 (d, $J=5.0$ Hz, 1H, Cz-H₁), 7.73 (d, $J=6.5$ Hz, 2H, Cz-H₅×2), 7.67 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, Cz-H₈×2), 7.51 (t, $J=7.5$ Hz, 2H, Cz-H₇×2), 7.27 (t, $J=7.3$ Hz, 2H, Cz-H₆×2), 4.48 (t, $J=6.8$ Hz, 4H, NCH₂×2), 1.77~1.91 (m, 4H, NCH₂CH₂×2), 0.90 (t, $J=7.3$ Hz, 6H, CH₃×2); ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 100 MHz) δ : 173.95 (C=S), 141.23 (CH=N), 140.57 (CH=N), 141.23, 140.57, 126.15, 124.15~125.85 (broad peak), 122.23, 122.02, 120.54, 119.81~121.33 (broad peak), 119.31, 109.70, 43.86 (NCH₂), 21.88, 11.32 (CH₃); IR (KBr) ν : 3289, 3246, 3188, 3159, 3046, 2973, 2868, 1670, 1627, 1594, 1533,

1493, 1475, 1271, 1235 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{33}\text{H}_{32}\text{N}_6\text{S}$: C 72.76, H 5.92, N 15.43; found C 73.04, H 5.81, N 15.67.

1,5-双[(9-丁基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**4c**): 黄色固体粉末, 产率 88.4%. m.p. 180.1~180.4 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.76 (s, 1H, NH_a), 11.54 (s, 1H, NH_b), 8.82 (s, 1H, $\text{CH}'=\text{N}$), 8.66 (s, 1H, $\text{CH}=\text{N}$), 8.48 (s, 1H, Cz-H_4), 8.35 (s, 1H, Cz-H_4), 8.25 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_2\times 2$), 8.00 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_1\times 2$), 7.70 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_5\times 2$), 7.65 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_8\times 2$), 7.50 (t, $J=7.8$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_7\times 2$), 7.27 (t, $J=7.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_6\times 2$), 4.44 (t, $J=7.0$ Hz, 4H, $\text{NCH}_2\times 2$), 1.70~1.85 (m, 4H, $\text{NCH}_2\text{CH}_2\times 2$), 1.20~1.40 (m, 4H, $\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\times 2$), 0.90 (t, $J=7.5$ Hz, 6H, $\text{CH}_3\times 2$); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 125 MHz) δ : 175.91 (C=S), 151.77 ($\text{C}'\text{H}=\text{N}$), 146.39 ($\text{CH}=\text{N}$), 143.07, 142.42, 128.07, 125.97~127.81 (broad peak), 124.19, 123.98, 122.46, 121.80~123.01 (broad peak), 121.22, 111.56, 44.11 (NCH_2), 32.61, 21.65, 15.57 (CH_3); IR (KBr) ν : 3285, 3050, 2955, 2868, 1627, 1598, 1529, 1493, 1475, 1246, 1215 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{35}\text{H}_{36}\text{N}_6\text{S}$: C 73.39, H 6.34, N 14.67; found C 73.22, H 6.20, N 14.44.

1,5-双[(9-戊基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**4d**): 黄色固体粉末, 产率 89.0%. m.p. 155.7~156.3 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.81 (s, 1H, NH_a), 11.55 (s, 1H, NH_b), 8.82 (s, 1H, $\text{CH}'=\text{N}$), 8.67 (s, 1H, $\text{CH}=\text{N}$), 8.47 (s, 1H, Cz-H_4), 8.34 (s, 1H, Cz-H_4), 8.26 (d, $J=7.5$ Hz, 2H, Cz-H_2), 8.06 (d, $J=7.0$ Hz, 1H, Cz-H_1), 7.97 (br, s, 1H, Cz-H_1), 7.71 (d, $J=7.0$ Hz, 2H, Cz-H_5), 7.65 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, Cz-H_8), 7.51 (t, $J=7.5$ Hz, 2H, Cz-H_7), 7.21 (t, $J=7.3$ Hz, 2H, Cz-H_6), 4.44 (t, $J=6.0$ Hz, 4H, $\text{NCH}_2\times 2$), 1.70~1.90 (m, 4H, $\text{NCH}_2\text{CH}_2\times 2$), 1.10~1.50 (m, 8H, $\text{NCH}_2\text{CH}_2(\text{CH}_2)_2\times 2$), 0.82 (t, $J=6.0$ Hz, 6H, $\text{CH}_3\times 2$); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 125 MHz) δ : 175.87 (C=S), 151.79 ($\text{C}'\text{H}=\text{N}$), 146.34 ($\text{CH}=\text{N}$), 143.07, 142.40, 128.09, 126.06~127.66 (broad peak), 124.17, 123.95, 122.40, 121.82~122.74 (broad peak), 121.23, 111.54, 44.29 (NCH_2), 30.51, 30.11, 23.76, 15.70 (CH_3); IR (KBr) ν : 3289, 3136, 3050, 2955, 2868, 1627, 1598, 1533, 1489, 1475, 1246, 1213 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{37}\text{H}_{40}\text{N}_6\text{S}$: C 73.97, H 6.71, N 13.99; found C 73.70, H 6.96, N 14.18.

1,5-双[(9-己基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**4e**): 黄色固体粉末, 产率 87.9%. m.p. 165.4~166.0 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.82 (s, 1H, NH_a), 11.56 (s, 1H, NH_b), 8.83 (s, 1H, $\text{CH}'=\text{N}$), 8.68 (s, 1H, $\text{CH}=\text{N}$), 8.48 (s, 1H, Cz-H_4), 8.36 (s, 1H, Cz-H_4), 8.25 (d, $J=7.0$

Hz, 2H, $\text{Cz-H}_2\times 2$), 8.06 (d, $J=7.5$ Hz, 1H, Cz-H_1), 7.98 (d, $J=7.5$ Hz, 1H, Cz-H_1), 7.70 (d, $J=7.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_5\times 2$), 7.64 (d, $J=8.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_8\times 2$), 7.50 (t, $J=7.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_7\times 2$), 7.27 (t, $J=7.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_6\times 2$), 4.43 (t, $J=6.8$ Hz, 4H, $\text{NCH}_2\times 2$), 1.70~1.90 (m, 4H, $\text{NCH}_2\text{CH}_2\times 2$), 1.10~1.35 (m, 12H, $\text{NCH}_2\text{CH}_2(\text{CH}_2)_3\times 2$), 0.81 (t, $J=7.0$ Hz, 6H, $\text{CH}_3\times 2$); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 125 MHz) δ : 175.91 (C=S), 151.63 ($\text{C}'\text{H}=\text{N}$), 146.42 ($\text{CH}=\text{N}$), 143.06, 142.40, 128.05, 125.91~127.58 (broad peak), 124.19, 123.98, 122.44, 121.72~122.78 (broad peak), 121.20, 111.52, 44.32 (NCH_2), 32.82, 30.37, 27.99, 23.86, 15.66 (CH_3); IR (KBr) ν : 3284, 3139, 3048, 2925, 2853, 1627, 1598, 1533, 1489, 1471, 1235, 1213 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{39}\text{H}_{44}\text{N}_6\text{S}$: C 74.49, H 7.05, N 13.36; found C 74.71, H 6.92, N 13.20.

1,5-双[(9-庚基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**4f**): 黄色固体粉末, 产率 88.8%. m.p. 142.4~142.7 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.80 (s, 1H, NH_a), 11.55 (s, 1H, NH_b), 8.82 (s, 1H, $\text{CH}'=\text{N}$), 8.66 (s, 1H, $\text{CH}=\text{N}$), 8.47 (s, 1H, Cz-H_4), 8.34 (s, 1H, Cz-H_4), 8.25 (d, $J=7.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_2\times 2$), 8.05 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, Cz-H_1), 7.98 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, Cz-H_1), 7.70 (d, $J=6.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_5\times 2$), 7.65 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_8\times 2$), 7.50 (t, $J=7.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_7\times 2$), 7.27 (t, $J=7.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_6\times 2$), 4.44 (t, $J=7.0$ Hz, 4H, $\text{NCH}_2\times 2$), 1.72~1.88 (m, 4H, $\text{NCH}_2\text{CH}_2\times 2$), 1.10~1.35 (m, 16H, $\text{NCH}_2\text{CH}_2(\text{CH}_2)_4\times 2$), 0.82 (t, $J=6.8$ Hz, 6H, $\text{CH}_3\times 2$); ^{13}C NMR ($\text{DMSO}-d_6$, 125 MHz) δ : 175.90 (C=S), 151.70 ($\text{C}'\text{H}=\text{N}$), 146.45 ($\text{CH}=\text{N}$), 143.06, 142.40, 128.05, 125.92~127.64 (broad peak), 124.18, 123.97, 122.44, 121.66~122.70 (broad peak), 121.20, 111.54, 44.33 (NCH_2), 33.05, 30.42, 30.29, 28.32, 23.83, 15.73 (CH_3); IR (KBr) ν : 3289, 3131, 3049, 2925, 2854, 1627, 1595, 1535, 1491, 1475, 1236, 1214 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{41}\text{H}_{48}\text{N}_6\text{S}$: C 74.96, H 7.36, N 12.79; found C 75.16, H 7.51, N 12.67.

1,5-双[(9-辛基-3-咪唑基)亚甲基]硫代碳酰脲(**4g**): 黄色固体粉末, 产率 89.4%. m.p. 155.4~155.7 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (500 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ : 11.81 (s, 1H, NH_a), 11.55 (s, 1H, NH_b), 8.82 (s, 1H, $\text{CH}'=\text{N}$), 8.67 (s, 1H, $\text{CH}=\text{N}$), 8.47 (s, 1H, Cz-H_4), 8.35 (s, 1H, Cz-H_4), 8.25 (d, $J=7.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_2\times 2$), 8.05 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, Cz-H_1), 7.97 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, Cz-H_1), 7.70 (d, $J=7.0$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_5\times 2$), 7.64 (d, $J=8.0$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_8\times 2$), 7.50 (t, $J=7.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_7\times 2$), 7.27 (t, $J=7.5$ Hz, 2H, $\text{Cz-H}_6\times 2$), 4.43 (t, $J=6.8$ Hz, 4H, $\text{NCH}_2\times 2$), 1.70~1.90 (m, 4H,

$\text{NCH}_2\text{CH}_2 \times 2$), 1.10~1.35 (m, 20H, $\text{NCH}_2\text{CH}_2(\text{CH}_2)_5 \times 2$), 0.81 (t, $J=6.8$ Hz, 6H, $\text{CH}_3 \times 2$); ^{13}C NMR (DMSO- d_6 , 125 MHz) δ : 175.90 (C=S), 151.62 (C'H=N), 146.32 (CH=N), 143.06, 142.40, 128.03, 125.66~127.74 (broad peak), 124.19, 123.98, 122.43, 121.82~122.77 (broad peak), 121.19, 111.52, 44.32 (NCH_2), 33.02, 30.60, 30.46, 30.40, 28.34, 23.86, 15.74 (CH_3); IR (KBr) ν : 3289, 3137, 3049, 2973, 2865, 1627, 1598, 1536, 1489, 1475, 1253, 1235 cm^{-1} . Anal. calcd for $\text{C}_{43}\text{H}_{52}\text{N}_6\text{S}$: C 75.40, H 7.65, N 12.27; found C 75.64, H 7.87, N 12.44.

3.5 目标化合物生物活性测试

目标化合物对 Cdc25B 和 PTP1B 的抑制活性筛选实验方法: 按照参考文献[52, 53]的方法进行。

3.6 目标化合物 4d 和 4a 与 Cdc25B/PTP1B 的分子对接

从 RCSB 的 PDB 库 (<http://www.rcsb.org>) 下载 Cdc25B 蛋白晶体结构(PDB ID:1QB0)和 PTP1B 蛋白晶体结构(PDB ID:1NNY). 采用 Dockingserver 软件进行分子对接研究。

辅助材料(Supporting Information) 目标化合物 3 和 4 的 IR、 ^1H NMR、 ^{13}C NMR 和 2D NOESY 谱图。这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载

References

- [1] Li, Q. H.; *Chin. Chem. Lett.* **2009**, 20, 793.
- [2] Riyadh, S. M.; Gomha, S. M.; Mahmoud, E. A. *World J. Pharm. Pharm. Sci.* **2015**, 4, 192.
- [3] Brockman, R. W.; Thomson, J. R.; Bell, M. J.; Skipper, H. E. *Cancer Res.* **1956**, 16, 167.
- [4] Gangarapu, K.; Manda, S.; Jallapally, A.; Thota, S.; Karki, S. S.; Balzarini, J.; Clercq, E. D.; Tokuda, H. *Med. Chem. Res.* **2013**, 23, 1046.
- [5] Božić, A.; Marinković, A.; Bjelogrić, S.; Todorović, T. R.; Cvijetić, I. N.; Novaković, I.; Muller, C. D.; Filipović, N. R. *RSC Adv.* **2016**, 6, 104763.
- [6] Sathisha, M. P.; Revankar, V. K.; Pai, K. S. R. *Met.-Based Drugs* **2008**, 2008, 362105.
- [7] Gabr, M. T.; El-Gohary, N. S.; El-Bendary, E. R.; El-Kerdawy, M. M.; Ni, N. *Eur. J. Med. Chem.* **2017**, 128, 36.
- [8] Tejasree, C.; Kiran, G.; Rajyalakshmi, G.; Reddy, R. N. *Eur. J. Med. Chem.* **2014**, 5, 2738.
- [9] Kiran, G.; Maneshwar, T.; Rajeshwar, Y.; Sarangapani, M. *J. Chem.* **2013**, 2013, 1.
- [10] Li, L.; Jiang, Y. J.; Liu, X. L.; Zhao, Z. G. *J. Chem. Res.* **2013**, 37, 372.
- [11] Shi, Z. C.; Zhao, Z. G.; Liu, M.; Wang, X. H. *C. R. Chim.* **2013**, 16, 977.
- [12] Zhang, L. N.; Zhao, Z. G.; Tan, J.; Li, H. *Chin. J. Synth. Chem.* **2015**, 23, 677 (in Chinese).
(张丽娜, 赵志刚, 谭炯, 李晖, 合成化学, **2015**, 23, 677.)
- [13] Qiu, L. Y.; Zhao, Z. G.; Li, L.; Zhang, L. N. *Chin. J. Synth. Chem.* **2014**, 22, 293 (in Chinese).
(仇丽娜, 赵志刚, 李琳, 张丽娜, 合成化学, **2014**, 22, 293.)
- [14] Vlaar, C. P.; Castillo-Pichardo, L.; Medina, J. I.; Marrero-Serra, C. M.; Vélez, E.; Ramos, Z.; Hernández, E. *Bioorg. Med. Chem.* **2018**, 26, 884.
- [15] Montalvo-Ortiz, B. L.; Castillo-Pichardo, L.; Hernández, E.; Humphries-Bickley, T.; Mota-Peynado, A. D. L.; Cobano, L. A.; Vlaar, C. P.; Dharmawardhane, S. *J. Biol. Chem.* **2012**, 287, 13228.
- [16] Kaulage, M. H.; Maji, B.; Pasadi, S.; Ali, A.; Bhattacharya, S.; Muniyappa, K. *Eur. J. Med. Chem.* **2018**, 148, 178.
- [17] Humphries, P. S.; Bersot, R.; Kincaid, J.; Mabery, E.; McCluskie, K.; Park, T.; Renner, T.; Riegler, E.; Steinfeld, T.; Turtle, E. D.; Wei, Z. L.; Williset, E. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2018**, 28, 293.
- [18] Kim, J.; Jung, S. H.; Yun, E.; Cho, S. H.; Yuseok, O.; Kim, J. E.; Kim, Y. H.; Myung, C. S.; Song, G. Y. *Bull. Korean. Chem. Soc.* **2018**, 39, 726.
- [19] Wang, W.; Li, Q.; Wei, Y.; Xue, J.; Sun, X.; Yu, Y.; Chen, Z.; Li, S.; Duan, L. *Int. J. Parasitol. Drugs and Drug Resist.* **2017**, 7, 191.
- [20] Saturnino, C.; Grande, F.; Aquaro, S.; Caruso, A.; Iacopetta, D.; Bonomo, M. G.; Longo, P.; Schols, D.; Sinicropi, M. S. *Molecules* **2018**, 23, 286.
- [21] Mahapatra, D. K.; Shivhare, R. S.; Haldar, A. G. M. *Asian. J. Chem. Pharm. Sci.* **2017**, 2, 10.
- [22] Schmidt, U.; Theumer, G.; Jäger, A.; Kataeva, O.; Wan, B. J.; Franzblau, S. G.; Knölker, H. J. *Molecules* **2018**, 23, 1402.
- [23] Salih, N.; Salimon, J.; Yousif, E. *Arabian J. Chem.* **2016**, 9, 781.
- [24] Kaplanckl, Z. A. *Marmara Pharm. J.* **2011**, 15, 105.
- [25] Mahapatra, D. K.; Shivhare, R. S.; Dadure, K. M. *Acta. Sci. Pharm. Sci.* **2018**, 2, 40.
- [26] Kaur, H.; Kumar, S.; Vishwakarma, P.; Sharma, M.; Saxena, K. K.; Kumar, A. *Eur. J. Med. Chem.* **2010**, 45, 2777.
- [27] Dang, Z. S.; Xu, S.; Zhang, H. B.; Gui, W. F.; Zhao, Y. N.; Duan, L. P.; Hu, W. *Acta Trop.* **2018**, 185, 138.
- [28] Li, Y.; Huang, Y. X.; Lu, Q.; Li, Y. M. *Chin. J. Mod. Nurs.* **2018**, 24, 3172 (in Chinese).
(李艳, 黄永霞, 陆晴, 李雅梅, 中华现代护理, **2018**, 24, 3172.)
- [29] Wang, G. C.; Chen, M.; Qiu, J.; Xie, Z. Z.; Cao, A. B. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2018**, 28, 113.
- [30] Xu, H. M.; Mu, C.; Bao, D.; Xing, Q. L. *Chin. J. Diabetes Mellitus* **2018**, 10, 735 (in Chinese).
(许洪梅, 穆纯, 包颀, 邢秋玲, 中华糖尿病, **2018**, 10, 735.)
- [31] Evain-Bana, E.; Schiavo, L.; Bour, C.; Lanfranchi, D. A.; Berardozi, S.; Ghirga, F.; Bagrel, D.; Botta, B.; Hanquet, G.; Mori, M. *J. Enzyme Inhib. Med. Chem.* **2017**, 32, 113.
- [32] Ma, Y.; Li, H. L.; Chen, X. B.; Jin, W. Y.; Zhou, H.; Wang, R. L. *Comput. Biol. Chem.* **2018**, 73, 1.
- [33] Li, Y. J.; Yu, Y.; Jin, K.; Gao, L. X.; Luo, T. C.; Sheng, L.; Shao, X.; Li, J. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2014**, 24, 4125.
- [34] Liu, J.; Wang, Y. L.; Zhang, J. H.; Yang, J. S.; Mou, H. C.; Lin, J.; Yan, S. J. *ACS Omega* **2018**, 3, 4534.
- [35] Xiao, Y. J.; Yu, Y.; Gao, D.; Jin, W. R.; Jiang, P. C.; Li, Y. H.; Wang, C.; Song, Y. N.; Zhan, P.; Gu, F.; Zhang, C. C.; Wang, B.; Chen, Y. H.; Du, B.; Zhang, R. *Front. Oncol.* **2019**, 9, 236.
- [36] Liu, H. Y.; Sun, D. W.; Du, H.; Zheng, C. J.; Li, J. Y.; Piao, H. R.; Li, J.; Sun, L. P. *Eur. J. Med. Chem.* **2019**, 172, 163.
- [37] He, R. J.; Yu, Z. H.; Zhang, R. Y.; Zhang, Z. Y. *Acta Pharmacol. Sin.* **2014**, 35, 1227.
- [38] Krishnan, N.; Konidaris, K. F.; Gasser, G.; Tonk, N. K. *J. Biol. Chem.* **2018**, 293, 1517.
- [39] Li, Y. J.; Wang, S. Y.; Jin, K.; Gao, L. X.; Sheng, L.; Zhang, N.; Yang, K. D.; Zhao, Y.; Li, J. *Chin. J. Org. Chem.* **2018**, 38, 1242 (in Chinese).

- (李英俊, 王思远, 靳焜, 高立信, 盛丽, 张楠, 杨凯栋, 赵月, 李佳, 有机化学, **2018**, 38, 1242.)
- [40] Li, Y. J.; Wang, S. Y.; Jin, K.; Gao, L. X.; Sheng, L.; Zhang, N.; Liu, J. H.; Li, J. *Chin. J. Org. Chem.* **2019**, 39, 491 (in Chinese). (李英俊, 王思远, 靳焜, 高立信, 盛丽, 张楠, 刘季红, 李佳, 有机化学, **2019**, 39, 491.)
- [41] Li, Y. J.; Zhao, Y.; Jin, K.; Gao, L. X.; Sheng, L.; Liu, X. J.; Yang, H. J.; Lin, L. D.; Li, J. *Chin. J. Org. Chem.* **2019**, 39, 2599 (in Chinese). (李英俊, 赵月, 靳焜, 高立信, 盛丽, 刘雪洁, 杨鸿境, 林乐弟, 李佳, 有机化学, **2019**, 39, 2599.)
- [42] Li, Y. Q.; Shi, W.; Ma, J. C.; Wang, X.; Kong, X. J.; Zhang, Y. P.; Feng, L.; Hui, Y. H.; Xie, Z. F. *J. Photochem. Photobiol. A* **2017**, 338, 1.
- [43] Su, H. Y.; Li, J. W.; Lin, H.; Lin, H. K. *J. Braz. Chem. Soc.* **2010**, 21, 541.
- [44] Murali, M. G.; Vishnumurthy, K. A.; Seethamraju, S.; Ramamurthy, P. C. *RSC Adv.* **2014**, 4, 20592.
- [45] Bose, P.; Ghosh, P. *Chem. Commun.* **2010**, 46, 2962.
- [46] Momidi, B. K.; Tekuri, V.; Trivedi, D. R. *Spectrochim. Acta, Part A* **2017**, 180, 175.
- [47] Dhineshkumar, E.; Iyappan, M.; Anbuselvan, C. *Spectrochim. Acta, Part A* **2018**, 199, 209.
- [48] Abdulazeez, I.; Basheer, C.; Al-Saadi, A. A. *J. Mol. Liq.* **2018**, 264, 58.
- [49] Barakat, A.; Islam, M. S.; Al-Majid, A. M.; Ghabbour, H. A.; Atef, F.; Zarrouk, A.; Warad, I. *J. Theor. Comput. Chem.* **2018**, 17, 1850005.
- [50] Rahmani, R.; Boukabcha, N.; Chouaih, A.; Hamzaoui, F.; Goumri-Said, S. *J. Mol. Struct.* **2018**, 1155, 484.
- [51] Jagadeeswari, S.; Paramaguru, G.; Thennarasu, S.; Renganathan, R. *J. Mol. Struct.* **2014**, 1060, 191.
- [52] Huang, W. G.; Jiang, Y. Y.; Li, Q.; Li, J.; Li, J. Y.; Lu, W.; Cai, J. C. *Tetrahedron* **2005**, 61, 1863.
- [53] Sun, L. P.; Shen, Q.; Piao, H. H.; Ma, W. P.; Gao, L. X.; Zhang, W.; Nan, F. J.; Li, J.; Piao, H. R. *Eur. J. Med. Chem.* **2011**, 46, 3630.

(Lu, Y.)