近十年 Dendralenes 催化合成研究进展

祝洁^a 杨文超^b 张乘运^a 吴磊^{*,a}^(a) 南京农业大学理学院化学系 江苏省农药学重点实验室 南京 210095^(b) 扬州大学园艺与植物保护学院 江苏扬州 225009

摘要 Dendralenes 作为一种含有支链骨架的交叉共轭聚烯烃, 是多种天然产物和光电材料的基本骨架, 也是快速构建手性多环结构的重要中间体, 在功能材料、天然产物化学、聚合物化学和合成化学等诸多领域占据重要地位. Dendralenes 的合成与衍生化应用是一个曾经被忽视但正在兴起的领域. 近年来, dendralenes 的合成得到了较快发展, 按 dendralenes 共轭单元数的不同概述了其合成领域的最新成果, 重点介绍反应设计与机理, 并展望了 dendralenes 的后续合成与应用研究发展.

关键词 Dendralenes; 共轭低聚烯烃; 累积烯烃; 偶联; 环化; 衍生化

Recent Progress in the Synthesis of Dendralenes: A Decade Update

Zhu, Jie^a Yang, Wenchao^b Zhang, Chengyun^a Wu, Lei^{*,a}^(a) Jiangsu Key Laboratory of Pesticide Science, Department of Chemistry, College of Sciences, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095^(b) College of Horticulture and Plant Protection, Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu 225009

Abstract Dendralenes, also known as acyclic, branched and cross-conjugated polyenes, represent an important class of hydrocarbons. Serving as basic motifs for a number of natural products and photoelectric materials as well as key intermediates in the rapid synthesis of polycyclic compounds, dendralenes have recently played a prominent part in the area of material chemistry, polymer chemistry, synthetic chemistry and so on. The study on dendralenes has long been neglected but received renewed attention and witnessed rapid development in recent years. The advanced syntheses of dendralenes in the last decade are summarized and organized in order of the number of conjugated units. The synthetic design and mechanism are highlighted in this review with their future development on synthesis and application proposed as well.

Keywords dendralenes; conjugated polyenes; cumulenes; coupling; cyclization; derivate

Dendralenes 是仅包含 sp^2 杂化碳的六种基本类型的低聚烯烃结构之一(图 1), 是一种含有支链骨架的非环交叉共轭聚烯烃. 剩下的五个低聚烯烃家族分别是“线性多烯”(非循环、无支链), 轴烯(环状、有支链), 轮烯(环状、无支链), 富烯(环状、有支链), 累积多烯(无环、无支链)^[1]. 实际上, 线性多烯和轮烯已经得到诸多关注, 其中以苯衍生物存在的芳香类轮烯具有较高的关注度和商业价值. 线性多烯及其衍生物不仅能从天然产物中分离得到, 而且还是构成各种“有机金属”的母体结构. 与上述两个骨架相比, 剩下的四种低聚烯烃从天然产物中分离获得的文献报道较少, 因此其利用价值被低

估. dendralenes 更是很少得到关注, 因为在很长一段时间内, dendralenes 被误认为是不稳定的化合物, 在实验室中很难用现有的设备和方法处理它们^[2].

Dendralenes 英文名称是来自于 dendrimer, linear 和 alkene 的综合体, 命名常冠以[3], [4], ……,[*n*]表示结构中的双键数目. 目前 Dendralenes 尚无中文名称, 由于其立体构型形似大戟科植物的叶茎分布, 故建议其中文名称可命名为“戟烯”. Dendralenes 代表性发展历程如图 2 所示. 1951 年, Paul 等^[3]报道了第一例功能化[3]dendralenes, 随后, Bolmquist 和 Bailey 等分别在 1955 年和 1962 年利用经典流管热解实现了无取代[3]和[4]den-

* Corresponding author. E-mail: rickywu@njau.edu.cn

Received August 13, 2020; revised September 3, 2020; published online September 22, 2020.

Project supported by the Natural Science Foundation of Jiangsu Province (No. BK20191305), the Fundamental Research Funds for the Central Universities of Nanjing Agricultural University (No. KYDZ201904) and the Qing-Lan Project of Jiangsu Provincial Department of Education.

江苏省自然科学基金面上项目(No. BK20191305)、南京农业大学中央高校基本科研业务费专项基金(No. KYDZ201904)和江苏省教育厅“青蓝工程”资助项目.

图1 代表性共轭低聚烯烃的基本类别

Figure 1 Representative fundamental classes of conjugated oligo-alkenes

dralenes的合成^[4]. 直到21世纪初, 随着 dendralene 结构单元在天然产物中相继被发现, dendralenes 被证实是能稳定存在的, 其独特的结构及反应特性越来越受到合成化学家们的重视, 被广泛应用于高分子与材料化学、理论与计算化学、复杂天然产物合成及合成方法学等领域, 成为近年来研究热点^[5]. 2000年, Sherburn 课题组^[6]以 Stille 偶联和二氧化硫热消除成烯的方法实现了 [5], [6], [8]dendralenes 的合成; 2002年, Brummond 等^[7]在研究一价铑催化炔烃与联烯的 Pauson-Khand 反应时, 意外发现生成了新型环状的多取代 dendralenes; 2007年, Sherburn 课题组^[8]报道了手性[3]dendralenes 的合成并将其用于多环化合物单一对映异构体的构建; 2009年, Sherburn 课题组^[9]在前期工作基础上利用连续的 Kumada-Tamao-Corriu 和 Negishi 偶联反应, 再次发展

了一种实用的非环共轭聚烯烃 dendralenes 的合成方法, 可实现克级规模合成. 之后, dendralenes 的合成及应用得到快速发展.

如今, dendralenes 已被证实具有巨大的应用价值. 作为一类特殊的非环交叉共轭烯烃骨架, dendralenes 不仅是多种天然产物和光电材料的基本骨架, 而且是快速构建手性多环结构的重要中间体, 在天然产物及全合成领域中占据着重要地位^[10]. 早期构筑 dendralenes 的经典方法有包括金属催化的偶联反应、流管热解、Peterson 消除、Hoffman 消除、Mitsunobu 脱水和热异构化等^[11], 但合成条件大都比较苛刻或产率低下. 随着现代合成技术的革新与广大化学工作者的关注, 越来越多无取代或多取代的 dendralenes 及其衍生物被相继合成出来, 高阶 dendralenes 的系统合成方法也在不断完善, 其合成方法和产物应用性被逐渐丰富, 这类共轭烯烃的重要性也在不断凸现. 本综述主要按照共轭单元数目的不同分别概述了近十年来 dendralenes 的最新合成进展, 重点介绍反应设计理念和反应机理, 并对部分 dendralenes 的双键化学活性进行了总结, 以期对后续 dendralenes 的合成与应用研究起到一定借鉴作用.

1 [3]dendralenes 的合成

近年来, 由于在天然产物化学、聚合物化学、合成化学等方面的重要性日益凸显, dendralenes 吸引了越来越多科学家的研究兴趣. 其中, [3]dendralenes 作为最简单的 dendralenes 无疑是最受关注的. 其结构单元广泛存

发展多取代dendralene创新合成方法兴起中。。。

图2 Dendralenes 代表性发展历程

Figure 2 Representative development of dendralenes

在于许多天然产物中, 并且可以通过 Diels-Alder (D-A) 反应构建其他复杂分子. 此外, 单取代的[3]dendralenes 有 4 种几何构型, 取代基的引入也会很大程度上影响其物理性质、稳定性和反应活性.

[3]dendralenes 的合成往往涉及碳碳单键或烯烃双键的构建, 主要依赖于 Ni、Pd 催化的烯基金属试剂与 (双)卤代烯烃的偶联反应^[12]. 在该经典合成方法的基础上, 近年来又有了新的突破. 前不久, Sherburn 等^[13]报道了一种 dendralenes 广谱性合成方法, 可以合成 1 至 5 取代的 [3]dendralenes, 该方法同时也适用于 [4]dendralenes 的合成. 通过两次钯催化的偕二溴烯烃 **1a** 与烯炔有机锌试剂的 Negishi 偶联反应, 作者解决了 dendralenes 产物的区域选择性问题, 如 Scheme 1 所示, 改变两次偶联时有机锌试剂的顺序可以一锅得到相应构型的 dendralenes 产物(*E*)-**2** 或(*Z*)-**2**. 当用 2-(1,3-丁二烯)溴化锌试剂作为偶联组分与 **1b** 反应时, 可以区域选择性地合成[4]dendralenes (**3**).

图式 1 两次 Negishi 偶联合成 dendralenes

Scheme 1 Synthesis of dendralenes through two fold Negishi couplings

随着 dendralenes 合成研究的不断深入, 在 Negishi 偶联的基础上, 又发展了多种 dendralenes 合成方法. Horner-Wadsworth-Emmons (HWE)反应是构建双键的经典方法, 亦可用于 dendralenes 的合成. 众所周知, 二甲基·亚甲基硅(4)通过亚甲基的插入与醛或酮反应可用于合成环氧化合物. Ghosh 课题组^[14]发现, 在碱存在条件下, **4** 可以与活化烯烃发生串联的叶立德加成-消除烯基化反应, 从而作为卡宾负离子的合成等价物, 随后经 HWE 反应即可实现[3]dendralenes 的构建^[15]. 但是这种 dendralenes 活性较高, 未能分离得到, 仅通过薄层色谱(TLC)检测到, 因为在反应条件下 dendralenes 会通过原位的自身 Diels-Alder 二聚反应, 最终得到多取代的环己烯产物.

随后, Ghosh 课题组致力于[3]dendralenes 中取代基

的优化, 以期稳定骨架结构从而分离得到 dendralenes. 2016 年, Ghosh 课题组^[16]通过这种两次烯基化的策略, 成功合成并分离了三取代或四取代的[3]dendralenes (Scheme 2). 作者发现 2 号位和 4 号位基团的存在(无论是给电子基团还是吸电子基团), 使得 dendralenes 作为双烯体组分呈现 *s-trans* 构型, 因而避免了后续的自身 Diels-Alder 二聚反应. Ghosh 等^[16]进一步研究了产物 **5** 与 *N*-甲基马来酸酐(NMM)发生 D-A 反应的区域选择性, 结果表明位阻效应的影响比电子效应更加明显. 当 4 号位有芳基取代时位阻较大, 电子密度更大的双烯部分 B 区域由 *s-trans* 转化为 *s-cis* 的能垒较高, D-A 反应在 A 区域进行, 尽管 A 区域电子效应不利于反应进行; 当 4 号位为甲基取代时, 位阻影响较小, D-A 反应则在电子密度大的位置发生.

除 HWE 反应外, Parrain 课题组^[17]还报道了 Peterson 烯基化法用于构建 dendralenes 的研究. 作者以 3-溴-2,4-戊二烯基三甲基硅烷(**11**)为底物, 在有机锂试剂下经锂-溴交换反应后与醛/酮发生加成, 首先得到二烯基醇 **12**, 后经 Peterson 型 γ 消除即得到目标产物[3]dendralenes (**13**, Scheme 3). 衍生化实验表明 dendralenes 可以与多种亲双烯体(2 equiv.)发生两次 D-A 反应, 与环状亲双烯体反应则得到相应四环产物, 产物都只有一种非对映异构体. 而对于四氯苯醌, 即使用量达 2 equiv.也只能与 dendralenes 发生单次 D-A 反应, 但是其环加成产物还可以与 NMM 进一步发生 D-A 反应, 实现了多环骨架的快速构建.

近年来, 累积多烯烃化合物由于其独特的结构和反应活性, 已成为有机合成中重要的分子砌块. 累积多烯烃是分子中含有相邻碳碳双键的化合物, 中心碳原子为 sp 杂化因而具有线性结构, 其中研究最为深入的是累积二烯烃, 即联烯. 其特有的化学性质如金属催化的偶联和环化反应吸引了众多合成化学家的广泛关注^[18]. 反应多数涉及 π -烯丙基金属中间体, 并伴随环金属化、插入或者 β -消除、还原消除、质子化等反应历程, 为 [3]dendralenes 骨架的构建提供了可能, Scheme 4 总结了近年来由联烯构建 dendralenes 的方法.

2013 年, Glorius 课题组^[19]通过 Rh 催化导向基团辅助的烯炔 C—H 键活化以及联烯丙基醋酸酯(**15**)的偶联反应, 实现了[3]dendralenes 的合成. 该方法能够以中等以上的收率快速构建多种位置取代的[3]dendralenes (**16**, Scheme 5), 反应具有良好的官能团兼容性. 对于 3 位取代的[3]dendralenes, 当取代基不同时, 产物还表现出一定的立体选择性. 反应产物与亲双烯体 *N*-甲基马来酸酐和丁炔二酸二甲酯均可以较高的产率发生 Diels-Alder 反应. 作者提出了相应的反应机理, 首先是

Dendralene	Ar ¹	R ¹	R ²	Ar ²	Product from diene A (yield)	Product from diene B (yield)
5a	4-BrC ₆ H ₄	CO ₂ Et	Bn	4-MeOC ₆ H ₄	6a (69%)	—
5b	4-BrC ₆ H ₄	CO ₂ Et	Bn	3-ClC ₆ H ₄	6b (62%)	—
5c	Ph	CO ₂ Et	Me	4-MeOC ₆ H ₄	8c (41%)	7c (48%)
5d	Ph	CH ₂ OH	Me	4-MeOC ₆ H ₄	10d (10%)	9d (65%) <i>endo</i>

图式 2 HWE 反应合成[3]dendralenes 及其高区域选择性 Diels-Alder 反应研究

Scheme 2 Synthesis of [3]dendralenes through HWE reactions and their Diels-Alder reactions with unexpected regioselectivity

图式 3 3-溴-2,4-戊二烯基三甲基硅烷用于合成[3]dendralenes 及其环化反应制备多环化合物

Scheme 3 3-Bromopenta-2,4-dienylsilane as reagent for the preparation of [3]dendralenes and their cycloaddition reactions toward polycyclic compounds

图式 4 累积烯烃用于 dendralenes 的构建

Scheme 4 Synthesis of dendralenes from substituted cumulative alkenes

酰胺导向基团和特戊酸辅助 C—H 活化得到物种 **17**, 随后与联烯协同化、碳铑化得到 π -烯丙基铑(III)中间体 **18**, 该物种与 η^1 -烯丙基铑(III)配合物 **19** 处于平衡状态. 最后中间体 **18** 经 β -氧消除生成目标产物 **16**, 同时释放出催化剂铑(III)参与下一个催化循环.

Bäckvall 课题组^[20]的工作亦是通过对联烯碳碳单键的构筑合成[3]dendralenes. 在铑催化下, 联烯 **20** 与烯炔 **21** 作用, 通过烯丙基 C—H 键氧化与分子间 C—C 键的形成构建[3]dendralenes 衍生物 **22**, 此外作者也检测到了少量的联烯自偶联产物[4]dendralenes 衍生物(**23**, Scheme 6). 该策略不仅具有较高的原子经济性, 而且底物范围广, 为这类衍生物的合成提供了便捷、高效的途径. 在控制实验基础上, 作者提出了可能的反应机理. 首先, 二价铑和联烯反应获得中间体 **24**, 随后该物种经历选择性的联烯基 C—H 键断裂形成 π -烯丙基铑中间体 **25**. **25** 可能会转变为烯基铑中间体 **26**, 该物种发生分子间的烯炔插入反应生成铑中间体 **27**, 最后该物种发生 β -H 消除获得目标产物[3]dendralenes 衍生物 **22**, 同时释放出的零价铑被对苯二醌氧化参与下一个催化循环.

图式 5 铑催化导向基团辅助的烯炔 C—H 键活化以及联烯丙基碳酸酯的偶联反应合成[3]dendralenes

Scheme 5 Rhodium(III)-catalyzed alkenyl C—H activation and coupling reaction with allenyl carbinol carbonate to construct [3]dendralenes

图式 6 钯催化联烯丙基 C—H 键氧化与分子间 C—C 键形成构建[3]dendralenes

Scheme 6 Pd-catalyzed allenic C—H bond oxidation and intermolecular C—C bond formation for the synthesis of [3]dendralenes

2017 年, 宋传君和常俊标课题组^[21]在 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ 和 K_2CO_3 存在下, 实现了 3-芳基-(2-溴烯丙基)-1,3-二羧基化合物的二聚反应制备[3]dendralenes. 反应也可以视为是由联烯构建 dendralenes, 因为底物 **27** 在反应条件下首先脱去一分子 HBr 形成联烯 **28**, 然后与催化剂形成环状钯中间体 **29**, 在碱的作用下消除芳酰基生成[3]dendralenes 产物 **30**, 同时实现催化剂的再生(Scheme 7).

与一般的联烯比较而言, 缺电子联烯因吸电子基团的引入使得联烯结构中双键的电子云密度发生明显差异化, 使得亲电加成、亲核加成、环加成反应及多组分串联反应等更容易实现优秀的区域或立体选择性控制^[22]. 众所周知, 芳基膦氧基团的引入可以有效调控有机化合物的化学、生物学、医学和材料学功能. 在化学合成方面, 膦氧基团能有效改变与调节化学反应的区域选择性及立体选择性等性能^[23], 其作为联烯的取代基

图式 7 钯催化的去单芳酰基二聚合成[3]dendralenes
Scheme 7 Palladium-catalyzed monodearoylative dimerization approach for the synthesis of [3]dendralenes

团时甚至赋予联烯母体更为特别的性质. 2017 年, 吴磊课题组^[24]实现了钯催化下磷酰基取代的联烯 **31** 与 *N*-苯磺酰脲 **32** 的偶联反应, 以较高产率一步合成了各种磷酰基取代[3]dendralenes 衍生物 **33** (Scheme 8). 对照实验表明, 添加剂特戊酸钠在钯中间体的顺式 β -H 消除中的作用至关重要. 该方法与文献已知的 [3]dendralenes 合成方法相比展现出了较大的优势, 例如不需要导向基团辅助、不需要对反应底物进行预官能化及反应起始原料易得等. 在前人工作基础上, 作者提出了可能的反应机理. 首先二价钯在还原生成零价钯, 磷酰基取代联烯芳基醚在零价钯的作用下, 发生 $\text{C}(\text{sp}^3)\text{—O}(\text{Ar})$ 的断裂, 与钯形成 π -烯丙基-钯物种 **34**. 与此同时, *N*-苯磺酰脲在碱的作用下脱去 Ts^- , 形成重氮化合物并与 **34** 形成原位的 π -烯丙基钯卡宾物种 **35**, 同时作者并未检测到经由卡宾中间体 **35'** 生成的联烯副产物. 中间体 **35** 异构形成 **36**, 经迁移插入形成 **37**, **37** 发生 β -氢消除生成最终的催化产物 **33**, 同时释放出零价钯进行下一个循环. 但是该体系还存在一定的缺陷, 产物立体选择性难以控制, 仅有部分底物表现出明显的立体选择性($Z:E > 20:1$)且产率相对较低. 随后, 该课题组^[25]将新型次级膦氧化物稳定的 Au/Pd 纳米合金应用于共轭烯炔 **38** 的选择性催化氢化反应中, 高选择性地合成了 (*Z*) 及 (*Z,Z*)-[3]dendralenes 衍生物 **39**. 研究发现, 该体系底物适用性良好, 通过调节金属组分的比例, 能够控制共轭烯炔催化氢化的反应类型、催化效率和立体选择性(Scheme 9).

另一方面, 由于体系中的原料烯炔化合物是利用磷酰基取代联烯与炔烃经偶联炔基化反应得到的, 因此吴磊等^[26]进一步尝试了磷氧联烯与炔烃的炔基化、选择性氢化串联反应. 以金属共价键稳定的钯纳米粒子(Bin-PdNPs)为催化剂, 以磷酰基联烯 **31** 和端炔 **42** 为起始底物, 成功实现了 (*Z*) 及 (*Z,Z*)-[3]-dendralenes 的高产率、高立体选择性合成(Scheme 10). 反应底物适用性良好, 且具有很好的区域选择性和立体选择性. 值得一提的是,

图式 8 钯催化磷酰基取代联烯与 *N*-苯磺酰肼的偶联反应合成磷酰基[3]dendralenes

Scheme 8 Palladium-catalyzed coupling of allenylphosphine oxides with *N*-tosylhydrazones toward phosphinyl [3]dendralenes

Catalyst	Solvent	Ratio of 39/40/41	Yield/%
SPOs-AuNPs	EtOH	0/0/100	76
SPOs-PdNPs	EtOH	0/100/0	80
Au/PdNAs-1	EtOH	75/25/0	46
Au/PdNAs-2	EtOH	100/0/0	40
Au/PdNAs-3	EtOH	100/0/0	20
Au/PdNAs-2	DMAC	100/0/0	94

Au/PdNAs-1 (Au: 20.33%, Pd: 7.33%); Au/PdNAs-2 (Au: 33.43%, Pd: 6.61%) Au/PdNAs-3 (Au: 25.82%, Pd: 3.94%).

图式 9 金属组分控制的立体选择性氢化合成磷氧取代(Z)-[3]dendralenes

Scheme 9 Metal components-controlled regioselective hydrogenation toward phosphinyl (Z)-[3]dendralenes

图式 10 炔基化、选择性氢化串联反应合成磷酰基(Z)-[3]dendralenes

Scheme 10 Cascade alkynylation and selective hydrogenation to access phosphinyl (Z)-[3]dendralenes

以醋酸锰(III)和亚硝酸叔丁酯处理(Z)-[3]dendralenes **39a** 时,其可以转化为 *E* 构型。此外作者开展了衍生化研究,通过分子内的芳烃-烯烃氧化偶联反应,将[3]-dendralenes 转化为乙烯基萘酚衍生物 **43**。

以联烯为底物构建[3]dendralenes 的研究已经有了较多报道,但联烯一般为非商品化试剂,其作为起始原料往往需要预先合成,使得[3]dendralenes 的制备路线相对繁琐。Fañanás-Mastral 课题组^[27]利用炔烃的硼化/烯丙基化反应,实现了[3]dendralenes 分子的构建(Scheme 11),相比传统的卤素偶联反应合成 dendralenes(原料需

多步合成),该反应条件温和,操作简单,产率优越。优化条件下,铜催化剂首先与硼化试剂形成 LCu-Bpin 物种,该物种随后与炔的硼化过程(47)要明显快于与 1,4-二溴-2-丁烯的烯丙基化反应,且该历程表现出更好的区域选择性与立体选择性。随后 **47** 中间体与 1,4-二溴-2-丁烯发生选择性 S_N2 亲核取代反应生成 **48**,再经还原消除得到产物 **45**,其溴原子处于消除步骤所需的合适位置,在碱性条件下回流即可经消除反应即可得到硼化的[3]dendralenes 衍生物 **46**。有机硼官能团在合适的条件下可以进一步转化,通过偶联反应得到乙烯基取代的

图式 11 铜催化炔烃的烯丙基硼化构筑硼化[3]dendralenes

Scheme 11 Copper catalyzed allylboration of alkynes for the synthesis of borylated [3]dendralenes

环己二烯(**49**, 含环[3]dendralenes). 此外, 硼酸酯使得产物更加稳定, 能够与苯乙烯经交叉复分解反应得到 5 号位功能化的产物[4]dendralenes (**50**), 进一步丰富了 dendralenes 骨架构建的方法.

Dendralenes 是全合成领域中重要的有机合成砌块, 在多种具有复杂结构天然产物的经济性全合成中起到了关键作用^[10], 因此手性 dendralenes 的构建具有十分重要的意义^[7]. 2019 年, Antonchick 课题组^[28]以 Rh^{III}-Cp^x 为催化剂实现了 α -亚芳基吡唑酮 **51** 与炔的不对称环化, 得到一系列手性螺环化合物 **52**. 通过烯丙基醇氧化-Wittig 反应或 Corey-Fuchs 反应, 作者成功将该手性螺环化合物应用于多种手性 [3]dendralenes 的构建 (**53**, Scheme 12), 并得到较高的产率与 *ee* 值. 当产物 **53a** 与 4-苯基-3*H*-1,2,4-三唑啉-3,5-二酮(PTAD)作用时, 还可以通过 D-A 反应进一步衍生得到环加成产物 **54**.

2 高阶[n]dendralenes 的合成

在 2000 年以前, 仅有[3]-和[4]-dendralenes 的合成报道. 21 世纪初, 随着合成化学的快速发展, dendralenes 被证实是能稳定存在的, 并且这类特殊的化合物具有巨大的应用价值, 这一发现引起了广大研究者的兴趣, 随后其合成与应用迅速发展起来, 各种多取代或无取代 [n]dendralenes ($n > 4$) 被相继报道出来. 2000 年, Sherburn 等^[6]利用 3-环丁烯酮在 450 °C 高热条件下发生热消除成烯的方法首次实现了具有更高共轭单元的 dendralenes 的合成, 但是该方法条件比较苛刻. 随后, 该课题组^[12b]对格氏试剂和卤代烃偶联反应合成 dendralenes 的方法进行了改进, 以金属 Ni 催化氯丁二烯格氏试剂与偕二氯乙烯在室温下发生 Kumada-Tamao-Corriu (KTC) 偶联以及 Negishi 偶联反应合成[5]dendralenes. 与同系物[4]dendralenes 相比, [5]dendralenes 相对容易分解, 然而这类化合物可以溶解在 0.75 mol/L 的轻质汽油、二氯甲烷或四氢呋喃(THF)中, 同时在 -15 °C 下保存数月仅仅发生轻微分解. 2009 年, Sherburn 等^[9]在原有基础上继续探索了此类衍生物的合成与应用, 合成了[7]dendralenes, 并对[3]~[8]dendralenes 的合成方法进行了进一步优化(Scheme 13), 其最大合成产量高达 5 g. 此外, 作者在 Diels-Alder 反应的研究中发现, 奇数共轭单元的 dendralenes ([1]-, [3]-, [5]-)反应活性较偶数共轭单元的 dendralenes ([2]-, [4]-, [6]-)更高.

高阶 dendralenes 由于其大的共轭体系还可能在光电材料领域得到应用. 2010 年, Diederich 课题组^[29]在研究发色体的电荷转移时, 构建了高共轭单元的 dendralenes 骨架结构(Scheme 14). 共轭双键构建的关键是强给电子体四硫富瓦烯(TTF)、四氰基乙烯(TCNE)与寡聚炔

(a) Synthesis of bioactive spiropyrazolone derivatives

(b) Preparation of enantioenriched [3]dendralenes

(c) Derivative transformation of [3]dendralenes

图式 12 手性螺环[3]dendralenes 的构建

Scheme 12 Constructions of chiral spiro[3]dendralenes

炔 **55** 的[2+2]环加成/开环反应, 一步合成得到 1,3-二硫杂环戊烯和氨基取代的[6]-, [8]-和[10]-dendralenes, 产率最高为 58%. 类似结构的报道还有 Misaki 等^[30]的工作, 作者制备了 1,3-二硫杂环戊烯和氨基取代的[3]dendralenes 骨架并将其用于可充电电池的正极材料.

如前所述, 联烯作为累积二烯烃用于[3]dendralenes 的构建已有较多文献报道, 而对更多双键数的累积多烯烃的研究还相对较少. 2014 年, Tykwinski 等^[31]利用四芳基取代的累积[5]烯炔 **57** 与缺电子烯炔 **58** 的环加成反应成功构建了轴烯、环状[3]dendralenes 及[4]dendralenes (**62**, Scheme 15). 反应首先得到环外双联烯取代的环丁烷化合物 **59**, 该化合物仅能于低温下分离得到, 室温下即转化为轴烯 **60** 或环状[3]dendralenes **61**, **60** 再通过溴代可得到多取代的[4]dendralenes.

图式 13 KTC 以及 Negishi 偶联反应制备[3]~[8]dendralenes

Scheme 13 Practical syntheses of [3]~[8]dendralenes using KTC and Negishi couplings

图式 14 [2+2]环加成/开环反应制备[n]dendralenes

Scheme 14 Synthesis of [n]dendralenes through [2+2] cycloaddition/cycloreversion cascades

虽然[3]~[8]dendralenes的合成、表征与应用在过去十年中已相继被报道,但是更高共轭单元 dendralenes的合成仍然是一个挑战。2016年, Sherburn 等^[32]在前期工作基础上,通过对反应底物再设计成功将偶联反应从[3]~[8]dendralenes的合成拓展到[9]~[12]dendralenes (Scheme 16),作者在获得相应产物表征数据的同时,也间接证明更高共轭单元的 dendralenes 依然是相对稳定的。通过光谱分析和 dendralenes 与 *N*-甲基马来酰亚胺的 Diels-Alder 反应及理论计算,作者系统研究了[3]~[12]dendralenes 的物理和化学性质。结果表明,奇数共轭单元和偶数共轭单元的[n]dendralenes 反应性质的区别可能由其构象导致。

基于双卤素或双硼酸酯的双偶联法的发现使得较多共轭单元的 dendralenes 得以方便地合成出来。但是该方法往往局限于无取代的对称型 dendralenes,而单取代或非对称型的[n]dendralenes 的合成还鲜有报道。Tobman 课题组^[33]用 2-溴环丁酮 **63** 为起始原料,将其相继转化为 2-溴环丁基磷酸酯 **64** 和二取代环丁烯 **65**,最后通过环丁烯电环化开环反应构建共轭双键,可以合成 2,3-取代的 1,3-丁二烯 **66** 和端位取代的[3]~[4]dendralenes (**67** 和 **67'**, Scheme 17)。作者尝试用该方法制备[6]dendralenes 但是没有成功,推测是产物不稳定分解或直接转化为其他副产物导致的。

图式 15 四氰基乙烯与四芳基累积[5]烯烃的加成反应合成[4]轴烯和 dendralenes

Scheme 15 Formation of [4]radialene and dendralenes by addition of tetracyanoethylene to tetraaryl[5]cumulene

图式 16 双偶联合成[n]dendralenes 及[3]~[12]dendralenes 化学性质分析

Scheme 16 Double-cross coupling approach for the synthesis of [n]dendralenes and the analysis on chemical properties of [3]~[12]dendralenes

图式 17 电环化开环合成端位取代[3]~[4]dendralenes
Scheme 17 Synthesis of terminally substituted [3]~[4]dendralenes through electrocyclic ring-opening reaction

与此同时, Lipshutz 课题组^[34]报道了联烯酸酯用于合成[3]~[6]dendralenes 衍生物的研究. 与 Sherburn 所报道的工作不同, 作者利用钯催化的 Suzuki-Miyaura 和 Heck 偶联反应, 实现了取代的非对称型的[3]~[6]dendralenes 的构建(Scheme 18). 非对称 dendralenes 的合成成为区域选择性功能化某个双键提供了可能, 作者选用不同的氧化剂如间氯过氧化苯甲酸(*m*-CPBA)、过硫酸氢钾复合盐(Oxone)或过氧叔丁基锂(*t*-BuOOLi)实现了非对称[3]dendralenes 中双键的单一选择性氧化.

3 环化 dendralenes 的合成

在 dendralenes 分子中, 如果所有双键处于同一平面, *endo* 型的取代基将会产生明显的位阻, 因此 dendralenes 倾向于旋转单键以减小位阻, 使分子近似“螺旋桨”形状存在(Scheme 19)^[1a]. 但如果 dendralenes 置于环状分子中, 将会限制其单键的旋转, 对双键的排布及分子的化学性质产生影响. 因此将环化 dendralenes 在此部分单独介绍.

近来, 将硼化和 C—C 键的形成与环化结合, 一步反应快速构筑具有潜在价值的分子已经成为一个新的热点, 此外利用硼化产物的偶联特性, 进一步功能化可以得到更为复杂的分子骨架^[35]. 2012 年, Bäckvall 课题组^[36]将该策略应用到了 dendralenes 的构建, 以 Pd(OAc)₂ 为催化剂, 对苯醌(BQ)为氧化剂, 实现了联烯炔 68 的硼化环化, 合成了环化 dendralenes 分子. 作者发现, 底物取代基的改变会影响反应的选择性, 生成相应五元环 dendralenes 69 或乙烯基联烯 70 (Scheme 20, a). 2013 年, Bäckvall 课题组^[37]进一步通过改变反应条件实现了产物选择性的调控(Scheme 20, b). 在含有 LiOAc·2H₂O 的 1,2-二氯乙烷(DCE)介质中可以生成硼取代的[3]dendralenes 衍生物 71; 在含有 BF₃·Et₂O 的四氢呋喃(THF)介质中可以获得硼取代的烯丙基联烯 72. 作者通过动力学同位素效应研究证实: 反应的选择性取决于联烯炔中烯丙基或炔丙基 C—H 键断裂的竞争性, 生成相应的[3]dendralenes 或乙烯基联烯产物. 联烯通过烯丙基 C—H 键断裂进攻 Pd(II)物种 73 将得到 74 中间体, 随后发生炔烃插入反应生成 75 物种, 75 物种与

图式 18 钯催化取代联烯酸酯的偶联反应合成功能化[3]~[6]dendralenes

Scheme 18 Synthesis of functionalized [3]~[6]dendralenes through palladium-catalyzed cross-couplings of substituted allenates

图式 19 Dendralenes 中 C—C 单键的旋转

Scheme 19 Rotation of C—C bond in dendralenes molecules

B_2pin_2 发生转金属化以及还原消除最终得到硼取代的 [3]dendralenes 衍生物。而 **73** 中炔丙基 C—H 键的断裂进攻将会得到联烯钯物种 **76**，随后联烯骨架的分子内烯钯化产生 π -烯丙基钯中间体 **77**，最后 **77** 物种与 B_2pin_2 发生转金属化以及还原消除得到乙烯基联烯产物 **73**。

之后，Bäckvall 课题组^[38]又对钯催化联烯炔的硼化及碳环化反应的机理进行了系统的研究。同位素实验结果表明，烯丙位或炔丙位 C—H 键的活化发生在底物结合之后。水是反应选择性的重要参数，如果有过量的水存在，反应经烯丙基 C—H 键活化生成 dendralenes 产物；而生成乙烯基联烯的反应为零级反应，炔丙基 C—H 键

的活化是反应的决速步，少量的水存在会生成混合产物。加入 $BF_3 \cdot OEt_2$ 添加剂时，反应选择性生成乙烯基联烯产物，并且对芳基硼酸为一级反应。

在硼化、碳环化的基础上，2013 年，Bäckvall 课题组^[39]又实现了钯催化的联烯炔与端炔的多米诺氧化碳环化/炔基化反应。反应需 2 equiv. 的苯醌，也可以用催化量的苯醌和氧气替代，同时需要大环钴化合物作为电子转移介质。反应的底物适用性很好，并且与硼化/碳环化不同，该反应仅选择性生成五元环化 dendralenes，而没有乙烯基联烯产物(**78**, Scheme 21, a)。2014 年，Bäckvall 课题组^[40]又实现了钯催化的联烯炔与 CO 和醇的羰基化/碳环化反应(Scheme 21, b)。反应在常温下进行，二甲亚砜(DMSO)作为添加剂有效促进了反应的进行，反应仅需 1 mol% 的 $Pd(OAc)_2$ 催化剂和 101 kPa 的 CO，氧化剂也可以用催化量的苯醌和氧气替代，实现了温和条件下酯基取代的五元环化 [3]dendralenes **79** 的合成。

Bäckvall 课题组^[41]一直致力于金属催化的联烯分子内环化/串联反应，除联烯炔外，双联烯的环化反应也被成功用于构建 dendralenes 骨架。2016 年，该课题组^[42]以 1,4-双联烯 **80** 为底物，在钯催化下与苯硼酸发生多米诺串联碳环化-芳基化反应(Scheme 22, a)，得到六元环

图式 20 底物控制(a)和反应条件控制(b)的钯催化联烯炔的硼化、碳环化反应

Scheme 20 Palladium-catalyzed borylating carbocyclizations of allenynes with (a) structural difference determined selectivity and (b) reaction conditions controlled selectivity

图式 21 联烯炔碳环化反应构建环化[3]dendralenes

Scheme 21 Carbocyclization of allenynes for the construction of cyclo-[3]dendralenes

[3]dendralenes 产物 **81**. 实验证明钯源和溶剂对反应所呈现的选择性和活性影响较大. 反应经历烯丙基钯中间体, 有趣的是, 在没有亲核试剂情况下的优势路径是氧化碳环化- β -消除生成 **82** (Scheme 22, a). 随后该课题组^[43]继续探索了该类联烯衍生物在钯催化下的插羧碳环化反应, 制备了[3]、[4]和[5]dendralenes 衍生物 (Scheme 22, b), 与作者之前的工作相比, 该研究首次将双联烯应用于七元环(**83**)的构筑中. 接着作者^[44]又报道了钯催化 1,4-双联烯的选择性串联碳环化-硼化反应, 得到硼取代的六元环化[3]dendralenes, 其芳基硼中间体还可以由醛捕捉, 高立体选择性地生成含 dendralenes 骨架的醇 **85** (Scheme 22, c).

Scheme 23 总结了以联烯炔或双联烯为底物分子内环化构建 dendralenes 的方法. 除分子内环化外, 过渡金属催化的分子间环化构建 dendralenes 的研究也有报道. 2012 年, Haak 课题组^[45]在 Ru/环戊二烯酮试剂催化下, 实现了 1-乙炔基炔丙醇和 1,3-二羰基化合物的烯丙基化、环化串联反应 (Scheme 24). 当用双亚苄基取代的炔丙醇 **86** 为底物时可以得到产物环化[3]dendralenes **87**. 随后, 作者^[46]进一步拓展底物范围, 并将烯丙基化、环化反应与 dendralenes 的 D-A 反应串联起来, 实现了天然产物类似骨架 **88** 的快速、高选择性、一锅法合成.

2016 年, Tanaka 课题组^[47]以 Rh(I)/Binap 为催化剂, 利用联烯与炔烃的二聚/三聚反应实现了[3]dendralenes 的构建. 作者发现底物的取代基对反应选择性有明显的影响, 单取代的联烯会以两分子参与反应, 与一分子取代炔烃发生环化三聚生成六元环[3]dendralenes 产物, 而对双取代、三取代的联烯及无取代的炔烃而言, 仅发生二聚反应, 最终通过 Rh 环状中间体的 β -H 消除得到非环[3]dendralenes (Scheme 25). 作者认为该反应产生区域选择性的原因在于联烯取代基与铑配体间空间排

Method A: Pd(OAc)₂ (5 mol%), F₄-BQ (1.5 equiv.), B₂pin₂ (2 equiv.), Na₂CO₃ (20 mol%), DCE, r.t., 7 h.
Method B: Pd(OAc)₂ (5 mol%), F₄-BQ (20 mol%), Co(salophen) (5 mol%), B₂pin₂ (2 equiv.), Na₂CO₃ (20 mol%), DCE, r.t., O₂ balloon, 7 h.

图式 22 催化双联烯的选择性串联反应

Scheme 22 Palladium-catalyzed selective cascade reaction of bisallenenes

斥作用大小的不同. 也给出了得到各种产物的反应路径. 首先, 联烯 **89**、炔烃和 Rh(I)生成环戊烯铑化合物 **92**, 通过另一分子联烯的插入得到中间体 **93**, 再经还原消除最终得到环化三聚产物 **90**. 少量的产物 **90'**可能是联烯插入 **92** 时产生的异构体 **94** 形成的. 另一方面, 二取代和三取代的联烯与 Rh(I)生成环戊烯铑中间体 **95**, 经 β -H 消除(**96**)、还原消除最终得到二聚产物 **91**.

图式 23 联烯炔/双联烯分子内环化构建环化 dendralenes

Scheme 23 Construction of cyclo-dendralenes with allenynes or bisallenynes through intermolecular cyclization

图式 24 Ru 催化的烯丙基化-环化反应构建环化[3]dendralenes 及串联反应制备复杂多环化合物

Scheme 24 Ruthenium-catalyzed allylation-cyclization reactions for the synthesis 2,3-cyclo[3]dendralenes and cascade reactions toward complex polycyclic compounds

2019 年,邵志会课题组^[48]实现了钯催化的联烯酯不对称环加成反应,通过改变配体可以控制反应路径,实现[4+1]或[4+3]环加成(Scheme 26).当以 Pd(cod)Cl₂ 为催化剂, PPh₃ 为配体时,联烯乙酸酯 **92** 与吡唑啉酮 **93** 经[4+3]环化/偶联反应,以优秀的产率得到一系列含氧杂七元环的[3]dendralenes **94**,且反应的立体选择性高,

主要生成 *E* 构型的[3]dendralenes (*E* : *Z* > 20 : 1).

4 结语与展望

Dendralenes(戟烯)作为一类交叉共轭低聚烯烃,因其独特的结构和应用价值受到了越来越多研究者的关注,各种多取代或无取代的 $[n]$ dendralenes 被相继合成出来. Dendralenes 已被成功应用于多种经典有机反应,如 D-A 反应、乙烯基 Nazarov 环化反应以及有机催化多米诺环化反应等,在一些重要的功能性材料以及天然产物的快速合成中发挥着重要的作用.

总结了近十年来 Dendralenes 催化合成研究进展, 包括[3]~[12]非环状 dendralenes 和五元/六元/七元环化[3]dendralenes, 以期对未来 dendralenes 的研究发展提供一定的借鉴. 如今 dendralenes 的合成方法已不局限于烯基金属试剂与(双)卤代烯烃的偶联反应, 底物、催化剂和合成方法的多样性, 更促进了 dendralenes 研究领域的蓬勃发展. 另一方面, 目前多取代的 dendralenes 的合成还大都局限于[3]dendralenes, 对于多取代的[n]dendralenes 合成研究还较少. 高阶 dendralenes 的合成及其立体选择性控制仍然是最具挑战性的领域. 此外, 环境友好的光催化、电催化合成 dendralenes 及其自由基串联反应也将是未来发展的方向.

图式 25 Rh 催化的联烯与炔烃的环化三聚/二聚反应

Scheme 25 Rhodium-catalyzed cyclotrimerization and dimerization of allenes with alkynes

图式 26 钯催化联烯酯[4+3]环加成/偶联反应构建[3]dendralenes

Scheme 26 Palladium-catalyzed [4+3] cycloaddition/cross-coupling of allenic esters to construct [3]dendralenes

References

- [1] (a) Hopf, H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1984**, 23, 948.
(b) Hopf, H. *Nature* **2009**, 460, 183.
(c) Hopf, H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2001**, 40, 705.
(d) Sherburn, M. S. *Acc. Chem. Res.* **2015**, 48, 1961.
(e) Hopf, H.; Sherburn, M. S. *Cross Conjugation-Modern Dendralene, Radialene and Fulvene Chemistry*, Wiley-VCH, Verlag GmbH & Co. KGaA, **2016**.
- [2] Hopf, H. *Classics in Hydrocarbon Chemistry: Syntheses, Concepts, Perspectives*, Wiley-VCH, Weinheim, **2000**, p. 103.
- [3] Paul, R.; Tchelitcheff, S. C. R. *Hebd. Seances Acad. Sci.* **1951**, 232, 1939.
- [4] (a) Bolmquist, A. T.; Verdol, J. A. *J. Am. Chem. Soc.* **1955**, 77, 81;
(b) Bailey, W. J.; Economy, J. *J. Am. Chem. Soc.* **1955**, 77, 1133;
(c) Bailey, W. J.; Nielsen, N. A. *J. Org. Chem.* **1962**, 27, 3088.
- [5] (a) Bradford, T. A.; Payne, A. D.; Willis, A. C.; Paddon-Row, M. N.; Sherburn, M. S. *J. Org. Chem.* **2010**, 75, 491.
(b) Hopf, H.; Sherburn, M. S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, 51, 2298.
(c) Naidua, G. S.; Singh, R.; Ghosh, S. K. *Synlett* **2018**, 29, 282.
- [6] Fielder, S.; Rowan, D. D.; Sherburn, M. S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2000**, 39, 4331.
- [7] Brummond, K. M.; Chen, H.; Sill, P.; You, L. *J. Am. Chem. Soc.* **2002**, 124, 15186.
- [8] Miller, N. A.; Willis, A. C.; Paddon-Row, M. N.; Sherburn, M. S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2007**, 46, 937.
- [9] Payne, A. D.; Bojase, G.; Paddon-Row, M. N.; Sherburn, M. S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, 48, 4836.
- [10] (a) Stehling, L.; Wilke, G. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1988**, 27, 571.
(b) Payne, A. D.; Willis, A. C.; Sherburn, M. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, 127, 12188.
(c) Pellissier, H. *Tetrahedron* **2005**, 61, 6479.
(d) Frontier, A. J.; Collison, C. *Tetrahedron* **2005**, 61, 7577.
(e) Tius, M. A. *Eur. J. Org. Chem.* **2005**, 2193.
(f) Pronin, S. V.; Shenvi, R. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, 134, 19604;
(g) Fallon, T.; Willis, A. C.; Paddon-Row, M. N.; Sherburn, M. S. *J. Org. Chem.* **2014**, 79, 3185.
(h) Desfeux, C.; Besnard, C.; Mazet, C. *Org. Lett.* **2020**, 22, 8181.
- [11] (a) Bloomquist, A. T.; Verdol, J. A. *J. Am. Chem. Soc.* **1955**, 77, 81.
(b) Bailey, W. J.; Economy, J. *J. Am. Chem. Soc.* **1955**, 77, 1133.
(c) Bloomquist, A. T.; Verdol, J. A. *J. Am. Chem. Soc.* **1955**, 77, 1806.
(d) Bailey, W. J.; Cunov, C. H.; Nicholas, L. *J. Am. Chem. Soc.* **1955**, 77, 2787.
(e) Martin, H. D.; Echert-Macsic, M.; Mayer, B. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1980**, 19, 807.
(f) Hopf, H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1982**, 21, 286.
(g) Hopf, H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **1984**, 23, 947.
(h) Brain, P. T.; Smart, B. A.; Robertson, H. E.; Davis, M. J.; H. Rankin, D. W.; Henry, W. J.; Gosney, I. *J. Org. Chem.* **1997**, 62, 2767.
(i) Woo, S.; Squires, N.; Fallis, A. G. *Org. Lett.* **1999**, 1, 573.
(j) Woo, S.; Legoupy, S.; Parra S.; Fallis, A. G. *Org. Lett.* **1999**, 1, 1013.
(k) Le Nôte, J.; Martinez, A. A.; Dixneuf, P. H.; Bruneau, C. *Tetrahedron* **2003**, 59, 9425.
(l) Park S.; Lee, D. *Synthesis* **2007**, 2313.
- [12] (a) Shimizu, M.; Kurahashi, T.; Shimono, K.; Tanaka, K.; Nagao, I.; Kiyomoto, S.; Hiyama, T. *Chem.-Asian J.* **2007**, 2, 1400.
(b) Bojase, G.; Payne, A. D.; Willis, A. C.; Sherburn, M. S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, 47, 910.
- [13] George, J.; Ward, J. S.; Sherburn, M. S. *Chem. Sci.* **2019**, 10, 9969.
- [14] Ghosh, S. K.; Singh, R.; Date, S. M. *Chem. Commun.* **2003**, 636.
- [15] Singh, R.; Ghosh, S. K. *Chem. Commun.* **2011**, 47, 10809.
- [16] (a) Singh, R.; Naidu, G. S.; Ghosh, S. K. *Proc. Natl. Acad. Sci., India, Sect. A Phys. Sci.* **2016**, 86, 619.
(b) Naidu, G. S.; Singh, R.; Kumarb, M.; Ghosh, S. K. *RSC Adv.*

- 2016, 6, 37136.
- [17] Rahif, M.; Roux, M.; Thibonnet, J.; Parrain, J.-L. *Mol. Diversity* **2013**, 17, 49.
- [18] (a) Ma, S. *Chem. Rev.* **2005**, 105, 2829.
(b) Ye, J.; Ma, S. *Acc. Chem. Res.* **2014**, 47, 989.
(c) Jia, M.; Ma, S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2016**, 55, 9134.
- [19] Wang, H.; Beiring, B.; Yu, D.-G.; Collins, K. D.; Glorius, F. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, 52, 12430.
- [20] Qiu, Y.; Posevins, D.; Bäckvall, J.-E. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2017**, 56, 13112.
- [21] Zhang, T.; Song, C.; Meng, Y.; Chen, P.; Xu, H.; Chang, J. *J. Org. Chem.* **2017**, 82, 9905.
- [22] (a) Lu, X.-Y.; Zhang, C.-M.; Xu, Z.-R. *Acc. Chem. Res.* **2001**, 34, 535.
(b) Cowen, B. J.; Miller, C. J. *Chem. Soc. Rev.* **2009**, 38, 3102.
(c) Pei, C.-K.; Shi, M. *Chem.-Eur. J.* **2012**, 18, 6712.
- [23] (a) Yang, Y.; Qiu, X.; Zhao, Y.; Mu, Y.; Shi, Z. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, 138, 495.
(b) Yang, Y.; Li, R.; Zhao, Y.; Zhao, D.; Shi, Z. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, 138, 8743.
- [24] Mao, M.; Zhang, L.; Chen, Y.-Z.; Zhu, J.; Wu, L. *ACS Catal.* **2017**, 7, 181.
- [25] Xia, Y.-T.; Xie, X.-Y.; Cui, S.-H.; Ji, Y.-G.; Wu, L. *Chem. Commun.* **2019**, 55, 11699.
- [26] Xia, Y.-T.; Wu, J.-J.; Zhang, C.-Y.; Mao, M.; Ji, Y.-G.; Wu, L. *Org. Lett.* **2019**, 21, 6383.
- [27] Rivera-Chao, E.; Fañanás-Mastral, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2018**, 57, 9945.
- [28] Li, H.; Gontla, R.; Flegel, J.; Merten, C.; Ziegler, S.; Antonchick, A. P.; Waldmann, H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2019**, 58, 307.
- [29] Frank, B. B.; Kivala, M.; Blanco, B. C.; Breiten, B.; Schweizer, W. B.; Laporta, P. R.; Biaggio, I.; Jahnke, E.; Tykwinski, R. R.; Boudon, C.; Gisselbrecht, J.-P.; Diederich, F. *Eur. J. Org. Chem.* **2010**, 2487.
- [30] Yamauchi, T.; Shibata, Y.; Aki, T.; Yoshimura, A.; Yao, M.; Misaki, Y. *Chem. Lett.* **2018**, 47, 1176.
- [31] Januszewski, J. A.; Hampel, F.; Neiss, C.; Gçrling, A.; Tykwinski, R. R. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, 53, 3743.
- [32] Saglam, M. F.; Fallon T.; Paddon-Row, M. N.; Sherburn, M. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, 138, 1022.
- [33] Polák, P.; Tobrman T. *Eur. J. Org. Chem.* **2019**, 957.
- [34] Lippincott, D. J.; Linstadt, R. T. H.; Maser, M. R.; Lipshutz, B. H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2017**, 56, 847.
- [35] (a) Miyaoura, N.; Suzuki, A. *Chem. Rev.* **1995**, 95, 2457.
(b) Kennedy, J. W. J.; Hall, D. G. *J. Am. Chem. Soc.* **2002**, 124, 11586.
(c) Ishiyama, T.; Miyaoura, N. *Chem. Rec.* **2004**, 3, 271.
(d) Clay, J. M.; Vedejs, E. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, 127, 5766.
(e) Mkhali, I. A. I.; Barnard, J. H.; Marder, T. B.; Murphy, J. M.; Hartwig, J. F. *Chem. Rev.* **2010**, 110, 890.
- [36] Deng, Y.; Bartholomeyzik, T.; Persson, A. K. Å.; Sun, J.; Bäckvall, J.-E. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, 51, 2703.
- [37] Deng, Y.; Bartholomeyzik, T.; Bäckvall, J.-E. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, 52, 6283.
- [38] Bartholomeyzik, T.; Pendrill, R.; Lihammar, R.; Jiang, T.; Widmalm, G.; Bäckvall, J.-E. *J. Am. Chem. Soc.* **2018**, 140, 298.
- [39] Volla, C.; M. R.; Bäckvall, J.-E. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, 52, 14209.
- [40] Volla, C. M. R.; Mazuela, J.; Bäckvall, J.-E. *Chem.-Eur. J.* **2014**, 20, 7608.
- [41] Yang, B.; Qiu, Y.; Bäckvall, J.-E. *Acc. Chem. Res.* **2018**, 51, 1520.
- [42] Volla, C. M. R.; Bäckvall, J.-E. *ACS Catal.* **2016**, 6, 6398.
- [43] Zhu, C.; Yang, B.; Qiu, Y.; Bäckvall, J.-E. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2016**, 55, 14405.
- [44] Naidu, V. R.; Posevins, D.; Volla, C. M. R.; Bäckvall, J.-E. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2017**, 56, 1590.
- [45] Jonek, A.; Berger, S.; Haak, E. *Chem.-Eur. J.* **2012**, 18, 15504.
- [46] Thies, N.; Haak, E. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, 54, 4097.
- [47] Sakashita, K.; Shibata, Y.; Tanaka, K. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2016**, 55, 6753.
- [48] Li, L.; Luo, P.; Deng, Y.; Shao, Z. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2019**, 58, 4710.

(Lu, Y.)