以森田-贝里斯-希尔曼(MBH)碳酸酯为原料合成多取代
1,4-二氢喹啉类衍生物

史鸿燕 钟莹* 赵志刚*

(西南民族大学化学与环境保护工程学院 成都 610041)

摘要 以森田-贝里斯-希尔曼(MBH)碳酸酯和活泼亚甲基类化合物为原料,在叔胺的催化下,经历两次亲核取代反应得到关键叠氮中间体,再与三苯基膦作用经连续的 Staudinger 反应、分子内 aza-Wittig 反应及异构化等,在温和的反应条件下合成了 17 个新的多取代 1,4-二氢喹啉类衍生物。中间体及目标化合物均为新化合物,其结构均经红外光谱、高分辨质谱、核磁共振氢谱和核磁共振碳谱确证。

关键词 1,4-二氢喹啉; 氮杂 Wittig 反应; MBH 碳酸酯; 叠氮化物

Synthesis of Multi-substituted 1,4-Dihydroquinoline Derivatives from Morita-Baylis-Hillman (MBH) Carbonates

Shi, Hongyan Zhong, Ying* Zhao, Zhigang*

(College of Chemistry & Environment Protection Engineering, Southwest Minzu University, Chengdu 610041)

Abstract Using Morita-Baylis-Hillman (MBH) carbonates and active methylene compounds as raw materials, the key azide intermediates were obtained through two nucleophilic substitution reactions catalyzed by tertiary amine. Then, seventeen new multi-substituted 1,4-dihydroquinoline derivatives were obtained by sequential Staudinger/intramolecular aza-Wittig/isomerization reactions of the azide intermediates with triphenylphosphine under mild conditions. The intermediates and target compounds are all new compounds, and their structures have been confirmed by IR, HRMS, ^1H NMR and ^{13}C NMR techniques.

Keywords 1,4-dihydroquinolines; aza-Wittig reaction; Morita-Baylis-Hillman (MBH) carbonate; azide

喹啉类化合物是一类重要的含氮杂环化合物,具有广泛的生物活性和应用价值^[1]。比如奎宁、氯喹和他非诺喹等是商品化的抗疟药物(图 1)^[2-6],此外,还有一些喹啉类化合物表现出良好的抗疟性^[7]、抗菌性^[8-9]、抗病毒性^[10]、抗结核活性^[11]及抗肿瘤活性^[12]等。因此,喹啉类杂环常作为医药或农药母体结构引入到药物分子中。

膦亚胺叶立德的氮杂 Wittig 反应已被广泛应用于含氮杂环的合成,并且成为一种合成新型含氮杂环及具有生物活性杂环化合物的有效方法^[13-22],该方法原料易得,反应条件温和,操作简便,不论对于分子内反应还是分子间反应都有很好的收率^[23]。我们^[24-27]曾应用氮杂 Wittig 反应作为关键步骤,合成了一系列杂环化合物。

本文在已有研究基础上,利用森田-贝里斯-希尔曼

图 1 具有生物活性的喹啉类药物

Figure 1 Biologically active quinolines

(MBH)碳酸酯 **1** 和活泼亚甲基类化合物 **2** 为原料,在叔胺的催化下,经历两次亲核取代反应得到关键叠氮中间体 **3**,再与三苯基膦作用经 Staudinger 反应、分子内氮杂 Wittig 反应及异构化合成了一系列多取代 1,4-二氢喹啉类衍生物(Scheme 1)。

* Corresponding authors. E-mail: zyswun@163.com; zzg63129@163.com

Received August 12, 2020; revised September 8, 2020; published online September 29, 2020.

Project supported by the Fundamental Research Funds for the Central Universities, Southwest Minzu University (No. 2018NQ35)

西南民族大学中央高校基本科研业务费专项资金(No. 2018NQ35)资助项目。

图式 1 1,4-二氢喹啉衍生物的合成

Scheme 1 Synthesis of 1,4-dihydroquinoline derivatives

1 结果与讨论

1.1 中间体 3 的合成

利用 MBH 反应合成了含叠氮基的 MBH 碳酸酯 2-[(2-叠氮基苯基)叔丁氧酰氧基甲基]丙烯酸酯(**1**), 利用 Lewis 碱催化其与活泼亚甲基类化合物 **2** 反应, 得到取代产物 **3**. 以 MBH 碳酸酯 **1a** 与 3,5-庚二酮的反应作为模型反应, 系统考察 Lewis 碱种类、碱的用量、溶剂及反应温度对反应的影响, 结果见表 1.

表 1 反应条件优化^a

Table 1 Optimization of reaction conditions

Entry	Catalyst	Catalyst/ mol%	Solvent	T/°C	Time/h	Yield ^b /%
1	DABCO	10	DCM	30	3	60
2	DMAP	10	DCM	30	3	44
3	DBU	10	DCM	30	4	NP
4	Et ₃ N	10	DCM	30	4	NR
5	CH ₃ ONa	10	DCM	30	4	NR
6	K ₂ CO ₃	10	DCM	30	4	NR
7	DABCO	5.0	DCM	30	3	56
8	DABCO	7.5	DCM	30	3	65
9	DABCO	15	DCM	30	4	40
10	DABCO	20	DCM	30	4	NP
11	DABCO	7.5	CH ₃ CN	30	3	47
12	DABCO	7.5	THF	30	3	NP
13	DABCO	7.5	DMF	30	3	20
14	DABCO	7.5	DCE	30	3	45
15	DABCO	7.5	DCM	25	3	52
16	DABCO	7.5	DCM	35	3	70
17	DABCO	7.5	DCM	40	3	55

^a Reaction conditions: MBH carbonate **1a** (1.0 equiv.), heptane-3,5-dione (**2a**) (1.05 equiv.), solvent (3 mL), air; ^b Isolated yields.

在对路易斯碱的筛选中, 主要选用叔胺类(Entries 1~4)、甲醇钠(Entry 5)以及无机碱碳酸钾(Entry 6), 发现三乙二胺(DABCO)催化效果最佳; 接着对催化剂用量进行了筛选(Entries 7~10), 当催化剂用量为 7.5 mol%时催化效果最佳, 且碱的用量过高对反应明显不

利; 然后, 在对常见溶剂的筛选中发现二氯甲烷作溶剂时效果最好(Entries 8, 11~14); 此外, 温度变化对反应产率影响明显(Entries 15~17), 35 °C下反应产率最高. 通过以上条件优化, 获得了最优条件为: MBH碳酸酯 **1a** 与 3,5-庚二酮物质的量比为 1 : 1.05, 催化剂 DABCO 用量为 7.5 mol%, 二氯甲烷为溶剂, 反应温度为 35 °C, 反应时长 3 h (表 1, Entry 16). 在该最优化的反应条件基础上, 系统考察 MBH 碳酸酯 **1** 与一系列不同的含羰基的活性亚甲基类化合物 **2** 的反应情况, 结果见表 2.

由表 2 可知, 该反应对不同的含羰基的活性亚甲基类化合物 **2** 有较好的适用性. 实验结果显示, 不论 R 为甲基或乙基, 对产物产率并无明显影响. 当选用 1,3-二酮类化合物为底物时, 以中等到较好的产率得到产物 **3a**~**3e**, 且开链二酮产率明显好于环状二酮; 当使用 β-羰基酯类化合物参与反应时能以较高的产率得到产物 **3f**~**3l**, 均为无法分离的非对映异构体, 其 *dr* 值在 50 : 50 到 60 : 40 之间, 当 R¹ 为甲基时(**3f**~**3k**), 随着 EWG 基团空间位阻的增大产率降低, 当 EWG 为乙氧酰基时(**3f**, **3g**, **3l**), 产率也随着 R¹ 位阻的增大而降低; 使用丙二酸二酯类化合物时(**3m**, **3n**, **3o**), 均能得到产物, 产率也与空间位阻有关, 位阻小的产率更高; 使用氰乙酸乙酯参与反应时, 可以较高的产率得到化合物 **3p**, 为无法分离的非对映异构体; 值得一提的是, 当使用 2-吡啶酮参与反应时, 主要得到吡啶 1 位 N—H 取代的产物 **3q**, 但在反应体系中也分离得到少量 3 位 C—H 取代的产物 **3q'**; 当使用乙酰乙酰胺类化合物时, 也能以中等产率得到产物 **3r** 和 **3s**.

1.2 目标化合物 5 的合成

含叠氮基的中间体 **3** 在室温下与三苯基膦发生 Staudinger 反应, 生成膦亚胺 **4**, 膦亚胺 **4** 不经分离, 直接在甲苯中回流, 可以良好的产率得到未见文献报道的 1,4-二氢喹啉类化合物 **5** (表 3). 对代表性化合物 **5i** 进行单晶衍射分析进一步确证了所合成产物的结构(图 2)^[28]. 中间体 **3a**~**3q** 都可以顺利地得到最终产物, 但由于 **3q'** 分离得到的量非常少, 并未得到最终产物, 而酰胺类中间体 **3r** 和 **3s** 因为酰胺羰基活性较低, 也未得到最终产物. 该方法连续进行, 反应条件温和, 操作简便.

表 2 中间体 3 的合成^a
Table 2 Synthesis of intermediate 3

^a Isolated yields. ^b In addition to 3q, 3q' was obtained by the reaction of substrate 1a with 2-indolinone.

图 2 化合物 5i 的单晶结构

Figure 2 Single-crystal structure of compound 5i

依据文献报道^[29]和前期工作基础,我们提出了叔胺催化 MBH 碳酸酯与含羰基的活泼亚甲基类化合物合

成 1,4-二氢喹啉类化合物的反应机理(Scheme 2). 叔胺作为亲核试剂进攻 MBH 碳酸酯 1, 得到中间体 A, 同时消除的叔丁氧负离子作碱夺取活性亚甲基 2 上活泼氢形成烯醇氧负离子 B, B 再次作为亲核试剂进攻 A, 消除叔胺得到产物 3, 再与三苯基膦作用, 依次发生 Staudinger 反应得到磷亚胺中间体 4, 再经历分子内氮杂 Wittig 反应环化得到中间体 C, C 最终异构化得到目标产物 5.

2 结论

利用含邻叠氮基的 MBH 碳酸酯与含活泼亚甲基的羰基化合物作用, 在叔胺催化下, 连续发生两次亲核取代反应得到叠氮中间体, 再与三苯基膦作用通过 Staudinger 反应生成磷亚胺, 再发生分子内氮杂 Wittig

表 3 目标化合物 5 的合成^a
Table 3 Synthesis of target compounds 5

^a Isolated yields.

图示 2 构建 1,4-二氢喹啉的可能机理
Scheme 2 Plausible mechanism for construction 1,4-dihydroquinolines

反应, 进一步异构化后得到 17 个新型 1,4-二氢喹啉类化合物, 该方法条件温和, 原料易得, 操作简便。

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

使用薄层色谱(TLC)技术跟踪反应(紫外灯检测波长 254, 365 nm). 柱层析使用黄海 200~300 目硅胶. Agilent 400 MHz 核磁共振仪(内标为 TMS, 溶剂为 CDCl_3 或 $\text{DMSO}-d_6$); Thermo Scientific LTQ Orbitrap XL

型高分辨质谱仪; PERKIN-ELMER 1700 型傅里叶变换红外光谱仪(KBr 压片). 底物 2-[(2-叠氮基苯基)叔丁氧酰氧基甲基]丙烯酸酯 1 参考已报道的文献制备^[30-32].

3.2 实验方法

3.2.1 中间体 3 的合成

以 3-(2-叠氮基)-2-亚甲基-5-氧代-4-丙酰基庚酸甲酯(3a)为例: 室温下, 向 50 mL 的圆底烧瓶中加入 2-[(2-叠氮基苯基)叔丁氧酰氧基甲基]丙烯酸甲酯(1a) (0.5 mmol), DABCO (0.037 mmol), 无水二氯甲烷(3

mL), 将混合物搅拌 10 min, 之后加入含羰基的活性亚甲基类化合物 3,5-庚二酮(**2a**) (0.52 mmol), 室温下继续反应, 薄层色谱(TLC)跟踪反应进程, 2 h 后反应完全, 减压浓缩去溶剂得粗产物, 粗产物经柱层析[*V*(石油醚): *V*(乙酸乙酯)=10:1~6:1]分离, 得到中间体叠氮化合物 **3a**。

3-(2-叠氮苯基)-2-亚甲基-5-氧代-4-丙酰基庚酸甲酯(**3a**): 黄色油状物, 产率 70%。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.31~7.23 (m, 2H), 7.12~7.04 (m, 2H), 6.26 (s, 1H), 5.85 (s, 1H), 5.03 (d, *J*=12.0 Hz, 1H), 4.88 (d, *J*=12.0 Hz, 1H), 3.67 (s, 3H), 2.59~2.51 (m, 2H), 2.38~2.29 (m, 1H), 2.22~2.12 (m, 1H), 0.99 (t, *J*=6.0 Hz, 3H), 0.77 (t, *J*=6.0 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 205.13, 204.76, 166.32, 139.00, 138.24, 129.96, 128.62, 127.32, 124.85, 118.72, 70.17, 51.94, 41.79, 35.90, 35.20, 7.36, 7.26; IR (KBr) ν : 3423, 2953, 2134, 1732, 1453, 1304, 757 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₁₈H₂₁N₃O₄Na (M+Na)⁺ 366.1424, found 366.1428。

3-(2-叠氮苯基)-2-亚甲基-5-氧代-4-丙酰基庚酸乙酯(**3b**): 黄色油状物, 产率 65%。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.30 (d, *J*=7.6 Hz, 1H), 7.25 (t, *J*=7.6 Hz, 1H), 7.10 (d, *J*=8.0 Hz, 1H), 7.06 (t, *J*=7.6 Hz, 2H), 6.27 (s, 1H), 5.81 (s, 1H), 5.04 (d, *J*=12.0 Hz, 1H), 4.85 (d, *J*=12.0 Hz, 1H), 4.11 (qd, *J*=7.0, 1.6 Hz, 2H), 2.63~2.48 (m, 2H), 2.39~2.29 (m, 1H), 2.20~2.10 (m, 1H), 1.22 (t, *J*=7.2 Hz, 3H), 1.00 (t, *J*=7.2 Hz, 3H), 0.76 (t, *J*=7.2 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 205.14, 204.79, 165.89, 139.37, 138.23, 129.98, 128.60, 126.95, 124.81, 118.67, 70.26, 60.92, 41.67, 35.97, 35.15, 13.97, 7.37, 7.26; IR (KBr) ν : 3420, 2947, 2134, 1726, 1494, 1304, 1153, 759 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₁₉H₂₃N₃O₄Na (M+Na)⁺ 380.1581, found 380.1579。

4-乙酰基-3-(2-叠氮基苯基)-2-亚甲基-5-氧代己酸甲酯(**3c**): 黄色油状物, 产率 73%。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.33 (dd, *J*=7.6, 1.2 Hz, 1H), 7.26 (t, *J*=7.2 Hz, 1H), 7.17~7.06 (m, 2H), 6.28 (s, 1H), 5.88 (s, 1H), 5.00 (d, *J*=12.4 Hz, 1H), 4.91 (d, *J*=12.0 Hz, 1H), 3.68 (s, 3H), 2.22 (s, 3H), 1.96 (s, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 202.51, 202.10, 166.23, 138.79, 138.18, 129.92, 129.30, 128.67, 127.42, 124.88, 118.73, 71.45, 51.92, 41.72, 29.57, 29.24; IR (KBr) ν : 3423, 2966, 2133, 1730, 1493, 1152, 756 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₁₆H₁₇N₃O₄Na (M+Na)⁺ 338.1111, found 338.1116。

4-乙酰基-3-(2-叠氮基苯基)-2-亚甲基-5-氧代己酸乙酯(**3d**): 黄色油状物, 产率 78%。¹H NMR (400 MHz,

CDCl₃) δ : 7.32 (d, *J*=7.6 Hz, 1H), 7.26 (t, *J*=6.8 Hz, 1H), 7.13~7.07 (m, 2H), 6.29 (s, 1H), 5.84 (s, 1H), 5.00 (d, *J*=12.4 Hz, 1H), 4.88 (d, *J*=12.4 Hz, 1H), 4.12 (dd, *J*=13.2, 6.4 Hz, 2H), 2.22 (s, 3H), 1.96 (s, 3H), 1.23 (t, *J*=7.2 Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 202.60, 202.18, 165.84, 139.18, 138.20, 129.97, 129.47, 128.68, 127.10, 124.88, 118.72, 71.59, 60.96, 41.67, 29.67, 29.23, 13.97; IR (KBr) ν : 3419, 2996, 2135, 1714, 1425, 1153, 759 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₁₇H₁₉N₃O₄Na (M+Na)⁺ 352.1268, found 352.1266。

2-[(2-叠氮苯基)(2,6-二氧化环己基)甲基]丙烯酸甲酯(**3e**): 黄色油状物, 产率 46%。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.39 (d, *J*=8.0 Hz, 1H), 7.28 (d, *J*=7.4 Hz, 1H), 7.19~7.14 (m, 2H), 6.44 (s, 1H), 6.30 (s, 1H), 5.58 (s, 1H), 5.33 (s, 1H), 3.77 (s, 3H), 2.45 (t, *J*=6.2 Hz, 2H), 2.32 (t, *J*=7.6 Hz, 2H), 2.00~1.94 (m, 2H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 199.67, 175.94, 165.33, 137.97, 137.91, 130.01, 128.22, 127.99, 124.95, 118.38, 104.90, 72.40, 52.22, 36.61, 29.67, 28.93, 21.07; IR (KBr) ν : 3463, 2939, 2137, 1737, 1612, 1186, 754 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₁₇H₁₇N₃O₄Na (M+Na)⁺ 350.1111, found 350.1117。

1-乙基-5-甲基-2-乙酰基-3-(2-叠氮基苯基)-4-亚甲基戊二酸酯(**3f**): 黄色油状物, 产率 82%。是无法分离的非对映异构体, *d.r.*: 58:42。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.34 (d, *J*=7.6 Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.25 (t, *J*=8.0 Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.14~7.02 (m, 2H, both diastereoisomers), 6.31 (s, 1H, minor), 6.28 (s, 1H, major), 5.91 (s, 1H, minor), 5.85 (s, 1H, major), 4.93 (d, *J*=12.0 Hz, 1H), 4.69 (d, *J*=12.0 Hz, 1H, major), 4.63 (d, *J*=12.0 Hz, 1H, minor), 4.16 (q, *J*=7.2 Hz, 1H, minor), 3.95 (q, *J*=7.2 Hz, 1H, major), 3.68 (s, 3H), 2.29 (s, 3H, major), 2.09 (s, 3H, minor), 1.24 (t, *J*=7.2 Hz, 3H, minor), 0.99 (t, *J*=7.2 Hz, 3H, major); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 201.43, 201.15, 167.76, 167.46, 166.39, 166.18, 139.12, 138.65, 138.34, 138.21, 129.91, 129.84, 128.57, 128.46, 127.48, 126.86, 124.77, 124.64, 118.65, 118.51, 62.38, 62.22, 61.61, 61.39, 51.90, 41.60, 41.51, 29.37, 13.96, 13.67; IR (KBr) ν : 3379, 2967, 2135, 1728, 1449, 1303, 757 cm⁻¹; HRMS (ESI) calcd for C₁₇H₁₉N₃O₅Na (M+Na)⁺ 368.1217, found 368.1220。

1-乙基-5-乙基-2-乙酰基-3-(2-叠氮基苯基)-4-亚甲基戊二酸酯(**3g**): 黄色油状物, 产率 86%。是无法分离的非对映异构体, *d.r.*: 52:48。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.34 (ddd, *J*=14.4, 8.0, 1.2 Hz, 1H, both dia-

stereoisomers), 7.27~7.23 (m, 1H, both diastereoisomers), 7.13~7.09 (m, 1H, both diastereoisomers), 7.08~7.04 (m, 1H, both diastereoisomers), 6.32 (s, 1H, minor), 6.28 (s, 1H, major), 5.88 (s, 1H, minor), 5.82 (s, 1H, major), 4.93 (d, $J=12.0$ Hz, 1H), 4.66 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, major), 4.61 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, minor), 4.21~4.07 (m, 2H, both diastereoisomers, 2H, minor), 3.94 (q, $J=7.2$ Hz, 2H, major), 2.29 (s, 3H, major), 2.08 (s, 3H, minor), 1.24 (t, $J=7.2$ Hz, 3H, minor), 1.23 (t, $J=7.2$ Hz, 3H, both diastereoisomers), 0.99 (t, $J=7.2$ Hz, 3H, major); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 201.42, 201.18, 167.78, 167.50, 165.96, 165.74, 139.50, 139.02, 138.34, 138.21, 129.95, 129.91, 128.56, 128.43, 127.29, 127.10, 126.45, 126.02, 124.74, 124.61, 119.60, 118.61, 118.47, 62.49, 62.35, 61.57, 61.36, 60.87, 60.81, 47.43, 41.51, 41.42, 29.64, 29.31, 27.68, 14.05, 13.96, 13.67; IR (KBr) ν : 3442, 2940, 2135, 1727, 1286, 1157, 758 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_5\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$ 382.1373, found 382.1377.

2-乙酰基-3-(2-叠氮基苯基)-4-亚甲基戊二酸二甲酯 (**3h**): 黄色油状物, 产率 88%, 是无法分离的非对映异构体, *d.r.*: 50 : 50. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.33 (dd, $J=12.4, 8.0$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.26 (t, $J=6.8$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.11 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.07 (t, $J=8.0$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 6.31 (s, 1H, isomer), 6.28 (s, 1H, isomer), 5.90 (s, 1H, isomer), 5.85 (s, 1H, isomer), 4.94 (dd, $J=12.4, 2.8$ Hz, 1H, isomer), 4.72 (d, $J=12.4$ Hz, 1H, isomer), 4.65 (q, $J=7.2$ Hz, 1H, isomer), 3.70 (s, 3H, isomer), 3.68 (s, 3H, both diastereoisomers), 3.50 (s, 3H, isomer), 2.89 (s, 3H, isomer), 2.08 (s, 3H, isomer); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 201.31, 201.04, 168.25, 167.98, 166.38, 166.19, 139.17, 138.57, 138.30, 138.25, 129.81, 129.69, 128.63, 128.49, 127.63, 126.81, 124.80, 124.71, 118.69, 118.59, 62.17, 62.14, 52.61, 52.42, 51.91, 51.88, 41.68, 41.54, 29.70, 29.44; IR (KBr) ν : 3436, 2967, 2135, 1729, 1446, 1154, 759 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}_5\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$ 354.1060, found 354.1064.

1-甲基-5-乙基-2-乙酰基-3-(2-叠氮基苯基)-4-亚甲基戊二酸二酯 (**3i**): 黄色油状物, 产率 85%, 是无法分离的非对映异构体, *d.r.*: 53 : 47. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.32 (dd, $J=12.4, 7.6$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.25 (t, $J=6.0$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.11 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.07 (t, $J=7.6$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 6.32 (s, 1H, major), 6.28 (s, 1H, minor), 5.86 (s, 1H, major), 5.81 (s, 1H, minor), 4.95 (d,

$J=2.4$ Hz, 1H, minor), 4.92 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, major), 4.69 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, minor), 4.62 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, major), 4.12 (q, $J=7.2$ Hz, 2H), 3.71 (s, 3H, major), 3.50 (s, 3H, minor), 2.29 (s, 3H, minor), 2.07 (s, 3H, major), 1.23 (t, $J=7.0$ Hz, 3H, both diastereoisomers); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 201.37, 201.14, 168.30, 168.03, 165.98, 165.78, 139.55, 138.92, 138.31, 138.26, 129.89, 129.74, 128.64, 128.49, 127.30, 126.44, 124.79, 124.70, 118.66, 118.57, 62.30, 62.27, 60.92, 60.89, 52.63, 52.43, 41.62, 41.45, 29.76, 29.44, 13.99; IR (KBr) ν : 3448, 2943, 2135, 1730, 1453, 1152, 757 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{N}_3\text{O}_5\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$ 368.1217, found 368.1217.

1-叔丁基-5-甲基-2-乙酰基-3-(2-叠氮基苯基)-4-亚甲基戊二酸酯 (**3j**): 淡黄色油状物, 产率 74%, 是无法分离的非对映异构体, *d.r.*: 59 : 41. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.37 (d, $J=6.8$ Hz, 1H, major), 7.31 (d, $J=6.8$ Hz, 1H, minor), 7.24 (t, $J=7.2$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.12~7.04 (m, 2H, both diastereoisomers), 6.32 (s, 1H, minor), 6.26 (s, 1H, major), 5.92 (s, 1H, minor), 5.83 (s, 1H, major), 4.86 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 4.58 (d, $J=12.4$ Hz, 1H, major), 4.52 (d, $J=12.4$ Hz, 1H, minor), 3.68 (s, 3H, both diastereoisomers), 2.28 (s, 3H, major), 2.09 (s, 3H, minor), 1.42 (s, 9H, minor), 1.17 (s, 9H, major); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 201.69, 201.50, 166.91, 166.60, 166.47, 166.23, 139.33, 138.93, 138.47, 138.19, 130.35, 130.15, 129.94, 129.73, 128.46, 128.39, 127.14, 126.66, 124.75, 124.58, 118.63, 118.48, 82.34, 82.00, 63.54, 63.17, 51.87, 41.54, 41.48, 29.46, 29.09, 27.91, 27.75, 27.38; IR (KBr) ν : 3441, 2991, 2134, 1728, 1301, 1151, 757 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{N}_3\text{O}_5\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$ 396.1530, found 396.1534.

1-叔丁基-5-乙基-2-乙酰基-3-(2-叠氮基苯基)-4-亚甲基戊二酸酯 (**3k**): 淡黄色油状物, 产率 82%, 是无法分离的非对映异构体, *d.r.*: 58 : 42. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.37 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, major), 7.31 (d, $J=7.6$ Hz, 1H, minor), 7.25 (dd, $J=16.0, 8.8$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.12~7.03 (m, 2H, both diastereoisomers), 6.33 (s, 1H, minor), 6.26 (s, 1H, major), 5.89 (s, 1H, minor), 5.80 (s, 1H, major), 4.87 (d, $J=12.4$ Hz, 2H), 4.56 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, major), 4.49 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, minor), 4.12 (qd, $J=7.2, 1.6$ Hz, 4H, both diastereoisomers), 2.28 (s, 3H, major), 2.08 (s, 2H, minor), 1.43 (s, 9H, minor), 1.23 (t, $J=7.2$ Hz, 3H, both diastereoisomers), 1.17 (s, 9H, major); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 201.67, 201.53, 166.89, 166.63, 166.02, 165.78, 139.68, 139.27,

138.45, 138.17, 130.36, 130.25, 129.98, 128.43, 128.35, 126.75, 126.27, 124.69, 124.53, 118.56, 118.42, 82.27, 81.94, 63.61, 63.31, 60.82, 60.75, 41.42, 41.34, 29.62, 29.46, 27.73, 27.36, 13.96; IR (KBr) ν : 2992, 2943, 2134, 1725, 1303, 1151, 758 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{25}\text{N}_3\text{O}_5\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 410.1686, found 410.1687.

5-乙基-3-(2-叠氮基苯基)-4-亚甲基-2-丙酰基戊二酸-1-乙基酯(**3l**): 淡黄色油状物, 产率 75%, 是无法分离的非对映异构体, *d.r.*: 50 : 50. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.37 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, isomer), 7.31 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, isomer), 7.25 (t, $J=8.0$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.12~7.04 (m, 2H, both diastereoisomers), 6.31 (s, 1H, isomer), 6.25 (s, 1H, isomer), 5.91 (s, 1H, isomer), 5.84 (s, 1H, isomer), 4.94 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 4.73 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, isomer), 4.64 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, isomer), 4.15 (q, $J=8.0$ Hz, 2H, isomer), 3.94 (q, $J=7.2$ Hz, 2H, isomer), 3.68 (s, 3H, both diastereoisomers), 2.68~2.53 (m, 2H, both diastereoisomers), 1.28 (t, $J=7.2$ Hz, 3H, isomer), 1.23 (t, $J=7.2$ Hz, 3H, isomer), 1.04 (t, $J=7.2$ Hz, 3H, isomer), 0.98 (t, $J=7.2$ Hz, 3H, isomer); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 203.95, 203.70, 167.84, 167.59, 166.43, 166.24, 139.24, 138.72, 138.38, 138.24, 129.92, 129.89, 128.53, 128.41, 127.51, 126.76, 124.74, 124.62, 118.65, 118.49, 61.54, 61.44, 61.33, 61.29, 51.88, 51.86, 48.98, 41.74, 41.63, 36.21, 35.77, 13.99, 13.70, 7.45, 7.36; IR (KBr) ν : 3439, 2995, 2134, 1727, 1303, 1154, 755 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_5\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 382.1373, found 382.1377.

2-(2-叠氮基苯基)-丁-3-烯-1,1,3-三羧酸三甲酯(**3m**): 淡黄色油状物, 产率 75%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.27 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.12 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.07 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.33 (s, 1H), 5.90 (s, 1H), 4.91 (d, $J=12.0$ Hz, 1H), 4.51 (d, $J=12.8$ Hz, 1H), 3.71 (s, 3H), 3.68 (s, 3H), 3.52 (s, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 168.06, 167.77, 166.11, 138.78, 138.38, 129.78, 129.37, 128.57, 127.08, 124.65, 118.55, 54.42, 52.70, 52.50, 51.89, 42.09; IR (KBr) ν : 3463, 2967, 2135, 1744, 1444, 1264, 757 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{N}_3\text{O}_6\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 370.1010, found 370.1012.

1,1-二甲基-3-乙基-2-(2-叠氮基苯基)-丁-3-烯-1,1,3-三羧酸酯(**3n**): 黄色油状物, 产率 76%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.34 (dd, $J=7.6, 1.2$ Hz, 1H), 7.26 (td, $J=8.0, 1.6$ Hz, 1H), 7.11 (dd, $J=8.0, 0.8$ Hz, 1H), 7.06 (td, $J=7.4, 0.8$ Hz, 1H), 6.34 (s, 1H), 5.86 (s, 1H), 4.91 (d, $J=12.0$ Hz, 1H), 4.49 (d, $J=12.0$ Hz, 1H), 4.12 (qd, $J=$

7.2, 1.2 Hz, 2H), 3.71 (s, 3H), 3.51 (s, 3H), 1.23 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 168.02, 167.75, 165.61, 139.09, 138.33, 129.79, 129.45, 128.51, 126.64, 124.57, 118.45, 60.80, 54.46, 52.63, 52.43, 41.93, 13.92; IR (KBr) ν : 3432, 2968, 2136, 1746, 1495, 1155, 760 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{N}_3\text{O}_6\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 384.1166, found 384.1161.

1,1-二乙基-3-甲基-2-(2-叠氮基苯基)-丁-3-烯-1,1,3-三羧酸酯(**3o**): 黄色油状物, 产率 54%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.37 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.26 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.11 (d, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.07 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.33 (s, 1H), 5.91 (s, 1H), 4.89 (d, $J=12.4$ Hz, 1H), 4.48 (d, $J=12.4$ Hz, 1H), 4.18 (q, $J=7.2$ Hz, 2H), 3.97 (q, $J=7.0$ Hz, 2H), 3.68 (s, 3H), 1.24 (t, $J=7.2$ Hz, 3H), 1.00 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 167.68, 167.39, 166.14, 138.90, 138.44, 130.08, 129.55, 128.50, 126.97, 124.59, 118.48, 61.60, 61.37, 54.59, 51.86, 42.10, 13.95, 13.69; IR (KBr) ν : 3461, 2998, 2136, 1739, 1494, 1155, 759 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_6\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 398.1323, found 398.1326.

1-乙基-5-甲基-3-(2-叠氮基苯基)-2-氰基-4-亚甲基戊二酸酯(**3p**): 黄棕色油状物, 产率 94%, 是无法分离的非对映异构体, *d.r.*: 53 : 47. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.56~7.30 (m, 2H, both diastereoisomers), 7.19~7.11 (m, 2H, both diastereoisomers), 6.57 (s, 1H, major), 6.46 (s, 1H, minor), 6.13 (s, 1H, major), 5.67 (s, 1H, minor), 4.99 (d, $J=7.2$ Hz, 1H, major), 4.95 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, minor), 4.55 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, minor), 4.37 (d, $J=7.6$ Hz, 1H, major), 4.22 (dd, $J=14.4, 7.2$ Hz, 2H, both diastereoisomers), 3.78 (s, 3H, minor), 3.69 (s, 3H, major), 1.23 (t, $J=7.2$ Hz, 3H, major), 1.17 (t, $J=7.2$ Hz, 3H, minor); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 165.99, 165.88, 164.62, 164.58, 138.34, 137.82, 137.78, 137.01, 129.37, 129.30, 129.04, 128.70, 128.05, 125.04, 124.93, 118.62, 118.42, 115.53, 115.29, 62.97, 62.85, 52.30, 52.24, 40.85, 40.82, 40.72, 40.71, 24.68, 13.82, 13.75; IR (KBr) ν : 3464, 2937, 2134, 1750, 1447, 1252, 755 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{N}_4\text{O}_4$ ($\text{M}+\text{H}$)⁺ 329.1244, found 329.1245.

2-[(2-叠氮基苯基)(2-氧吡啶-1-基)甲基]丙烯酸甲酯(**3q**): 黄色油状物, 产率 58%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.40~7.34 (m, 2H), 7.23 (d, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.17~7.07 (m, 3H), 6.98 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.71 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.58 (s, 1H), 6.52 (s, 1H), 5.54 (s, 1H), 3.71 (s, 3H), 3.59 (s, 2H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 174.85, 165.89, 144.22, 138.26, 137.15, 129.54, 129.47,

128.25, 127.54, 124.71, 124.44, 124.36, 122.11, 118.36, 110.19, 52.23, 51.81, 35.50; IR (KBr) ν : 3427, 2967, 2135, 1726, 1474, 1172, 753 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{N}_4\text{O}_3\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 371.1115, found 371.1119.

2-[(2-叠氮基苯基)(2-氧吡啶-3-基)甲基]丙烯酸甲酯 (**3q'**): 黄色油状物, 产率 9%, 是无法分离的非对映异构体, *d.r.*: 50 : 50. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.93 (s, 1H, isomer), 8.71 (s, 1H, isomer), 7.35~6.99 (m, 6H, both diastereoisomers), 6.86 (t, $J=8.0$ Hz, 2H, both diastereoisomers), 6.76 (d, $J=7.6$ Hz, 1H, isomer), 6.63 (d, $J=7.6$ Hz, 1H, isomer), 6.41 (s, 1H, isomer), 6.36 (s, 1H, isomer), 5.49 (s, 1H, isomer), 5.33 (s, 1H, isomer), 5.19 (d, $J=5.2$ Hz, 1H, isomer), 4.92 (d, $J=7.6$ Hz, 1H, isomer), 3.79 (s, 3H, isomer), 3.64 (s, 3H, isomer); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 171.25, 166.90, 166.72, 141.42, 139.82, 138.33, 130.59, 129.56, 129.24, 128.55, 128.41, 128.22, 128.12, 128.09, 128.04, 127.99, 127.83, 127.36, 125.49, 125.06, 124.71, 124.69, 124.51, 124.48, 122.60, 121.98, 121.91, 119.44, 118.43, 118.38, 109.86, 52.13, 52.08, 47.92, 47.20, 41.14; IR (KBr) ν : 3435, 2937, 2134, 1730, 1484, 1202, 757 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{N}_4\text{O}_3\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 371.1115, found 371.1119.

3-(2-叠氮基苯基)-4-(二乙基氨基甲酰基)-2-亚甲基-5-氧代己酸甲酯(**3r**): 黄色油状物, 产率 52%, 为单一异构体. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.34 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.23 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.10 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.04 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.35 (s, 1H), 5.92 (s, 1H), 5.09 (d, $J=12.0$ Hz, 1H), 4.67 (d, $J=12.0$ Hz, 1H), 3.69 (s, 3H), 3.36~3.25 (m, 4H), 2.25 (s, 3H), 1.12 (t, $J=7.2$ Hz, 3H), 0.78 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 205.09, 166.36, 165.58, 138.87, 138.37, 130.33, 130.09, 128.34, 127.89, 124.48, 118.66, 60.43, 51.95, 43.03, 42.04, 40.66, 29.65, 26.68, 14.30, 12.29; IR (KBr) ν : 3459, 2939, 2132, 1730, 1645, 1444, 1292, 753 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{24}\text{N}_4\text{O}_4\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 395.1690, found 395.1697.

3-(2-叠氮基苯基)-4-(甲基氨基甲酰基)-2-亚甲基-5-氧代己酸甲酯(**3s**): 黄色油状物, 产率 56%, 是无法分离的非对映异构体, *d.r.*: 53 : 47. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.33 (t, $J=7.2$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.26 (t, $J=6.4$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.12 (d, $J=7.6$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 7.07 (t, $J=7.4$ Hz, 1H, both diastereoisomers), 6.31 (s, 1H, minor), 6.27 (s, 1H, major), 6.18 (s, 1H, major), 6.02 (s, 1H, major), 5.93 (s, 1H, minor), 5.83 (s, 1H, minor), 4.95 (d, $J=12.0$ Hz, 1H,

minor), 4.86 (d, $J=12.4$ Hz, 1H, major), 4.55 (d, $J=12.4$ Hz, 1H, major), 4.41 (d, $J=12.0$ Hz, 1H, minor), 3.68 (s, 3H), 2.77 (d, $J=4.8$ Hz, 3H, major), 2.57 (d, $J=4.8$ Hz, 3H, minor), 2.31 (s, 3H, minor), 2.05 (s, 3H, major); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 204.99, 204.72, 167.16, 166.71, 166.42, 166.27, 139.48, 138.33, 138.26, 129.19, 128.67, 128.62, 128.08, 126.39, 124.94, 124.84, 118.72, 118.60, 64.79, 64.29, 52.02, 51.93, 42.75, 29.75, 29.53, 26.61, 26.46; IR (KBr) ν : 3463, 2941, 2135, 1739, 1494, 1253, 757 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{N}_4\text{O}_4\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 353.1220, found 353.1222.

3.2.2 目标化合物 **5** 的合成

室温下, 向 50 mL 的圆底烧瓶中依次加入中间体 **3** (0.4 mmol)、 PPh_3 (0.4 mmol)、二氯甲烷(5 mL), TLC 跟踪反应进程, 约 2 h 反应完全, 产物不经分离, 旋干溶剂, 再加入重蒸的甲苯(5 mL), 升温至回流, TLC 跟踪反应进程, 6 h 反应完全. 减压浓缩除去溶剂得粗产物, 粗产物经柱层析[$V(\text{石油醚}) : V(\text{乙酸乙酯}) = 8 : 1 \sim 5 : 1$] 分离得到纯的 1,4-二氢喹啉类化合物 **5**.

2-乙基-3-丙酰基-4-(2-丙烯酸甲酯)-1,4-二氢喹啉 (**5a**): 淡黄色油状物, 产率 70%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.73 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.01 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.86 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.65 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.49 (s, 1H), 6.11 (s, 1H), 5.45 (s, 1H), 5.16 (s, 1H), 3.69 (s, 3H), 2.79 (dt, $J=13.4, 6.8$ Hz, 2H), 2.56~2.50 (m, 1H), 2.33~2.27 (m, 1H), 1.18 (s, 3H), 0.96 (d, $J=7.2$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 199.51, 167.45, 153.61, 143.83, 136.05, 128.48, 127.13, 125.23, 123.71, 123.03, 114.53, 104.39, 51.95, 38.65, 33.05, 27.30, 12.93, 8.52; IR (KBr) ν : 3381, 2975, 1724, 1489, 1261, 1150, 760 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{NO}_3$ ($\text{M}+\text{H}$)⁺ 300.1594, found 300.1602.

2-乙基-3-丙酰基-4-(2-丙烯酸乙酯)-1,4-二氢喹啉 (**5b**): 淡黄色油状物, 产率 74%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.39 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.10 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.95 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.72 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.34 (s, 1H), 6.19 (s, 1H), 5.51 (s, 1H), 5.24 (s, 1H), 4.24 (q, $J=7.2$ Hz, 2H), 2.90~2.84 (m, 2H), 2.66~2.56 (m, 1H), 2.43~2.33 (m, 1H), 1.30 (t, $J=7.2$ Hz, 3H), 1.28 (t, $J=7.6$ Hz, 3H), 1.05 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 199.59, 167.03, 153.18, 144.17, 136.03, 128.62, 127.17, 124.99, 123.86, 123.07, 114.45, 104.75, 60.93, 38.62, 33.09, 27.41, 14.14, 12.91, 8.50; IR (KBr) ν : 2990, 2944, 1719, 1489, 1107, 761 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{NO}_3\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 336.1570, found 336.1566.

2-甲基-3-乙酰基-4-(2-丙烯酸甲酯)-1,4-二氢喹啉(**5c**): 棕色油状物, 产率 90%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.37 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.09 (t, $J=7.0$ Hz, 1H), 6.96 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.73 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.65 (s, 1H), 6.21 (s, 1H), 5.51 (s, 1H), 5.21 (s, 1H), 3.77 (s, 3H), 2.48 (s, 3H), 2.20 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 197.15, 167.38, 148.57, 144.07, 135.77, 128.62, 127.19, 125.42, 123.94, 123.31, 114.57, 105.95, 51.98, 39.48, 29.13, 21.50; IR (KBr) ν : 3307, 2938, 1723, 1485, 1257, 952, 758 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{NO}_3$ ($\text{M}+\text{H}$) $^+$ 272.1281, found 272.1290.

2-甲基-3-乙酰基-4-(2-丙烯酸乙酯)-1,4-二氢喹啉(**5d**): 棕色油状物, 产率 85%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.37 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.09 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 6.95 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 6.73 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.57 (s, 1H), 6.20 (s, 1H), 5.49 (s, 1H), 5.21 (s, 1H), 4.23 (qd, $J=7.0$, 2.2 Hz, 2H), 2.48 (s, 3H), 2.20 (s, 3H), 1.30 (t, $J=7.0$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 197.26, 166.97, 148.46, 144.44, 135.76, 128.66, 127.18, 125.14, 124.05, 123.28, 114.55, 106.05, 60.92, 39.45, 29.09, 21.50, 14.13; IR (KBr) ν : 3305, 2939, 1717, 1486, 1256, 949, 759 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{NO}_3\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$ 308.1257, found 308.1260.

9-(2-丙烯酸甲酯)-3,4,9,10-四氢吡啶-1(2H)-酮(**5e**): 淡黄色油状物, 产率 39%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.35 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.05 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.74 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.69 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 4.67 (s, 1H), 4.46 (s, 1H), 4.16 (d, $J=11.2$ Hz, 2H), 3.98 (d, $J=11.2$ Hz, 1H), 3.78 (s, 3H), 2.46 (s, 2H), 1.98~1.90 (m, 2H), 1.26 (s, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 197.67, 172.67, 171.57, 147.61, 130.82, 128.10, 126.81, 120.35, 113.68, 110.74, 67.21, 53.17, 39.76, 36.98, 28.31, 20.01; IR (KBr) ν : 3468, 2937, 1735, 1468, 1293, 970, 745 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{NO}_3$ ($\text{M}+\text{H}$) $^+$ 284.1281, found 284.1286.

2-甲基-3-乙氧酰基-4-(2-丙烯酸甲酯)-1,4-二氢喹啉(**5f**): 棕色油状物, 产率 82%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.31 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.07 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.92 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.67 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.17 (s, 1H), 6.13 (s, 1H), 5.58 (s, 1H), 5.21 (s, 1H), 4.11 (t, $J=7.2$ Hz, 2H), 3.76 (s, 3H), 2.46 (s, 3H), 1.23 (t, $J=7.6$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 167.50, 167.36, 147.98, 145.99, 135.87, 128.86, 127.02, 125.14, 124.26, 123.00, 114.28, 97.48, 59.40, 51.82, 38.51, 20.53, 14.27; IR (KBr) ν : 3390, 2996, 1733, 1494, 1243, 1074, 764

cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{NO}_4\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$ 324.1206, found 324.1212.

2-甲基-3-乙氧酰基-4-(2-丙烯酸乙酯)-1,4-二氢喹啉(**5g**): 黄色油状物, 产率 86%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.31 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.05 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.91 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.67 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.39 (s, 1H), 6.16 (s, 1H), 5.56 (s, 1H), 5.22 (s, 1H), 4.24~4.17 (m, 2H), 4.15~4.07 (m, 2H), 2.45 (s, 3H), 1.29 (t, $J=6.8$ Hz, 3H), 1.23 (t, $J=6.8$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 167.57, 166.98, 148.11, 146.35, 135.96, 128.78, 126.93, 124.79, 124.30, 122.87, 114.33, 97.32, 60.59, 59.33, 38.51, 20.35, 14.23, 14.13; IR (KBr) ν : 3370, 2994, 1721, 1494, 1253, 1074, 758 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{NO}_4\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$ 338.1363, found 338.1367.

2-甲基-3-甲氧酰基-4-(2-丙烯酸甲酯)-1,4-二氢喹啉(**5h**): 黄色油状物, 产率 72%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.25 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.00 (t, $J=8.2$ Hz, 1H), 6.85 (t, $J=7.8$ Hz, 1H), 6.60 (d, $J=7.8$ Hz, 1H), 6.14 (s, 1H), 6.07 (s, 1H), 5.47 (s, 1H), 5.13 (s, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.59 (s, 3H), 2.39 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 167.94, 167.36, 148.37, 145.34, 136.00, 128.88, 127.05, 124.86, 124.03, 123.07, 114.31, 97.03, 51.80, 50.83, 38.69, 20.52; IR (KBr) ν : 3464, 2936, 1733, 1442, 1269, 1076, 745 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{NO}_4$ ($\text{M}+\text{H}$) $^+$ 288.1230, found 288.1233.

2-甲基-3-甲氧酰基-4-(2-丙烯酸乙酯)-1,4-二氢喹啉(**5i**): 白色固体, 产率 92%, m.p. 125~127 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.32 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.06 (td, $J=7.6$, 1.6 Hz, 1H), 6.91 (td, $J=7.6$, 1.2 Hz, 1H), 6.68 (dd, $J=8.0$, 0.8 Hz, 1H), 6.51 (s, 1H), 6.15 (d, $J=1.2$ Hz, 1H), 5.53 (s, 1H), 5.21 (s, 1H), 4.23~4.17 (m, 2H), 3.66 (s, 3H), 2.45 (s, 3H), 1.28 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 168.03, 166.98, 148.55, 145.72, 136.03, 128.78, 126.95, 124.61, 124.04, 122.92, 114.36, 96.78, 60.62, 50.76, 38.61, 20.38, 14.11; IR (KBr) ν : 3384, 2940, 1700, 1495, 1219, 1074, 753 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{NO}_4\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$) $^+$ 324.1206, found 324.1207.

2-甲基-3-叔丁氧酰基-4-(2-丙烯酸甲酯)-1,4-二氢喹啉(**5j**): 棕色油状物, 产率 95%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.32 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.05 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 6.89 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.65 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.18 (s, 1H), 6.16 (s, 1H), 5.58 (s, 1H), 5.17 (s, 1H), 3.76 (s, 3H), 2.43 (s, 3H), 1.43 (s, 9H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 167.51, 166.87, 147.11, 146.36, 136.01, 128.74, 126.91,

124.89, 124.38, 122.73, 114.21, 99.00, 79.18, 51.75, 38.62, 28.30, 20.33; IR (KBr) ν : 3464, 2990, 1731, 1375, 1255, 1159, 767 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{24}\text{NO}_4$ ($\text{M}+\text{H}$)⁺ 330.1700, found 330.1694.

2-甲基-3-叔丁氧酰基-4-(2-丙烯酸乙酯)-1,4-二氢喹啉(**5k**): 棕色油状物, 产率 92%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.33 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.03 (td, $J=7.6$, 1.2 Hz, 1H), 6.88 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.65 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.33 (s, 1H), 6.17 (s, 1H), 5.56 (s, 1H), 5.18 (s, 1H), 4.25~4.09 (m, 2H), 2.42 (s, 3H), 1.44 (s, 9H), 1.30 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 167.09, 166.92, 147.21, 146.55, 136.07, 128.66, 126.84, 124.55, 124.35, 122.60, 114.23, 98.81, 79.07, 60.54, 38.59, 28.34, 20.20, 14.21; IR (KBr) ν : 2940, 2988, 1730, 1377, 1262, 1158, 758 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{25}\text{NO}_4\text{Na}$ ($\text{M}+\text{Na}$)⁺ 366.1676, found 366.1669.

2-乙基-3-乙氧酰基-4-(2-丙烯酸甲酯)-1,4-二氢喹啉(**5l**): 黄色油状物, 产率 60%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.32 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.06 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.91 (t, $J=8.1$ Hz, 1H), 6.70 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.44 (s, 1H), 6.17 (s, 1H), 5.58 (s, 1H), 5.23 (s, 1H), 4.15~4.07 (m, 2H), 3.75 (s, 3H), 2.86 (q, $J=7.6$ Hz, 2H), 1.27 (t, $J=7.6$ Hz, 3H), 1.23 (t, $J=7.6$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 167.46, 167.00, 153.69, 146.19, 136.04, 128.74, 126.95, 124.90, 124.21, 122.86, 114.37, 96.47, 59.34, 51.73, 38.34, 26.77, 14.18, 13.03; IR (KBr) ν : 3382, 2990, 1732, 1495, 1215, 1080, 761 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{NO}_4$ ($\text{M}+\text{H}$)⁺ 316.1543, found 316.1543.

2-甲氧基-3-甲氧酰基-4-(2-丙烯酸甲酯)-1,4-二氢喹啉(**5m**): 淡黄色油状物, 产率 93%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.28~7.22 (m, 2H), 7.10~7.04 (m, 2H), 6.30 (s, 1H), 5.29 (s, 1H), 5.15 (s, 1H), 4.56 (s, 1H), 3.92 (s, 3H), 3.80 (s, 3H), 3.66 (s, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 168.99, 166.38, 161.55, 143.13, 138.49, 128.75, 128.50, 127.89, 125.43, 125.20, 53.96, 52.76, 52.17, 47.26, 41.22; IR (KBr) ν : 3474, 2965, 1747, 1653, 1444, 1248, 987, 768 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{NO}_5$ ($\text{M}+\text{H}$)⁺ 304.1180, found 304.1184.

2-甲氧基-3-甲氧酰基-4-(2-丙烯酸乙酯)-1,4-二氢喹啉(**5n**): 黄色油状物, 产率 89%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.25~7.23 (m, 2H), 7.07~7.05 (m, 2H), 6.29 (s, 1H), 5.14 (s, 1H), 4.55 (d, $J=3.2$ Hz, 1H), 4.30~4.21 (m, 2H), 3.92 (s, 3H), 3.71 (d, $J=3.6$ Hz, 1H), 3.65 (s, 3H), 1.31 (t, $J=7.0$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 168.97, 165.81, 161.47, 143.08, 138.78, 128.39, 128.32,

127.83, 125.32, 125.19, 125.13, 61.06, 53.86, 52.64, 47.23, 41.21, 13.94; IR (KBr) ν : 2998, 2965, 1751, 1654, 1444, 1247, 1026, 766 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{NO}_5$ ($\text{M}+\text{H}$)⁺ 318.1336, found 318.1327.

2-乙氧基-3-乙氧酰基-4-(2-丙烯酸甲酯)-1,4-二氢喹啉(**5o**): 白色油状物, 产率 70%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.23~7.19 (m, 2H), 7.04 (s, 2H), 6.30 (s, 1H), 5.18 (s, 1H), 4.53 (s, 1H), 4.46~4.30 (m, 2H), 4.10 (d, $J=7.0$ Hz, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.65 (s, 1H), 1.34 (t, $J=7.2$ Hz, 3H), 1.15 (t, $J=7.0$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 168.60, 166.42, 161.29, 143.39, 138.58, 128.65, 128.38, 127.76, 125.33, 125.16, 125.04, 62.41, 61.51, 52.14, 47.60, 41.23, 14.13; IR (KBr) ν : 3461, 2936, 1744, 1468, 1271, 1031, 745 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{NO}_5$ ($\text{M}+\text{H}$)⁺ 332.1493, found 332.1495.

2-乙氧基-3-氰基-4-(2-丙烯酸甲酯)-1,4-二氢喹啉(**5p**): 淡黄色油状物, 产率 47%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.86 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.74 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.65 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.42 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.03 (s, 1H), 6.05 (s, 1H), 5.30 (s, 1H), 4.64 (q, $J=7.0$ Hz, 2H), 3.78 (s, 3H), 1.61 (s, 1H), 1.51 (t, $J=7.0$ Hz, 3H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 164.55, 159.24, 152.97, 147.42, 135.15, 133.56, 132.58, 127.93, 125.79, 125.38, 122.58, 114.44, 98.74, 63.28, 52.79, 29.67, 14.36; IR (KBr) ν : 3456, 2936, 1734, 1584, 1332, 1036, 767 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{O}_3$ ($\text{M}+\text{H}$)⁺ 285.1234, found 285.1236.

12-(2-丙烯酸甲酯)-6,12-二氢吡啶并[2,1-*b*]喹啉(**5q**): 黄绿色油状物, 产率 80%. ¹H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.24 (d, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.07~7.02 (m, 2H), 6.96 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 6.89 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.65~6.59 (m, 2H), 6.40 (s, 1H), 6.05 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 3.64 (s, 3H), 3.61 (d, $J=5.6$ Hz, 2H), 3.58 (s, 1H), 3.51 (bs, 1H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 175.44, 171.83, 144.73, 128.45, 127.58, 127.51, 124.53, 124.33, 122.05, 118.74, 114.96, 52.22, 43.22, 40.59, 35.58; IR (KBr) ν : 3414, 2936, 1716, 1472, 1272, 1088, 748 cm^{-1} ; HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{O}_2$ ($\text{M}+\text{H}$)⁺ 305.1285, found 305.1280.

辅助材料(Supporting Information) 化合物 **3a**~**3s** 和 **5a**~**5q** 的 ¹H NMR 与 ¹³C NMR 谱图, 以及化合物 **5i** 的 X 射线单晶衍射结构. 这些材料可以免费从本刊网站 (<http://sioc-journal.cn/>) 上下载.

References

- [1] Liu, Z.; Zhao, R.; He, N.; Li, W. *Chin. J. Org. Chem.* **2018**, *38*, 1261 (in Chinese). (刘子强, 赵冉, 贺妮, 李伟, 有机化学, **2018**, *38*, 1261.)
- [2] Yang, M.; Hu, X.; Ouyang, B.; Xie, W.; Liu, J.-B. *Tetrahedron* **2019**, *75*, 3516.
- [3] Foley, M.; Tilley, L. *Pharmacol. Ther.* **1998**, *79*, 55.
- [4] Kaur, K.; Jain, M.; Reddy, R. P.; Jain, R. *Eur. J. Med. Chem.* **2010**, *45*, 3245.
- [5] Gorka, A. P.; de Dios, A.; Roepe, P. D. *J. Med. Chem.* **2013**, *56*, 5231.
- [6] Vandekerckhove, S.; D'hooghe, M. *Bioorg. Med. Chem.* **2015**, *23*, 5098.
- [7] Shiomi, S.; Misaka, R.; Kaneko, M.; Ishikawa, H. *Chem. Sci.* **2019**, *10*, 9433.
- [8] Kartsev, V.; Shikhaliev, K. S.; Geronikaki, A.; Medvedeva, S. M.; Ledenyova, I. V.; Krysin, M. Y.; Petrou, A.; Ciric, A.; Glamoclija, J.; Sokovic, M. *Eur. J. Med. Chem.* **2019**, *175*, 201.
- [9] Peng, X.-M.; Peng, L.-P.; Li, S.; Avula, S. R.; Kannekanti, V. K.; Zhang, S.-L.; Tam, K. Y.; Zhou, C.-H. *Future Med. Chem.* **2016**, *8*, 1927.
- [10] Marvadi, S. K.; Krishna, V. S.; Sinagubova, E. O.; Volobueva, A. S.; Esaulkova, Y. L.; Muryleva, A. A.; Tentler, D. G.; Sriram, D.; Zarubaev, V. V.; Kantevari, S. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2019**, *29*, 2664.
- [11] Matteelli, A.; Carvalho, A. C. C.; Dooley, K. E.; Kritski, A. *Future Microbiol.* **2010**, *5*, 849.
- [12] Plowright, A. T.; Schaus, S. E.; Myers, A. G. *Chem. Biol.* **2002**, *9*, 607.
- [13] Ren, Z.-L.; Lu, W.-T.; Cai, S.; Xiao, M.-M.; Yuan, Y.-F.; He, P.; Ding, M.-W. *J. Org. Chem.* **2019**, *84*, 14911.
- [14] Ma, X.; Zhang, X.; Xie, G.; Awad, J. M.; Zhang, W. *Tetrahedron Lett.* **2019**, *60*, 151127.
- [15] Ma, X.; Zhang, X.; Awad, J. M.; Xie, G.; Qiu, W.; Zhang, W. *Green Chem.* **2019**, *21*, 4489.
- [16] Ivanov, K. L.; Kravtsova, A. A.; Kirillova, E. A.; Melnikov, M. Y.; Budynina, E. M. *Tetrahedron Lett.* **2019**, *60*, 1952.
- [17] Tryniszewski, M.; Bujok, R.; Cmocho, P.; Ganczarczyk, R.; Kulszewicz-Bajer, I.; Wrobel, Z. *J. Org. Chem.* **2019**, *84*, 2277.
- [18] Wang, H.-M.; Wang, T.-S.; He, S.-J.; Chen, Z.-Y.; Hu, Y.-G. *J. Chem. Res.* **2019**, *43*, 201.
- [19] Cai, L.; Zhang, K.; Chen, S.; Lepage, R. J.; Houk, K. N.; Krenske, E. H.; Kwon, O. *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 9537.
- [20] Tukhtaev, H. B.; Ivanov, K. L.; Bezzubov, S. I.; Cheshkov, D. A.; Melnikov, M. Y.; Budynina, E. M. *Org. Lett.* **2019**, *21*, 1087.
- [21] Ciccolini, C.; Mari, G.; Favi, G.; Mantellini, F.; De Crescentini, L.; Santeusano, S. *Molecules* **2019**, *24*, 3785.
- [22] Ma, X.; Zhang, X.; Awad, J. M.; Xie, G.; Qiu, W.; Muriph, R. E.; Zhang, W. *Tetrahedron Lett.* **2020**, *61*, 151392.
- [23] Wu, J.; Kong, H.; Ding, M. *Chin. J. Org. Chem.* **2016**, *36*, 1662 (in Chinese). (武静, 孔晗晗, 丁明武, 有机化学, **2016**, *36*, 1662.)
- [24] Chen, X.; Zhong, Y.; Zhao, Z.; Huang, G. *Synthesis* **2017**, *49*, 5371.
- [25] Zhong, Y.; Zhang, H.; Ding, M.-W. *J. Heterocycl. Chem.* **2015**, *52*, 330.
- [26] Zhong, Y.; Wu, L.; Ding, M.-W. *Synthesis* **2012**, *44*, 3085.
- [27] Zhong, Y.; Wang, L.; Ding, M. W. *Tetrahedron* **2011**, *67*, 3714.
- [28] Crystallographic data for **5i** has been deposited with the Cambridge Crystallographic Data Centre as deposition number CCDC 2021914.
- [29] Wei, J.; Li, Y.; Tao, C.; Wang, H.; Cheng, B.; Zhai, H.; Li, Y. *J. Org. Chem.* **2018**, *83*, 835.
- [30] Han, E. G.; Kim, H. J.; Lee, K. J. *Tetrahedron* **2009**, *65*, 9616.
- [31] Procopio, A.; Cravotto, G.; Oliverio, M.; Costanzo, P.; Nardi, M.; Paonessa, R. *Green Chem.* **2011**, *13*, 436.
- [32] Stokes, B. J.; Liu, S.; Driver, T. G. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 4702.

(Cheng, F.)