新型手性环戊二烯基铑催化剂的合成及其在对映选择性碳氢键官能团化中的应用

黄 怡 陈 弓*

(南开大学化学学院 元素有机化学国家重点实验室 天津 300071)

Chiral Bicyclo[2.2.2]octane-Fused Cyclopentadienyl Rhodium Complexes: Synthesis and Potential Use in Asymmetric C—H Activation

Huang, Yi Chen, Gong*

(State Key Laboratory of Elemento-organic Chemistry, College of Chemistry, Nankai University, Tianjin 300071)

环戊二烯基负离子(cyclopentadienyl, Cp)及五甲基环戊二烯基负离子(Cp*)拥有6个 π 电子,能与过渡金属通过 σ 键和 π 键形成稳定的配合物,在过渡金属催化的氢化、聚合等领域有着广泛的应用^[1].随着不对称催化反应的发展,基于环戊二烯基负离子骨架的手性配体和催化剂也应运而生^[2].为了保障手性催化剂的稳定性,常用的手性因素引入策略有以下两种(Scheme 1A):将Cp类配体与另一分子双齿手性配体结合使用,共同与过渡金属配位形成稳定的手性催化剂(non-tethered/bis-chelating)^[3];或者通过共价键将单齿手性配体与Cp类骨架链接,再与过渡金属配位(mono-tethered/mono-chelating)^[4].这两种方法中,手性骨架直接与过渡金属配位,减少了反应过程中金属与反应底物结合时可用的配位数,一定程度上制约了此类手性骨架在不对称催化领域的应用范围.近年来,通过1,2位双共价键将手性骨架与Cp链接的策略受到了广泛的关注(biso-tethered/non-chelating)^[5].这一策略在Cp上引入了刚性且通常具有 C_2 对称性的非配位性手性骨架,通过Cp与过渡金属配位,最大限度地保留了金属周围的配位空间,在多种不对称反应特别是对称碳氢键官能团化反应中有着优异的表现^[6].近日,中山大学化学学院汪君课题组^[7]发展了一例基于 C_2 对称桥环骨架的新型环戊二烯基手性铑催化剂,成功实现了苯甲酰胺类化合物与1,4-苯醌类化合物的不对称加成反应.该反应条件温和,底物适用范围广,产率最高达82%,*ee*值最高达99%(Scheme 1B).

手性[2.2.2]桥环Cp配体最早由Halterman和Voll-

(A) Strategies of designing cyclopentadienyl (Cp) based chiral catalyst

(B) Chiral bicyclo[2.2.2]octane-fused CpRh complex catalyzed C-H functionalization

图式1 基于环戊二烯基骨架的手性催化剂设计及应用
Scheme 1 Design and application of chiral Cp ligands

* Corresponding author. E-mail: gongchen@nankai.edu.cn. Published online December 30, 2020.

hardt 等^[8]于 1987 年报道但遗憾的是, 该类手性 Cp 配体一直以来都没有引起人们的关注, 其在不对称催化中的应用几乎是一片空白. 近日, 汪君课题组^[9]参考 Halterman 报道的合成方法, 从 1,4-二烷基取代的苯衍生物 **1** 出发, 经过 Birch 还原、单异松茚基硼烷(IpcBH₂) 选择性硼氢化、双氧水氧化、甲磺酰氯活化羟基等转化得到光学纯化合物 **2**, 之后与环戊二烯基负离子发生取代反应得到具有 C₂ 对称性的手性骨架 **3**. 最后, 作者将其与二乙烯氯化铑络合得到手性催化剂 **Rh-1**, **Rh-2** 和 **Rh-3** (Scheme 2).

图式 2 新型环戊二烯基手性配体及铑催化剂的合成

Scheme 2 Synthesis of chiral bridged-ring-containing CpRh(I) complexes.

在得到手性催化剂之后, 作者首先通过单晶衍射对桥环环戊二烯铑催化剂的结构进行了分析. 通过和以往 Cramer 等^[10]发展的联萘轴手性催化剂 **Rh-4** 和 You 课题组^[11]发展的螺手性催化剂 **Rh-5** 进行比较, 他们发现该新型桥环环戊二烯铑催化剂在纵向上更加延伸, 在水平方向上更加紧凑, 导致金属中心的手性口袋更加紧致, 更有利于手性控制.

为了验证这一推测, 作者以 *N*-甲氧基苯甲酰胺(**4**)和对苯二醌(**5**)的碳氢键活化成环反应作为模板, 对不同铑催化剂的活性进行了对比(Scheme 3A). 在最优反应条件下, 手性催化剂 **Rh-1**, **Rh-2** 和 **Rh-3** 均能以中等收率和中等及以上的对映选择性生成产物 **6**. 其中, 环己基取代的催化剂 **Rh-1** 表现出最优的手性诱导效果, 给出 77% 的收率和 97% *ee* 值, 远优于已知手性催化剂 **Rh-4** 和 **Rh-5**.

随后作者对反应底物的普适性进行了系统考察 (Scheme 3B): 发现 *N*-烷氧基取代的苯甲酰胺类化合物均可以顺利与 1,4-对苯二醌发生不对称加成反应, 并可获得较高的收率和优异的 *ee* 值(**6**~**8**), 反应放大至 2 mmol 收率和对映选择性也没有明显下降; *N*-甲基取代的苯甲酰胺则不能生成预期产物(**9**). 随后, 作者对苯甲酰胺骨架上的取代基进行了考察, 发现取代基的电性对反应有较大的影响. 当苯环上带有给电子基团时, 可以得到较高的收率和 *ee* 值(**10**); 但当苯环上带有强拉电子

基时(如硝基), 反应几乎得不到任何产物. 反应有较广泛的官能团兼容性, 苯环上的溴取代基不受影响(**11**). 甲基取代对苯二醌也能以中等收率和良好的 *ee* 值生成目标产物(**12**).

A) Comparison of chiral CpRh catalysts

(B) Substrate scope

图式 3 铑催化剂活性考察及底物拓展

Scheme 3 Rh catalyzed enantioselective C-H functionalization

汪君课题组通过将具有 C₂ 对称性的刚性桥环骨架引入环戊二烯单元, 实现了新型半夹心结构(half sandwich)手性催化剂的设计, 并在苯甲酰胺骨架的对映选择性碳氢键官能团化反应中表现出了优异的催化效果. 这一工作为手性配体设计和手性分子骨架的高效构筑提供了新的思路和实用性新策略.

References

- [1] Crabtree, R. H. *The Organometallic Chemistry of the Transition Metals*, Wiley, 7th edition, Hoboken, **2019**.
- [2] Ye, B.; Cramer, N. *Acc. Chem. Res.* **2015**, *48*, 1308.
- [3] Murata, K.; Ikariya, T.; Noyori, R. *J. Org. Chem.* **1999**, *64*, 2186.
- [4] Trost, B. M.; Rao, M.; and Dieskau, A. P. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 18697.
- [5] Ye, B.; Cramer, N. *Science* **2012**, *338*, 504.
- [6] Mas-Rosello, J.; Herraiz, A. G.; Audic, B.; Laverny, A.; Cramer, N. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2020**. DOI: 10.1002/anie.202008166.
- [7] Li, G.; Yan, X.; Jiang, J.; Liang, H.; Zhou, C.; Wang, J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2020**, *59*, 22436.
- [8] Halterman, R. L.; Vollhardt, K. P. C.; Welker, M. E.; Blaeser, D.; Boese, R. *J. Am. Chem. Soc.* **1987**, *109*, 8105.
- [9] Chen, Z.; Eriks, K.; Halterman, R. L. *Organometallics* **1991**, *10*, 3449.
- [10] Ye, B.; Cramer, N. *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 636.
- [11] Zheng, J.; Cui, W. J.; Zheng, C.; You, S.-L. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, *138*, 5242.

(Lu, Y.)