二级脂肪醇的不对称炔丙基醚化反应

王娅妮^a 陈鹏^b 陆良秋^{*,b}^(a) 天津师范大学化学学院 天津市功能分子结构与性能重点实验室 天津 300387)^(b) 华中师范大学化学学院 农药与化学生物学教育部重点实验室 武汉 430079)

Asymmetric Propargyl Etherification of Secondary Aliphatic Alcohols

Wang, Yani^a Chen, Peng^b Lu, Liangqiu^{*,b}^(a) Tianjin Key Laboratory of Structure and Performance for Functional Molecules, College of Chemistry, Tianjin Normal University, Tianjin 300387)^(b) Key Laboratory of Pesticide & Chemical Biology, Ministry of Education, College of Chemistry, Central China Normal University, Wuhan 430079)

醚作为一类基本的化学结构,广泛存在于许多具有重要生物活性的天然分子中,其高效合成引起了化学家们的广泛关注^[1]. C—O 键的直接生成是构建醚类化合物最经典的方法之一,然而大位阻二级脂肪醇的不对称 C—O 键形成具有挑战性^[2],其主要原因是反应物的位阻较大,且醇的亲核性较弱,使得反应难以顺利进行.当加入强碱以提高醇的亲核性时,又容易造成底物的分解.尽管目前利用过渡金属催化的不对称烯丙基取代反应^[3]、卡宾插入反应^[4]和 Lewis 酸催化的环丙烷开环反应^[5]等策略,可以实现温和条件下 C—O 键的高效构建^[6],但是大位阻二级脂肪醇的不对称氧-烷基化反应仍然是一个具有挑战性的重要研究课题.

近年来,铜催化的不对称炔丙基取代反应作为构建碳-碳键、碳-杂键最直接有效的方法之一被广泛研究^[7].在这一反应过程中,通常使用廉价金属铜作为催化剂,利用一些简单易得的起始原料,生成在端位引入炔基的化合物,并通过进一步转化生成更加复杂的分子.如果脂肪醇在铜催化条件下作为亲核试剂发生不对称炔丙基取代反应,将会生成一系列含有端炔的烷基醚类化合物.实验证明,甲醇或异丙醇在该条件下通常作为很好的溶剂促进反应发生,但很少能够在低用量的情况下作为亲核试剂参与反应.四川大学化工学院钮大文课题组^[8]和日本东京大学 Nishibayashi 课题组^[9]发现使用硼酸作为共催化剂,并通过螯合作用提高脂肪醇的亲核性,成功实现多元醇、糖苷和苯甲醇的炔丙基取代反应.然而,二级脂肪醇在硼酸活化下依然很难发生该反应

(图 1).

图 1 (a)通过 C—O 键构建生成醚类化合物、(b)铜催化不对称炔丙基醚化反应、(c)铜-硼催化活化模式

Figure 1 (a) Construction of α -stereogenic ether by C—O bond-forming reaction, (b) Cu-catalyzed asymmetric *O*-propargylation, and (c) Cu/B dual catalysis

近日,四川大学化工学院钮大文团队^[10]再次利用铜和修饰后的吡啶-噁唑啉配体,以二氟二苯基硅作为添加剂,实现了大位阻二级脂肪醇的不对称炔丙基取代反应,合成了一系列手性 α,α' -二取代醚类化合物(图 2 上).这一反应条件温和,立体选择性好,值得一提的是,不仅炔丙基碳酸酯底物中的官能团兼容性好,一系列大位阻二级脂肪醇甚至三级脂肪醇都适用于这一反应.除此之外,一些具有生物活性的天然分子衍生物,如雄酮(androstene)、炔诺醇(etynodiol)、维生素 D3、加兰他敏三氟乙酸盐(glantamine trifluoroacetate salt)在标

* Corresponding author. E-mail: luliangqiu@mail.ccnu.edu.cn. Published online December 30, 2020.

图2 铜催化二级脂肪醇的不对称炔丙基醚化反应

Figure 2 Cu-catalyzed asymmetric *O*-propargylation of secondary aliphatic alcohols

准条件下也可以很好地转化, 得到相应的炔丙基醚化产物。为了拓展该方法学的实用性, 该课题组还将其应用于药物分子的后期修饰与整合上。例如将维生素 D3 衍生的产物与叠氮胸苷经过一步 Click 反应实现分子的重组(图 2 下)。这些衍生化反应充分说明端位炔基基团的合成多样性以及这一铜催化的不对称炔丙基醚化反应的有用性。

通过一系列机理探究实验, 作者推测炔丙基碳酸酯底物首先在铜和手性配体的催化下脱质子生成炔丙基铜中间体, 接着异构化生成亲电性的联烯铜中间体, 随后被亲核试剂进攻生成相应的炔丙基醚化的产物。作者发现, 反应中加入二氟二苯基硅作为添加剂, 可以很大程度上提高反应效率, 原因是它可以作为一个有效的脱水剂减少副反应的发生, 进而提高产率。

钮大文团队发展了大位阻二级脂肪醇参与的铜催化不对称炔丙基醚化反应, 在温和条件下实现了一系列 α, α' -二取代醚类化合物的高效高立体选择性构建。这一方法成功解决了铜催化炔丙基化反应中大位阻脂肪醇难以反应的问题, 拓展了铜催化炔丙基化反应构建化学键的范围。

References

- [1] Brown, W. H.; Iverson, B. L.; Anslyn, E. V.; Foote, C. S. *Organic Chemistry*, 7th ed, **2013**, Chapter 11.
- [2] Xiang, J.-B.; Shang, M.; Kawamata, Y.; Lundberg, H.; Reisberg, S. H.; Chen, M.; Mykhailiuk, P.; Beutner, G.; Collins, M. R.; Davies, A.; Bel, M. D.; Gallego, G. M.; Spangler, J. E.; Starr, J.; Yang, S.-L.; Blackmond, D. G.; Baran, P. S. *Nature* **2019**, 573, 398.
- [3] Trost, B. M.; McEachern, E. J.; Toste, F. D. *J. Am. Chem. Soc.* **1998**, 120, 12702.
- [4] Zhu, S.-F.; Cai, Y.; Mao, H.-X.; Xie, J.-H.; Zhou, Q.-L. *Nat. Chem.* **2010**, 2, 546.
- [5] Xia, Y.; Lin, L.-L.; Chang, F.-Z.; Fu, X.; Liu, X.-H.; Feng, X.-M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, 54, 13748.
- [6] Ziegler, D. T.; Fu, G. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, 138, 12069.
- [7] Miyake, Y.; Uemura, S.; Nishibayashi, Y. *ChemCatChem* **2009**, 1, 342.
- [8] Li, R.-Z.; Tang, H.; Yang, K. R.; Wan, L.-Q.; Zhang, X.; Liu, J.; Fu, Z.-Y.; Niu, D.-W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2017**, 56, 7213.
- [9] Nakajima, K.; Shibata, M.; Nishibayashi, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **2015**, 137, 2472.
- [10] Li, R.-Z.; Liu, D.-Q.; Niu, D.-W. *Nat. Catal.* **2020**, 3, 672.

(Lu, Y.)