氢键促进的级联重排

王亚俐^a 郭红超^{*b}^(a) 榆林学院化学与化工学院 陕西榆林 719000^(b) 中国农业大学化学系 北京 100193

Hydrogen-Bonding-Promoted Cascade Rearrangement

Wang, Yali^a Guo, Hongchao^{*,b}^(a) School of Chemistry & Chemical Engineering, Yulin University, Yulin, Shaanxi 719000^(b) Department of Chemistry, China Agricultural University, Beijing 100193

多环喹啉衍生物是一类非常重要的化合物, 广泛存在于天然产物与生物活性分子中, 在过去几十年中受到广泛关注. 从易得原料快速构建多环喹啉衍生物, 开发简单、高效、步骤经济性的合成方法具有重要意义.

级联反应是开展天然产物全合成和合成砌块构建的重要方法^[1], 其中基于异腈的级联反应为杂环化合物的制备提供了非常有用的途径^[2]. 色胺衍生的异腈, 也就是在吲哚的 3-位碳上安装了一个链状异腈的吲哚化合物, 在串联反应中展示了极为高效的反应特性, 作为初始原料已经被用于若干串联反应来构建螺环吲哚啉化合物, 相关级联反应研究取得了极大的成功^[3-7]. 然而, 基于色胺衍生异腈的反应模式和反应产物的多样性仍然比较有限, 因此围绕 3-(2-异氰乙基)吲哚开发更多的新反应仍然是一个挑战性的科学问题和迫切需要开展的工作.

在这种背景下, 基于异腈与 1,3-偶极子可以相互作用^[8], 近日, 苏州大学材料与化学化工学部纪顺俊、徐小平等与郑州大学化学学院蓝宇等一起探索了偶氮甲亚胺叶立德与 3-(2-异氰乙基)吲哚之间的反应, 所分离得到的产物并非预期将生成的生成螺环吲哚啉化合物, 而是一种多环吡咯并[2,3-*c*]喹啉衍生物(图 1), 由此成功开发了一种不用催化剂的 3-(2-异氰乙基)吲哚与偶氮甲亚胺叶立德之间的级联重排反应^[9].

特别需要指出的是, 该反应仅需要在甲醇的辅助下便可在室温顺利进行, 以中等到良好产率得到多环吡咯并[2,3-*c*]喹啉类衍生物. 这项工作是一个独特的级联反应的例子, 反应涉及四个新杂环的形成、吲哚环的开环以及偶氮甲亚胺叶立德的扩环. 这一新的发现不仅提供

了一个从容易获得的起始材料转化为多环喹啉衍生物的一步反应方案, 而且该反应独特的反应机理为相关新反应的设计带来了深刻的启示.

图 1 3-(2-异氰乙基)吲哚与偶氮甲亚胺叶立德的级联重排反应

Figure 1 Cascade rearrangement reaction of 3-(2-isocyanethyl) indoles with azomethine imines

作者采用实验和理论计算对该反应的独特机理开展了深入全面的研究. 作者通过对反应溶剂进行系统考察后发现, 使用醇类溶剂是成功获得最终产物的关键, 当使用其它溶剂时则生成耦合的二氮杂环丁烷化合物, 这表明氢键促进了级联重排过程. 此外, 作者分离得到了耦合的二氮杂环丁烷和螺环吲哚啉两种反应中间体.

为了进一步揭示该反应的机理, 作者进行了密度泛函理论(DFT)计算, 发现甲醇溶剂通过氢键降低过渡态的自由能垒. 在对甲苯磺酰基消除步骤中, 它可以与对甲苯磺酰基结合, 通过氢键过渡态降低级联反应中对甲苯磺酰基消除和质子转移过程中的自由能垒, 促进对甲苯磺酰基的离去. 甲醇分子也充当了质子穿梭试剂, 在

* Corresponding author. E-mail: hchgao@cau.edu.cn. Published online January 4, 2021.

最终产物的生成过程中, 促进后续的质子转移。

基于实验和理论计算结果, 作者为该氢键促进的级联重排反应提出了一个合理的反应机理(图 2)。从这个机理图可以很容易看出, 甲醇在活化反应物及促进反应进程中起到了关键作用。

综上所述, 纪顺俊、徐小平、蓝宇等实现了一例独特的甲醇促进的级联重排反应, 在无催化剂和温和的反

应条件下, 3-(2-异氰乙基)吲哚与偶氮甲亚胺叶立德在甲醇中顺利反应, 以中等到良好的产率得到多环吡咯并[2,3-*c*]喹啉类化合物。实验研究和 DFT 计算表明, 溶剂甲醇可以通过氢键过渡态降低级联反应中的自由能垒, 并充当了质子穿梭试剂, 促进反应顺利进行。这一工作拓宽了色胺衍生的异氰在串联反应中的应用范围, 为设计新反应带来了深刻的启示。

图 2 合理的反应机理

Figure 2 Plausible reaction mechanism

References

- [1] Touré, B. B.; Hall, D. G. *Chem. Rev.* **2009**, *109*, 4439.
- [2] Wang, W.; Herdtweck, E.; Dömling, A. *Chem. Commun.* **2010**, *46*, 770.
- [3] Wang, X.; Wang, S.-Y.; Ji, S.-J. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 1954.
- [4] Zhao, X.-H.; Liu, X.-H.; Mei, H.-J.; Guo, J.; Lin, L.-L.; Feng, X.-M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, *54*, 4032.
- [5] Saya, J. M.; Roose, T. R.; Peek, J. J.; Weijers, B.; de Waal, T. J. S.; Vande Velde, C. M. L.; Orru, R. V. A.; Ruijter, E. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2018**, *57*, 15232.
- [6] Li, L.-H.; Liu, J.-X.; Shi, M. *Org. Lett.* **2018**, *20*, 7076.
- [7] Chen, G.-S.; Chen, S.-J.; Luo, J.; Mao, X.-Y.; Chan, A. S.-C.; Sun, R. W.-Y.; Liu, Y.-L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2020**, *59*, 614.
- [8] Grassot, J.; Masson, G.; Zhu, J.-P. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2008**, *47*, 947.
- [9] Cao, W.-B.; Li, S.; Xu, M.-M.; Li, H.; Xu, X.-P.; Lan, Y.; Ji, S.-J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2020**, *59*, 21425.

(Lu, Y.)