三氟甲基酰肼 *N*-烃基化反应研究

杨金宇 黄丹凤 王克虎 王君姣 苏瀛鹏
 邓周斌 杨天宇 胡雨来*

(西北师范大学化学化工学院 兰州 730070)

摘要 探索了三氟甲基酰肼的 *N*-烃基化反应, 得到了一系列 *N*-烃基取代的三氟甲基酰肼衍生物. 其结构经 ^1H NMR 和 ^{13}C NMR、HRMS 等确证. 该方法具有反应条件温和、产率高及操作简单等优点, 为合成 *N*-烃基取代的三氟甲基酰肼类化合物提供了一种简单高效的方法.

关键词 三氟甲基酰肼; 卤代烃; α,β -不饱和酯; *N*-烃基化

Study on *N*-Alkylation Reactions of Trifluoromethylated Acylhydrazones

Yang, Jinyu Huang, Danfeng Wang, Kehu Wang, Junjiao Su, Yingpeng
 Deng, Zhoubin Yang, Tianyu Hu, Yulai*

(College of Chemistry and Chemical Engineering, Northwest Normal University, Lanzhou 730070)

Abstract The *N*-alkylation reaction of trifluoromethylated acylhydrazones was investigated, and a series of *N*-alkyl trifluoromethyl acylhydrazones were afforded in good yield. Their structures were confirmed by ^1H NMR, ^{13}C NMR and HRMS analysis. The strategy has advantages of simple and mild reaction conditions, wide scope of substrates and good yields. This protocol provides an efficient and new method for the synthesis of *N*-alkyl substituted trifluoromethyl acylhydrazones.

Keywords trifluoromethyl acylhydrazone; halohydrocarbon; α,β -unsaturated ester; *N*-alkylation

酰肼是一类分子结构中含有活性 $\text{CONHN}=\text{CH}$ 结构的特殊的席夫碱, 不仅是制备含氮化合物常用的合成砌块之一^[1], 而且具有广泛的生理活性^[2]. 在众多的酰肼类化合物中, *N*-取代的酰肼化合物具有治疗心血管疾病^[3]、抗肿瘤^[4]、磷酸二酯酶抑制剂^[5]、组蛋白酶抑制剂^[6]以及光电开关^[7]等生理活性(图 1). *N*-取代酰肼化合物的合成, 主要的方法有四种: (1)通过 *N*-取代的酰肼和醛进行反应得到 *N*-取代的酰肼^[8], (2)通过酰肼与卤代烃在一定条件下反应得到 *N*-烷基取代的酰肼^[9], (3)*N*-芳基取代的酰肼在醋酸酐中回流高产率地得到 *N*-芳基酰肼^[10], (4)铜盐催化二芳基碘盐参与的三氟甲基酰肼的 *N*-芳基化反应得到 *N*-芳基取代的酰肼^[11]. 然而, 目前合成 *N*-烷基取代的酰肼类衍生物的文报道较少^[12]. 因此, 开发一种简便高效的获得多种官能团取代的 *N*-取代酰肼化合物的合成方法具有重要的意义.

近年来, 含氟有机化合物因其独特的理化性质和生物活性备受关注. 三氟甲基化合物是一类典型的含氟有机化合物, 在医药、农药以及材料科学领域得到广泛应用. 因此, 三氟甲基化合物的合成备受化学家关注^[13]. 向有机化合物中引入三氟甲基主要有两种方式: 第一种是采用三氟甲基化试剂, 利用亲核、亲电以及自由基反应直接向有机分子中引入三氟甲基^[14]; 第二种是利用三氟甲基合成砌块, 通过一系列化学转化合成含三氟甲基的目标产物^[15]. 例如, 芳基三氟甲基酮、三氟甲基炔丙醇、三氟重氮乙烷以及三氟丙烯胺等均可作为三氟甲基合成砌块, 简单高效地转化为一类重要的三氟甲基化合物. 在众多的三氟甲基合成砌块中, 三氟甲基酰肼因其性质与酰肼衍生物类似, 是亚胺的等效体, 表现出了潜在的合成应用价值. 近年来, 我们课题组以稳定易得的三氟甲基酰肼作为三氟甲基合成砌块, 探索了三氟

* Corresponding author. E-mail: huyl@nwnu.edu.cn

Received November 2, 2020; revised December 24, 2020; published online January 14, 2021.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21662030, 22061037).

国家自然科学基金(Nos. 21662030, 22061037)资助项目.

甲基酰肼参与的 1,2-加成反应^[16]、[3+2]环加成反应以及自由基引发的加成/环化反应^[17], 合成了一系列具有潜在生物活性的三氟甲基含氮化合物. 在研究过程中发现, 三氟甲基酰肼在参与[3+2]环加成反应过程中, 既可作为 1,3-偶极子参与反应, 也可作为亲偶极体与其他 1,3-偶极子发生反应. 然而, 由于三氟甲基的强吸电子效应, 三氟甲基酰肼中的 N—H 酸性得以增强, 对丙烯酸酯等参与的三氟甲基酰肼的 1,2-加成反应有一定的影响. 为了避免这一现象, 我们课题组^[11]报道了铜盐催化二芳基碘盐参与的三氟甲基酰肼的 *N*-芳基化反应. 在上述研究工作的基础上, 本工作探索了三氟甲基酰肼与卤代烃或 α,β -不饱和酯的 *N*-烷基化反应, 得到了一系列具有潜在生物活性的多官能团 *N*-取代三氟甲基酰肼衍生物, 进一步拓展了三氟甲基酰肼在有机合成中的应用.

图1 具有生物活性的酰肼化合物

Figure 1 Bioactive molecules containing acylhydrazones

1 结果与讨论

反应以 *N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼(**1a**)和烯丙基溴(**2a**)为模板底物, 对反应条件进行优化. 在碳酸钾(1.5 equiv.)存在的情况下, *N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼(**1a**, 1.0 equiv.)和烯丙基溴(**2a**, 2.0 equiv.)在乙腈中室温反应 61 h 后, 以 77% 的产率得到了 *N*-烯丙基化产物 **3a**(表 1, Entry 1). 添加四丁基碘化铵(TBAI)作为相转移催化剂, 目标产物 **3a** 的产率有所提高(表 1, Entry 2). 为了进一步提高目标产物 **3a** 的产率, 对反应物投料比、添加剂、反应溶剂和碱进行了探究, 结果见表 1.

首先对反应物投料比进行了探究. 实验结果表明, 增加 **2a** 的量, 目标产物 **3a** 的产率有显著的提高. 当 **1a**、**2a**、碳酸钾和四丁基碘化铵的物质的量之比为 1 : 2.5 :

1.5 : 0.1 时, **3a** 的产率可提高至 88%, 并且反应时间缩短为 12 h(表 1, Entry 4). 继续增加 **2a** 的量时, 反应产率没有得到改善(表 1, Entry 5). 改变碳酸钾或四丁基碘化铵的用量时, 反应产率也没有得到改善(表 1, Entries 6~8). 随后考察了添加剂四丁基溴化铵(TBAB)、四丁基氯化铵(TBAC)、苄基三乙基氯化铵(TEBA)、四丁基氟化铵(TBAF)和 18-冠醚-6 (18-crown-6)对反应产率的影响(表 1, Entries 9~13). 结果表明, 四丁基碘化铵为最佳添加剂. 在此基础上, 又考察了二甲基亚砜、1,4-二氧六环、四氢呋喃和甲苯等不同溶剂对反应产率的影响(表 1, Entries 14~19). 结果发现, 乙腈是该反应的最佳溶剂. 最后, 考察了不同有机碱和无机碱对该反应的影响(表 1, Entries 20~25). 结果表明, 碳酸钾为该反应的最佳碱. 另外, 通过对照实验证明, 碳酸钾对该反应至关重要(表 1, Entry 26).

综上所述, 合成化合物 **3a** 的最佳反应条件为: 碳酸钾做碱, 四丁基碘化铵做添加剂, 三氟甲基酰肼 **1a**、烯丙基溴 **2a**、碳酸钾和四丁基碘化铵的物质的量之比为 1 : 2.5 : 1.5 : 0.1, 乙腈作溶剂.

在上述最佳的反应条件下, 对各种不同官能团取代三氟甲基酰肼与卤代烃的反应情况进行了考察, 结果见表 2. 由表 2 可知, 对于芳香酰肼形成的三氟甲基酰肼而言, 无论芳环上取代基是吸电子基还是供电子, 反应均能顺利进行, 以较高的收率得到目标产物. 芳环上取代基的电子效应对反应产率有一定的影响, 当芳环上的取代基为给电子基时, 目标产物的收率相比芳环上取代基为吸电子基时的收率高(表 2, **3b** vs. **3c**, **3e** vs. **3f**, **3j** vs. **3k**, **3o** vs. **3p** 和 **3w** vs. **3x**). 芳环上取代基的位置对反应产率没有明显的影响. 此外, 我们还考察了脂肪酰肼形成的三氟甲基酰肼对反应的影响. 研究表明, 当三氟甲基酰肼分子中的烃基 R^1 为正十七烷基时, 反应能顺利进行, 但是产物产率较低(**3i**).

当 *N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼(**1a**)为底物时, 不同结构的一级卤代烃对反应产率没有明显的影响, 反应均能顺利进行, 以较高的收率得到目标产物(表 2, **3a**, **3d**, **3g**, **3l**, **3n**, **3q**, **3r**, **3t** 和 **3v**). 然而, 当使用 2-溴丙烷作为烷基化试剂时, 该反应并没有发生, 2-溴丙烷几乎可定量回收.

在标准条件下, 烯丙基溴、肉桂基溴、炔丙基溴、苄基溴以及溴乙酸酯作为烷基化试剂时, 反应均能顺利进行, 以较高的收率得到目标产物. 当对氯苄基氯作为烷基化试剂和 *N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼以及 *N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-硝基苯甲酰肼反应时, 反应能顺利进行, 分别以 90% 和 60% 的收率得到目标产物(表 2, **3q** 和 **3s**). 当碘甲烷作为烷基化试剂和 *N'*-(2,2,2-三

表 1 反应条件优化^a
Table 1 Optimization of reaction conditions

Entry	Molar ratio of 1a/2a/ base/additive	Base	Additive	Solvent	Time/h	Isolated yield/%
1	1/2/1.5/0	K ₂ CO ₃	—	CH ₃ CN	61	77
2	1/2/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TBAI	CH ₃ CN	15	79
3	1/1.5/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TBAI	CH ₃ CN	24	76
4	1/2.5/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TBAI	CH₃CN	12	88
5	1/3.0/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TBAI	CH ₃ CN	4	77
6	1/2.5/1/0.1	K ₂ CO ₃	TBAI	CH ₃ CN	14	78
7	1/2.5/2/0.1	K ₂ CO ₃	TBAI	CH ₃ CN	11	74
8	1/2.5/1.5/0.2	K ₂ CO ₃	TBAI	CH ₃ CN	5	80
9	1/2.5/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TBAB	CH ₃ CN	8	73
10	1/2.5/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TBAC	CH ₃ CN	10	84
11	1/2.5/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TEBA	CH ₃ CN	8	85
12	1/2.5/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TBAF	CH ₃ CN	6	84
13	1/2.5/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	18-Crown-6	CH ₃ CN	11	75
14	1/2.5/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TBAI	DMSO	1	84
15	1/2.5/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TBAI	DCE	36	74
16	1/2.5/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TBAI	DMF	1.5	72
17	1/2.5/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TBAI	1,4-Dioxane	22	81
18	1/2.5/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TBAI	THF	23	76
19	1/2.5/1.5/0.1	K ₂ CO ₃	TBAI	Toluene	52	67
20	1/2.5/1.5/0.1	Cs ₂ CO ₃	TBAI	CH ₃ CN	2	75
21	1/2.5/1.5/0.1	KOH	TBAI	CH ₃ CN	29	79
22	1/2.5/1.5/0.1	NaOH	TBAI	CH ₃ CN	17	54
23	1/2.5/1.5/0.1	LiOH	TBAI	CH ₃ CN	29	14
24	1/2.5/1.5/0.1	Et ₃ N	TBAI	CH ₃ CN	39	52
25	1/2.5/1.5/0.1	DBU	TBAI	CH ₃ CN	39	trace
26	1/2.5/—/0.1	—	TBAI	CH ₃ CN	24	0

^a Reaction conditions: all reactions were performed with **1a** (0.2 mmol), **2a**, base, additive in the solvent (2 mL) at room temperature.

亚乙基)苯甲酰胺、*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-甲氧基苯甲酰胺以及 *N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-氯苯甲酰胺反应时, 反应能顺利进行, 以较高的收率得到目标产物(表 2, **3v**, **3w** 和 **3x**)。当溴乙烷作为烷基化试剂和 **1a** 反应时, 原料 **1a** 会出现大量剩余的现象, 仅以 18% 的收率得到目标产物 **3y**。当碘乙烷或 1-碘代正丁烷作为烷基化试剂和 **1a** 反应时, 在标准条件下, 碘乙烷或 1-碘代正丁烷大量剩余, **3y** 和 **3z** 的产率为 19% 和 35%。为了提高碘乙烷或 1-碘代正丁烷的转化率, 将反应温度升至 60 °C, 碘乙烷或 1-碘代正丁烷反应完全, 反应产率有所提高, 分别以 51% 和 53% 的产率得到了相应目标产物 **3y** 和 **3z**。

为了进一步探究该方法的普适性, 在上述研究的基础上, 将 α,β -不饱和酯作为烷基化试剂, 探索了 α,β -不饱和酯 **4** 与三氟甲基芳酰胺的 Michael 加成反应, 实验结果见表 3。由表 3 可知, 三氟甲基芳酰胺可以与丙烯酸乙酯或丙炔酸甲酯反应得到相应的目标产物。研究发

现, 当 **4** 为丙烯酸乙酯时, 三氟甲基芳酰胺 **1** 芳环上的取代基 R^1 的电子性质对反应影响较大。当 R^1 基团为供电子基团时, 目标产物 **5c** 的产率为 49%。但是, 当 R^1 基团为吸电子基时, 目标产物 **5b** 的产率仅为 14%。当 **4** 为丙炔酸甲酯时, 反应也可以顺利进行, 以中等到良好的产率得到目标产物 **5d**~**5f**。对于芳环上连有取代基的三氟甲基芳酰胺, 不管 R^1 基团是吸电子基还是供电子基, 反应均能顺利进行, 分别以 73% ($R^1=\text{NO}_2$) 和 75% ($R^1=\text{CH}_3$) 的产率得到目标产物(表 3, **5e** 和 **5f**)。但当使用巴豆酸甲酯、肉桂酸甲酯和丁炔酸甲酯作为烷基化试剂时, 该反应没有发生。

2 结论

综上所述, 探索了一种利用三氟甲基芳酰胺与卤代烃或 α,β -不饱和酯合成 *N*-烷基取代的三氟甲基芳酰胺类化合物的方法。该方法具有反应条件温和、产率高及操作

表 2 三氟甲基酰肼与卤代烃的烷基化反应^a

Table 2 Alkylations reactions of trifluoromethylated acylhydrazones with halogenated hydrocarbons

^a Unless otherwise noted, all reactions were performed with **1** (0.2 mmol), **2** (0.5 mmol), K_2CO_3 (0.3 mmol), TBAI (0.02 mmol) in the CH_3CN (2 mL) at room temperature. Isolated yields. ^b The reaction was performed at 60 °C.

表 3 三氟甲基酰肼与 α,β -不饱和酯的 Michael 加成反应^aTable 3 Michael addition reactions of trifluoromethylated acylhydrazones with α,β -unsaturated esters

^a Unless otherwise noted, all reactions were performed with **1** (0.2 mmol), **4** (0.5 mmol), K_2CO_3 (0.3 mmol), TBAI (0.02 mmol) in the CH_3CN (2 mL) at room temperature. Isolated yields. ^b Without TBAI.

简单等优点. 通过该反应得到的 *N*-烷基取代的三氟甲基酰肼衍生物可作为新的三氟甲基合成砌块在有机合成中得到应用, 并有望应用于医药、农药和材料等各个领域.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

核磁共振谱使用 Varian Mercury 400 MHz 或 Agilent DD2 600 MHz 型核磁共振仪测定, 氘代氯仿作为溶剂, TMS 为内标; 高分辨质谱使用 Bruker APEX II 傅里叶变换离子回旋共振质谱仪测定, ESI 源; 熔点利用 X-4 型显微熔点测定仪测定, 温度未校正.

含三氟甲基的酰肼(**1**)根据文献[18]自制, 石油醚和乙酸乙酯重蒸后使用, 其他试剂均为国产分析纯.

3.2 实验方法

3.2.1 化合物 **3** 的合成

在反应管中, 依次加入 *N*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼(**1a**, 0.050 g, 0.20 mmol)、碳酸钾(0.041 g, 0.30

mmol)、四丁基碘化铵(0.007 g, 0.02 mmol)、乙腈(2 mL)和烯丙基溴(**2a**, 0.061 g, 0.50 mmol)。将此混合液在室温条件下搅拌, 直至薄层色谱(TLC)监测反应完全。然后向反应混合物中加入 2 mL 饱和氯化铵溶液, 搅拌 5 min, 用乙酸乙酯(4 mL $\times$ 3)萃取, 分出有机相, 用无水硫酸钠干燥。减压蒸馏除去溶剂, 残留物利用柱层析分离[V(石油醚): V(乙酸乙酯)=5:1], 得到产物 *N*-烯丙基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼(**3a**) 45 mg, 黄色液体, 产率 88%。¹H NMR (600 MHz, CDCl₃) δ : 7.71 (d, J =7.2 Hz, 2H), 7.49 (t, J =7.8 Hz, 1H), 7.41 (t, J =7.8 Hz, 2H), 6.98 (q, J =3.6 Hz, 1H), 5.81~5.75 (m, 1H), 5.32 (d, J =10.2 Hz, 1H), 5.18 (d, J =17.4 Hz, 1H), 4.72 (d, J =4.2 Hz, 2H); ¹³C NMR (150 MHz, CDCl₃) δ : 170.6, 132.9, 131.3, 130.1, 128.5, 127.6, 126.2 (q, J_{C-F} =39.3 Hz), 120.2 (q, J_{C-F} =269.9 Hz), 118.1, 44.6; ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ : -67.1 (d, J_{F-H} =3.4 Hz); HRMS (ESI) calcd for C₁₂H₁₁F₃N₂O₂Na [M+Na]⁺ 279.0716, found 279.0708.

化合物 **3b**~**3w** 的合成方法同 **3a**。

N-烯丙基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-氯苯甲酰肼(**3b**): 48 mg, 黄色液体, 产率 83%。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.68 (d, J =8.8 Hz, 2H), 7.39 (d, J =8.8 Hz, 2H), 6.99 (q, J =3.6 Hz, 1H), 5.82~5.73 (m, 1H), 5.33 (d, J =10.4 Hz, 1H), 5.17 (d, J =17.2 Hz, 1H), 4.71 (d, J =4.8 Hz, 2H); ¹³C NMR (150 MHz, CDCl₃) δ : 169.5, 137.6, 131.7, 131.2, 128.4, 127.9, 126.6 (q, J_{C-F} =39.3 Hz), 120.1 (q, J_{C-F} =269.9 Hz), 118.3, 44.7; ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ : -67.1 (d, J_{F-H} =3.4 Hz); HRMS (ESI) calcd for C₁₂H₁₀ClF₃N₂O₂Na [M+Na]⁺ 313.0326, found 313.0327.

N-烯丙基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-甲氧基苯甲酰肼(**3c**): 51 mg, 黄色液体, 产率 90%。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.80 (d, J =9.2 Hz, 2H), 6.96 (q, J =3.6 Hz, 1H), 6.91 (d, J =9.2 Hz, 2H), 5.82~5.73 (m, 1H), 5.31 (d, J =10.4 Hz, 1H), 5.16 (d, J =17.2 Hz, 1H), 4.71 (d, J =4.4 Hz, 2H), 3.85 (s, 3H); ¹³C NMR (150 MHz, CDCl₃) δ : 169.7, 162.2, 132.9, 128.7, 125.6 (q, J_{C-F} =39.0 Hz), 124.8, 120.3 (q, J_{C-F} =269.9 Hz), 118.1, 113.0, 55.4, 44.9; ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ : -66.9 (d, J_{F-H} =3.0 Hz); HRMS (ESI) calcd for C₁₃H₁₃F₃N₂O₂Na [M+Na]⁺ 309.0821, found 309.0834.

N-肉桂基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼(**3d**): 63 mg, 黄色液体, 产率 95%。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.77~7.74 (m, 2H), 7.52~7.47 (m, 1H), 7.44~7.27 (m, 7H), 7.10~7.07 (m, 1H), 6.52 (d, J =17.2 Hz, 1H), 6.14~

6.08 (m, 1H), 4.86 (d, J =5.2 Hz, 2H); ¹³C NMR (150 MHz, CDCl₃) δ : 170.6, 135.6, 133.5, 132.9, 131.3, 130.2, 128.7, 128.2, 127.6, 126.4, 126.1 (q, J_{C-F} =39.2 Hz), 120.2 (q, J_{C-F} =270.0 Hz), 119.9, 44.3; ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ : -66.9 (d, J_{F-H} =3.4 Hz); HRMS (ESI) calcd for C₁₈H₁₅F₃N₂O₂Na [M+Na]⁺ 355.1029, found 355.1027.

N-肉桂基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-3-甲基苯甲酰肼(**3e**): 66 mg, 无色液体, 产率 96%。¹H NMR (600 MHz, CDCl₃) δ : 7.57 (s, 1H), 7.54~7.43 (m, 1H), 7.36~7.33 (m, 3H), 7.32~7.30 (m, 3H), 7.27~7.25 (m, 1H), 7.08 (q, J =3.6 Hz, 1H), 6.52 (d, J =16.2 Hz, 1H), 6.13~6.08 (m, 1H), 4.86 (d, J =4.2 Hz, 2H), 2.39 (s, 3H); ¹³C NMR (150 MHz, CDCl₃) δ : 170.8, 137.4, 135.7, 133.5, 132.7, 132.0, 130.8, 128.6, 128.2, 127.4, 127.3, 126.4, 126.0 (q, J_{C-F} =39.2 Hz), 120.2 (q, J_{C-F} =270.0 Hz), 120.0, 44.3, 21.2; ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ : -66.9 (d, J_{F-H} =3.4 Hz); HRMS (ESI) calcd for C₁₉H₁₇F₃N₂O₂Na [M+Na]⁺ 369.1185, found 369.1187.

N-肉桂基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-3-氯苯甲酰肼(**3f**): 53 mg, 无色液体, 产率 72%。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.75 (s, 1H), 7.62 (d, J =8.0 Hz, 1H), 7.48 (d, J =8.0 Hz, 1H), 7.39~7.29 (m, 6H), 7.12 (q, J =3.6 Hz, 1H), 6.54 (d, J =16.4 Hz, 1H), 6.15~6.08 (m, 1H), 4.88 (d, J =4.0 Hz, 2H); ¹³C NMR (150 MHz, CDCl₃) δ : 169.2, 135.5, 134.5, 133.9, 133.8, 131.3, 130.3, 128.9, 128.7, 128.4, 128.3, 126.7 (q, J_{C-F} =39.3 Hz), 126.5, 120.0 (q, J_{C-F} =270.2 Hz), 119.6, 44.5; ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ : -67.1 (d, J_{F-H} =3.8 Hz); HRMS (ESI) calcd for C₁₈H₁₄ClF₃N₂O₂Na [M+Na]⁺ 389.0639, found 389.0653.

N-(2-甲基烯丙基)-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼(**3g**): 48 mg, 黄色液体, 产率 89%。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.71 (d, J =7.2 Hz, 2H), 7.49 (t, J =7.2 Hz, 1H), 7.44~7.39 (d, J =3.6 Hz, 2H), 6.94 (q, J =3.6 Hz, 1H), 5.02 (q, J =0.8 Hz, 1H), 4.79 (t, J =0.8 Hz, 1H), 4.65 (s, 2H), 1.78 (d, J =0.8 Hz, 3H); ¹³C NMR (150 MHz, CDCl₃) δ : 170.8, 136.2, 133.0, 131.2, 130.1, 127.6, 126.5 (q, J_{C-F} =39.2 Hz), 120.2 (q, J_{C-F} =270.0 Hz), 112.6, 48.1, 19.7; ¹⁹F NMR (376 MHz, CDCl₃) δ : -67.1 (d, J_{F-H} =3.4 Hz); HRMS (ESI) calcd for C₁₃H₁₃F₃N₂O₂Na [M+Na]⁺ 293.0872, found 293.0874.

N-(2-甲基烯丙基)-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-硝基苯甲酰肼(**3h**): 51 mg, 黄色液体, 产率 81%。¹H NMR (600 MHz, CDCl₃) δ : 8.27 (d, J =8.0 Hz, 2H), 7.82 (d, J =8.0

Hz, 2H), 7.01 (q, $J=3.0$ Hz, 1H), 5.06 (s, 1H), 4.81 (s, 1H), 4.67 (s, 2H), 1.80 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 169.1, 149.0, 139.2, 135.7, 130.7, 128.0 (q, $J_{\text{C-F}}=39.3$ Hz), 122.8, 119.8 (q, $J_{\text{C-F}}=270.0$ Hz), 112.9, 48.1, 19.6; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -67.4 (d, $J_{\text{F-H}}=3.4$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{F}_3\text{N}_3\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 338.0723, found 338.0728.

N-烯丙基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)硬脂酰肼(**3i**): 19 mg, 无色液体, 产率 22%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 6.88 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 5.71~5.62 (m, 1H), 5.25 (d, $J=12.0$ Hz, 1H), 5.04 (d, $J=16.0$ Hz, 1H), 4.54 (s, 2H), 2.77 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 1.69~1.62 (m, 2H), 1.25 (s, 28H), 0.88 (t, $J=8.0$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 175.4, 128.7, 125.6 (q, $J_{\text{C-F}}=38.9$ Hz), 120.3 (q, $J_{\text{C-F}}=269.4$ Hz), 117.8, 43.5, 33.1, 31.9, 29.7, 29.7, 29.7, 29.6, 29.5, 29.4, 29.3, 29.3, 25.0, 22.7, 14.1; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -71.8 (d, $J_{\text{F-H}}=3.4$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{23}\text{H}_{41}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 441.3063, found 441.3061.

N-炔丙基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-甲基苯甲酰肼(**3j**): 50 mg, 无色液体, 产率 94%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.58 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.19~7.13 (m, 3H), 4.78 (s, 2H), 2.33 (s, 3H), 2.29 (t, $J=4.0$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 169.6, 142.3, 130.6, 129.2, 128.4, 126.6 (q, $J_{\text{C-F}}=39.3$ Hz), 120.1 (q, $J_{\text{C-F}}=270.0$ Hz), 74.6, 74.4, 31.8, 21.5; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -67.0 (d, $J_{\text{F-H}}=3.8$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 291.0716, found 291.0708.

N-炔丙基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-氯苯甲酰肼(**3k**): 49 mg, 白色固体, 产率 85%. m.p. 58~60 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.69 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.40 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 7.26 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 4.86 (d, $J=2.0$ Hz, 2H), 2.40~2.38 (m, 1H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 168.7, 138.0, 131.8, 130.5, 128.0, 127.3 (q, $J_{\text{C-F}}=39.5$ Hz), 120.0 (q, $J_{\text{C-F}}=270.2$ Hz), 74.7, 74.3, 31.9; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -71.9 (d, $J_{\text{F-H}}=3.4$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{ClF}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 311.0169, found 311.0173.

N-(丁-2-炔-1-基)-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼(**3l**): 48 mg, 无色液体, 产率 90%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.71 (d, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.48 (t, $J=6.8$ Hz, 1H), 7.40 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.24 (q, $J=3.2$ Hz, 1H), 4.79 (q, $J=2.0$ Hz, 2H), 1.81 (t, $J=2.0$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 169.8, 132.6, 131.4, 130.2, 127.5, 126.9 (q, $J_{\text{C-F}}=39.2$ Hz), 120.2 (q, $J_{\text{C-F}}=270.0$ Hz), 82.4, 69.8, 32.3, 3.4; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -67.2 (d,

$J_{\text{F-H}}=3.4$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 291.0716, found 291.0706.

N-(丁-2-炔-1-基)-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-甲氧基苯甲酰肼(**3m**): 38 mg, 无色液体, 产率 63%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.79 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.23 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 6.90 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 4.78 (q, $J=2.4$ Hz, 2H), 3.85 (s, 3H), 1.82 (t, $J=2.4$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 168.9, 162.2, 132.9, 126.3 (q, $J_{\text{C-F}}=39.3$ Hz), 124.4, 120.3 (q, $J_{\text{C-F}}=270.0$ Hz), 112.9, 82.3, 70.0, 55.3, 32.5, 3.5; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -67.0 (d, $J_{\text{F-H}}=3.4$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_2\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 321.0821, found 321.0815.

N-苄基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼(**3n**): 56 mg, 无色液体, 产率 92%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.78 (d, $J=6.8$ Hz, 2H), 7.50 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.43 (t, $J=6.8$ Hz, 2H), 7.36 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.30 (t, $J=6.8$ Hz, 1H), 7.21 (d, $J=6.8$ Hz, 2H), 6.91 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 5.31 (s, 2H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 171.1, 132.9, 132.9, 131.4, 130.2, 129.3, 128.0, 127.6, 126.4 (q, $J_{\text{C-F}}=39.2$ Hz), 126.3, 120.0 (q, $J_{\text{C-F}}=270.2$ Hz), 46.3; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -67.1 (d, $J_{\text{F-H}}=3.0$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{13}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 329.0872, found 329.0871.

N-苄基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-甲氧基苯甲酰肼(**3o**): 63 mg, 无色液体, 产率 94%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.88 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 7.37 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.30 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 7.21 (d, $J=7.6$ Hz, 2H), 6.95 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 6.89 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 5.32 (s, 2H), 3.88 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 170.2, 162.3, 133.1, 132.9, 129.2, 127.9, 126.3, 125.8 (q, $J_{\text{C-F}}=39.2$ Hz), 124.7, 120.1 (q, $J_{\text{C-F}}=269.9$ Hz), 113.0, 55.4, 46.5; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -66.9 (d, $J_{\text{F-H}}=3.8$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_2\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 359.0978, found 359.0983.

N-苄基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-硝基苯甲酰肼(**3p**): 52 mg, 白色固体, 产率 74%. m.p. 104~106 °C; ^1H NMR (600 MHz, CDCl_3) δ : 8.29 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.89 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.40 (t, $J=7.8$ Hz, 2H), 7.34 (t, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.23 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 6.98 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 5.34 (s, 2H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 169.5, 149.1, 139.1, 132.3, 130.9, 129.5, 128.4, 127.9 (q, $J_{\text{C-F}}=39.6$ Hz), 126.3, 122.9, 119.7 (q, $J_{\text{C-F}}=270.3$ Hz), 46.4; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -67.3 (d, $J_{\text{F-H}}=3.0$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{F}_3\text{N}_3\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 374.0723, found 374.0719.

N-(4-氯苄基)-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼(**3q**): 61 mg, 无色液体, 产率 90%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.77 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.52 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.44 (t, $J=7.2$ Hz, 2H), 7.35 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.16 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 6.87 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 5.28 (s, 2H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 171.0, 133.9, 132.6, 131.5, 131.4, 130.3, 129.5, 127.8, 127.7, 126.3 (q, $J_{\text{C-F}}=39.5$ Hz), 119.9 (q, $J_{\text{C-F}}=270.0$ Hz), 45.7; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -67.1 (d, $J_{\text{F-H}}=3.8$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{ClF}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 363.0482, found 363.0479.

N-(4-甲基苄基)-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼(**3r**): 62 mg, 白色固体, 产率 97%. m.p. 74~76 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.77 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.50 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.42 (t, $J=4.0$ Hz, 2H), 7.17 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.10 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 6.92 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 5.27 (s, 2H), 2.33 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 171.1, 137.8, 133.0, 131.3, 130.2, 129.9, 129.8, 127.6, 126.3 (q, $J_{\text{C-F}}=39.2$ Hz), 126.3, 120.0 (q, $J_{\text{C-F}}=269.9$ Hz), 46.1, 21.0; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -71.0 (d, $J_{\text{F-H}}=3.8$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 343.1029, found 343.1033.

N-(4-氯苄基)-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-硝基苯甲酰肼(**3s**): 48 mg, 黄色固体, 产率 62%. m.p. 134~136 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.30 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.89 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.39 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.18 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 6.95 (q, $J=3.2$ Hz, 1H), 5.31 (s, 2H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 169.4, 149.2, 138.8, 134.3, 130.9, 130.8, 129.7, 127.8, 127.7 (q, $J_{\text{C-F}}=39.6$ Hz), 122.9, 119.6 (q, $J_{\text{C-F}}=270.5$ Hz), 45.7; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -67.3 (d, $J_{\text{F-H}}=3.4$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{11}\text{ClF}_3\text{N}_3\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 408.0333, found 408.0330.

N-苯甲酰基-*N*-(2,2,2-三氟亚乙基)氨基)甘氨酸乙酯(**3t**): 59 mg, 无色液体, 产率 98%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.73 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.51 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.42 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 6.84 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 4.84 (s, 2H), 4.27 (q, $J=6.8$ Hz, 2H), 1.30 (t, $J=6.8$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 170.6, 165.9, 132.3, 131.6, 130.2, 127.7, 125.5 (q, $J_{\text{C-F}}=39.9$ Hz), 120.0 (q, $J_{\text{C-F}}=270.0$ Hz), 62.3, 43.7, 14.1; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -72.3 (d, $J_{\text{F-H}}=3.4$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_{13}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 325.0770, found 325.0763.

N-苯甲酰基-*N*-(2,2,2-三氟亚乙基)氨基)甘氨酸苄酯(**3u**): 71 mg, 白色固体, 产率 97%. m.p. 64~66 °C;

^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.70 (d, $J=7.2$ Hz, 2H), 7.49 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.41 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.38~7.35 (m, 5H), 6.77 (q, $J=3.2$ Hz, 1H), 5.22 (s, 2H), 4.87 (s, 2H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 170.6, 165.8, 134.7, 132.2, 131.5, 130.2, 128.8, 128.7, 128.4, 127.6, 125.5 (q, $J_{\text{C-F}}=39.6$ Hz), 119.9 (q, $J_{\text{C-F}}=270.2$ Hz), 67.8, 43.7; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -72.2 (d, $J_{\text{F-H}}=3.4$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 387.0927, found 387.0912.

N-甲基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼(**3v**): 41 mg, 黄色液体, 产率 90%. ^1H NMR (600 MHz, CDCl_3) δ : 7.68 (d, $J=7.8$ Hz, 2H), 7.48 (t, $J=7.8$ Hz, 1H), 7.40 (t, $J=7.8$ Hz, 2H), 6.96 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 3.44 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 170.8, 132.9, 131.2, 130.1, 127.6, 125.3 (q, $J_{\text{C-F}}=39.2$ Hz), 120.3 (q, $J_{\text{C-F}}=269.5$ Hz), 29.2; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -66.8 (d, $J_{\text{F-H}}=3.4$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 253.0559, found 253.0563.

N-甲基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-甲氧基苯甲酰肼(**3w**): 39 mg, 白色固体, 产率 75%. m.p. 49~51 °C; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.76 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 6.95 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 6.91 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 3.86 (s, 3H), 3.44 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 169.9, 162.1, 132.8, 124.8, 124.7 (q, $J_{\text{C-F}}=39.2$ Hz), 120.4 (q, $J_{\text{C-F}}=269.4$ Hz), 112.9, 55.3, 29.4; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -66.6 (d, $J_{\text{F-H}}=3.0$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_2\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 283.0665, found 283.0660.

N-甲基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-氯苯甲酰肼(**3x**): 41 mg, 无色液体, 产率 78%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.65 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.39 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 6.99 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 3.45 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 169.7, 137.5, 131.7, 131.2, 127.9, 125.7 (q, $J_{\text{C-F}}=39.3$ Hz), 120.2 (q, $J_{\text{C-F}}=269.7$ Hz), 29.2; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -66.8 (d, $J_{\text{F-H}}=3.0$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{ClF}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 287.0169, found 287.0170.

N-乙基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)苯甲酰肼(**3y**): 25 mg, 无色液体, 产率 51%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.67 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.46 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.39 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.02 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 4.10 (q, $J=7.2$ Hz, 2H), 1.25 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 170.5, 133.2, 131.1, 130.1, 127.5, 124.5 (q, $J_{\text{C-F}}=39.3$ Hz), 120.3 (q, $J_{\text{C-F}}=269.7$ Hz), 36.9, 9.9; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -71.7 (d, $J_{\text{F-H}}=3.8$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 267.0716, found

267.0729.

N-正丁基-*N'*-(2,2,2-三氟亚乙基)-4-甲基苯甲酰肼(**3z**): 30 mg, 无色液体, 产率 53%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.60 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.20 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 6.99 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 4.03 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 2.39 (s, 3H), 1.65~1.57 (m, 2H), 1.48~1.40 (m, 2H), 0.99 (t, $J=8.0$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 170.6, 141.6, 130.4, 130.3, 128.2, 124.2 (q, $J_{\text{C-F}}=39.3$ Hz), 120.4 (q, $J_{\text{C-F}}=269.7$ Hz), 41.8, 26.6, 21.5, 20.2, 13.7; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -71.5 (d, $J_{\text{F-H}}=3.4$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{14}\text{H}_{17}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_4\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 309.1185, found 309.1191.

3.2.2 化合物 **5** 的合成

在反应管中, 依次加入三氟甲基酰肼(**1a**, 0.050 g, 0.20 mmol)、碳酸钾(0.041 g, 0.30 mmol)、四丁基碘化铵(0.007 g, 0.02 mmol)、乙腈(2 mL)和丙烯酸乙酯(**4a**, 0.061 g, 0.50 mmol). 将此混合液在室温条件下搅拌, 直至薄层色谱(TLC)监测反应完全. 然后向反应混合物中加入 2 mL 饱和氯化铵溶液, 搅拌 5 min, 用乙酸乙酯(4 mL $\times$ 3)萃取, 分出有机相, 用无水硫酸钠干燥. 减压蒸馏除去溶剂, 残留物利用柱层析分离[V (石油醚): V (乙酸乙酯)=5:1], 得到产物 3-(1-苯甲酰基-2-(2,2,2-三氟亚乙基)肼基)丙烯酸乙酯(**5a**) 32 mg, 无色液体, 产率 51%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.68 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.48 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.39 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.20 (q, $J=3.2$ Hz, 1H), 4.31 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 4.18 (q, $J=8.0$ Hz, 2H), 2.68 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 1.27 (t, $J=8.0$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 170.9, 170.7, 132.8, 131.3, 130.1, 127.6, 125.6 (q, $J_{\text{C-F}}=39.9$ Hz), 120.3 (q, $J_{\text{C-F}}=270.0$ Hz), 61.3, 37.9, 30.2, 14.1; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -67.0 (d, $J_{\text{F-H}}=3.4$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{14}\text{H}_{15}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 339.0927, found 339.0917.

化合物 **5b**~**5c** 的合成方法同 **5a**.

3-(1-(4-溴苯甲酰基)-2-(2,2,2-三氟亚乙基)肼基)丙烯酸乙酯(**5b**): 11 mg, 无色液体, 产率 14%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.58~7.53 (m, 4H), 7.21 (q, $J=3.2$ Hz, 1H), 4.30 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 4.18 (q, $J=8.0$ Hz, 2H), 2.68 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 1.27 (t, $J=8.0$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 170.8, 169.7, 131.8, 131.6, 130.9, 126.2, 126.0 (q, $J_{\text{C-F}}=39.2$ Hz), 120.2 (q, $J_{\text{C-F}}=270.2$ Hz), 61.3, 37.9, 30.2, 14.1; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -72.2 (d, $J_{\text{F-H}}=3.0$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{BrF}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 417.0032, found 417.0014.

3-(1-(4-甲氧基苯甲酰基)-2-(2,2,2-三氟亚乙基)肼基)

丙酸乙酯(**5c**): 34 mg, 无色液体, 产率 49%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.75 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.17 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 7.90 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 4.30 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 4.18 (q, $J=8.0$ Hz, 2H), 3.86 (s, 3H), 2.67 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 1.27 (t, $J=4.0$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 170.9, 169.7, 162.2, 132.8, 124.9 (q, $J_{\text{C-F}}=39.3$ Hz), 124.6, 120.4 (q, $J_{\text{C-F}}=269.9$ Hz), 112.9, 61.2, 55.3, 38.0, 30.2, 14.1; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -66.8 (d, $J_{\text{F-H}}=3.0$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_4\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 369.1033, found 369.1029.

在反应管中, 依次加入三氟甲基酰肼(**1a**, 0.050 g, 0.20 mmol)、碳酸钾(0.041 g, 0.30 mmol)、乙腈(2 mL)和丙炔酸乙酯(**4b**, 0.068 g, 0.50 mmol). 将此混合液在室温条件下搅拌, 直至薄层色谱(TLC)监测反应完全. 然后向反应混合物中加入 2 mL 饱和氯化铵溶液, 搅拌 5 min, 用乙酸乙酯(4 mL $\times$ 3)萃取, 分出有机相, 用无水硫酸钠干燥. 减压蒸馏除去溶剂, 残留物利用柱层析分离[V (石油醚): V (乙酸乙酯)=5:1], 得到产物 3-(1-苯甲酰基-2-(2,2,2-三氟亚乙基)肼基)丙烯酸甲酯(**5d**): 39 mg, 黄色液体, 产率 65%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.73 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.52 (t, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.43 (t, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.12 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 6.55 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.23 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 3.71 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 170.1, 163.5, 132.7, 132.3, 131.9, 130.1, 129.2 (q, $J_{\text{C-F}}=39.5$ Hz), 127.8, 121.5, 120.0 (q, $J_{\text{C-F}}=270.2$ Hz), 52.0; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -67.2 (d, $J_{\text{F-H}}=3.8$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 323.0614, found 323.0605.

化合物 **5e**~**5f** 的合成方法同 **5d**.

3-(1-(4-硝基苯甲酰基)-2-(2,2,2-三氟亚乙基)肼基)丙烯酸甲酯(**5e**): 50 mg, 黄色液体, 产率 73%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.30 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.88 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.09 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 6.57 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.36 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 3.75 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 168.4, 163.1, 149.4, 138.8, 131.4, 130.8, 129.7 (q, $J_{\text{C-F}}=39.6$ Hz), 123.4, 123.0, 119.7 (q, $J_{\text{C-F}}=270.5$ Hz), 52.3; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -67.4 (d, $J_{\text{F-H}}=3.4$ Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{F}_3\text{N}_3\text{O}_5\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 368.0465, found 368.0482.

3-(1-(4-甲基苯甲酰基)-2-(2,2,2-三氟亚乙基)肼基)丙烯酸甲酯(**5f**): 47 mg, 黄色液体, 产率 75%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.66 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.24 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.12 (q, $J=3.6$ Hz, 1H), 6.55 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.20 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 3.70 (s, 3H), 2.41 (s, 3H); ^{13}C NMR (150 MHz, CDCl_3) δ : 170.0, 163.5, 142.7, 132.6,

130.3, 129.7, 129.1 (q, J_{C-F} = 39.6 Hz), 128.6, 121.0, 120.0 (q, J_{C-F} = 270.2 Hz), 52.0. 21.6; ^{19}F NMR (376 MHz, CDCl_3) δ : -72.4 (d, J_{F-H} = 3.8 Hz); HRMS (ESI) calcd for $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{F}_3\text{N}_2\text{O}_3\text{Na}$ $[\text{M} + \text{Na}]^+$ 337.0770, found 337.0761.

辅助材料(Supporting Information) 合成产物 **3a~3z**, **5a~5f** 的 ^1H NMR、 ^{13}C NMR 和 ^{19}F NMR 图谱. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] Sugiura, M.; Kobayashi, S. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2005**, *44*, 5176.
- [2] (a) Che, Z.; Zhang, S.; Shao, Y.; Fan, L.; Xu, H.; Yu, X.; Zhi, X.; Yao, X. *J. Agric. Food Chem.* **2013**, *61*, 5696.
(b) Zhou, Y.; Luo, Y.; Yang, Y.-S.; Lu, L.; Zhu, H.-L. *Med. Chem. Commun.* **2016**, *7*, 1980.
(c) Roth, H. S.; Hergenrother, P. J. *Curr. Med. Chem.* **2016**, *23*, 201.
(e) Dimmock, J. R.; Vashishtha, S. C.; Stables, J. P. *Eur. J. Med. Chem.* **2000**, *35*, 241.
- [3] Silva, A. G.; Zapata-Sudo, G.; Kummerle, A. E.; Fraga, C. A.; Barreiro, E. J.; Sudo, R. T. *Bioorg. Med. Chem.* **2005**, *13*, 3431.
- [4] de Figueiredo, L. P.; Ibiapino, A. L. do Amaral, D. N.; Ferraz, L. S.; Rodrigues, T.; Barreiro, E. J.; Lima, L. M.; Ferreira, F. F. *J. Mol. Struct.* **2017**, *1147*, 226.
- [5] Kümmerle, A. E.; Schmitt, M.; Cardozo, S. V. S.; Lugnier, C.; Villa, P.; Lopes, A. B.; Romeiro, N. C.; Justiniano, H.; Martins, M. A.; Fraga, C. A. M.; Bourguignon, J.-J.; Barreiro, E. J. *J. Med. Chem.* **2012**, *55*, 7525.
- [6] Rodrigues, D. A.; Ferreira-Silva, G. A.; Ferreira, A. C. S.; Fernandes, R. A.; Kwee, J. K.; Sant'Anna, C. M. R.; Ionta, M.; Fraga, C. A. *J. Med. Chem.* **2016**, *59*, 655.
- [7] Vantomme, G.; Jiang, S.; Lehn, J.-M. *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 9509.
- [8] (a) Shih, M.-H.; Xu, Y.-Y.; Yang, Y.-S.; Lin, T.-T. *Molecules* **2015**, *20*, 5184.
(b) Ragnarsson, U. *Chem. Soc. Rev.* **2001**, *30*, 205.
- [9] Kümmerle, A. E.; Raimundo, J. M.; Leal, C. M.; da Silva, G. S.; Balliano, T. L.; Pereira, M. A.; de Simone, C. A.; Sudo, R. T.; Zapata-Sudo, G.; Fraga, C. A. M.; Barreiro, E. J. *Eur. J. Med. Chem.* **2009**, *44*, 4004.
- [10] Oikawa, N.; Müller, C.; Kunz, M.; Lichtenthaler, F. W. *Carbohydr. Res.* **1998**, *309*, 269.
- [11] Zhang, H.; Wang, K.-H.; Wang, J.; Su, Y.; Huang, D.; Hu, Y. *Org. Biomol. Chem.* **2019**, *17*, 2940.
- [12] Mahmoud, N. F. H.; Elsayed, G. A. *J. Heterocycl. Chem.* **2020**, *57*, 1845.
- [13] (a) Zhou, Y.; Wang, J.; Gu, Z.; Wang, S.; Zhu, W.; Aceña, J. L.; Soloshonok, V. A.; Lzawa, K.; Liu, H. *Chem. Rev.* **2016**, *116*, 422.
(b) Vitale, A.; Bongiovanni, R.; Ameduri, B. *Chem. Rev.* **2015**, *115*, 8835.
- [14] (a) Liu, X.; Xu, C.; Wang, M.; Liu, Q. *Chem. Rev.* **2015**, *115*, 683.
(b) Charpentier, J.; Früh, N.; Togni, A. *Chem. Rev.* **2015**, *115*, 650.
(c) Studer, A. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2012**, *51*, 8950.
- [15] (a) Ji, X.; Shi, G.; Zhang, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2019**, *39*, 929 (in Chinese).
(季小明, 史广法, 张扬会, 有机化学, **2019**, *39*, 929.)
(b) Qing, F. *Chin. J. Org. Chem.* **2012**, *32*, 815 (in Chinese).
(卿凤翎, 有机化学, **2012**, *32*, 815.)
(c) Liang, H.; Xu, G.; Feng, Z.; Wang, Z.; Xu, P. *J. Org. Chem.* **2019**, *84*, 60.
(d) Wang, J.; Li, F.; Xu, Y.; Wang, J.; Wu, Z.; Yang, C.; Liu, L. *Chin. J. Org. Chem.* **2018**, *38*, 1155 (in Chinese).
(王晶晶, 李峰, 徐妍, 王娟, 武紫燕, 杨成玉, 刘澜涛, 有机化学, **2018**, *38*, 1155.)
- [16] (a) Wang, K.-H.; Shi, B.; Wang, Y.; Wang, J.; Huang, D.; Su, Y.; Hu, Y. *Asian J. Org. Chem.* **2019**, *8*, 716.
(b) Xu, W.; Huang, D.; Wang, K.; Zhao, F.; Zhao, Z.; Hu, Y.; Su, Y.; Hu, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2020**, *40*, 922 (in Chinese).
(徐伟刚, 黄丹凤, 王克虎, 赵芳霞, 赵转霞, 虎永琴, 苏瀛鹏, 胡雨来, 有机化学, **2020**, *40*, 922.)
(c) Hu, Y.; Huang, D.; Wang, K.; Zhao, F.; Zhao, Z.; Xu, W.; Hu, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2020**, *40*, 1689 (in Chinese).
(虎永琴, 黄丹凤, 王克虎, 赵芳霞, 赵转霞, 徐伟刚, 胡雨来, 有机化学, **2020**, *40*, 1689.)
- [17] (a) Peng, X.; Huang, D.; Wang, K.-H.; Wang, Y.; Wang, J.; Su, Y.; Hu, Y. *Org. Biomol. Chem.* **2017**, *15*, 6214.
(b) Liu, L.; Huang, D.; Wang, Y.; Wen, L.; Yang, Z.; Su, Y.; Wang, K.; Hu, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2018**, *38*, 1469 (in Chinese).
(刘丽丽, 黄丹凤, 王玉祥, 文岚, 杨政, 苏瀛鹏, 王克虎, 胡雨来, 有机化学, **2018**, *38*, 1469.)
(c) Zhao, F.; Wang, K.-H.; Wen, L.; Zhao, Z.; Hu, Y.; Xu, W.; Huang, D.; Su, Y.; Wang, J.; Hu, Y. *Asian J. Org. Chem.* **2020**, *9*, 1036.
- [18] Du, G.; Huang, D.; Wang, K. H.; Chen, X.; Xu, Y.; Ma, J.; Su, Y.; Hu, Y. *Org. Biomol. Chem.* **2016**, *14*, 1492.

(Lu, Y.)