HBr 催化 α -溴代甲基酮类化合物的全脱溴反应研究郑梦霞^a 曾 竟^a 买里克扎提·买合木提^{*,b}阿布都热西提·阿布力克木^{*,a}^(a) 新疆师范大学化学系 乌鲁木齐 830054)^(b) 新疆大学化工学院 乌鲁木齐 830046)

摘要 报道了 HBr 催化下以水为氢源的 α -溴代甲基酮类化合物的脱溴化反应. 以 α -溴代甲基酮类化合物为原料, 四氢呋喃为溶剂, α -溴代甲基酮与质量分数 5% 的氢溴酸的物质的量比为 1.0 : 0.2 时, 在 180 °C 下反应 5~14 h, 分离产率高达 94% [高效液相(HPLC)产率 96%] 的脱溴产物. 该方法无金属催化剂参与, 催化剂价格低廉, 所有产物均经 ¹H NMR 和 ¹³C NMR 结构确证.

关键词 α -溴代甲基酮类化合物; HBr; 脱溴

Study on the Debromination of α -Bromomethyl Ketones Catalyzed by HBrZheng, Mengxia^a Zeng, Jing^a Meihemuti, Mailikezhati^{*,b} Abulikemu, Abudu Rexit^{*,a}^(a) Department of Chemistry, Xinjiang Normal University, Urumqi 830054)^(b) School of Chemical Engineering, Xinjiang University, Urumqi 830046)

Abstract The debromination reaction of α -bromomethylketone compounds was achieved by using water as the hydrogen source under the catalysis of HBr. Using α -bromomethylketones as raw materials, tetrahydrofuran as solvent, when the molar ratio of α -bromomethylketone to 5% mass fraction hydrobromic acid was 1.0 : 0.2, the debrominated product could be obtained with a isolated yield of 94% [high performance liquid chromatography (HPLC) yield 96%] by reacting at 180 °C for 5~14 h. All products were confirmed by ¹H NMR and ¹³C NMR spectra.

Keywords α -bromomethylketone; HBr; debromination

自然界中存在的溴代有机天然产物种类繁多^[1]. 除了自然界产生的溴化物外, 环境还存在着大量人工合成的溴化物. 溴代有机化合物是一类难降解、结构相对稳定的化合物, 大多数溴代有机物还具有较高的毒性和较强的“致癌、致畸、致突变”作用, 且容易通过食物链在生物体内富集, 严重地威胁着自然生态和人类健康^[2]. 溴代有机化合物的负面效应一般归因于溴原子, 因此研究溴代有机化合物的脱溴反应是一种非常有前景的环境修复策略^[3]. 尽管 α -溴代甲基酮类化合物是一种良好的亲核试剂, 可用于合成喹啉衍生物^[4]、新型蒽烷基噻唑衍生物^[5]、 α -卤代芳基醇^[6]及 α -乙酰氧基芳基酮^[7], 但 α -溴代甲基酮类化合物的存在也对生态环境不利. 因

此, 研究 α -溴代甲基酮类化合物的脱溴方法具有非常重要的意义.

在过去的十多年中, α -溴代甲基酮类化合物的脱溴方法得到了大力发展^[8]. 2011 年, Maji 等^[9]以 Ru(Bpy)₃-Cl₂ 为催化剂, 在 1,5-二甲氧基萘和抗坏血酸存在下, 实现了邻位二溴、 α -溴代和 α,α -二溴羰基化合物的光催化脱溴. 2014 年, Wang 等^[10]合成了一种 π -共轭多孔聚合物作为光催化剂, 光催化作用下可实现 α -溴代甲基酮的脱溴. 2016 年, Li 等^[11]报道了可见光驱动以还原氧化石墨烯固载三(联吡啶)钌(II)配合物为催化剂的 α -溴代甲基酮的脱溴. 2019 年, Li 等^[12]报道了在可见光照射下, 光催化剂亚胺基二维共价有机骨架(2D-COF)可用于苯酰

* Corresponding authors. E-mail: aarexit@xjnu.edu.cn; amelikezat@xjnu.edu.cn

Received October 6, 2020; revised December 14, 2020; published online January 7, 2021.

Project supported by the Xinjiang Uygur Autonomous Region 2017 Tianshan Youth Program (No. 2017Q026).

新疆维吾尔自治区 2017 年自治区“天山青年计划”(No. 2017Q026)资助项目.

溴衍生物的还原脱溴和醛的 α -烷基化反应, 但是光催化剂通常价格较高且合成方案复杂。

除光催化脱溴外, 利用还原剂还原脱溴的方法也较为常见, 以二丁基碲^[13]、铝-汞^[14]、亚磷酸三苯酯 P(OPh)_3 ^[15]、高配位聚甲基氢硅氧烷(PMHS)^[16]、铟^[17]、锌/氯化铵^[18]、1,4-二氢-2,6-二甲基吡啶-3,5-二羧酸二乙酯^[19]、苯硫醇^[20]及 Hantzsch Ester^[21]等为还原剂, 皆能实现 α -溴代甲基酮类化合物的还原, 但也存在底物适用范围有限及需金属还原剂等缺点。2019 年, 本课题组^[22]报道了苯硫醇还原 α,α,α -三溴甲基酮类化合物的反应。最近 Sadhukhan 等^[23]也报道了水的路易斯碱性或氢碘酸的酸性促进的 α,α -二溴代甲基酮类化合物还原的反应。在本课题组^[24]已报道的 α,α,α -三溴甲基酮类化合物选择性脱溴的基础上进一步研究了 HBr 催化的 α -溴代酮类化合物全脱溴的新方法, 该方法具有无金属催化剂参与及催化剂价格低廉等优点, 为 α -溴代酮类化合物的脱溴提供了一种新的方法, 研究过程中发现该方法也可用于 α -多溴代甲基酮和溴代环酮类化合物的还原。同时氘代作用在人类临床研究以及药物研发过程中的药代动力学研究中应用广泛^[25], 该方法也可用于氘代甲基酮类化合物的合成。

1 结果与讨论

1.1 反应的条件优化

前期工作发现氢溴酸是良好的脱溴试剂, 因此本实验选取 2-溴-1-(4-溴苯基)乙酮(**1a**)作为模板底物, 氢溴酸为脱溴试剂来优化 **1a** 的反应条件, 实验过程中考察了溶剂、氢溴酸的量及质量分数、溶剂的用量和温度等因素对模板反应的影响, 实验结果如表 1 所示。首先以四氢呋喃为溶剂, 添加 0.1 equiv. 质量分数 10% 氢溴酸, 在 150 °C 下对反应进行了初步尝试, 发现在 33 h 后以 67% 的收率得到目标产物 **2a**(表 1, Entry 4)。同时发现氢溴酸的用量及质量分数对反应收率有一定影响, 但皆能实现 2-溴-1-(4-溴苯基)乙酮的还原, 当使用 0.2 equiv. 质量分数 5% 氢溴酸时, 反应收率最高, 可达到 79%(表 1, Entry 7)。随后分别考察了 2-甲基四氢呋喃、二甲基亚砷、甲醇和 1,4-二氧六环等溶剂对反应的影响, 发现溶剂对反应收率的影响较大, 当以二甲基亚砷和甲醇为溶剂时, 几乎无目标化合物产生(表 1, Entries 10, 11)。1,4-二氧六环和 2-甲基四氢呋喃能较好地促进反应, 但以四氢呋喃(THF)为溶剂时, 反应收率最高, 可达到 79%(表 1, Entry 7)。接下来考察了温度对反应收率的影响, 发现随着温度的升高, 反应时间大大缩短, 180 °C 时 **2a** 分离

表 1 脱溴反应条件的优化^a
Table 1 Optimization of debromination reaction conditions

Entry	Mass fraction of HBr/%	HBr/equiv.	Solvent	<i>V</i> (solvent)/mL	<i>T</i> /°C	Time/h	Yield ^b /%
1	0	0	THF	1	150	33	37
2	0	0	THF	1	180	12	46
3 ^c	5	0.2	THF	1	180	12	45
4	10	0.1	THF	1	150	33	67
5	20	0.1	THF	1	150	33	66
6	5	0.1	THF	1	150	35	71
7	5	0.2	THF	1	150	35	79
8	5	0.3	THF	1	150	35	74
9	5	0.2	2-MeTHF	1	150	33	71
10	5	0.2	DMSO	1	150	33	Trace
11	5	0.2	CH ₃ OH	1	150	48	5
12	5	0.2	1,4-Dioxane	1	150	33	61
13	5	0.2	THF	0.5	180	7	63
14	5	0.2	THF	1	180	7	88 (96 ^d)
15	5	0.2	THF	2	180	7	87
16	5	0.2	THF	1	130	82	63

^a Reaction conditions: 180 °C, **1a** (0.20 mmol), 5% mass fraction HBr (0.2 equiv.), THF (1 mL). ^b Isolated yield. ^c Water blank test. ^d HPLC yield.

产率增加至 88% (HPLC 产率 96%)(表 1, Entry 14). 通过对溶剂用量的考察, 发现使用 1 mL 溶剂时产率最佳(表 1, Entry 14). 为了验证添加溴化氢和水的必要性, 分别进行了溴化氢空白和水空白的背景实验, 结果显示, **2a** 的产率皆较低, 180 °C 时溴化氢空白实验的分离产率为 46%(表 1, Entry 2), 水空白实验的分离产率为 45%(表 1, Entry 3). 因此模板反应最优反应条件是: 2-溴-1-(4-溴苯基)乙酮(**1a**, 0.2 mmol)为底物, THF 为溶剂, 添加 0.2 equiv. 质量分数 5% 氢溴酸, 180 °C 反应 7 h.

1.2 底物的扩展

选用最佳模板条件: 180 °C 下以 0.2 equiv. 质量分数 5% 氢溴酸作为脱溴剂、THF 作为溶剂, 考察了不同取代基的 α -溴代甲基酮脱溴情况, 结果如表 2 所示. 从实验结果可以看出, 无论芳环上含有供电子基还是吸电子基, 均可适用于该体系. 当苯环上无取代基(**2b**)时, 能以较好的分离产率得到目标产物; 当苯环上引入给电子基(甲基)时, 能以中等到较高的产率得到目标产物

(**2c~2d**); 当苯环上引入吸电子基(卤素、氰基和硝基)时, 反应更容易进行并且产率较高(**2e~2i**), 但当苯环上引入硝基时, 分离收率相对较低(**2j**); 对于含有萘环、杂环及脂肪族的底物, 也能以较好的产率得到目标化合物(**2k~2m**).

研究过程中还发现在相同条件下 α -多溴代甲基酮类化合物可实现全脱溴(Scheme 1), 以 2,2,4'-三溴苯乙酮为底物时, 反应 7 h 时分离产率可达 88%; 以 2,2,2-三溴-1-(4-溴苯基)乙酮为底物时, 反应 7 h 分离产率为 86%. 同时该方法还适用于 α -溴代环酮类化合物的脱溴(Scheme 1), 反应时间稍长, 产率适中(48%~69%), α -溴代六元环酮脱溴的产率(68%~69%)高于 α -溴代五元环酮(48%~50%).

1.3 可能的反应机理

为了获得反应机理方面的信息, 获取脱溴的氘代产物, 对 **9a** 进行了基于质量分数 5% 溴化氘的氘代水溶液的实验探索(Scheme 2), 发现有氘代产物(**10a**)存在, 产

表 2 脱溴反应底物的拓展^{a,b}

Table 2 Scope of substrates

$\text{Ar}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow[180\text{ }^\circ\text{C, THF}]{0.2\text{ equiv. 5\% HBr}} \text{Ar}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$	
1	2

2b , 12 h 68% (88%)	2c , 14 h 68% (96%)

2d , 11 h 75% (78%)	2e , 5 h 87% (87%)

2f , 5 h 71% (73%)	2g , 5 h 87% (91%)

2h , 5 h 92% (95%)	2i , 5 h 79% (93%)

2j , 5 h 25% (77%)	2k , 10 h 67% (78%)

2l , 3 h 60% (86%)	2m , 3 h 56% (60%)

^a Reaction conditions: 180 °C, **1a** (0.20 mmol), 5% mass fraction HBr (0.2 equiv.), THF (1 mL). ^b Isolated yield (HPLC yield).

图式 1 α -溴代酮类化合物的脱溴化反应

Scheme 1 Debromination reaction of α -bromoketone compounds

图式 2 氘代实验

Scheme 2 Deuterium experiment

率为 83%, 总氘代率 85%, 该体系在催化量 DBr 和过量 D_2O 的作用下产生了氘代产物, 这表明在本实验中 HBr 为催化剂, H_2O 为氢源. 基于前期的研究及以上的实验结果, 我们推测反应可能的机理如 Scheme 3 所示. 首先 α -三溴甲基酮在酸性条件下转化为中间体 **I**, 离去的溴正离子和体系中的溴负离子结合后生成溴单质, 同时产生中间体 **II**, 烯醇不稳定, 通过异构化得到中间产物 α,α -二溴甲基酮, 最终生成目标产物, 过程中产生的 Br_2 和水反应释放 HBr, 次溴酸加热后释放 HBr, 完成催化循环.

图式 3 可能的反应机理

Scheme 3 Proposed mechanism

为验证溴正离子的产生, 我们基于模板反应做了以下实验(Scheme 4): 第一, 向反应完后的体系中加入 1.0 equiv. NaI, 但没有产生碘单质; 第二, 反应前向体系中加入 1.0 equiv. NaI, 反应过程中产生了碘单质(体系中能明显看出碘的颜色), 反应速率加快, 产率有所降低, 分离产率 63%. 碘单质的出现说明体系中产生了溴正离子, 其氧化碘负离子后产生了碘单质和溴负离子.

图式 4 验证实验

Scheme 4 Verification experiment

2 结论

该体系在 180 °C 下以 α -溴代甲基酮为原料, 四氢呋喃为溶剂, 在 0.2 equiv. 5% 氢溴酸的作用下, 高效的合成了一系列脱溴产物, 分离产率介于 25%~92%, 高效液相产率介于 60%~96%. 该催化体系以 HBr 为催化剂, 水为氢源, 不仅能使 α -溴甲基酮脱溴, 还可用于 α -多溴代甲基酮及 α -溴代环酮类化合物的脱溴. 反应不需要过渡金属的参与, 催化剂价格低廉, 方法简单, 为溴代化合物的脱溴提供了一种新思路, 同时也为甲基酮类化合物的合成提供了一种新方法.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

HMS-14 数字型加热磁力搅拌器(上海泰坦科技股份有限公司); IKA-HB10 型旋转蒸发器(上海兴创仪器设备有限公司); XT4-100B 型熔点仪(北京市科仪电光仪器厂); Varian Inova-400 型核磁共振谱仪(美国 Varian 公司); BRUKER-TENSOR 27 红外吸收光谱仪(BRUKER 光谱仪器公司). 研究过程中使用的所有试剂均在泰坦科技探索平台购买.

3.2 实验方法

3.2.1 化合物 2a~2m、6a 和 8b 的合成

以化合物 2a 的合成为例. 向 15 mL 厚壁耐压瓶中依次加入搅拌磁子、2-溴-1-(4-溴苯基)乙酮(1a, 0.2 mmol)、0.2 equiv. 质量分数 5% 氢溴酸(0.04 mmol)和四氢呋喃(1 mL), 180 °C 下开始反应, 用薄层色谱(TLC)监测反应进程. 反应结束后, 粗产物直接用石油醚/二氯甲烷($V:V=2:1$)为展开剂用薄层层析板纯化, 得到 17.4 mg 淡黄色固体 4-溴苯乙酮(2a), 分离产率 88% (HPLC 产率 96%). m.p. 46.0~47.0 °C (lit.^[21] m.p. 47.1~48.2 °C); 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.83 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.62 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 2.59 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 196.96, 135.78, 131.85, 129.80, 128.25, 26.50; IR (KBr) ν : 1674, 1585, 1419, 1394, 1267, 1076, 1008, 960, 823, 748, 590 cm^{-1} .

苯乙酮(2b)^[10]: 无色液体, 16.2 mg, 分离产率 68% (HPLC 产率 88%). 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ : 7.97 (d, $J=7.2$ Hz, 2H), 7.58 (t, $J=14.4, 7.2$ Hz, 1H), 7.48 (t, $J=15.2, 8.0$ Hz, 2H), 2.61 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$) δ : 198.12, 137.09, 133.06, 128.50, 128.26, 26.58; IR (KBr) ν : 1685, 1598, 1447, 1359, 1265, 1179, 955, 760, 691, 589 cm^{-1} .

4-甲基苯乙酮(2c)^[15]: 无色液体, 19.4 mg, 分离产率 68% (HPLC 产率 96%). 1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ :

7.87 (d, $J=8.0$ Hz, 2H), 7.26 (t, $J=6.4, 7.2$ Hz, 2H), 2.58 (s, 3H), 2.41 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 197.81, 143.83, 134.68, 129.19, 128.39, 26.49, 21.60; IR (KBr) ν : 1682, 1606, 1430, 1358, 1268, 1182, 954, 816, 673, 591, 567 cm^{-1} .

2-甲基苯乙酮(**2d**)^[28]: 淡黄色液体, 24.8 mg, 分离产率 82% (HPLC 产率 66%). ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.68 (d, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.37 (t, $J=14.0, 6.4$ Hz, 1H), 7.26 (t, $J=11.2, 8.0$ Hz, 2H), 2.56 (s, 3H), 2.51 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 201.67, 138.37, 137.59, 131.96, 131.45, 129.28, 125.63, 29.51, 21.55; IR (KBr) ν : 1685, 1569, 1455, 1355, 1292, 1250, 953, 760, 721, 603 cm^{-1} .

4-氟苯乙酮(**2e**)^[10]: 无色液体, 25.0 mg, 分离产率 87% (HPLC 产率 87%). ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.00~7.97 (m, 2H), 7.15 (t, $J=17.2, 8.4$ Hz, 2H), 2.59 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 196.42, 166.98, 133.55, 130.93, 115.71, 26.49; IR (KBr) ν : 1686, 1598, 1506, 1408, 1359, 1266, 1232, 1157, 1015, 840, 589, 566 cm^{-1} .

3-氯苯乙酮(**2f**)^[29]: 淡黄色液体, 21.8 mg, 分离产率 71% (HPLC 产率 73%). ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.90 (t, $J=3.6, 1.6$ Hz, 1H), 7.81~7.79 (m, 1H), 7.52~7.49 (m, 1H), 7.40 (t, $J=15.6, 8.0$ Hz, 1H), 2.57 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 196.66, 138.56, 134.87, 132.98, 129.89, 128.36, 26.60; IR (KBr) ν : 1690, 1570, 1423, 1357, 1251, 1075, 960, 792, 683, 592 cm^{-1} .

3-氯-4-氟苯乙酮(**2g**)^[26]: 淡黄色固体, 33.6 mg, 分离产率 94% (HPLC 产率 87%). m.p. 35.0~36.0 $^{\circ}\text{C}$; ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.04 (dd, $J=7.2, 2.4$ Hz, 1H), 7.88~7.85 (m, 1H), 7.27 (t, $J=14.0, 5.6$ Hz, 1H), 2.59 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 195.30, 162.31, 134.25, 131.23, 128.70, 121.88, 116.87, 26.45; IR (KBr) ν : 2922, 2852, 1720, 1654, 1463, 1261, 1097, 1023, 802, 704, 636, 574, 505 cm^{-1} .

4-氯苯乙酮(**2h**)^[12]: 淡黄色液体, 28.4 mg, 分离产率 92% (HPLC 产率 95%). ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.91 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.45 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 2.59 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 196.77, 139.52, 135.37, 129.68, 128.85, 26.22; IR (KBr) ν : 1686, 1589, 1486, 1396, 1260, 1094, 1013, 957, 826, 761, 588, 524 cm^{-1} .

4-氰基苯乙酮(**2i**)^[32]: 淡黄色固体, 23.1 mg, 分离产率 79% (HPLC 产率 93%). m.p. 55.0~56.0 $^{\circ}\text{C}$ (lit.^[32] m.p. 82.0~83.0 $^{\circ}\text{C}$); ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.03

(d, $J=8.4$ Hz, 2H), 7.76 (d, $J=8.4$ Hz, 2H), 2.62 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 196.48, 139.88, 132.48, 128.66, 117.88, 116.37, 26.73; IR (KBr) ν : 2920, 2228, 1688, 1603, 1402, 1357, 1262, 1016, 961, 835, 646, 593, 536 cm^{-1} .

4-硝基苯乙酮(**2j**)^[32]: 淡黄色固体, 7.1 mg, 分离产率 25% (HPLC 产率 77%). m.p. 76.0~77.0 $^{\circ}\text{C}$ (lit.^[32] m.p. 60.0~61.0 $^{\circ}\text{C}$); ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.26 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 8.06 (d, $J=8.8$ Hz, 2H), 2.61 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 196.25, 150.34, 141.34, 129.27, 123.83, 26.95; IR (KBr) ν : 2922, 1692, 1605, 1524, 1345, 1255, 1104, 858, 746, 690, 617, 585, 504 cm^{-1} .

2-蔡乙酮(**2k**)^[21]: 白色固体, 23.1 mg, 分离产率 67% (HPLC 产率 78%). m.p. 49.0~51.0 $^{\circ}\text{C}$ (lit.^[21] m.p. 49.0~50.2 $^{\circ}\text{C}$); ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.45 (s, 1H), 8.03 (dd, $J=8.4, 1.6$ Hz, 1H), 7.96 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.88 (t, $J=14.4, 4.0$ Hz, 2H), 7.61~7.52 (m, 2H), 2.71 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 198.06, 135.56, 134.46, 132.48, 130.16, 129.51, 128.44, 128.38, 127.75, 126.74, 123.86, 26.66; IR (KBr) ν : 2922, 1678, 1626, 1466, 1364, 1278, 1228, 1020, 822, 753, 664, 479 cm^{-1} .

2-乙酰基噻吩(**2l**)^[30]: 棕色液体, 16.6 mg, 分离产率 65% (HPLC 产率 86%). ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.68 (dd, $J=4.0, 1.2$ Hz, 1H), 7.62 (t, $J=4.8, 1.2$ Hz, 1H), 7.11 (t, $J=8.8, 3.6$ Hz, 1H), 2.54 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 190.70, 144.52, 133.74, 132.43, 128.04, 26.89; IR (KBr) ν : 3094, 1663, 1518, 1416, 1358, 1272, 1029, 933, 854, 729, 597 cm^{-1} .

苊基丙酮(**2m**)^[31]: 黄色液体, 16.5 mg, 分离产率 56% (HPLC 产率 60%). ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 7.28 (t, $J=15.2, 8.0$ Hz, 2H), 7.19 (t, $J=14.4, 6.8$ Hz, 3H), 2.90 (t, $J=15.2, 7.6$ Hz, 2H), 2.76 (t, $J=14.8, 7.6$ Hz, 2H), 2.12 (s, 3H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 207.88, 140.96, 128.46, 128.26, 126.08, 45.12, 30.02, 29.70; IR (KBr) ν : 2930, 1715, 1496, 1446, 1416, 1362, 1161, 1029, 750, 702, 501 cm^{-1} .

1-四氢萘酮(**6a**)^[9]: 黄色液体, 20.3 mg, 分离产率 68%~69%. ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.02 (dd, $J=7.6, 0.8$ Hz, 1H), 7.46 (td, $J=14.8, 1.2$ Hz, 1H), 7.30 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.24 (t, $J=14.4, 4.0$ Hz, 1H), 2.96 (t, $J=12.4, 6.4$ Hz, 2H), 2.65 (t, $J=13.2, 6.4$ Hz, 2H), 2.15~2.09 (m, 2H); ^{13}C NMR (100 MHz, CDCl_3) δ : 198.32, 144.46, 133.35, 132.59, 128.68, 127.12, 126.58, 39.09,

29.66, 23.26; IR (KBr) ν : 1683, 1601, 1454, 1324, 1286, 1225, 1187, 1025, 901, 765, 734, 553 cm^{-1} .

1-茛酮(**8b**)^[27,33]: 棕色固体, 23.1 mg, 分离产率 48%~50%. m.p. 37.0~38.0 °C (lit.^[33] 39.0~41.0 °C); ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ : 7.79 (d, J =8.0 Hz, 1H), 7.63 (t, J =14.8, 7.6 Hz, 1H), 7.51 (d, J =7.6 Hz, 1H), 7.41 (t, J =14.8, 7.6 Hz, 1H), 3.19 (t, J =12.0, 6.0 Hz, 2H), 2.73 (t, J =12.0, 6.0 Hz, 2H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ : 207.05, 155.07, 137.04, 134.51, 127.24, 126.66, 123.67, 36.19, 25.77; IR (KBr) ν : 1712, 1609, 1466, 1439, 1326, 1280, 1203, 1090, 759, 567 cm^{-1} .

辅助材料(Supporting Information) 目标化合物 **2a**~**2m**、**6a** 和 **8b** 的 ¹H NMR 和 ¹³C NMR 原始图谱、氘代实验 ¹H NMR 图及验证实验颜色变化图. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] Gribble, G. W. *Fortschr. Chem. Org. Naturst.* **1996**, 68, 1.
- [2] (a) Bhaskar, T.; Matsui, T.; Kaneko, J.; Uddin, M. A.; Muto, A.; Sakata, Y. *Green Chem.* **2002**, 4, 372.
(b) Pee, K. H. V. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2003**, 42, 3718.
(c) Agarwal, V.; Miles, Z. D.; Winter, J. M.; Eustáquio, A. S.; El Gamal, A. A.; Moore, B. S. *Chem. Rev.* **2017**, 117, 5619.
- [3] Alonso, F.; Beletskaya, I. P.; Yus, M. *Chem. Rev.* **2002**, 102, 4009.
- [4] Wu, H.-W.; Yang, G. S. *Chin. J. Org. Chem.* **2008**, 28, 2132 (in Chinese).
(吴红伟, 杨高升, 有机化学, **2008**, 28, 2132.)
- [5] Sun, N.; Wang, X.; Ding, Z. B.; Zhang, Q.; Xu, X.; Xu, H. J.; Wang, S. F. *Chin. J. Org. Chem.* **2016**, 36, 2489 (in Chinese).
(孙楠, 王欣, 丁志彬, 张齐, 徐徐, 徐海军, 王石发, 有机化学, **2016**, 36, 2489.)
- [6] Yang, J. W.; Chen, J. B.; Wang, S. J.; Wu, X. M.; Ma, B. D.; Xu, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2018**, 38, 1811 (in Chinese).
(杨靖文, 陈建波, 王诗婕, 吴小梅, 马宝娣, 徐毅, 有机化学, **2018**, 38, 1811.)
- [7] Wang, M. R.; Wu, Y. Z.; Yao, J.; Deng, L.; Pan, Y. M.; Huang, K. B.; Tang, H. T. *Chin. J. Org. Chem.* **2019**, 39, 3223 (in Chinese).
(王毛锐, 吴雨峥, 姚健, 邓黎, 潘英明, 黄克斌, 唐海涛, 有机化学, **2019**, 39, 3223.)
- [8] Xue, F.-L.; Xiong, J. F.; Mo, G. Z.; Peng, P.; Chen, R. H. *Chin. J. Org. Chem.* **2013**, 33, 2291 (in Chinese).
(薛福玲, 熊金峰, 莫广珍, 彭湃, 陈任宏, 有机化学, **2013**, 33, 2291.)
- [9] Maji, T.; Karmakar, A.; Reiser, O. *J. Org. Chem.* **2011**, 76, 736.
- [10] Wang, Z.-J.; Ghasimi, S.; Landfester, K.; Zhang, K. A. I. *J. Mater. Chem. A* **2014**, 2, 18720.
- [11] Li, X.-Y.; Hao, Z. K.; Zhang, F.; Li, H. X. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2016**, 8, 12141.
- [12] Li, Z.-P.; Zhi, Y. F.; Shao, P. P.; Xia, H.; Li, G. S.; Feng, X.; Chen, X.; Shi, Z.; Liu, X. M. *Appl. Catal., B* **2019**, 245, 334.
- [13] Zhong, Q.; Ma, F.; Liu, C. Q.; Shao, J. G. *Chin. J. Org. Chem.* **1991**, 11, 209 (in Chinese).
(钟琦, 马锋, 刘长庆, 邵建国, 有机化学, **1991**, 11, 209.)
- [14] Wang, Y.-C.; Yan, T. H. *Chem. Commun.* **2000**, 56, 545.
- [15] Huang, Z.-Z.; Tang, Y. J. *J. Org. Chem.* **2002**, 67, 5320.
- [16] Maleczka Jr, R. E.; Rahaim Jr, R. J.; Teixeira, R. R. *Tetrahedron Lett.* **2002**, 43, 7087.
- [17] Lee, S. H.; Cho, M. Y.; Nam, M. H.; Park, Y. S.; Yoo, B. W.; Lee, C. W.; Yoon, C. M. *Synth. Commun.* **2005**, 35, 1335.
- [18] Li, J.; Ye, D. J.; Liu, H.; Luo, X. M.; Jiang, H. L. *Synth. Commun.* **2008**, 38, 567.
- [19] Li, H.-S.; Li, Y. Q. *Chin. Chem. Lett.* **2010**, 21, 931.
- [20] Dong, W.-L.; Cai, W. X.; Wu, R.; Li, Z. M.; Zhao, W. G.; Liu, X. H. *Phosphorus Sulfur* **2016**, 191, 980.
- [21] Lu, Z.; Yang, Y. Q. *Synthesis* **2019**, 51, 508.
- [22] Yang, Y.; Hasimujiang, B.; Rexit, A. A. *Chin. J. Org. Chem.* **2019**, 39, 727 (in Chinese).
(杨莹, 哈斯木江·巴拉提, 阿布都热西提·阿布力克木, 有机化学, **2019**, 39, 727.)
- [23] (a) Sadhukhan, S.; Baire, B. *Adv. Synth. Catal.* **2018**, 360, 298.
(b) Sadhukhan, S.; Baire, B. *ChemistrySelect* **2019**, 4, 3376.
- [24] Wang, H.; Zheng, M. X.; Guo, H. M.; Huang, G. Z.; Cheng, Z.; Rexit, A. A. *Eur. J. Org. Chem.* **2020**, 41, 6455.
- [25] Tan, J.-J.; Liu, B. B.; Su, S. S. *Org. Chem. Front.* **2018**, 5, 3093.
- [26] Budweg, S.; Junge, K.; Beller, M. *Chem. Commun.* **2019**, 55, 14143.
- [27] Mikhael, M.; Adler, S.; Wengryniuk, S. *Org. Lett.* **2019**, 21, 5889.
- [28] Liang, S.-Z.; Hammond, G. B.; Xu, B. *Chem. Commun.* **2015**, 51, 903.
- [29] Moriyama, K.; Takemura, M.; Togo, H. *Org. Lett.* **2012**, 14, 2414.
- [30] Ma, X.-Y.; Li, Z. F.; Liu, F. J.; Cao, S. L.; Rao, H. H. *Adv. Synth. Catal.* **2014**, 356, 1741.
- [31] Plank, T. N.; Drake, J. L.; Kim, D. K.; Funk, D. W. *Adv. Synth. Catal.* **2012**, 354, 597.
- [32] Li, F.; Wang, N. N.; Lu, L.; Zhu, G. J. *J. Org. Chem.* **2015**, 80, 3538.
- [33] Gülcemal, S.; Gülcemal, D.; Whitehead, G. F. S.; Xiao, J. L. *Chem. Eur. J.* **2016**, 22, 10513.

(Lu, Y.)