可见光驱动磺酰胺催化的杂原子 $\alpha\text{-C}(\text{sp}^3)\text{-H}$ 键烷基化反应

赵全庆 陈加荣*

(华中师范大学化学学院 武汉 430079)

Visible-Light-Driven Sulfonamide Catalyzed Alkylation of $\alpha\text{-C}(\text{sp}^3)\text{-H}$ Bonds of Heteroatoms

Zhao, Quanqing Chen, Jiarong*

(College of Chemistry, Central China Normal University, Wuhan 430079)

氢原子转移(hydrogen atom transfer, HAT)反应是自由基化学领域中的一个重要分支。通过氢原子转移策略可以直接活化惰性的 $\text{C}(\text{sp}^3)\text{-H}$ 键来生成高活性的碳自由基中间体,进而实现碳碳键以及碳杂键的构建,该方法无需对底物进行预先官能化^[1]。近年来,基于光氧化还原催化与氢原子转移的协同催化模式,因其具有较高的反应活性、较好的区域选择性以及原子经济性而受到化学工作者们的广泛关注,尤其是在 $\text{C}(\text{sp}^3)\text{-H}$ 键烷基化方面,这种催化模式有许多报道。如硫醇^[2]、奎宁^[3]、酰胺^[4]、磷酸盐^[5]和醇^[6]等有机小分子,都可以作为有效的氢原子转移催化剂。在此类反应中,缺电子烯烃往往作为自由基受体和烷基化试剂。另外,氢原子转移过程能否顺利进行主要取决于氢原子转移催化剂的键解离能(BDE)、极性效应以及空间位阻效应等。当氢原子转移催化剂具有较强的键解离能时,反应的选择性会削弱,反之,则催化活性降低并限制其底物使用范围。因此,发展新型的氢原子转移催化剂,同时能较好地调控上述参数是实现高效、高选择性氢原子转移反应的关键。

相较于已经报道的氢原子转移催化剂,磺酰胺具备

以下优势:磺酰胺易于制备;其电子效应和空间位阻效应容易通过改变氮原子和磺基的取代基来进行调控;磺酰胺的氮氢键解离能的范围较广(398~440 kJ/mol)(Scheme 1)。因此,磺酰胺是一类具有重要潜力的氢原子转移催化剂。例如,Knowles 团队^[7]在质子耦合电子转移(PCET)领域做出一些重要工作。通过该策略可以实现酰胺氮氢键在较为温和的条件下直接生成酰胺自由基,从而发展了一系列 1,*n*-HAT 反应。最近, Kanai 团队^[8]使用二芳基磺酰胺作为氢原子转移催化剂,实现了苄位和烯丙位 $\text{C}(\text{sp}^3)\text{-H}$ 键的自由基芳基化反应。据此,西安交通大学化学学院段新华团队认为,基于密度泛函(DFT)理论计算有望设计合成一类键解离能可调的新型磺酰胺类氢原子转移催化剂,并用于杂原子的 $\alpha\text{-C}(\text{sp}^3)\text{-H}$ 键烷基化反应来构建 $\text{C}(\text{sp}^3)\text{-C}(\text{sp}^3)$ 键。

基于这一设想,该研究团队近日开发了烷基芳基磺酰胺 **3** 作为氢原子转移催化剂,并结合可见光驱动的质子耦合电子转移催化、镍催化策略,实现了 $\text{C}(\text{sp}^3)\text{-H}$ 键与烯烃以及烷基溴代物的烷基化反应^[9]。

图式 1 光氧化还原催化与氢原子转移协同催化的 $\text{C}(\text{sp}^3)\text{-H}$ 键烷基化反应和氮氢键解离能

Scheme 1 Dual photoredox and hydrogen atom transfer catalysis for alkylation of $\text{C}(\text{sp}^3)\text{-H}$ bonds and bond dissociation energy (BDE) of N—H bonds

* Corresponding author. E-mail: chenjiarong@mail.ccnu.edu.cn. Published online February 1, 2021.

该反应可以兼容一系列缺电子烯烃与环醚和链状醚, 并普遍能以中等至较高的收率得到目标产物 (Scheme 2). 其中, 烯烃底物中包含敏感官能团如环氧丙烷、羟基等时, 反应均能以较高的收率得到产物 **4a~4b**. 其它环状底物如四氢噻吩、四氢吡咯以及二氢化茚, 也能以中等至较高的收率得到产物 **4c~4g**. 此外, 作者结合镍催化, 实现了 $C(sp^3)-H$ 键与烷基溴代物的自由基交叉偶联反应, 得到产物如 **4i~4j**.

为了探究反应的机理, 作者进行了一系列机理验证实验. 荧光淬灭实验的结果表明, 磺酰胺离子能够有效淬灭激发态光催化剂. 在自由基捕获实验中, 当向标准反应体系中加入 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)作为自由基捕获试剂时, 反应被完全抑制. 当向反应体系中加入 2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物(TEMPO)作为自由基捕获试剂时, 作者使用高分辨质谱成功检测到捕获碳自由基的产物. 这些结果证明反应过程中涉及自由基. 同时, 量

子收率的结果($\Phi=0.24$)表明自由基链反应并非主要的反应途径. 据此, 作者认为烷基芳基磺酰胺首先通过光致质子耦合电子转移策略, 产生磺酰胺氮自由基. 随后, 该自由基攫取底物 **1** 中的杂原子的 α -氢原子产生碳自由基中间体, 并重新生成磺酰胺催化剂. 最后, 该碳自由基中间体与烯烃或者烷基溴代物等烷基化试剂, 经过后续自由基加成或者偶联反应得到相应的烷基化产物 **4**.

段新华团队基于 DFT 理论计算, 设计合成了一类新的烷基芳基磺酰胺作为氢原子转移催化剂, 结合光致质子耦合电子转移策略, 实现了杂原子 $\alpha-C(sp^3)-H$ 键与烯烃的加成以及烷基溴代物的偶联反应, 合成了一系列结构多样的 $C(sp^3)-C(sp^3)$ 成键反应产物. 这个工作不仅拓展了磺酰胺氮自由基在氢原子转移催化方面的应用范围, 基于氮自由基催化剂前体的多样性^[10], 这个工作也为设计其他类型的氢原子转移催化剂提供了新的思路.

图式 2 杂原子 $\alpha-C(sp^3)-H$ 键烷基化反应的底物范围

Scheme 2 Selected examples for the alkylation of $\alpha-C(sp^3)-H$ bonds of heteroatoms

References

- [1] Hynes, J. T.; Klinman, J. P.; Limbach, H. H.; Schowen, R. L. *Hydrogen-Transfer Reactions*, Wiley-VCH, Weinheim, **2007**.
- [2] Hager, D.; MacMillan, D. W. J. *Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 16986.
- [3] Jeffrey, J. L.; Terrett, J. A.; MacMillan, D. W. C. *Science* **2015**, *349*, 1532.
- [4] Ohmatsu, K.; Suzuki, R.; Furukawa, Y.; Sato, M.; Ooi, T. *ACS Catal.* **2019**, *10*, 2627.
- [5] Morton, C. M.; Zhu, Q.; Ripberger, H.; Troian-Gautier, L.; Toa, Z. S. D.; Knowles, R. R.; Alexanian, E. J. *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 13253.
- [6] Hu, A.; Guo, J. J.; Pan, H.; Zuo, Z. *Science* **2018**, *361*, 668.
- [7] Gentry, E. C.; Knowles, R. R. *Acc. Chem. Res.* **2016**, *49*, 1546.
- [8] Tanaka, H.; Sakai, K.; Kawamura, A.; Oisaki, K.; Kanai, M. *Chem. Commun.* **2018**, *54*, 3215.
- [9] Ma, Z.-Y.; Li, M.; Guo, L.-N.; Liu, L.; Wang, D.; Duan, X.-H. *Org. Lett.* **2021**, *23*, 474.
- [10] Zhao, Q.-Q.; Chen, J.; Zhou, X.-S.; Yu, X.-Y.; Chen, J.-R.; Xiao, W.-J. *Chem.-Eur. J.* **2019**, *25*, 8024.

(Zhao, C.)