镍催化不对称镍催化端位烯烃 1,1-芳-硼化反应不对称芳-硼化反应

席龙龙 史壮志*

(南京大学化学化工学院 化学和生物医药创新研究院(ChemBIC) 配位化学国家重点实验室 南京 210023)

Enantioselective Nickel-Catalyzed 1,1-Arylboration of Terminal Olefins

Xi, Longlong Shi, Zhuangzhi*

(State Key Laboratory of Coordination Chemistry, Chemistry and Biomedicine Innovation Center (ChemBIC), School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, Nanjing 210093)

烯烃具有廉价、易得等优点,被广泛应用于有机合成中^[1]. 烯烃的选择性双官能团化是快速制备复杂手性分子的有效途径,然而已知的转化大多数局限于 1,2-选择性双官能团化,对于端位 1,1-双官能团化反应仅限于活性烯烃或具有导向基团的非活性烯烃,对于无导向的非活性烯烃几乎没有被报道(Scheme 1)^[2].

图式 1 传统的烯烃双官能团化模式

Scheme 1 Traditional difunctionalization of alkenes

手性烷基硼酸酯是非常重要的有机合成砌块,基于碳硼键的立体专一性转化,可以快速制备其它具有光学纯的产物. 如何高效构建手性碳硼键,是极具挑战性的转化,也是近年来人们关注的热点^[3]. 2014 年, Morken 课题组^[4]报道了通过偕二硼和芳基卤化物的不对称偶联得到手性苄基硼酸酯. 2018 年, Fu 课题组^[5]利用镍催化实现消旋苄基氯的动态动力学不对称硼化反应. 武汉大学高等研究院阴国印课题组^[6-7]长期致力于镍催化烯烃的官能团化反应,尤其是利用镍催化迁移策略实现了一系列烯烃高选择性转化. 近期,他们利用镍催化体系发展了一类高选择性烯烃端位不对称芳-硼化反应. 在其体系中,烯烃和硼酸酯在镍催化下生成烷基镍中间体,之后经 1,2-镍迁移和芳基卤化物反应生成光学纯硼化产物(Scheme 2)^[8].

图式 2 镍催化的对映选择性不活泼烯烃的 1,1-芳基硼化
Scheme 2 Ni-catalyzed enantioselective 1,1-arylboration of unactivated olefins

作者选用末端烯烃、对溴苯甲酸甲酯和联硼酸酯(B₂pin₂)进行条件优化,最佳的消旋反应条件是使用 N,N'-二甲基-1,2-环己二胺与 NiCl₂·DME 的配合物(5 mol%)作为催化剂, 1.5 equiv.的 MeOLi 作为碱, 1,4-二氧六环为溶剂, 在 50 °C 温度下反应 35 h, 可以高效地得到一系列消旋产物(Scheme 3). 烯烃或者溴苯上含有杂环、卤素、酯基、酰胺、环氧丙烷、硅基等官能团, 都可以兼容, 以较好的收率得到相应产物. 值得注意的是, 与烯丙基苯类原料反应时, 可以以较高分离收率和专一的区域选择性得到端位芳-硼化产物. 该现象间接证明了此反应是由“硼-Heck 反应”启动, 而不是传统的“碳-Heck 反应”类型. 作者进一步研究发现, 将反应条件稍作改变, 即使用手性 N,N'-二甲基-1,2-环己二胺/Ni 配合物作为催化剂, 反应温度降低到 30 °C, 可以高立体选择性地得到相关光学纯产物. 在此条件下, 他们针对不同的烯烃、溴代芳烃做了底物拓展, 均取得不错的结果. 对于常温下是气态的烯烃, 如乙烯、丙烯, 使用气球充满气体, 插在反应瓶上, 就可以实现其不对称催化, 得到端位芳-硼化产物.

* Corresponding author. E-mail: shiz@nju.edu.cn. Published online February 22, 2021.

图式 3 底物范围考察
Scheme 3 Representative substrates scope

作者也对反应机制进行了一些探究(Scheme 4)。他们首先将两个可能的反应中间体 1,1-和 1,2-二硼酸酯与溴苯在标准条件下进行反应,并未发现相关产物生成,从而排除了其作为中间体的可能性(Scheme 4a)。之后,作者将烯基硼化合物与烯烃一起加入反应体系做竞争实验,并未发现烯基硼相应产物的生成,否定了烯基硼为该反应的中间体(Scheme 4b)。氘代实验进一步证明反应过程中存在 1,2-镍迁移过程(Scheme 4c)。

基于以上对机理的详细研究和相关文献的报道^[7,9],作者提出了该反应可能的机理(Scheme 5)。首先二价镍被 B_2pin_2 还原生成零价镍,进一步歧化生成活性一价镍

1. 该催化剂与 B_2pin_2 转金属产生中间体 2, 插入烯烃得到中间体 3, 再经过 Ni-H 消除与反插入得到中间体 4。它和芳基溴化物氧化加成产生中间体 5, 最后 5 还原消除得到产物, 并再生催化剂 1。

综上, 阴国印教授课题组发展了首例镍催化不活泼烯烃端位的不对称芳-硼化反应, 提供了一种从廉价、易得的末端烯烃、芳基卤化物和联硼酸酯高效合成手性的苄基硼酸酯的策略。机理研究表明, 反应过程涉及 1,2-镍迁移的过程。这一重要突破, 不仅为手性烷基硼酸酯的合成提供了新的策略, 也为烯烃的不对称官能团化提供了新的思路。

图式4 反应机理研究

Scheme 4 Mechanistic investigations

图式5 机理推测

Scheme 5 Proposed mechanism

References

- [1] Belal, M.; Li, Z.; Lu, X.; Yin, G. *Sci. China Chem.* **2021**, DOI: 10.1007/s11426-020-9910-2.
- [2] Li, Y.; Wu, D.; Cheng, H.-G.; Yin, G. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2020**, *59*, 7990.
- [3] Wang, M.; Shi, Z. *Chem. Rev.* **2020**, *120*, 7348.
- [4] Sun, C.; Potter, B.; Morken, J. P. *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 6534.
- [5] Wang, Z.; Bachman, S.; Dudnik, A. S.; Fu, G. C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2018**, *57*, 14529.
- [6] Wang, W.; Ding, C.; Li, Y.; Li, Z.; Li, Y.; Peng, L.; Yin, G. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2019**, *58*, 4612.
- [7] Li, Y.; Pang, H.; Wu, D.; Li, Z.; Wang, W.; Wei, H.; Fu, Y.; Yin, G. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2019**, *58*, 8872.
- [8] Wang, W.; Ding, C.; Yin, G. *Nat. Catal.* **2020**, *3*, 951.
- [9] Chen, L.; Lear, A. R.; Gao, P.; Brown, M. K. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2019**, *58*, 10956.

(Cheng, F.)