亚甲基乙烯基亚乙基碳酸酯: 一种用于钯催化环加成反应的新型合成子

郝向洪 郭红超*
(中国农业大学化学系 北京 100193)

Vinyl Methylene Cyclic Carbonate: A New Type of Synthon for Pd-Catalyzed Cycloaddition Reactions

Hao, Xianghong Guo, Hongchao*
(Department of Chemistry, China Agricultural University, Beijing 100193)

碳环和杂环结构是构成大量生物活性天然产物、药用合成化合物、农药、材料等的重要结构单元, 因此, 发展经济、高效的环状结构的构建反应具有重要意义。

研究经济、高效、原子利用率高的环加成反应用于构建环状分子一直是有机合成领域的一项重要工作。作为一类十分重要的有机反应活性中间体, π -烯丙基钯两性离子中间体因其良好的反应活性受到有机合成化学家们的密切关注, 围绕它们开发的环加成反应已成为合成碳环和杂环化合物的有力工具^[1-3]。一般而言, 钯催化环加成反应起始于钯催化剂与烯丙基化合物的作用, 由此产生的烯丙基钯两性离子进一步反应完成环加成反应。这种反应模式决定了钯催化环加成反应的开发高度依赖于烯丙基化合物的种类和特性, 因此发掘和设计适用于钯催化环加成反应的烯丙基化合物是发展钯催化环加成反应的关键。一种新型烯丙基化合物的发现, 往往会导致发现新型环加成反应。最早报道的 π -烯丙基钯两性离子是由烯基三甲基甲烷供体在钯催化剂作用下形成的 Pd-TMM 两性离子, 其作为 1,3-偶极子与贫电烯烃进行 [3+2] 环加成反应^[2]。此后, 各种类型的 π -烯丙基钯两性离子逐渐被发现并用于环加成反应^[1-3]。除了 Pd-TMM 两性离子外, 其它两性离子目前大致可以概括为两种类型, 第一类是钯催化下通过环张力开环形成的 π -烯丙基钯两性离子, 例如钯催化乙烯基环丙烷、乙烯基环氧乙烷、乙烯基环氧丁烷及乙烯基氮杂环丙烷等开环形成的两性离子; 第二类是钯催化下环状化合物通过脱羧反应形成的 π -烯丙基钯两性离子, 例如钯催化下

乙烯基碳酸酯、乙烯基噁唑啉酮、 γ -亚甲基取代内酯、2-烯基三亚甲基碳酸酯、 γ -亚甲基取代内酰胺、乙烯基苯并噁唑酮等脱羧形成的两性离子。基于这些多样性的烯丙基钯两性离子, 各种环加成反应包括 [3+n]、[4+n]、[5+n] 和 [6+n] 等环加成已经被报道。

最近, 南开大学化学学院资伟伟研究组^[4]、西安交通大学前沿科学技术研究院郭武生研究组^[5]几乎同时报道了一种用于钯催化环加成反应的新型烯丙基化合物, 也即亚甲基乙烯基亚乙基碳酸酯 (Scheme 1)。在钯作用下, 该化合物脱羧形成烯丙基钯两性离子, 乙烯基的存在可以稳定正离子, 形成具有亲核性的活性中间体。围绕该烯丙基化合物, 资伟伟研究组和郭武生研究组成功实现了钯催化的亚甲基乙烯基亚乙基碳酸酯与缺电子烯烃的 [3+2] 和 [5+2] 环加成反应。

图式 1 新型合成子亚甲基乙烯基亚乙基碳酸酯

Scheme 1 A new type of synthon: vinyl methylene cyclic carbonate

资伟伟研究组采用硝基烯作为亲电试剂, 非常顺利地实现了亚甲基乙烯基亚乙基碳酸酯与硝基乙烯的 [3+2] 环加成反应, 但使用已有的常规手性配体均不能取得较满意的对映选择性。在这种情况下, 资伟

* Corresponding author. E-mail: hchgao@cau.edu.cn. Published online March 30, 2021.

图式 2 钯催化的亚甲基乙烯基亚乙基碳酸酯与缺电子烯烃的环加成反应

Scheme 2 Pd-Catalyzed cycloaddition reactions of vinyl methylene cyclic carbonates with Electron-Deficient alkenes

伟与合作者在常规手性配体中引入脲或者硫脲结构单元,创造性地设计了一类新型的双功能氢键膦配体,利用配体与底物之间的氢键弱相互作用,提高了反应活性和立体选择性(Scheme 2).使用苯甘氨酸衍生的 $(S,R_p)\text{-Ph-FeUrPhos}$ 作为手性配体,首次实现了亚甲基乙烯基亚乙基碳酸酯与缺电子烯烃的不对称[3+2]环加成反应,以中等收率和优异的立体选择性(最高99% ee, >20:1 dr)合成了一系列含有手性季碳中心的环戊酮化合物。

郭武生课题组采用氰基烯作为亲电试剂与亚甲基乙烯基亚乙基碳酸酯反应,实现了两种钯催化的环加成反应(Scheme 2).当使用双膦配体 SEGPhos 时,以中等至高的收率得到[5+2]环加成产物环庚烯酮衍生物;当直接使用三苯基膦钯作为催化剂时,以中等收率和中等至优秀的非对映选择性得到环戊酮衍生物。

综上所述,资伟伟和郭武生课题组分别独立设计合成了一种新型的烯丙基化合物亚甲基乙烯基亚乙基碳酸酯,在钯催化下,成功实现了钯催化的亚甲基乙烯基

亚乙基碳酸酯与缺电子烯烃的[3+2]和[5+2]环加成反应。这种新型的烯丙基化合物有望在钯催化的环加成反应中得到广泛应用,并为设计新的烯丙基化合物提供深刻的启示。在研究中,资伟伟研究组通过大量的密度泛函理论(DFT)计算考察了多种氧烯丙基钯两性离子的亲电/亲核属性,提出了合理的反应机理。此外,资伟伟研究组还设计合成了新型的基于二茂铁骨架的双功能氢键膦配体,为开展不对称催化研究提供了一类新型手性配体。

References

- [1] Guo, W. S.; Gómez, J. E.; Cristòfol, À.; Xie, J.; Kleij, A. W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2018**, 57, 13735.
- [2] Allen, B. D. W.; Lakeland, C. P.; Harrity, J. P. A. *Chem. Eur. J.* **2017**, 23, 13830.
- [3] Li, Q.-Z.; Liu, Y.; Li, M.-Z.; Zhang, X.; Qi, T.; Li, J.-L. *Org. Biomol. Chem.* **2020**, 18, 3638.
- [4] Zheng, Y.; Qin, T.; Zi, W. *J. Am. Chem. Soc.* **2021**, 143, 1038.
- [5] Yan, B.; Zuo, L. H.; Chang, X. W.; Liu, T.; Cui, M. Y.; Liu, Y.; Sun, H. Y.; Chen, W. P.; Guo, W. S. *Org. Lett.* **2021**, 23, 351.

(Lu, Y.)