烷基取代的 1,3-二烯区域可控还原烯基化反应

陶相华^a 龚和贵^{*,a,b}^(a) 上海大学材料科学与工程学院 上海 200444)^(b) 上海大学化学系 超分子化学与催化中心 上海 200444)

Regiocontrolled Reductive Vinylation of Aliphatic 1,3-Dienes

Tao, Xianghua^a Gong, Hegui^{*,a,b}^(a) School of Materials Science and Engineering, Shanghai University, Shanghai 200444)^(b) Center for Supramolecular Chemistry and Catalysis, Department of Chemistry, Shanghai University, Shanghai 200444)

过渡金属催化 1,3-二烯选择性可控的氢-碳化反应在有机合成中具有很高的研究价值^[1]. 通常情况下, 此类反应会经历 η^3 - π -烯丙基金属中间体, 从而得到相应的 1,2-和 1,4-加合物. 此外, 由于上述中间体在反应过程中处于平衡状态, 导致反应中往往伴随着顺反异构化的现象(Scheme 1-1). 因此, 区域选择性的调控是二烯化学领域中颇具挑战性的研究课题. 以往的研究表明: 1,3-二烯氢化-官能团化反应的选择性与二烯类底物的电性和空间结构密切相关. 因此, 迄今为止绝大多数已

报道的选择性可控反应主要集中于芳香族 1,3-二烯类化合物. 其中, 二烯与亲核试剂反应得到 branch 选择性的 1,2-加合物^[1-2](Scheme 1, 2a); 二烯与亲电试剂反应得到 Linear 构型的产物(Scheme 1, 2b)^[3-4]. 相比之下, 脂肪族 1,3-二烯的区域选择性调控一直未能得以解决. 目前的研究方案主要是采用具有环系结构的二烯^[5]和大位阻的底物^[3,6-7]. 近日, 兰州大学化学化工学院舒兴中课题组在该领域取得了突破性的进展. 他们发展了一类膦-氰基类配体, 该配体可与 Ni(0)作用形成四聚络合物

图式 1 1,3-二烯的 1,2-氢-碳化反应

Scheme 1 1,2-Hydrocarbon functionalization of 1,3-dienes

* Corresponding author. E-mail: hegui_gong@shu.edu.cn. Published online April 22, 2021.

(complex A). 该络合物被证实具有特殊的催化活性, 可以规避经典的 $\eta^3\text{-}\pi$ -烯丙基金属中间体历程, 从而有效解决了普通脂肪族二烯的反应选择性难题(Scheme 1, 3). 除此之外, 芳香族 1,3-二烯、丁二烯以及共轭多烯均能以优异的选择性得到 branch 类型 1,2-加成产物.

作者前期对配体进行了考察研究, 烯炔还原氢化-官能团化反应中常用的含氮配体对反应的转化以及选择性控制几乎无效; 使用常见的膦配体时反应也不能进行. 后来, 作者发现膦-氰基类配体能够作用于该反应. 通过后续对此类配体的电性以及位阻进行调整, 反应最终能够区域可控地实现脂肪族二烯的高效转化.

在得到最优条件后, 作者对反应的普适性进行了考察(Scheme 2). 实验结果表明, 该反应具有广泛的底物适用范围, 能够高效地实现小位阻脂肪族二烯、共轭多烯以及丁二烯的选择性调控, 以优异的化学、区域、立体选择性得到相应的目标产物. 另外, 富电子、电中性以及缺电子芳香族二烯也均适用于该反应体系. 对于烯基磺酸酯, 该反应也体现出了良好的适应性. 一系列环系和非环系的烯基磺酸酯均能高效地转化为相应的多烯化合物. 此外, 该反应具有良好的官能团兼容性, 能兼容硅醚、羟基、缩酮、酯基、杂环以及酰胺等官能团. 该反应可实现克级规模的制备, 同时适用于诺卡酮、睾

图式2 反应的普适性及应用性考察
Scheme 2 Scope of the substrates and applications

酮和维生素 A 等一系列复杂生物活性分子的后期修饰.

机理研究实验表明, 该反应的催化机制不同于常见的氢化-官能团化反应, 避免了经历 η^3 - π -烯丙基金属中间体过程. 具体催化过程如 Scheme 3 所示: Ni(0)首先与 vinyl-OTf 发生氧化加成反应生成 vinyl-Ni(II)-OTf 中间体, 之后该络合物与 Si-H 发生金属交换得到 vinyl-Ni(II)-H; 该中间体与二烯进行 vinyl-Ni(II)选择性插入反应和还原消除得到目标产物.

图式 3 可能的反应机理

Scheme 3 Possible reaction mechanism

综上所述, 舒兴中课题组发展了一种新型的催化体系, 为 1,3-二烯的 branch 选择性 1,2-加成反应提供了一种较为普适的解决方案. 反应代表了该领域一类崭新的选择性加成模式, 适用于脂肪族、芳香族 1,3-二烯以及共轭多烯的还原烯基化反应, 为 1,4-二烯的合成提供了一条简洁高效的途径.

References

- [1] Li, G.; Huo, X.; Jiang, X.; Zhang, W. *Chem. Soc. Rev.* **2020**, *49*, 2060.
- [2] Adamson, N. J.; Malcolmson, S. J. *ACS Catal.* **2020**, *10*, 1060.
- [3] Saini, V.; O'Dair, M.; Sigman, M. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2015**, *137*, 608.
- [4] Lv, L.; Yu, L.; Qiu, Z.; Li, C.-J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2020**, *59*, 6466.
- [5] RajanBabu T. V.; Adam Cox G.; Lim H. J.; Nomura N.; Sharma R. K.; Smith C. R.; Zhang, A. In *Organic Synthesis Comprehensive Organic Synthesis*, Vol. 5, 2nd ed., Oxford, Elsevier, **2014**, pp. 1582~1620.
- [6] Liao, L.; Sigman, M. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 10209.
- [7] Xiao, L. J.; Cheng, L.; Feng, W. M.; Li, M. L.; Xie, J. H.; Zhou, Q. L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2018**, *57*, 461.
- [8] Pang, X.; Zhao, Z.-Z.; Wei, X.-X.; Qi, L.; Xu, G.-L.; Duan, J.; Liu, X.-Y.; Shu, X.-Z. *J. Am. Chem. Soc.* **2021**, *143*, 4536.

(Zhao, C.)