光催化烯炔亚胺烯基化反应实现 2-肉桂基吡咯啉的非对映选择性和立体多样性合成

周雪松 陈加荣*

(华中师范大学化学学院 武汉 430079)

Photoredox-Catalyzed Iminoalkenylation of Alkenes for Diastereoselective and Stereodivergent Synthesis of 2-Cinnamylpyrrolines

Zhou, Xuesong Chen, Jiarong*

(College of Chemistry, Central China Normal University, Wuhan 430079)

吡咯啉, 又被称为二氢吡咯, 是一类非常重要的含氮杂环骨架, 广泛存在于生物或医药分子中^[1]。另外, 烯炔类化合物具有丰富的反应活性, 被广泛应用于化学合成领域^[2]。因此, 发展高效的新策略来合成烯基吡咯啉骨架可以极大地促进新功能和反应活性试剂的发现。在过去的几年里, Narasaka^[3]和 Bower^[4]课题组在合成烯基取代的吡咯啉化合物这一领域发展了一些重要方法, 利用过渡金属钯和铜催化脲酯与烯炔的分子内环化反应来构筑烯基取代的吡咯啉。但是, 这些方法大多只能得到热力学稳定的(*E*)-式烯炔为主要产物。因此, 如何从相同的原料出发可控地合成(*Z*)-式烯炔化合物仍是一个具有挑战性的领域^[5]。

近年来, 光驱动单电子转移(SET)^[6]和能量转移(EnT)^[7]活化模式为发展新型有机反应提供了强大的工具。其中, 亚胺氮自由基因其高效的反应活性得到了化学家们的广泛关注^[8], 为合成含氮化合物, 特别是含氮杂环提供重要中间体。然而, 其自由基反应的立体化学的控制较为困难, 尤其是当反应过程中生成多个立体中心时, 产物的非对映选择性控制往往难以达到令人满意的效果。

2018 年, 南京大学化学化工学院俞寿云课题组^[9]使用烯基硼酸作为烯基化试剂, 在光氧化还原催化条件下采用亚胺氮自由基通过分子内氢原子转移(HAT)的策略实现了远端 C(sp³)-H 键的烯基化反应。基于这一工作基础, 近日, 俞寿云课题组与曲阜师范大学化学与化工学院袁相爱课题组^[10]合作, 以 γ -烯基 *O*-酰基脲酯作为

亚胺氮自由基前体, 在光氧化还原催化条件下与烯基硼酸发生烯炔的亚胺烯基化反应, 合成了一系列 2-肉桂基二氢吡咯化合物。该反应具有如下优势: (1)该反应构建了两个立体中心, 具有非常高的非对映选择性, 只观察到其中一种非对映异构体; (2)只需改变反应的溶剂就可以高选择性地获得(*E*)-式烯炔取代和(*Z*)-式烯炔取代的异构体产物; (3)烯基硼酸作为烯基化试剂是实现高非对映选择性控制的关键因素; (4)可见光驱动的 SET 和 EnT 过程均参与了该反应。

在最优的反应条件下, 作者分别以 CH₂Cl₂ (DCM) 和四氢呋喃(THF)为溶剂对反应底物进行了普适性考察 (Scheme 1)。对于 γ -烯基 *O*-酰基脲酯底物, 当取代基 Ar² 苯环上含有给电子基或吸电子基时, 反应均能够以中等至良好的收率得到单一的非对映体。取代基 R 基团除了芳基, 杂芳基如呋喃、噻吩和烷基取代的底物也能够以良好的收率和非对映选择性得到(*E*)-式产物 **3a~3d** (DCM 作溶剂)和(*Z*)-式产物 **4a~4d** (THF 作溶剂)。对于烯基硼酸类底物, 底物的电性和空间位阻因素对反应的影响不大, 均可以以中等至较高的收率和优异的非对映选择性得到相应的(*E*)-式产物 **3e~3f** (CH₂Cl₂ 作溶剂)和(*Z*)-构型产物 **4e~4f** (THF 作溶剂)。

为了深入理解反应机理和立体选择性的影响因素, 作者利用实验和理论计算的手段对反应过程进行了深入的研究。例如, 通过 Stern-Volmer 淬灭实验, 作者发现在 THF 中底物 γ -烯基 *O*-酰基脲酯和产物 2-肉桂基二氢吡咯对光敏剂 Ir(*t*-Buppy)₃ 的淬灭速率比在 DCM 中

* Corresponding author. E-mail: chenjiarong@mail.ccnu.edu.cn. Published online April 26, 2021.

图1 烯基亚胺烯基化反应的部分例子

Scheme 1 Selected examples for the iminoalkenylation of alkenes

快。动力学实验表明, 顺式产物是由反式产物转化而来的, 并且在 THF 溶剂中的转化速率快于在 DCM 中的转化速率。由于在 THF 中, 产物的三线态能量与光敏剂的三线态能量更加匹配, 所以在 THF 中双键的反式构型向顺式构型的异构化更加有效。

为了进一步了解反应中高非对映选择性的原因, 他们还进行了密度泛函理论(DFT)计算, 发现在由亚胺氮自由基与烯基加成生成的碳自由基中间体中, 其亚胺氮原子与烯基硼酸之间有氢键作用, 使得后续碳自由基对烯基硼酸的烯基加成具有非常好的选择性。随后, 新形成的碳自由基进一步发生 SET 氧化, 随后被初始离去的羧酸阴离子捕获, 最后发生硼酸酯消除生成单一的非对映异构体。

总之, 俞寿云课题组发展了光氧化还原催化条件下 γ -烯基 O-酰基肟酯与烯基硼酸的烯基亚胺烯基化反应。通过改变反应的溶剂就可以高选择性、可控地获得含有 (E)-式构型 2-肉桂基二氢吡咯(CH_2Cl_2 作为溶剂)和 (Z)-式构型的 2-肉桂基二氢吡咯产物(THF 作为溶剂)。通过

一系列控制实验和机理研究, 并与袁相爱课题组合作进行了理论计算研究, 对该反应过程和产物的非对映选择性控制做了详细的探究和解释。该研究也为自由基反应中立体化学的多样性控制提供了新的思路。

References

- [1] Vitaku, E.; Smith, D. T.; Njardarson, J. T. *J. Med. Chem.* **2014**, *57*, 10257.
- [2] Itami, K.; Yoshida, J. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **2006**, *79*, 811.
- [3] Race, N. J.; Faulkner, A.; Fumagalli, G.; Yamauchi, T.; Scott, J. S.; Ryden-Landergren, M.; Sparkes, H. A.; Bower, J. F. *Chem. Sci.* **2017**, *8*, 1981.
- [4] Koganemaru, Y.; Kitamura, M.; Narasaka, K. *Chem. Lett.* **2002**, *31*, 784.
- [5] Fu, S.; Chen, N.-Y.; Liu, X.; Shao, Z.; Luo, S.-P.; Liu, Q. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, *138*, 8588.
- [6] Prier, C. K.; Rankic, D. A.; MacMillan, D. W. C. *Chem. Rev.* **2013**, *113*, 5322.
- [7] Zhou, Q.-Q.; Zou, Y.-Q.; Lu, L.-Q.; Xiao, W.-J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2019**, *58*, 1586.
- [8] Zard, S. Z. *Chem. Soc. Rev.* **2008**, *37*, 1603.
- [9] Shen, X.; Zhao, J.-J.; Yu, S.-Y. *Org. Lett.* **2018**, *20*, 5523.
- [10] Shen, X.; Huang, C.-C.; Yuan, X.-A.; Yu, S.-Y. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2021**, 10.1002/anie.202016941.

(Zhao, C.)