可见光催化的 Minisci 反应研究进展

董建洋 刘玉秀 汪清民*

(南开大学化学学院 元素有机化学国家重点实验室 南开大学有机新物质创造前沿科学中心 天津 300071)

摘要 氮杂芳环广泛存在于天然产物、药物分子、有机材料及配体中. 通过选择性碳氢键官能团化的方式对氮杂芳环进行后期修饰具有重要意义. 在酸性和氧化条件下, 烷基自由基对氮杂芳环的加成反应, 即 Minisci 反应, 提供了一种合成烷基取代的含氮芳环的方法. 传统的 Minisci 反应往往需要过量的氧化剂、酸以及高温, 这大大限制了底物的适用范围. 随着光催化在有机合成中的快速发展, 近几年来多种光催化的 Minisci 反应被报道, 并被成功应用到药物的合成中. 对近年来可见光催化的 Minisci 反应进行了概述.

关键词 含氮芳环; Minisci 反应; 烷基自由基; 光催化

Recent Advances in Visible-Light-Mediated Minisci Reactions

Dong, Jianyang Liu, Yuxiu Wang, Qingmin*

(State Key Laboratory of Elemento-organic Chemistry, Frontiers Science Center for New Organic Matter of Nankai University, College of Chemistry, Nankai University, Tianjin 300071)

Abstract *N*-Heteroarenes are present in a wide variety of natural products, small-molecule drugs, organic materials, and ligands. Therefore, the methods for selective C—H functionalization of *N*-heteroarenes are highly sought-after for late-stage modification of pharmaceuticals. A useful tool for the synthesis of alkyl-substituted nitrogen-containing aromatic rings is the Minisci reaction, in which a protonated *N*-heteroarene is attacked by an alkyl radical under oxidative and acidic conditions. Classic Minisci reactions often require the use of excess oxidant, excess acid, and high temperature, which greatly limits the scope of the substrates. With the rapid development of photocatalysis in organic synthesis, in recent years, a variety of photocatalytic Minisci reactions have been reported, and successfully been applied to the synthesis of drugs. In this paper, the visible light mediated Minisci reactions in recent years are briefly reviewed.

Keywords *N*-heteroarenes; Minisci reaction; alkyl radical; photocatalysis

氮杂芳环广泛存在于药物和天然产物分子中. 2015 至 2020 年, 美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市的 164 个有机小分子药物中有 88% (144 个)含有氮杂环, 86% (142 个)含有芳环. 其中有 28 个药物分子含有吡啶环, 10 个药物分子含有嘧啶环^[1]. 因此, 含氮芳环及其衍生物的高效合成及结构改造引起了合成化学家的高度重视和极大的兴趣^[2]. 在酸性和氧化条件下, 烷基自由基对含氮芳环的加成反应, 即 Minisci 反应, 提供了一种合成烷基取代的含氮芳环的方法^[3]. Minisci 反应与 Friedel-Crafts 反应互补, 可以直接向缺电子氮杂芳环中引入烷基、芳基、三氟甲基、酰胺基、羟甲基、胺甲基

或酰基等取代基. 因此, Minisci 反应在药物化学和合成化学中得到了广泛的应用^[4]. 一般而言, Minisci 反应在机理上分为三步: 第一步是自由基前体在氧化剂氧化下产生烷基自由基; 第二步是烷基自由基加成到质子化的氮杂芳环上得到杂环芳烃自由基正离子中间体; 第三步是杂环芳烃自由基正离子中间体被氧化芳构化得到最终产物. 传统的 Minisci 反应往往需要过量的氧化剂、酸以及高温, 这大大限制了底物的适用范围. 特别是对于含有氮杂芳环的药物和天然产物的后期官能团化修饰, 该苛刻的反应条件往往不能够适用, 限制了 Minisci 烷基化反应的应用. 可见光反应体系一般具有反应活性

* Corresponding author. E-mail: wangqm@nankai.edu.cn

Received April 12, 2021; revised May 4, 2021; published online June 1, 2021.

Dedicated to the 100th anniversary of Chemistry at Nankai University.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21732002, 21672117), and the Frontiers Science Center for New Organic Matter of Nankai University (No. 63181206).

国家自然科学基金(Nos. 21732002, 22077071)和南开大学有机新物质创造前沿科学中心专项资金(No. 63181206)资助项目.

高、条件温和、官能团容忍性好及底物适用范围广等优点. 随着光催化在有机合成中的快速发展, 近几年来, 多种光催化的 Minisci 反应被报道, 并且成功应用到药物的合成中. 本文从产生烷基自由基的前体化合物角度综述了近年来可见光催化的 Minisci 反应研究进展 (Scheme 1).

1 脱羧的 Minisci 反应

1.1 直接脱羧的 Minisci 反应

烷基羧酸在自然界中广泛存在且方便易得, 因此直接使用烷基羧酸实现氮杂芳环的 Minisci 烷基化反应具有重要的意义. 2017 年, Glorius 等^[5]报道了光催化下烷基羧酸脱羧的 Minisci 反应 (Scheme 2). 在该反应中, 过硫酸盐氧化激发态的光催化剂 Ir^{III} 得到高价态的光催化剂 Ir^{IV} , 同时产生一分子 $\text{SO}_4^{\cdot-}$, $\text{SO}_4^{\cdot-}$ 作为氢原子转移 (HAT, Hydrogen Atom Transfer) 试剂攫取烷基羧酸的羧基氢原子得到羧基自由基, 羧基自由基快速脱去一分子 CO_2 得到烷基自由基. 烷基自由基与氮杂芳环加成, 再被高价态的光催化剂 Ir^{IV} 氧化芳构化得到烷基化产物, 完成光催化循环. 与传统的 Minisci 反应相比较, 该反应条件温和、官能团兼容性好、底物适用范围广. 作者通过加入自由基捕获剂 (TEMPO), 成功抑制了反应的进行, 并通过高分辨质谱检测到了烷基自由基被 TEMPO 捕获的产物. 另外, 作者通过进行自由基钟开环实验也从另一个侧面证实了该反应经历自由基历程. 该反应对于五元和六元氮杂环, 一级、二级和三级烷基羧酸均能适用, 但该反应对于芳基羧酸不能适用. 随后, 陈弓课

课题组^[6]使用 $\text{Ru}(\text{bpy})_3\text{Cl}_2$ 作为光催化剂, Frenette 课题组^[7]使用有机光敏染料吡啶盐作为光催化剂, 同样也实现了室温光催化条件下烷基羧酸脱羧的 Minisci 烷基化反应. 何卫民课题组^[8]使用 $\text{Ru}(\text{bpy})_3\text{Cl}_2$ 作为光催化剂, $\text{PhI}(\text{OAc})_2$ 作为氧化剂, 实现了烷基羧酸脱羧对喹啉酮类化合物的烷基化反应. 夏吾炯课题组^[9]利用相同的策略实现了氮杂芳环的醛基化反应, 不需要使用光催化剂, 在光照的条件下即可进行, 作者认为 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 在光激发下就可均裂产生 $\text{SO}_4^{\cdot-}$.

2020 年, 宣俊课题组^[10]在无光催化剂条件下, 使用 $\text{PhI}(\text{OAc})_2$ 作为氧化剂实现了 α -羧基羧酸对喹啉酮类化合物的脱羧酰基化反应 (Scheme 3). 在该反应中, $\text{PhI}(\text{OAc})_2$ 与 α -羧基羧酸进行阴离子交换, 再在光照条件下均裂得到羧基自由基, 其脱去一分子 CO_2 得到酰基自由基.

虽然由烷基羧酸作为自由基前体的 Minisci 烷基化反应得到广泛的发展, 但由芳基羧酸作为芳基自由基前体实现氮杂芳环的 Minisci 芳基化反应却很难实现. 芳基羧酸氧化产生羧基自由基后, 由于羧基与芳环的共轭效应, 很难脱去一分子 CO_2 产生芳基自由基. 相反, 该羧基自由基很容易从反应体系中攫取氢原子重新得到芳基羧酸. 2017 年, Glorius 课题组^[11]在他们报道的光催化下烷基羧酸脱羧的 Minisci 反应基础上, 又实现了光催化下芳基羧酸脱羧的 Minisci 反应 (Scheme 4). 为了解决芳基羧基自由基很难脱 CO_2 , 更倾向于攫取体系中氢原子的问题, 他们设想产生的羧基自由基攫取溴原子得到苯甲酰基次溴酸盐, 苯甲酰基次溴酸盐在光催化剂还

图式 1 可见光催化的 Minisci 反应
Scheme 1 Visible-light-mediated Minisci reactions

图式 2 可见光催化的烷基羧酸脱羧的 Minisci 反应

Scheme 2 Visible-light-mediated decarboxylative Minisci reaction with alkyl carboxylic acids

图式 3 可见光催化的喹啉酮的酰基化反应

Scheme 3 Visible-light-mediated acylation of quinoxalin-2(1H)-ones

原下很容易脱去 CO_2 , 作者通过计算证明了脱 CO_2 过程是有利的. 他们提出激发态的光催化剂 Ir^{III} 氧化羧酸得到低价态的光催化剂 Ir^{II} 和羧基自由基, 羧基自由基攫取体系中的溴原子得到苯甲酰基次溴酸盐, 再被低价态的光催化剂 Ir^{II} 还原, 同时失去一分子 Br^- 和 CO_2 得到芳

基自由基.

图式 4 可见光催化的芳基羧酸的 Minisci 反应

Scheme 4 Visible-light-mediated Minisci reaction with aryl carboxylic acids

1.2 活化的羧酸作自由基前体的 Minisci 反应

已发展的可见光催化的脱羧 Minisci 反应中, 通常需要过量的强氧化剂来实现氧化脱羧和再芳构化的过程. 但由于体系中强氧化剂的使用, 使得反应难以兼容容易被氧化的官能团, 并且容易生成自由基加成的副产物, 因此在氧化还原中性条件下实现可见光催化的氮杂芳环的脱羧烷基化反应具有重要的意义.

N-(酰氧基)邻苯二甲酰亚胺可以通过烷基羧酸和 *N*-羟基邻苯二甲酰亚胺一步缩合高效获得, 这类活性羧酸酯已经被广泛用于光催化的脱羧卤代和 1,4-加成等反应^[12-14]. 近年来 Baran 课题组^[15]利用这类活性羧酸酯作为烷基化试剂, 实现了廉价金属催化的脱羧偶联反应. 在这类反应中, 活性羧酸酯能够被金属或者光催化剂还原产生烷基自由基. 基于这一过程, 傅尧课题组^[16]于 2017 年报道了可见光催化的氨基酸衍生的 *N*-(酰氧基)邻苯二甲酰亚胺作为烷基自由基前体的 Minisci 反应 (Scheme 5). 作者提出活性羧酸酯氧化低价态的光催化剂 Ir^{II} 得到基态的光催化剂 Ir^{III} 并产生胺基 α 位自由基, 胺基 α 位自由基加成到氮杂芳环后再被激发态的光催化剂 Ir^{III} 氧化芳构化得到最终烷基化产物. 该反应是氧化还原中性的, 不需要外加氧化剂. 随后, 傅尧课题组^[17]使用催化量的 Lewis 酸同样实现了光催化氧化还原中性条件下烷基羧酸脱羧的 Minisci 反应. 2018 年, Sherwood

图式 5 可见光催化的活性羧酸酯的 Minisci 反应

Scheme 5 Visible-light-mediated Minisci reaction with activated esters

等^[18]由烷基羧酸出发,通过两步一锅法实现了光催化氧化还原中性条件下烷基羧酸脱羧的 Minisci 反应. 2020 年,汪清民课题组^[19]利用同样的策略,使用甲醛酸的活性酯作为甲酰基自由基前体,实现了可见光催化的氧化还原中性的 Minisci 甲酰基化反应. 2021 年,郑柯课题组^[20]在紫光光照射下无需使用光催化剂,同样实现了活性羧酸酯的 Minisci 反应.

尽管 Minisci 反应得到很快的发展,但是立体选择性的 Minisci 反应却很难实现,这在于在自由基加成到氮杂芳环时,由于烷基自由基是一个平面结构,很难控制其手性. 基于傅尧课题组报道的使用催化量的磷酸实现 *N*-酰氧基邻苯二甲酰亚胺作为自由基前体的 Minisci 反应. 2018 年 Phipps 等^[21]使用手性磷酸控制胺基 α 位自由基与氮杂芳环加成这一步,实现了这个反应的立体选择性控制(Scheme 6). 同时该反应也有很好的位置选择性,对于未取代的喹啉底物,该反应选择性地得到 2 位烷基化的产物. 对于吡啶类底物,该反应发生在位阻较小的 2 位或 6 位. 同年,江智勇课题组^[22]使用有机光催化剂,利用同样的手性控制策略实现了该反应的立体选择性控制.

2019 年汪清民课题组^[23]使用廉价的金属铜作光催化剂,实现了氧化还原中性条件下活性羧酸酯作为烷基自由基来源的 Minisci 反应(Scheme 7). 在该反应中铜光催化剂不需要预先制备,能够在体系中原位生成. 作者提出激发态的光催化剂 $^*\text{Cu}^{\text{I}}$ 将活性羧酸酯还原,脱去一

分子邻苯二甲酰亚胺和 CO_2 产生烷基自由基和高价态的光催化剂 Cu^{II} , 烷基自由基对氮杂芳环加成,再被高价态的光催化剂 Cu^{II} 氧化芳构化得到烷基化的产物.

2019 年,傅尧课题组^[24]使用三苯基膦/碘化钠的光氧化还原体系,实现了氧化还原中性条件下烷基羧酸脱羧的 Minisci 反应(Scheme 8). 在该反应中,碘化钠、三苯基膦以及活性羧酸酯通过库仑力形成电荷转移复合物,其在光照条件下发生电子转移得到烷基自由基.

使用 *N*-(酰氧基)邻苯二甲酰亚胺作为烷基自由基前体的 Minisci 反应,由于要脱去一分子邻苯二甲酰亚胺,使得其原子经济性较差. 为了提高氧化还原中性条件下 Minisci 反应的原子经济性. Stephenson 等^[25]在 2018 年报道了一例光催化下使用吡啶氮氧化物作为自由基受体和活化羧酸试剂,酰氯作为烷基自由基前体的 Minisci 反应(Scheme 9). 同样该反应不需要外加氧化剂,吡啶氮氧化物既作为氮杂芳环的前体,又作为活化酰氯的试剂. 首先,吡啶氮氧化物与酰氯反应得到 *N*-酰氧基吡啶盐,其被激发态的光催化剂 $^*\text{Ir}^{\text{III}}$ 还原得到吡啶、烷基自由基和高价态的光催化剂 Ir^{IV} , 烷基自由基对吡啶加成,再被高价态的光催化剂 Ir^{IV} 氧化芳构化得到烷基化产物.

2 通过 HAT 产生烷基自由基的 Minisci 反应

2.1 分子间的 HAT 产生烷基自由基的 Minisci 反应

2015 年, MacMillan 等^[26]报道了光催化下经历 HAT

图式 6 可见光催化的活性羧酸酯的不对称 Minisci 反应

Scheme 6 Visible-light-mediated enantioselective Minisci reaction with activated esters

图式 7 铜催化剂的活性羧酸酯的 Minisci 反应

Scheme 7 Cu-catalyzed Minisci reaction with activated esters

图式 8 光催化下三苯基磷/碘化钠介导的活性羧酸酯的 Minisci 反应

Scheme 8 Photocatalytic Minisci reaction with activated esters mediated by triphenylphosphine and sodium iodide

图式 9 可见光催化的酰氯的 Minisci 反应

Scheme 9 Visible-light-mediated Minisci reaction with acid chloride

过程的醚类化合物的 Minisci 反应(Scheme 10). 该反应的反应机理与 Glorius 等报道的光催化下烷基羧酸脱羧的 Minisci 反应机理类似. 过硫酸盐氧化激发态的光催化剂 Ir^{III} 得到高价态的光催化剂 Ir^{IV} , 同时产生一分子 $\text{SO}_4^{\cdot-}$, $\text{SO}_4^{\cdot-}$ 作为 HAT 试剂攫取氧邻位碳氢键的氢原子得到烷基自由基. 该反应是首例光催化条件下经历 HAT 过程的 Minisci 反应, 避免了传统高温反应条件, 使得反应有很好的官能团耐受性和广泛的底物适用范

围, 进一步验证了光催化的优越性.

图式 10 可见光催化的醚类化合物的 Minisci 反应

Scheme 10 Visible-light-mediated Minisci reaction with ethers

2016 年, 纪海涛课题组^[27]报道了一例光催化苯甲醛促进的活化碳氢化合物的 Minisci 反应(Scheme 11). 该反应不需要外加光催化剂, 作者提出在光照条件下, 苯甲醛被激发产生碳氧双自由基, 碳氧双自由基活化

$S_2O_8^{2-}$ 产生 $SO_4^{\cdot-}$. 当使用甲酰胺作反应底物时, 不需要加入苯甲醛该反应同样能够进行, 作者认为可能是甲酰胺氮上的两个氢原子活化 $S_2O_8^{2-}$ 产生 $SO_4^{\cdot-}$. 该反应条件温和, 且避免使用了金属光催化剂, 提供了一种活化 $S_2O_8^{2-}$ 产生 $SO_4^{\cdot-}$ 的新策略.

图式 11 苯甲醛介导的 HAT 过程的 Minisci 反应

Scheme 11 Benzaldehyde-mediated Minisci reaction via HAT process

随后, Shah 等^[28]报道了光照条件下无需光催化剂的醚类化合物的 Minisci 烷基化反应, 在该反应中作者认为氮杂芳环与过硫酸盐形成电子给-受体(EDA)复合物, 其在光照条件下产生 $SO_4^{\cdot-}$, 进而攫取氧邻位的氢原子产生烷基自由基(Scheme 12).

图式 12 可见光催化的无需光催化剂的醚类化合物的 Minisci 反应

Scheme 12 Visible-light-mediated Minisci reaction with ethers under photocatalyst-free conditions

2018 年, 雷爱文课题组^[29]在光照条件下, 使用过氧化物作氧化剂, 实现了无光催化剂条件下醛的 Minisci 酰基化反应(Scheme 13). 在该反应中质子化的氮杂芳

环与过氧化物形成的复合物在光照条件下均裂, 得到叔丁氧自由基和羟基自由基. 随后, 叔丁氧自由基攫取醛的氢原子得到酰基自由基.

图式 13 可见光催化的无需光催化剂的醛的 Minisci 反应

Scheme 13 Visible-light-mediated Minisci reaction with aldehydes under photocatalyst-free conditions

同年, 雷爱文课题组^[30]在光照条件下, 使用 Selectfluor 作氧化剂实现了无光催化剂条件下烷烃的 Minisci 烷基化反应(Scheme 14). 在该反应中, 作者认为 Selectfluor 在光照条件下均裂产生氮正离子自由基和氟自由基, 随后氮正离子自由基攫取烷烃的氢原子得到烷基自由基.

图式 14 可见光催化的无需光催化剂的烷烃的 Minisci 反应

Scheme 14 Visible-light-mediated Minisci reaction with alkanes under photocatalyst-free conditions

受 MacMillan 等报道的光催化下醚类化合物的 Minisci 反应的启发, 2016 年 DiRocco 等^[31]使用过氧化物作氧化剂, 甲醇作反应溶剂, 实现了光催化下氮杂芳环的羟甲基化反应(Scheme 15). 该反应的官能团耐受性非常好, 特别是对于一些易于氧化的官能团, 该反应同样能够兼容. 温和的反应条件使得该反应适用于对复杂的氮杂芳环进行后期羟甲基化修饰, 这对于生物活性分子的发现非常有帮助.

2019 年, 张永强课题组^[32]利用同样的策略, 使用有机硅烷作底物, 实现了氮杂芳环的硅基化反应(Scheme 16). 值得注意的是, 对于异喹啉类底物, 当 C1 位被占时, 反应发生在 C6 位.

有机胺类化合物在自然界中也是广泛存在的, 且方

图式 15 可见光催化的甲醇的 Minisci 反应

Scheme 15 Visible-light-mediated Minisci reaction with methanol

便易得. 有机胺作为烷基化试剂, 实现氮杂芳环的烷基化反应具有重要的意义, 可以非常方便地得到芳基苄胺类化合物. 尽管醚类化合物的 Minisci 烷基化反应被广泛报道, 但是实现有机胺的 Minisci 烷基化反应是非常困难的. 原因是有机胺相对于醚来说更容易被氧化, 其通过 HAT 过程产生的胺基 α 位自由基中间体, 在高温氧化的条件下很容易氧化成亚胺. 温和的光催化反应条件为该问题的解决提供了一个有效的途径. 2018 年, 汪清民课题组^[33]报道了一例光催化的胺作自由基前体的 Minisci 反应 (Scheme 17). 在该反应中作者使用过氧化乙酰叔丁酯作氧化剂, 使用 2 equiv. 的胺就可以实现二

图式 16 可见光催化的硅烷的 Minisci 反应

Scheme 16 Visible-light-mediated Minisci reaction with silanes

级胺与氮杂芳环的偶联反应. 该反应不仅适用于二级胺, 对于醚、醛、烷烃、二甲苯等底物也能适用. 作者提出过氧化乙酰叔丁酯氧化激发态的光催化剂 Ir^{III} , 得到高价态的光催化剂 Ir^{IV} 和叔丁氧自由基, 叔丁氧自由基作为 HAT 试剂攫取氮邻位的氢原子得到胺基 α 位自由基, 该自由基对氮杂芳环加成, 再被高价态的光催化剂 Ir^{IV} 氧化芳构化得到最终产物. 该反应首次实现了氮杂芳环与二级胺的偶联反应, 氮上的 Boc 保护基对于反应的成功起着重要的作用, 温和的反应条件使得该反应有着广泛的底物适用范围和良好的官能团兼容性. 随后, Berthelot^[34]和 Johnson 等^[35]分别报道了两例类似的反应.

图式 17 可见光催化的胺类化合物的 Minisci 反应

Scheme 17 Visible-light-mediated Minisci reaction with amines

2019 年, 黄华文课题组^[36]在光催化条件下, 使用氧气作氧化剂, 实现了醛分子脱羰基的 Minisci 烷基化反应(Scheme 18). 作者提出氧气氧化激发态的光催化剂得到 $O_2^{\cdot-}$, $O_2^{\cdot-}$ 攫取醛分子的酰基氢原子得到酰基自由基, 其脱去一分子 CO 得到烷基自由基, 烷基自由基对氮杂芳环加成, 再被高价态的光催化剂氧化芳构化得到烷基化产物.

2020 年朱晨课题组^[37]在光照条件下, 使用三氟乙酸碘苯(PIFA)作氧化剂, 胺或醇作 HAT 催化剂, 实现了烷烃的 Minisci 反应(Scheme 19). 在该反应中, PIFA 与胺或醇进行阴离子交换, 再在光照条件下均裂产生氮或

氧自由基, 其攫取烷烃的氢原子得到烷基自由基.

金属钨的 $(Bu_4N)_4[W_{10}O_{32}]$ 盐是一种常见的 HAT 金属光催化剂, 其被光激发后能够攫取惰性碳氢键的氢原子产生烷基自由基^[38]. 2017 年, Ryu 等^[39]报道了使用金属钨催化的活化和未活化的碳氢化合物与氮杂芳环的 Minisci 反应(Scheme 20). 作者提出激发态的钨催化剂攫取烷烃的碳氢键产生烷基自由基, 烷基自由基加成到氮杂芳环, 再被氧化剂氧化芳构化得到烷基化的产物, 最后氧化剂将低价态的钨催化剂氧化, 完成钨催化循环. 但是该反应使用 500 W 的氙灯作光源, 使得反应的官能团耐受性不好.

图式 18 可见光催化的氧气氧化的醛的 Minisci 反应

Scheme 18 Visible-light-mediated Minisci reaction with aldehydes using O_2 as the oxidant

图式 19 光催化下氮/氧自由基介导的烷烃的 Minisci 反应

Scheme 19 Photocatalytic Minisci reaction with alkanes mediated by N/O-centered radical

图式 20 $(\text{Bu}_4\text{N})_4[\text{W}_{10}\text{O}_{32}]$ 催化的烷烃的 Minisci 反应Scheme 20 $(\text{Bu}_4\text{N})_4[\text{W}_{10}\text{O}_{32}]$ -catalyzed Minisci reaction with alkanes

在通过 HAT 过程产生烷基自由基前体的 Minisci 反应中, 对于活化的碳氢化合物, 反应位点往往在杂原子的邻位. 但是对于未活化的烷烃, 由于其各个位点的碳氢键差异性很小, 往往有多个反应位点, 这使得反应很混乱, 产物分离困难. 2018 年, 陈弓课题组^[40]报道了一例具有亚甲基选择性的 Minisci 烷基化反应(Scheme 21). 作者提出全氟羟基苯并碘氧杂戊环(perfluorinated hydroxybenziodoxole, PFBI-OH)被激发态的光催化剂 $^*\text{Ru}^{\text{II}}$ 还原得到强亲电性的羧基自由基, 该羧基自由基高选择性地攫取亚甲基的碳氢键产生烷基自由基. 作者认为该反应具有选择性的关键在于所使用的 PFBI-OH, 芳环上四个氟原子的引入非常关键. 作者通过机理实验证明了

次甲基位点在产生自由基后, 很容易被氧化为碳正离子, 这解释了次甲基位点不发生反应的原因. 该反应的底物适用范围非常广泛, 并且对于天然产物分子同样具有亚甲基选择性.

2021 年 Phipps 课题组^[41]使用 2,3-丁二酮作氧化剂, 利用他们组之前报道的手性磷酸策略, 实现了酰胺分子的不对称 Minisci 反应(Scheme 22). 在该反应中, 2,3-丁二酮在光照条件下被激发产生碳氧双自由基, 其攫取酰胺氮邻位碳氢键的氢原子得到胺基 α 位自由基.

2.2 分子内 1,5-氢迁移产生烷基自由基的 Minisci 反应

2018 年, 朱晨课题组^[42]利用氧自由基 1,5-氢迁移的

图式 21 可见光催化的亚甲基选择性的 Minisci 反应

Scheme 21 Visible-light-mediated Minisci reaction with high selectivity of methylene

图式 22 可见光催化的酰胺的不对称 Minisci 反应

Scheme 22 Visible-light-mediated enantioselective Minisci reaction with amides

策略实现了醇远端碳氢键的 Minisci 烷基化反应(Scheme 23). 该反应的机理是烷氧自由基发生分子内的 1,5 氢迁移得到烷基自由基, 进而实现醇远端碳氢键的 Minisci 反应. 随后陈弓课题组^[43]使用 $\text{Ru}(\text{bpy})_3\text{Cl}_2$ 作光催化剂, PFBI-OH 作氧化剂, 实现了一例类似的醇远端碳氢键的 Minisci 烷基化反应.

图式 23 可见光催化的醇分子内 1,5 氢迁移的 Minisci 反应

Scheme 23 Visible-light-mediated Minisci reaction with alcohols via 1,5-hydrogen-atom-transfer

在此基础上, 2019 年朱晨课题组^[44]又利用氮自由基 1,5-氢迁移的策略, 实现了非活化酰胺分子远端碳氢键的 Minisci 烷基化反应(Scheme 24a). 同样, 陈弓课题组^[45]使用 $\text{Ru}(\text{bpy})_3\text{Cl}_2$ 作光催化剂, BI-OAc 作氧化剂, 实现了一例类似的磺酰基保护的胺分子远端碳氢键的 Minisci 烷基化反应(Scheme 24b).

2019 年俞寿云课题组^[46]同样利用氮自由基 1,5-氢迁移的策略, 实现了活化酰胺分子远端碳氢键的 Minisci 烷基化反应(Scheme 25). 在该反应中光催化剂还原活化酰胺底物得到氮自由基, 其发生分子内 1,5-氢迁移产

a) Zhu's work:

b) Chen's work:

图式 24 可见光催化的酰胺分子内 1,5 氢迁移的 Minisci 反应

Scheme 24 Visible-light-mediated Minisci reaction with amides via 1,5-hydrogen-atom-transfer

生烷基自由基.

图式 25 可见光催化的活化的酰胺分子内 1,5 氢迁移的 Minisci 反应

Scheme 25 Visible-light-mediated Minisci reaction with activated-amides via 1,5-hydrogen-atom-transfer

3 有机硼酸分子作自由基前体的 Minisci 反应

2016 年, 陈弓课题组^[47]报道了光催化下使用烷基硼酸作自由基前体的 Minisci 反应(Scheme 26). 作者认为激发态的光催化剂 $^*\text{Ru}^{\text{II}}$ 还原 BI-OAc 产生的羧基自由基加成到烷基硼酸上, 活化碳硼键产生烷基自由基. 该反应具有很好的官能团耐受性, 能够应用在药物分子和天然产物的后期官能团化中. 值得一提的是, 该反应对

于芳基硼酸也同样适用。

2020 年, 汪清民课题组^[48]在可见光催化条件下, 使用氧气作氧化剂, 同样实现了烷基硼酸的 Minisci 烷基化反应(Scheme 27). 在该反应中, 作者提出氧气氧化激发态的光催化剂 Ir^{III} 得到 $\text{O}_2^{\cdot-}$, $\text{O}_2^{\cdot-}$ 加成到烷基硼酸上, 使碳硼键断裂得到烷基自由基. 氧气即作为氧化剂, 又作为硼酸的活化试剂。

2017 年, Molander 等^[49]实现了光催化下烷基三氟硼酸钾作为烷基自由基前体的 Minisci 反应(Scheme 28). 基于吡啶光催化剂具有强氧化性的性质^[50], 作者认为吡啶光催化剂能够直接氧化烷基三氟硼酸钾产生烷基

自由基, 烷基自由基对氮杂芳环加成, 随后被氧化剂氧化芳构化得到最终的烷基化产物, 同时氧化剂氧化低价的吡啶光催化剂完成光催化循环. 基于这种策略, Molander 等^[51]随后又实现了其他方法难以实现的二氢吡喃类化合物 2 位的杂芳基化反应。

在 Molander 课题组报道的光催化下烷基三氟硼酸钾作为自由基前体的 Minisci 反应中, 需要使用等物质的量的过硫酸盐作为氧化剂. 2019 年, 徐海超课题组^[52]使用光电协同催化的策略, 实现了无需氧化剂的烷基三氟硼酸钾的 Minisci 烷基化反应(Scheme 29). 在该反应中作者使用阳极氧化的手段, 将低价态的光催化剂氧化

图式 26 可见光催化的烷基硼酸的 Minisci 反应

Scheme 26 Visible-light-mediated Minisci reaction with alkyl boronic acids

图式 27 可见光催化的氧气氧化的烷基硼酸的 Minisci 反应

Scheme 27 Visible-light-mediated Minisci reaction with alkyl boronic acids using O_2 as the oxidant

图式 28 可见光催化的烷基三氟硼酸钾的 Minisci 反应

Scheme 28 Visible-light-mediated Minisci reaction with alkyl trifluoroborate salts

图式 29 光电协同催化的烷基三氟硼酸钾的 Minisci 反应

Scheme 29 Photoelectrochemical Minisci reaction with alkyl trifluoroborate salts

为基态,同时自由基加成中间体被激发态的光催化剂氧化芳构化得到最终产物.最后体系中的氢质子在铂阴极还原生成氢气,完成电催化循环.控制实验表明,光催化剂和电流二者缺一不可.由于避免了强氧化剂过硫酸钾的使用,该反应条件更加温和,广泛适用于含有敏感

基团的天然产物的后期官能团化.接着徐海超课题组^[53-54]利用光电协同催化的策略实现了烷基羧酸、烷基二氢吡啶和普通烷烃作自由基前体的 Minisci 烷基化反应.

4 三氟甲烷磺酰氯和二氟甲基亚磺酸钠作自由基前体的 Minisci 反应

MacMillan 等^[55]在 2011 年报道了一例光催化下三氟甲烷磺酰氯的 Minisci 反应来实现芳环的三氟甲基化 (Scheme 30). 作者提出激发态的光催化剂 $^*\text{Ir}^{\text{III}}$ 将三氟甲烷磺酰氯还原得到高价态的光催化剂 Ir^{IV} 和三氟甲基自由基, 三氟甲基自由基对氮杂芳环加成, 再被高价态的光催化剂 Ir^{IV} 氧化芳构化得到芳环三氟甲基化的产物. 由于三氟甲基自由基是亲电性的自由基, 在对氮杂芳环加成时, 选择性地加成到氮杂芳环相对富电子的位点, 这一选择性与传统的 Minisci 反应的选择性正好相反.

图式 30 可见光催化的三氟甲烷磺酰氯的 Minisci 反应
Scheme 30 Visible-light-mediated Minisci reaction with triflyl chloride

2020 年, 李鑫课题组^[56]在可见光催化条件下, 使用氧气作氧化剂实现了氮杂芳环的二氟甲基化反应 (Scheme 31). 作者提出激发态的光催化剂将二氟甲基亚磺酸钠氧化得到二氟甲基自由基, 二氟甲基自由基对氮杂芳环加成得到杂环芳烃自由基正离子中间体. 氧气氧化低价态的光催化剂, 以完成整个光催化的循环同时得到 $\text{O}_2^{\cdot-}$, $\text{O}_2^{\cdot-}$ 攫取杂环芳烃自由基正离子中间体的氢原子得到二氟甲基化产物. 该反应适用于对复杂药物分子后期的二氟甲基化修饰, 为二氟甲基药物的研发提供了一种高效实用的方法.

5 卤代烷烃作自由基前体的 Minisci 反应

2016 年, Barriault 等^[57]报道了 $[\text{Au}_2(\text{dppm})_2]\text{Cl}_2$ 作为

图式 31 可见光催化的氧气氧化的二氟甲基亚磺酸钠的 Minisci 反应

Scheme 31 Visible-light-mediated Minisci reaction with sodium difluoromethane sulfonate using O_2 as the oxidant

光催化剂烷基溴作为自由基前体的 Minisci 反应 (Scheme 32). 在光催化的条件下使用卤代烷烃作自由基前体的 Minisci 反应一直是一个挑战, 这是因为非活化卤代烷

图式 32 $[\text{Au}_2(\text{dppm})_2]\text{Cl}_2$ 催化的溴代烷烃的 Minisci 反应
Scheme 32 $[\text{Au}_2(\text{dppm})_2]\text{Cl}_2$ -catalyzed Minisci reaction with alkyl bromides

烃的还原电位较低, 很难被常见的光催化剂还原产生烷基自由基^[58]. 因此通过直接单电子转移的方式实现非活化卤代烃的还原很难实现, 作者使用金配合物作光催化剂, 与溴原子外层的孤对电子作用, 直接还原烷基溴得到烷基自由基. 自由基钟关环实验和开环实验证明该反应经历自由基历程. 该反应是首例光催化下溴代烷烃作自由基前体的 Minisci 反应, 不需要高温, 不需要外加氧化剂. 该反应的缺点是使用昂贵的金催化剂且反应需要用紫外光激发.

2017 年, Fadeyi 等^[59]报道了一种 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 催化的烷基碘的 Minisci 烷基化反应(Scheme 33). $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 作为一种新型的光催化剂, 能够在可见光激发下得到 $[\text{Mn}(\text{CO})_5]^+$ ^[60]. $[\text{Mn}(\text{CO})_5]^+$ 能够攫取烷基碘的碘原子得到烷基自由基和 $\text{Mn}(\text{CO})_5\text{I}$, 这一过程与其他光催化剂经历单电子氧化还原的过程不同, 该碘原子攫取过程不会受到底物氧化还原电位的影响. 产生的烷基自由基加成到氮杂芳环, 再被 $\text{Mn}(\text{CO})_5\text{I}$ 氧化芳构化同时得到 $[\text{Mn}(\text{CO})_5]^+$ 活性催化剂. 该反应是首例可见光催化下碘代烷烃作自由基前体的 Minisci 反应, 不需要高温, 不需要外加氧化剂, 反应条件温和, 提供了一种对含有氮杂芳环的药物和天然产物进行后期烷基化修饰的好方法.

图式 33 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 催化的烷基碘的 Minisci 反应

Scheme 33 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ -catalyzed Minisci reaction with alkyl iodides

2018 年, Nuhant 等^[61]报道了一种可见光催化下烷基碘的 Minisci 烷基化反应(Scheme 34), 该反应使用 2,2,6,6-四甲基哌啶(HTMP)作为还原剂还原激发态的光催化剂 $^*\text{Ir}^{\text{III}}$, 得到还原能力较强的低价态光催化剂 Ir^{II} , 其还原烷基碘产生烷基自由基.

图式 34 可见光催化的烷基碘的 Minisci 反应

Scheme 34 Visible-light-mediated Minisci reaction with alkyl iodides

2019 年, 汪清民课题组^[62]报道了可见光催化下过氧化乙酸叔丁酯(*t*-BPA)作氧化剂的烷基碘的 Minisci 烷基化反应(Scheme 35). 该反应中过氧化乙酸叔丁酯(*t*-BPA)通过质子耦合电子转移(PCET)的方式氧化激发态的光催化剂 $^*\text{Ir}^{\text{III}}$, 得到叔丁氧自由基和高价态的光催化剂 Ir^{IV} , 叔丁氧自由基发生 β -裂解产生甲基自由基, 甲基自由基攫取烷基碘的碘原子得到烷基自由基, 烷基自由基加成到氮杂芳环后被高价态的光催化剂 Ir^{IV} 氧化芳构化得到烷基化产物并完成光催化循环.

图式 35 可见光催化的 *t*-BPA 作氧化剂的烷基碘的 Minisci 反应

Scheme 35 Visible-light-mediated Minisci reaction with alkyl iodides using *t*-BPA as the oxidant

2019 年, 汪清民课题组^[63]报道了可见光催化下使用卤代烃作为自由基前体的 Minisci 反应(Scheme 36). 作者提出体系中的烷基溴会产生微量的 Br^- 离子, 激发态的光催化剂 $^*\text{Ir}^{\text{III}}$ 将 Br^- 离子氧化成溴自由基, 同时得

到低价态的光催化剂 Ir^{II} . 溴自由基攫取硅烷的氢原子产生硅基自由基. 硅基自由基攫取溴代烷烃的溴原子产生烷基自由基. 亲核性的烷基自由基对含氮芳环加成得到杂环芳烃自由基正离子中间体. 氧气氧化低价态的光催化剂 Ir^{II} 以完成整个光催化的循环同时得到 $\text{O}_2^{\cdot-}$, $\text{O}_2^{\cdot-}$ 攫取杂环芳烃自由基正离子中间体的氢原子得到烷基化产物. 该反应对于一级、二级、三级和苄基自由基以及多种氮杂芳环均适用, 对碘代烷烃也适用. 该反应使用氧气作氧化剂, 避免了 Minisci 反应常用的氧化剂(过硫酸盐、过氧化物), 使反应具有很好的官能团兼容性. 并且该方法能够对多种天然产物和药物进行后期官能团化修饰.

图式 36 可见光催化通过卤原子转移的 Minisci 反应

Scheme 36 Visible-light-mediated Minisci reaction via halogen atom transfer

6 经历自旋中心迁移(SCS)过程的 Minisci 反应

脱氧核糖作为 DNA 的合成单元, 是由核糖通过自由基脱羟基过程合成. 该过程的关键一步在于羰基基发生自旋中心迁移(SCS), 脱去一分子水得到脱羟基的自由基中间体(Scheme 37)^[64].

由于醇在自然界中广泛存在, 使用醇作为烷基自由基前体实现 Minisci 反应具有非常重要的意义. 2015 年, MacMillan 课题组^[65]利用 SCS 这一关键步骤实现了醇作为烷基自由基前体的 Minisci 反应(Scheme 38). 作者提出高价态的光催化剂 Ir^{IV} 氧化硫醇得到硫中心自由基和基态的光催化剂 Ir^{III} , 硫中心自由基攫取醇羟基邻位的

图式 37 生物体中的自旋中心迁移(SCS)过程

Scheme 37 Spin-centre shift (SCS) process in organism

氢原子得到 α -羟基自由基, α -羟基自由基对氮杂芳环加成得到杂环芳烃自由基正离子中间体, 其失去质子后发生 1,2-氢迁移得到杂环芳烃自由基中间体. 杂环芳烃自由基中间体发生 SCS 失去一分子水得到苄基自由基, 其被激发态的光催化剂 Ir^{III} 还原, 再结合一个质子得到烷基化的产物. 该反应仅适用于一级醇, 对于二级和三级醇不适用, 可能是二级和三级醇的位阻较大, 硫中心自由基很难攫取羟基邻位的氢原子. 该反应对于环醚类化合物也适用, 通过 SCS 过程得到醚开环的烷基化产物.

图式 38 可见光催化的一级醇的 Minisci 反应

Scheme 38 Visible-light-mediated Minisci reaction with primary alcohol

2017 年, 李朝军课题组^[66]报道了类似的甲醇作自由基前体的 Minisci 甲基化反应(Scheme 39). 该反应不需要光催化剂和硫醇催化剂的参与, 在紫外光照射下即可实现. 随后 Barriault 等^[67]同样在紫外光照射下实现了甲醇作自由基前体的 Minisci 甲基化反应.

由于羰基化合物在自然界中广泛存在, 由羰基化合物脱氧产生烷基自由基的 Minisci 反应具有重要的意义. 但是由于羰基化合物碳氧双键极性的差异, 羰基的碳往

图式 39 紫外光照射下甲醇的 Minisci 甲基化反应

Scheme 39 Minisci methylation reaction with methanol under UV light

往具有碳正离子的性质^[68], 通过极性翻转的方式可以使得羰基化合物的碳具有碳负离子的性质^[69]. 2019 年, 汪清民课题组^[70-71]报道了使用羰基化合物作为烷基自由基前体的 Minisci 反应(Scheme 40). 在该反应中作者将质子耦合电子转移(PCET)过程与自旋中心迁移(SCS)过程结合起来. 作者提出三甲基硅基硅烷还原激发态的光催化剂 Ir^{III} , 得到还原性更强的低价态光催化剂 Ir^{II} , 低价态光催化剂 Ir^{II} 在酸的协助下与羰基化合物发生 PCET 过程, 得到羰游基并完成光催化循环, 羰游基对氮杂芳环加成, 再发生 SCS 得到苄基自由基, 其攫取体系中的氢原子得到烷基化的产物. 这是首次报道的羰基

图式 40 可见光催化的羰基化合物脱氧的 Minisci 反应

Scheme 40 Visible-light-mediated deoxygenation Minisci reaction with carbonyl compounds

化合物作为烷基自由基等价体的反应, 将为羰基化合物的应用打开一扇新的大门. 2020 年, 黄华文课题组^[72-73]使用溴化锂作 HAT 催化剂同样实现了醛分子脱氧的 Minisci 烷基化反应.

随后, 黄华文课题组^[74]利用 SCS 这一关键步骤实现了醛分子的 Minisci 羟烷基化反应(Scheme 41). 作者提出激发态的光催化剂氧化溴负离子得到溴自由基, 溴自由基攫取醛分子的酰基氢原子得到酰基自由基, 酰基自由基对氮杂芳环加成得到杂环芳烃自由基正离子中间体, 其失去质子后发生 1,2-氢迁移得到杂环芳烃自由基中间体, 杂环芳烃自由基中间体发生 SCS 过程得到羟烷基自由基, 其被低价态的光催化剂还原, 再结合一个质子得到羟烷基化产物. 使用相同的策略, Kanai 课题组^[75]使用硫醇作 HAT 催化剂, 实现了醛分子的 Minisci 羟烷基化反应. 同时, 黄华文课题组^[76]同样利用 SCS 的策略实现了四氢呋喃开环的 Minisci 烷基化反应.

图式 41 可见光催化的醛的 Minisci 羟烷基化反应

Scheme 41 Visible-light-mediated Minisci hydroxyalkylation with aldehydes

7 经历碳碳键断裂过程的 Minisci 反应

DiRocco 等^[77]在 2014 年报道了光催化下使用过氧化物作为烷基自由基前体的 Minisci 烷基化反应(Scheme 42). 该反应机理与前面介绍的汪清民课题组报道的光催化下烷基碘的 Minisci 烷基化反应类似. 在该反应中过氧化叔丁酯通过 PCET 的方式氧化激发态的光催化剂 Ir^{III} , 得到叔丁氧自由基和高价态的光催化剂 Ir^{IV} , 叔丁氧自由基发生 β -裂解产生甲基自由基, 甲基自由基

对氮杂芳环加成,再被高价态的光催化剂 Ir^{IV} 氧化芳构化得到甲基化的产物。

图式 42 可见光催化的过氧化物碳碳键断裂的 Minisci 反应
Scheme 42 Visible-light-mediated Minisci reaction via peroxide fragmentation

2019 年,陈弓课题组^[78]在他们发展的醇分子 1,5-氢迁移的 Minisci 反应的基础上,实现了醇分子 β -裂解的 Minisci 烷基化反应(Scheme 43).在该反应中醇分子在产生氧自由基后,由于没有 1,5-氢迁移的位点,使得氧自由基发生 β -裂解脱去一分子醛得到烷基自由基。也就是说,醇分子的 1,5-氢迁移 Minisci 反应和 β -裂解 Minisci 反应是由醇底物决定的。当 1,5-氢迁移位点有氢原子时,得到 1,5-氢迁移的 Minisci 反应产物,当 1,5-氢迁移位点没有氢原子时,得到 β -裂解的 Minisci 反应产物。

图式 43 可见光催化的醇 β -裂解的 Minisci 反应
Scheme 43 Visible-light-mediated Minisci reaction with alcohols via β -scission

8 芳基重氮盐作自由基前体的 Minisci 反应

芳基重氮盐作为一种常见的芳基自由基前体,在早

期报道有加成到氮杂芳环的例子,但是由于产率很低,未能得到广泛的应用^[79]。2014 年,薛东等^[80]报道了一例光催化的芳基重氮盐作芳基自由基前体的 Minisci 反应(Scheme 44)。在该反应中芳基重氮盐既作氧化剂氧化光催化剂,避免外加氧化剂,又作芳基自由基前体产生芳基自由基。但是该反应使用氮杂芳环的盐酸盐作反应底物,且需要大大过量。而作为芳基自由源的苯基重氮盐其除了需要预先制备以外,并不是一种稳定的结构,接触空气极易变质,而且极易得到两个苯基自由基偶联的副产物。值得注意的是,芳基重氮盐苯环上连有吸电子基和供电子基,均能以良好的收率得到芳基化的产物。

图式 44 可见光催化的芳基重氮盐的 Minisci 反应
Scheme 44 Visible-light-mediated Minisci reaction with aryl diazonium salts

9 烷基二氢吡啶作自由基前体的 Minisci 反应

由于直接由烷基醛的 Minisci 反应产生的酰基自由基中间体,脱 CO 不能进行完全,往往得到烷基化和酰基化的混合物。为了解决这一问题,2017 年 Molander 课题组^[81]由烷基醛出发,一步合成出 1,4-二氢吡啶(DHPs)类衍生物,并以氧化均裂烷基二氢吡啶的方式产生烷基自由基,实现了苯醌和含氮芳环的烷基化反应^[82],在形式上实现了醛脱 CO 的烷基化反应,不会得到酰基化的副产物。2020 年,汪清民课题组^[83]在可见光催化条件下,使用氧气作氧化剂同样实现了烷基二氢吡啶的 Minisci 烷基化反应(Scheme 45)。在该反应中,作者提出激发态的光催化剂 Ir^{III} 直接氧化烷基二氢吡啶得到烷基自由基。

10 烷基吡啶盐作自由基前体的 Minisci 反应

由于有机胺在自然界中广泛存在,通过断裂有机胺

图式 45 可见光催化的烷基二氢吡啶的 Minisci 反应

Scheme 45 Visible-light-mediated Minisci reaction with alkyl-dihydropyridine

分子碳氮键的方式产生烷基自由基来实现 Minisci 反应具有重要意义. 2017 年 Glorius 课题组^[84]利用有机胺合成了一系列烷基吡啶盐类化合物, 并实现了烷基吡啶盐类化合物碳氮键断裂产生烷基自由基的 Minisci 反应 (Scheme 46). 光化学领域通过碳氮键的断裂产生烷基自由基的反应其实并不常见, 提供了一种有机胺分子参与 Minisci 反应的新途径. 作者提出光催化剂将烷基吡啶盐还原产生烷基自由基, 使得该反应不需要外加氧化剂.

图式 46 可见光催化的烷基吡啶盐的 Minisci 反应

Scheme 46 Visible-light-mediated Minisci reaction with alkylpyridinium salts

11 烯烃参与的三组分 Minisci 反应

在前面介绍的两组分 Minisci 反应中, 亲核性的烷基自由基或酰基自由基能够直接加成到缺电子的氮杂芳环上. 对于缺电子的烷基自由基或杂原子自由基, 由

于其与氮杂芳环的极性不匹配, 不能直接加成到氮杂芳环上. 通过向反应体系中加入烯烃, 可以使得缺电子的烷基自由基或杂原子自由基先加成到烯烃双键上, 产生亲核性的烷基自由基中间体, 再加成到氮杂芳环上, 这样就可以实现烯烃和缺电子自由基参与的三组分 Minisci 烷基化反应 (Scheme 47)^[85].

图式 47 烯烃参与的三组分 Minisci 反应

Scheme 47 Three-component Minisci reaction with alkenes

2019 年 Nagib 等^[86]报道了可见光催化的有机磷化合物与烯烃参与的三组分 Minisci 烷基化反应 (Scheme 48). 在该反应中氧气氧化激发态的光催化剂 Ir^{III} 到高价态的光催化剂 Ir^{IV} , 高价态的光催化剂 Ir^{IV} 直接氧化有机磷化合物, 产生缺电子的磷自由基, 其先加成到烯烃双键上, 得到的中间体再加成到氮杂芳环上. 温和的反应条件使得反应有广泛的底物适用范围和很好的官能团兼容性.

图式 48 可见光催化的有机磷和烯烃三组分 Minisci 反应

Scheme 48 Visible-light-mediated three-component Minisci reaction with phosphines and alkene

12 总结与展望

本文从产生自由基的前体化合物角度阐述了可见

光催化的羧酸、活化酯、活化和未活化的烷烃、硼酸、三氟硼酸、三氟甲烷磺酰氯、卤代烃、醇、醛、酮、芳基重氮盐、烷基二氢吡啶和烷基吡啶盐的 Minisci 反应。可以看出,可见光催化的 Minisci 反应在近年来取得了很大的进展。其中最适合于 Minisci 反应的含氮芳环,如喹啉、异喹啉、吡啶、嘧啶等也是药物化学中研究最广泛的骨架结构,这意味着我们需要进一步改进和发展 Minisci 反应。这包括使用便宜易得的自由基前体,更加温和的反应条件,更好的立体选择性和区域选择性,避免使用贵金属光催化剂。随着越来越多的合成化学家开发出自由基产生的新方法,未来 Minisci 反应将会进一步取得突破。

References

- [1] Bhutani, P.; Joshi, G.; Raja, N.; Bachhav, N.; Rajanna, P. K.; Bhutani, H.; Paul, A. T.; Kumar, R. *J. Med. Chem.* **2021**, *64*, 2339.
- [2] Zhang, J.-R.; Xu, L.; Liao, Y.-Y.; Deng, J.-C.; Tang, R.-Y. *Chin. J. Chem.* **2017**, *35*, 271.
- [3] Proctor, R. S. J.; Phipps, R. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2019**, *58*, 13666.
- [4] Duncton, M. A. *J. Med. Chem. Commun.* **2011**, *2*, 1135.
- [5] Garza-Sanchez, R. A.; Tlahuext-Aca, A.; Tavakoli, G.; Glorius, F. *ACS Catal.* **2017**, *7*, 4057.
- [6] Wang, J.; Li, G. X.; He, G.; Chen, G. *Asian J. Org. Chem.* **2018**, *7*, 1307.
- [7] Genovino, J.; Lian, Y.; Zhang, Y.; Hope, T. O.; Juneau, A.; Gagné, Y.; Ingle, G.; Frenette, M. *Org. Lett.* **2018**, *20*, 3229.
- [8] Xie, L.-Y.; Jiang, L.-L.; Tan, J.-X.; Wang, Y.; Xu, X.-Q.; Zhang, B.; Cao, Z.; He, W.-M. *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2019**, *7*, 14153.
- [9] Jia, W.; Jian, Y.; Huang, B.; Yang, C.; Xia, W. *Synlett* **2018**, *29*, 1881.
- [10] Lu, J.; He, X.-K.; Cheng, X.; Zhang, A.-J.; Xu, G.-Y.; Xuan, J. *Adv. Synth. Catal.* **2020**, *362*, 2178.
- [11] Candish, L.; Freitag, M.; Gensch, T.; Glorius, F. *Chem. Sci.* **2017**, *8*, 3618.
- [12] Pratsch, G.; Lackner, G. L.; Overman, L. E. *J. Org. Chem.* **2015**, *80*, 6025.
- [13] Edwards, J. T.; Merchant, R. R.; McClymont, K. S.; Knouse, K. W.; Qin, T.; Malins, L. R.; Vokits, B.; Shaw, S. A.; Bao, D.-H.; Wei, F.-L.; Zhou, T.; Eastgate, M. D.; Baran, P. S. *Nature* **2017**, *545*, 213.
- [14] Zhao, Y.; Chen, J.-R.; Xiao, W.-J. *Org. Lett.* **2018**, *20*, 224.
- [15] Cornella, J.; Edwards, J. T.; Qin, T.; Kawamura, S.; Wang, J.; Pan, C.-M.; Gianatassio, R.; Schmidt, M.; Eastgate, M. D.; Baran, P. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, *138*, 2174.
- [16] Cheng, W.-M.; Shang, R.; Fu, Y. *ACS Catal.* **2017**, *7*, 907.
- [17] Cheng, W.-M.; Shang, R.; Fu, M.-C.; Fu, Y. *Chem.-Eur. J.* **2017**, *23*, 2537.
- [18] Sherwood, T. C.; Li, N.; Yazdani, A. N.; Murali Dhar, T. G. *J. Org. Chem.* **2018**, *83*, 3000.
- [19] Dong, J.; Wang, X.; Song, H.; Liu, Y.; Wang, Q. *Adv. Synth. Catal.* **2020**, *362*, 2155.
- [20] Jin, S.; Geng, X.; Li, Y.; Zheng, K. *Eur. J. Org. Chem.* **2021**, *6*, 969.
- [21] Proctor, R. S. J.; Davis, H. J.; Phipps, R. J. *Science* **2018**, *360*, 419.
- [22] Liu, X.; Liu, Y.; Chai, G.; Qiao, B.; Zhao, X.; Jiang, Z. *Org. Lett.* **2018**, *20*, 6298.
- [23] Lyu, X.; Huang, S.; Song, H.; Liu, Y.; Wang, Q. *Org. Lett.* **2019**, *21*, 5728.
- [24] Fu, M.-C.; Shang, R.; Zhao, B.; Wang, B.; Fu, Y. *Science* **2019**, *363*, 1429.
- [25] Sun, A. C.; McClain, E. J.; Beatty, J. W.; Stephenson, C. R. J. *Org. Lett.* **2018**, *2*, 3487.
- [26] Jin, J.; MacMillan, D. W. C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, *54*, 1565.
- [27] Zhang, Y.; Teuscher, K. B.; Ji, H. *Chem. Sci.* **2016**, *7*, 2111.
- [28] Devari, S.; Shah, B. A. *Chem. Commun.* **2016**, *52*, 1490.
- [29] Zhang, L.; Zhang, G.; Li, Y.; Wang, S.; Lei, A. *Chem. Commun.* **2018**, *54*, 5744.
- [30] Liang, X.-A.; Niu, L.; Wang, S.; Liu, J.; Lei, A. *Org. Lett.* **2019**, *21*, 2441.
- [31] Huff, C. A.; Cohen, R. D.; Dykstra, K. D.; Streckfuss, E.; DiRocco, D. A.; Krska, S. W. *J. Org. Chem.* **2016**, *81*, 6980.
- [32] Liu, S.; Pan, P.; Fan, H.; Li, H.; Wang, W.; Zhang, Y. *Chem. Sci.* **2019**, *10*, 3817.
- [33] Dong, J.-Y.; Xia, Q.; Luy, X.-L.; Yan, C.-C.; Song, H.-J.; Liu, Y.-X.; Wang, Q.-M. *Org. Lett.* **2018**, *20*, 5661.
- [34] Bosset, C.; Beucher, H.; Bretel, G.; Pasquier, E.; Queguiner, L.; Henry, C.; Vos, A.; Edwards, J. P.; Meerpoel, L.; Berthelot, D. *Org. Lett.* **2018**, *20*, 6003.
- [35] Grainger, R.; Heightman, T. D.; Ley, S. V.; Lima, F.; Johnson, C. N. *Chem. Sci.* **2019**, *10*, 2264.
- [36] Wang, Z.; Ji, X.; Zhao, J.; Huang, H. *Green Chem.* **2019**, *21*, 5512.
- [37] Shao, X.; Wu, X.; Wu, S.; Zhu, C. *Org. Lett.* **2020**, *22*, 7450.
- [38] Perry, I. B.; Brewer, T. F.; Sarver, P. J.; Schultz, D. M.; DiRocco, D. A.; MacMillan, D. W. C. *Nature* **2018**, *560*, 70.
- [39] Quattrini, M. C.; Fujii, S.; Yamada, K.; Fukuyama, T.; Ravelli, D.; Fagnoni, M.; Ryu, I. *Chem. Commun.* **2017**, *53*, 2335.
- [40] Li, G.-X.; Hu, X.; He, G.; Chen, G. *ACS Catal.* **2018**, *8*, 11847.
- [41] Proctor, R. S. J.; Chuentragool, P.; Colgan, A. C.; Phipps, R. J. *J. Am. Chem. Soc.* **2021**, *143*, 4928.
- [42] Wu, X.; Zhang, H.; Tang, N.; Wu, Z.; Wang, D.; Ji, M.; Xu, Y.; Wang, M.; Zhu, C. *Nat. Commun.* **2018**, *9*, 3343.
- [43] Li, G.-X.; Hu, X.; He, G.; Gong, C. *Chem. Sci.* **2019**, *10*, 688.
- [44] Tang, N.; Wu, X.; Zhu, C. *Chem. Sci.* **2019**, *10*, 6915.
- [45] Deng, Z.; Li, G.-X.; He, G.; Chen, G. *J. Org. Chem.* **2019**, *84*, 15777.
- [46] Chen, H.; Fan, W.; Yuan, X.-A.; Yu, S. *Nat. Commun.* **2019**, *10*, 4743.
- [47] Li, G.-X.; Morales-Rivera, C. A.; Wang, Y.; Gao, F.; He, G.; Liu, P.; Chen, G. *Chem. Sci.* **2016**, *7*, 6407.
- [48] Dong, J.; Yue, F.; Song, H.; Liu, Y.; Wang, Q. *Chem. Commun.* **2020**, *56*, 12652.
- [49] Matsui, J. K.; Primer, D. N.; Molander, G. A. *Chem. Sci.* **2017**, *8*, 3512.
- [50] Nguyen, T. M.; Manohar, N.; Nicewicz, D. A. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2014**, *53*, 6198.
- [51] Matsui, J. K.; Molander, G. A. *Org. Lett.* **2017**, *19*, 950.
- [52] Yan, H.; Hou, Z.-W.; Xu, H.-C. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 4592.
- [53] Xu, P.; Chen, P.-Y.; Xu, H.-C. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, *59*, 14275.
- [54] Lai, X.-L.; Shu, X.-M.; Song, J.; Xu, H.-C. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, *59*, 10626.
- [55] Nagib, D. A.; MacMillan, D. W. C. *Nature* **2011**, *480*, 224.
- [56] Zhang, W.; Xiang, X.; Chen, J.; Yang, C.; Pan, Y.; Cheng, J.; Meng, Q.; Li X. *Nat. Commun.* **2020**, *11*, 638.
- [57] McCallum, T.; Barriault, L. *Chem. Sci.* **2016**, *7*, 4754.
- [58] Kim, H.; Lee, C. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2012**, *51*, 12303.
- [59] Nuhant, P.; Oderinde, M. S.; Genovino, J.; Juneau, A.; Gagne, Y.; Allais, C.; Chinigo, G. M.; Choi, C.; Sach, N.; Bernier, W. L.; Fobian, Y. M.; Bundesmann, M. W.; Khunte, B.; Frenette, M.; Fadeyi, O. O. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2017**, *56*, 15309.
- [60] Wang, L.; Lear, J. M.; Rafferty, S. M.; Fosu, S. C.; Nagib, D. A. *Science* **2018**, *362*, 225.
- [61] Bissonnette, N. B.; Boyd, M. J.; May, G. D.; Giroux, S.; Nuhant, P. *J. Org. Chem.* **2018**, *83*, 10933.
- [62] Wang, Z.; Dong, J.; Hao, Y.; Li, Y.; Liu, Y.; Song, H.; Wang, Q. *J. Org. Chem.* **2019**, *84*, 16245.
- [63] Dong, J.; Lyu, X.; Wang, Z.; Wang, X.; Song, H.; Liu, Y.; Wang, Q. *Chem. Sci.* **2019**, *10*, 976.

- [64] Wessig, P.; Muehling, O. *Eur. J. Org. Chem.* **2007**, 2219.
- [65] Jin, J.; MacMillan, D. W. C. *Nature* **2015**, 525, 87.
- [66] Liu, W.; Yang, X.; Zhou, Z.-Z.; Li, C.-J. *Chem* **2017**, 2, 688.
- [67] McCallum, T.; Pitre, S. P.; Morin, M.; Scaiano, J. C.; Barriault, L. *Chem. Sci.* **2017**, 8, 7412.
- [68] Carey, F. A.; Sundberg, R. J. *Advanced Organic Chemistry: Part B: Reactions and Synthesis*, Springer, New York, **2001**.
- [69] Wang, H.; Dai, X.-J.; Li, C.-J. *Nat. Chem.* **2017**, 9, 374.
- [70] Dong, J.; Wang, Z.; Wang, X.; Song, H.; Liu, Y.; Wang, Q. *Sci. Adv.* **2019**, 5, eaax9955.
- [71] Cheng, X.; Lu, Z. *Chin. J. Org. Chem.* **2019**, 39, 3312 (in Chinese). (程晓恺, 陆展, 有机化学, **2019**, 39, 3312.)
- [72] Wang, Z.; Liu, Q.; Ji, X.; Deng, G.-J.; Huang, H. *ACS Catal.* **2020**, 10, 154.
- [73] Peng, S.; Lin, Y.; He, W. *Chin. J. Org. Chem.* **2020**, 40, 541 (in Chinese). (彭莎, 林英武, 何卫民, 有机化学, **2020**, 40, 541.)
- [74] Ji, X.; Liu, Q.; Wang, Z.; Wang, P.; Deng, G.; Huang, H. *Green Chem.* **2020**, 22, 8233.
- [75] Fuse, H.; Nakao, H.; Saga, Y.; Fukatsu, A.; Kondo, M.; Masaoka, S.; Mitsunuma, H.; Kanai, M. *Chem. Sci.* **2020**, 11, 12206.
- [76] Wang, Z.; Ji, X.; Han, T.; Deng, G.; Huang, H. *Adv. Synth. Catal.* **2019**, 361, 5643.
- [77] DiRocco, D. A.; Dykstra, K.; Krska, S.; Vachal, P.; Conway, D. V.; Tudge, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, 53, 4802.
- [78] Hu, X.; Li, G.-X.; He, G.; Chen, G. *Org. Chem. Front.* **2019**, 6, 3205.
- [79] Dou, H. J. M.; Lynch, B. M. *Tetrahedron Lett.* **1965**, 6, 897.
- [80] Xue, D.; Jia, Z.-H.; Zhao, C.-J.; Zhang, Y.-Y.; Wang, C.; Xiao, J. *Chem.-Eur. J.* **2014**, 20, 2960.
- [81] Ravelli, D.; Protti, S.; Fagnoni, M. *Chem. Rev.* **2016**, 116, 9850.
- [82] Gutiérrez-Bonet, Á.; Remeur, C.; Matsui, J. K.; Molander, G. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2017**, 139, 12251.
- [83] Dong, J.; Yue, F.; Xu, W.; Song, H.; Liu, Y.; Wang, Q. *Green Chem.* **2020**, 22, 5599.
- [84] Klauck, F. J. R.; James, M. J.; Glorius, F. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2017**, 56, 12336.
- [85] Antonietti, F.; Mele, A.; Minisci, F.; Punta, C.; Recupero, F.; Fontana, F. *J. Fluorine Chem.* **2004**, 125, 205.
- [86] Buquoi, J. Q.; Lear, J. M.; Gu, X.; Nagib, D. A. *ACS Catal.* **2019**, 9, 5330.

(Fan, Y.)