一氧化碳参与 β -内酰胺化合物合成的研究进展王 鹏^{*,a} 杨 姐^b 刘 欢^b(^a 中国科学院上海有机化学研究所 金属有机化学国家重点实验室 上海 200032)(^b 中国石油大学(华东)理学院 化学系 青岛 266580)

摘要 β -内酰胺类化合物是具有高生物活性及高应用价值的抗生素, 如何高效高选择性地设计、合成该类化合物一直是有机化学研究的热点问题. 由于其环状结构中具有羰基结构, 利用一氧化碳(CO)作为羰基源与底物分子发生羰基化反应也发展成为合成 β -内酰胺的有效方法. 通过该方法可以一步高效合成结构多样性且新颖的 β -内酰胺化合物. 综述了近年来通过不同底物分子与 CO 发生羰基化反应构建 β -内酰胺的研究进展, 并且对该方法存在的问题以及未来发展方向进行了展望.

关键词 β -内酰胺; 一氧化碳; 羰基化; 氮杂环丙烷; 烯酮

Recent Advances on the Synthesis of β -Lactams by Involving Carbon MonoxideWang, Peng^{*,a} Yang, Da^b Liu, Huan^b(^a State Key Laboratory of Organometallic Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032)(^b Department of Chemistry, College of Science, China University of Petroleum (East China), Qingdao 266580)

Abstract β -Lactam compounds are antibiotics with high biological activity and high application value. Design and synthesis of β -lactams with high efficiency and high selectivity have always been a hot issue in organic chemistry. Because of the carbonyl group in the ring structure, the carbonylation reaction between substrate and carbon monoxide (CO) has also developed into a new method for synthesis of β -lactams, which can be used to synthesize novel and diverse structures in one step. In this paper, the carbonylation of different substrates with CO to synthesize β -lactams in recent years is reviewed, and the existing problems and future development of this strategy are prospected.

Keywords β -lactams; carbon monoxide; carbonylation; aziridine; ketene

1929 年, Fleming^[1]首次发现了具有 β -内酰胺环结构的青霉素(Penicillin), 其作为广谱抗菌素在临床治疗中具有十分广泛的应用. 自从青霉素被发现以来, β -内酰胺结构的设计合成和立体化学研究一直是有机合成中的前沿问题^[2-4]. 因此设计合成结构多样性的 β -内酰胺环并且拓展它更广泛的应用, 已成为有机化学和药物化学研究的热点^[5].

通过化学合成手段制备 β -内酰胺类药物相比于生物手段存在一些缺点: 由于反应原料结构的局限会导致产物结构多样性的局限; 发生化学反应的条件比较苛

刻, 并且产物的收率较低等^[6-7]. 针对这些问题, 科研工作者已经发展了多种利用过渡金属催化剂催化底物高效合成 β -内酰胺的方法^[8], 例如卡宾 C—H 键的插入反应^[9-11], 氮杂环丙烷的羰基化扩环反应^[12], Kinugasa 反应^[13-15], 易形成烯醇的酯与亚胺的缩合反应(Gilman-Speeter 反应或者 Reformatsky 反应)^[16-17]等(Scheme 1). 一氧化碳(CO)参与的羰基化反应能够在底物分子内高效构建羰基官能团而被广泛关注^[18], 因此其也被应用于各类 β -内酰胺的合成中. 本文综述近年不同类型的底物与一氧化碳发生羰基化反应合成 β -内酰胺的研究进

* Corresponding author. E-mail: lzuwangpeng@mail.sioc.ac.cn

Received April 30, 2021; revised May 25, 2021; published online June 7, 2021.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China: Youth Project (No. 21901250) and the General Programs of China Postdoctoral Science Foundation (No. 2019M651625).

国家自然科学基金(No. 21901250)和中国博士后科学面上基金(No. 2019M651625)资助项目.

展,同时对羰基化反应在 β -内酰胺合成中的应用前景进行了展望。

图式 1 过渡金属催化合成 β -内酰胺

Scheme 1 Synthesis of β -lactams catalyzed by transition metal

1 氮杂环丙烷类化合物为底物构建 β -内酰胺

通过氮杂环化合物羰基化反应合成氮丙啶-2-酮是合成 β -内酰胺的重要方法。早在 1961 年, Elschmigg 课题组^[19]报道了八羰基二钴催化二氮杂环丙烷合成 β -内酰胺的方法,产物 1,3-壬二酸-2-酮的收率中等或较低(11%~65%)。此羰基化反应仅适用于 3,3-二取代二氮杂环丙烷,单取代基的底物在该条件下易发生聚合反应(Scheme 2)。后续其他种类的过渡金属(例如铑、钌、镍、铁)也可以应用于(催化或化学计量的)氮杂环丙烷的羰基化扩环反应^[20],这极大地丰富了通过该策略构建 β -内酰胺的方法^[21-22]。

图式 2 钴催化二氮杂环丙烷合成 β -内酰胺

Scheme 2 Carbonylation of diaziridines to β -lactams catalyzed by Cobalt

1983 年, Alper 课题组^[23]报道了铑催化氮杂环丙烷羰基化高区域选择性生成 β -内酰胺(化合物 2)的反应。当底物中 R 是苯基或对溴苯基, R' 为叔丁基或 1-金刚烷基时,可以得到单一的 β -内酰胺产物;但是当 R' 为苄基时(与 N 原子相连的亚甲基上的氢原子具有酸性),底物发生环裂解副反应,不能得到单一的目标产物(Scheme 3a)。随后,该课题组^[24]选择钌催化剂催化含有烯基的氮杂环丙烷羰基化合成 α -亚甲基- β -内酰胺,通过筛选不同的钌催化剂前体,该反应在较温和条件下(室温, CO 压力为 101~303 kPa), Pd(PPh₃)₄ 或者“Pd(OAc)₂/PPh₃”体系均能很好地催化底物得到目标产物(收率为

43%~83%) (Scheme 3b)。1989 年,该课题组^[25]又在之前工作^[23-24]基础上,选择光学活性的底物以中等或较低收率(21%~44%)合成了手性 β -内酰胺产物(Scheme 3c)。

图式 3 氮杂环丙烷区域选择性扩环合成 β -内酰胺

Scheme 3 Regiospecific ring expansion of aziridines to β -lactams

1991 年, Ohfuné 课题组^[26]报道了钯催化 2-取代 3-乙烯基氮丙啶类化合物羰基化合成 β -内酰胺的反应。该工作中提到合成 β -内酰胺具有两种不同的催化模式:乙烯基溴与钯催化剂氧化加成形成乙烯基钯活性物种,随后经历插羰反应和扣环反应得到目标产物(Scheme 4a);氮丙啶类化合物首先开环与钯催化剂配位形成烯丙基钯活性中间体,随后经历插羰和还原消除的过程得到终产物(Scheme 4b)。

图式 4 钯催化 2-取代 3-乙烯基氮丙啶类化合物羰基化合成 3,4-二取代 2-氮杂环丁酮衍生物

Scheme 4 Novel entry to 3,4-disubstituted 2-azetidinone derivative via Pd-assisted carbonylation of 2-substituted 3-vinyl-aziridine

1993 年, Tanner 课题组^[27]报道了钯催化手性乙烯基氮丙啶转化为 β -内酰胺的反应。由于青霉素类抗生素含有 β -内酰胺结构,利用该工作的手性底物发生羰基化反应能够优于之前文献报道^[28]高区域选择性得到光学纯

的青霉烯类抗生素的全合成中间体(+)-thienamycin 和(+)-PS-5 (Scheme 5).

图式 5 钌催化手性乙烯基氮丙啶转化为 β -内酰胺

Scheme 5 Pd-catalyzed transformation of a chiral vinylaziridine to a β -lactams

1996 年, Alper 课题组^[29]在之前工作^[23-25]基础上报道了 $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 催化氮杂环丙烷的羰基化反应制备 β -内酰胺, 并且首次合成了高度环张力的反式双环 β -内酰胺产物. 这项研究的一个重要结果是合成了反式-7-氮杂双环[4.2.0]-8-辛烷这种结构新颖并且具有生物活性的双环 β -内酰胺产物(Scheme 6). 2001 年, Torre 课题组^[30]也报道了钴催化氮杂环丙烷构建 β -内酰胺的反应, 该工作发现产物的区域选择性会受到底物分子环上取代基效应的影响. 当底物分子中含有吸电子基团(三氟甲基、酯基等)时, 反应不能够发生; 而分子中含有烷氧基或者氨甲基时, 反应能够很好地发生, 该反应以反式产物为主.

图式 6 高度环张力反式双环 β -内酰胺的首次合成

Scheme 6 First synthesis of highly strained *trans*-bicyclic β -lactams

1998 年, Pinhas 课题组^[31]报道了镍催化氮杂环丙烷构建 β -内酰胺的反应, 反应首先在碘离子的作用下开环, 其次镍催化羰基插入形成目标产物(Scheme 7).

图式 7 四羰基镍催化氮杂环丙烷“一锅法”合成 β -内酰胺

Scheme 7 One-pot conversion of aziridine to β -lactam using Nickel tetracarbonyl

2002 年, Coates 课题组^[32]报道了一类新型的钴催化剂 $[\text{Lewis Acid}]^+[\text{Co}(\text{CO})_4]^-$ 配合物, 其能够催化环氧化

物和氮杂环丙烷的扩环反应合成 β -内酯和 β -内酰胺. 经过条件筛选, 当 $[\text{Cp}_2\text{Ti}(\text{thf})_2][\text{Co}(\text{CO})_4]$ ($\text{Cp} = \text{C}_5\text{H}_5$) 作为催化剂(5 mol%)时(CO 压力为 6.2 MPa), 氮杂环丙烷能以良好的收率(80%~95%)生成 β -内酰胺(Scheme 8).

图式 8 $[\text{Lewis acid}]^+[\text{Co}(\text{CO})_4]^-$ 催化环氧化合物羰基化制备 β -内酰胺

Scheme 8 Carbonylation of epoxides to β -lactams using $[\text{Lewis acid}]^+[\text{Co}(\text{CO})_4]^-$ complexes

2006 年, Sordo 课题组^[33]报道了铑催化氮杂环丙烷羰基化合成 β -内酰胺的机理研究: 超共轭效应可以使底物分子的 C—N 键更容易断裂. 作者选择 *N*-叔丁基-2-苯基氮杂环丙烷与 *N*-叔丁基-2-甲基氮杂环丙烷进行研究, 实验表明开环过程的区域选择性是由反应刚开始形成的氮丙啶- $\text{Rh}(\text{CO})_2\text{Cl}$ 配合物上要断裂的碳氮键的不同活化程度决定的, 因为其与底物碳原子上取代基存在超共轭效应: 当碳原子上连接苯基时, 它与碳氮键的超共轭作用有助于 $\text{Rh}(\text{CO})_2\text{Cl}$ 基团的插入; 而当碳原子上的取代基是甲基时, 其通过超共轭效应形成的初始络合物更稳定, 使得 $\text{Rh}(\text{CO})_2\text{Cl}$ 基团插入 C—N 键更加困难, 因此也不能得到目标产物(Scheme 9).

图式 9 铑催化氮杂环丙烷羰基化合成 β -内酰胺的理论研究

Scheme 9 Theoretical study of Rh(I) catalyzed carbonylative ring expansion of aziridines to β -lactams

2010 年, Aggarwal 课题组^[34]报道了钌催化乙烯基氮杂环丙烷的羰基化反应, 立体选择性地合成反式 β -内酰胺. 该反应通过对反应条件(钌催化剂前体、一氧化碳压力、温度)的调节, 能够控制生成反式或顺式 β -内酰胺产物, 甚至 δ -内酰胺. 由于 π -烯丙基钌中间体在 β -内酰胺形成之前经历高度异构化过程, 因此通过调控不同的反应条件从而调控该中间体的异构化程度, 进而能够定向生成某种非对映异构体甚至 δ -内酰胺(Scheme 10).

2017 年, D'hooghe 课题组^[35]报道了钴催化非活化氮杂环丙烷羰基化反应合成 β -内酰胺. 该反应以高收率(75%~99%)合成了 24 种高区域选择性的 β -内酰胺, 并

图式 10 钯催化乙烯基氮杂环丙烷的羰基化反应立体选择性合成反式 β -内酰胺Scheme 10 Stereoselective synthesis of *trans*- β -lactams by Pd-catalyzed carbonylation of vinyl aziridines

且为后续扩环反应、关环反应以及侧链官能化反应等提供了好的方法,同时也为合成新型吡咯烷类化合物、双环和三环的 β -内酰胺以及单环碳青霉烯类化合物提供了方法(Scheme 11).

图式 11 钴催化功能化氮杂环丙烷羰基化反应合成 β -内酰胺Scheme 11 Cobalt carbonyl-catalyzed carbonylation of functionalized aziridines to versatile β -lactam building blocks

综上所述,通过氮杂环丙烷类化合物发生羰基化反应已发展成为十分重要的合成 β -内酰胺的方法,其反应机理根据底物的差异可以归纳为两种策略^[25-26]:底物首先开环,过渡金属配合物插入到 C—N 键之间,其次经历一氧化碳的配位插入构建羰基,最后还原消除得到目标产物(Strategy 1, Scheme 12);当底物分子中含有乙烯基时,底物首先开环与过渡金属配合物配位形成金属烯丙基活性中间体,其次经历插羰反应和还原消除反应得到终产物(Strategy 2, Scheme 12).

图式 12 氮杂环丙烷羰基化反应合成 β -内酰胺的反应机理Scheme 12 Mechanism for carbonylation of aziridines to β -lactams

2 烯酮类化合物为底物构建 β -内酰胺

1907 年, Staudinger^[36]首次报道了 β -内酰胺的合成,该方法通过亚胺和原位生成的烯酮[2+2]环加成得到目标产物,也是第一个经典合成 β -内酰胺骨架的方法.此

后经过渡金属催化 Staudinger 反应合成 β -内酰胺便被广泛发展和应用. β -内酰胺骨架中三号位的基团常见的为吸电子基团,但是含有吸电子基团的烯酮在 Staudinger 反应中是非常活泼的,不能用经典的方法合成和分离^[37]. 相比之下,许多含有给电子基团的烯酮类化合物比较稳定,需要在过渡金属催化剂参与的条件发生.因此通过调控底物分子上的取代基类型,便可丰富合成结构多样性 β -内酰胺的方法.

1993 年, Torii 课题组^[38]报道了钯催化烯丙基磷酸二乙酯发生羰基化反应与不同类型的亚胺[2+2]环加成构建 β -内酰胺(收率为 47%~86%)的方法.该反应通过烯丙基磷酸酯类底物与钯催化剂氧化加成形成烯丙基钯物种,其次伴随着插羰和与亚胺的环加成反应形成了 β -内酰胺产物(Scheme 13a).次年,该课题组^[39]优化条件,在反应体系无羧酸添加剂或额外活化剂的条件下,以高产率以及高立体选择性合成顺式-/反式-3-烯基- β -内酰胺(CO 压力为 30 kg·cm⁻²).立体化学的调控很大程度上取决于所用亚胺的性质以及反应温度:羰基化合物(如酮或酯)与亚胺在室温下立体选择性地产生顺式 β -内酰胺,而 70 °C 选择性生成反式 β -内酰胺(Scheme 13b).

图式 13 钯催化烯丙基磷酸二乙酯的羰基化反应合成 β -内酰胺Scheme 13 Pd-catalyzed carbonylation of allyl diethyl phosphate for synthesis of β -lactams

2004 年, Troisi 课题组^[40]报道了钯催化底物发生羰基化[2+2]环加成反应构建 β -内酰胺(收率为 40%~98%)的方法,该反应通过手性亚胺和苄基卤代物反应能够高区域选择性以及高光学活性合成顺式 β -内酰胺

(单晶结构和核磁确定了产物的绝对构型). 实验表明产物骨架结构中 C-3 和 C-4 位基团为反式构型, 而含氮四元环几乎成平面结构, 是由于 N 原子的孤对电子与羰基中的 π 电子强的相互作用造成的(Scheme 14a). 同年, 该课题组^[41]又报道了在 Et_3N 存在的条件下, 三苯基膦调控 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ 催化不同结构的烯丙基卤化物与各种亚胺 [2+2] 环加成制备 β -内酰胺的方法. 产物具有良好的顺式立体选择性(β -内酰胺环和乙烯基部分). 同时, 作者也明确了反应机理: 对于 β -内酰胺结构本身, 立体选择性是根据骨架中 C-3 与 C-4 相连的质子间的偶合常数决定的, 根据文献报道^[42], 对于较小的环结构, $J_{\text{cis}} > J_{\text{trans}}$, 该反应产物中的非对映异构体两个碳原子上质子的偶合常数与文献报道一致, 因此该产物的构型也就确定了(Scheme 14b).

图式 14 钯催化[2+2]羰基化环加成立体选择性合成烯基 β -内酰胺

Scheme 14 The stereoselective synthesis of alkenyl- β -lactams by Pd-catalyzed [2+2] carbonylative cycloaddition

2006 年, Arndtsen 课题组^[43]报道了钯催化多组分(亚胺、酰氯和一氧化碳)合成 3-氨基取代的 β -内酰胺. 反应包含四个组分的一锅法耦合, 并且内酰胺的产生是通过两种不同的亚胺参与反应完成的. 该方法为构建杂环化合物提供了灵活的合成途径, 可以独立调控五个不同的底物取代基. 反应具有中等至良好的收率(37%~76%) (Scheme 15).

2009 年, Troisi 课题组^[44]报道了钯催化手性亚胺与苄基卤代物羰基化高区域选择性构建 β -内酰胺的反应(收率为 58%~97%). 实验表明连接 N 原子的芳香基团

图式 15 多组分(亚胺、酸性氯化物和一氧化碳)合成 β -内酰胺

Scheme 15 Multicomponent synthesis of β -lactams from imines, acid chloride and carbon monoxide

能够影响产物的立体选择性, 同时选择手性亚胺能够合成高立体选择性的反式 β -内酰胺. 该工作对反应机理做了进一步的明确: 首先苄基卤代物与钯催化剂前体生成烯丙基钯物种, 其次一氧化碳插入, 最后发生[2+2]加成反应合成终产物. 当亚胺的氮原子连接大位阻的叔丁基时, 苄基上卤原子对于产物的立体选择性没有影响, 而 ^1H NMR 中 C-3 和 C-4 位氢原子的偶合常数(J)值会影响到产物的立体选择性, 当偶合常数较小(1.8~2.5 Hz)优先生成反式产物, 而较大的偶合常数(5.8~6.5 Hz)优先生成顺式产物^[45-46](Scheme 16).

图式 16 高区域选择性合成 3,4-二芳基 β -内酰胺
Scheme 16 Stereoselective synthesis of 3,4-diaryl β -lactams

2011 年, 王剑波课题组^[47]报道了钯催化重氮化合物在常压条件下发生羰基化反应合成烯酮, 并且利用合成的烯酮与亚胺通过环加成反应合成 β -内酰胺. 该工作通过串联羰基化反应以及 Staudinger 环加成反应使 β -内酰胺衍生物具有良好的产率和良好的反式非对映选择性(收率为 73%~93%, 区域选择性 $\text{trans/cis} > 95:5$). 通过密度泛函理论(DFT)计算探究反应机理: Pd 催化剂参与了[2+2]环加成过程, 并通过辅助加成中间体的异构化作用而影响产物的非对映选择性; 另一方面, 该羰基化反应为在温和条件下高效生成烯酮类化合物提供了新途径(Scheme 17).

图式 17 $\text{Pd}_2(\text{dba})_3$ 催化 CO 与 N-甲苯肼盐和亚胺的反应
Scheme 17 $\text{Pd}_2(\text{dba})_3$ -catalyzed reactions of CO with N-tosylhydrazones and imines

2012 年, 夏春谷课题组^[48]报道了钯/N-杂环卡宾配合物催化苄基氯代物、CO、亚胺合成 β -内酰胺的反应. 经过条件筛选, 产物具有良好的收率(61%~96%)和区域选择性($\text{trans/cis} > 95:5$). 动力学同位素效应实验

(KIE)表明, C—H 键消除形成烯酮中间体很可能是后续环加成反应的决速步骤. 但反应需要在较高温度(100 °C)下进行(Scheme 18).

图式 18 钯/N-杂环卡宾配合物催化苄基氯代物与亚胺的羰基化反应合成 β -内酰胺

Scheme 18 Pd/N-heterocyclic carbene-catalyzed carbonylation of substituted benzyl chlorides with imine to synthesize β -lactams

2019 年, 龚流柱课题组^[49]报道了钯催化苄基卤代物的羰基化[1+1+2]串联反应合成手性 β -内酰胺. 该反应首先经过过渡金属催化苄基卤代物插羰形成羰基钯中间体, 其次在有机碱的作用下形成烯酮, 从而发生[2+2]环加成反应得到终产物. 通过在催化体系中引入手性胺 **4b**, 诱导了产物的光学活性. 该反应体系具有中等至优秀的收率(49%~82%)和较高的非对映选择性($d.r.$ > 5:1)以及对映选择性(ee > 82%) (Scheme 19).

图式 19 [1+1+2]反应合成手性 β -内酰胺

Scheme 19 [1+1+2] reaction for the synthesis of chiral β -lactams

综上所述, 通过生成烯酮中间体可以进一步构建 β -内酰胺, 并且底物普适性优异. 其反应机理可以归纳如下^[38-44]: 底物分子首先与过渡金属配合物发生氧化加成反应, 其次一氧化碳配位插入生成过渡金属酰基中间体, 该中间体在碱的作用下形成烯酮中间体, 最后烯酮与亚胺发生[2+2]环加成反应得到终产物(Scheme 20).

图式 20 烯酮类化合物合成 β -内酰胺的反应机理

Scheme 20 Reaction mechanism of synthesis of β -lactams by involving ketenes: mechanistic proposal

3 卡宾类化合物为底物构建 β -内酰胺

CO 参与的金属卡宾羰基化反应的研究报道很少, 早期研究主要集中在过渡金属催化的二卤代烷与 CO 的羰基化反应. 这些反应底物范围狭窄, 并且反应条件苛刻(高压、高温); 另一方面, 金属卡宾能够生成重氮化合物, 因此过渡金属催化卡宾化合物的羰基化反应主要以重氮化合物为研究对象^[50-52], 但是有关该类反应的研究报道较少^[53]. 与 CO 插入 M—C 键形成酰基金属物种相比, 卡宾类化合物羰基化反应首先是过渡金属络合的烯酮中间体的形成(Scheme 21), 伴随着烯酮的形成, 其与亚胺类底物发生[2+2]环加成反应得到目标产物. 金属卡宾羰基化反应合成 β -内酰胺也是非常重要的合成策略, 为 β -内酰胺的多样性合成提供了新的思路和方法^[54-56].

图式 21 M—C 键与 M=C 键的羰基化过程合成 β -内酰胺

Scheme 21 Carbonylation of M—C bond and M=C bond to synthesize β -lactams

1993 年, Ungváry 课题组^[57]报道了钴催化高活性的乙氧羰基烯酮类化合物合成 β -内酰胺的反应. 该反应使用催化量的八羰基二钴, 在室温条件下(一氧化碳压力为 7.5 MPa)以乙基重氮乙酸酯和 *N*-叔丁基苯甲亚胺为底物, 高收率(95%)地制备了 *N*-叔丁基-反式- α -乙氧羰基- β -苯基- β -内酰胺. 该工作还能够通过乙氧羰基烯酮与 *N*-甲基或 *N*-苄基取代的亚胺合成反式 β -内酰胺, 但是收率只有 11%和 13%. 研究机理发现反应过程中一氧化碳压力的高低会导致不同的催化循环: 在高压条件下, 可能的活性催化种类为 $Co_2(CO)_7$ 和 $Co_2(CO)_7(CHCO_2Et)$, 而低压时为 $Co_2(CO)_6(CHCO_2Et)$ 和 $Co_2(CO)_6(CHCO_2Et)_2$ (Scheme 22).

图式 22 钴催化乙氧羰基烯酮类化合物合成 β -内酰胺

Scheme 22 Synthesis of β -lactams derived from the ethoxycarbonyl ketenes catalyzed by cobalt

2013 年, Bruin 课题组^[58]报道了钴卟啉中的卡宾自由基催化卡宾羰基与亚胺合成 β -内酰胺的反应. 经过条件筛选, 产物具有良好的收率(50%~67%)和区域选择性(*trans*:*cis*>95:5) (Scheme 23).

图式 23 $[\text{Co}^{\text{II}}(\text{Por})]$ 催化 α -重氮羰基化合物合成 β -内酰胺
Scheme 23 $[\text{Co}^{\text{II}}(\text{Por})]$ -catalyzed *trans*-selective β -lactams synthesis from α -diazocarbonyl compounds

2014 年, 该课题组^[59]又报道了用 PNN 配体调控铑催化卡宾转化为烯酮和烯酮亚胺复合物的反应, 由于烯酮是合成 β -内酰胺的重要中间产物, 所以作者又利用铑配合物(**A**)催化卡宾前体与 *N*-苄烯甲胺以较高收率得到了 β -内酰胺产物(67.7%) (Scheme 24).

图式 24 铑催化卡宾前体与 *N*-苄烯甲胺合成 β -内酰胺
Scheme 24 Rh catalyst screening for β -lactams synthesis from carbene precursor and *N*-benzylidenemethanamine

4 C—H 键活化策略构建 β -内酰胺

2014 年, Cramer 课题组^[60]报道了钯催化氯乙酰胺类化合物 $\text{C}(\text{sp}^3)$ —H 烷基化以较低至优异的收率(20%~99%)制备 β -内酰胺的反应. 反应使用零价钯催化剂, 在大体积的 taddol 配体与金刚烷羧酸作助剂的情况下, 很好地调控了产物的对映选择性; 另一方面, 这个反应解决了具有挑战性的 $\text{C}(\text{sp}^3)$ — $\text{C}(\text{sp}^3)$ 键的还原消除过程, 进而很好地合成了 β -内酰胺化合物(Scheme 25).

2014 年, Gaunt 课题组^[61]报道了钯催化 C—H 键活化脂肪胺制备氮杂环类化合物(其中 β -内酰胺的收率为 55%~87%)的反应. 该工作合成了四元环状钯复合物 **8**, 并且验证了通过该复合物能够很好地催化底物生成 β -内酰胺(Scheme 26a). 2016 年, 该课题组^[62]又报道了钯催化新型脂肪胺的 β -C—H 键活化发生羰基化反应构建 β -内酰胺的反应, 产物依然具有优秀的收率(28%~89%) (Scheme 26b).

图式 25 对映选择性钯催化 $\text{C}(\text{sp}^3)$ —H 烷基化制备 β -内酰胺
Scheme 25 Access to β -lactams by enantioselective $\text{Pd}(0)$ -catalyzed $\text{C}(\text{sp}^3)$ —H alkylation

图式 26 钯催化 C—H 活化脂肪胺制备氮杂环类化合物
Scheme 26 Pd-catalyzed C—H activation of aliphatic amines to give strained nitrogen heterocycles

2017 年, Baudoin 课题组^[63]报道了零价钯催化 $\text{C}(\text{sp}^3)$ —H 键的氨甲酰化合成 β -内酰胺的反应. 该反应使用化学计量的一氧化碳在两室反应器中发生, 该反应与之前报道的 $\text{C}(\text{sp}^3)$ —H 键的活化策略不同^[61-62,64-67], 能够很好地适用于一级、二级和活化的三级 C—H 键, 并且非手性膦酸盐配体的使用能够调控反应的对映选择性, 这种方法可以用来合成有价值的含对映体的 β -内酰胺和 β -氨基酸(Scheme 27).

图式 27 钯催化 $\text{C}(\text{sp}^3)$ —H 键的氨甲酰化合成 β -内酰胺
Scheme 27 Synthesis of β -lactams by $\text{Pd}(0)$ -catalyzed $\text{C}(\text{sp}^3)$ —H carbamoylation

2017 年, Gaunt 课题组^[68]报道了钯催化脂肪族二级胺的 β -C—H 键活化发生羰基化反应构建 β -内酰胺的反应, 该反应体系具有中等至优秀的收率(40%~82%)和较高的非对映选择性(*d.r.* > 7:1). 其中双膦配体 Xantphos 对于该反应的发生起到很重要的作用, 催化剂首先形成胺酰基钯(II)中间体, 其次 β -C—H 键的选择性

活化是通过形成一个五元环的环状钯中间体而引发的 (Scheme 28).

图式 28 钯催化脂肪胺 β -C—H 键的羰基化反应合成 β -内酰胺

Scheme 28 Pd(II)-catalyzed carbonylation of β -C—H bonds in aliphatic amines to synthesize β -lactams

同年, Gaunt 课题组^[69]又报道了 α -叔胺模块驱动钯催化脂肪胺 β -C—H 键的羰基化反应合成 β -内酰胺. 一般 α -叔胺中的甲基 C—H 键以及 $C(sp^2)$ -H 键更具活性, 产物特殊的选择性是由大位阻的叔胺基团调控的. 作者提出假设, 被活化的 C—H 键取向更加靠近钯中心, 以避免与 Pd 中心的第二个 α -叔胺基团发生不利的空间冲突, 能够促进在亚甲基位置优先发生环钯化反应. 该反应体系具有较低至优秀的收率(20%~89%) (Scheme 29).

图式 29 α -叔胺模块驱动钯催化脂肪胺 β -C—H 键的羰基化反应合成 β -内酰胺

Scheme 29 α -Tertiary amine motif drives remarkable selectivity for Pd-catalyzed carbonylation of methylene β -C—H bonds to synthesize β -lactams

综上所述, 通过碳氢键活化的策略构建 β -内酰胺化化合物的反应机理可以归纳如下^[61-69]: 首先过渡金属配合物活化底物分子中的氮氢键发生羰基化反应生成胺酰基金属中间体, 其次发生 C—H 键活化形成五元环金属中间体, 最后发生还原消除反应得到目标产物(Scheme 30).

图式 30 $C(sp^3)$ -H 键活化策略构建 β -内酰胺的反应机理
Scheme 30 Synthesis of β -lactams by $C(sp^3)$ -H carbonylation: mechanistic proposal

5 其他类型的羰基化策略构建 β -内酰胺

1979 年, Ban 课题组^[70]报道了 2-溴-3-氨基丙烯衍生物通过分子内的羰基化反应构建 β -内酰胺的反应. 该工作利用 “Pd(OAc)₂/PPh₃” 催化剂体系发现反应的关键中间体是一种酰基钯复合物, 它是通过乙烯基钯复合物与一氧化碳配体反应得到的(Scheme 31a). 1985 年, 该课题组^[71]又报道了一种新颖的方法合成 3-氨基诺卡地平, 其中很重要的一步就是通过羰基化反应合成 β -内酰胺环, 作者通过 PPh₃ 调控钯催化剂在一氧化碳气氛中合成了目标产物(Scheme 31b).

图式 31 β -内酰胺药物中间体的合成
Scheme 31 Synthesis of β -lactam skeleton medical intermediate

1985 年, Mori 课题组^[72]报道了 2-溴丙烯胺类化合物通过分子内的羰基化反应构建 β -内酰胺的反应, 该反应具有中等的收率(收率为 14.9%~62.9%). 作者以烯胺为底物, 首先合成了含有不同取代基的 2-溴丙烯胺类化合物, 再通过不同钯催化剂优化反应条件, 高收率得到了相应的目标产物(Scheme 32).

图式 32 通过 2-溴丙烯胺合成 β -内酰胺

Scheme 32 Synthesis of β -lactams from 2-bromopropenylamine

1991 年, Nagashima 课题组^[73]报道了铑催化炔丙基胺类衍生物发生羰基化反应以较低至优异的收率(14%~81%)制备 α -甲硅烷- β -内酰胺的反应. 在该工作中某些特定的底物是不能得到 β -内酰胺产物的, 只能得到氢甲酰化产物; 但是产物醛可以通过进一步的转化(醛基首先氧化为羧基, 其次在 4-吡咯烷基吡啶和二环己基碳二亚胺的协助下脱水环化)制备 β -内酰胺(Scheme 33).

图式 33 Rh 催化炔丙基胺类衍生物硅烷羰基化制备 α -甲硅烷- β -内酰胺

Scheme 33 Approach to α -silylmethylene- β -lactams via Rh-catalyzed silylcarbonylation of propargylamine derivatives

1996 年, Alper 课题组^[74]在之前工作^[23-25]的基础上报道了钌催化烯丙基磷酸酯和 2-芳基-1,3-噻吩衍生物发生羰基化反应, 以中等收率构建双环 β -内酰胺的反应(收率为 44%~72%), 该反应部分底物通过铑催化剂也可以转化(Scheme 34).

图式 34 钌/铑催化羰基化环化反应合成双环 β -内酰胺

Scheme 34 Synthesis of bicyclic β -lactams via Pd/Rh-catalyzed carbonylative coupling and cyclization reactions

2005 年, 麻生明课题组^[75]报道了 PdCl_2 催化(CuCl_2 和苯醌调控)炔丙基胺的环羰基化反应以中等至优异的收率(32%~80%)得到(*E*)- α -氯亚烷基- β -内酰胺产物, 该反应的产物未检测到相应的 *Z*-构型异构体或五元环产物. 该反应是一种利用具有光学活性炔丙基胺生成高光学活性(*ee* 值: 93%~98%)的(*E*)- α -氯亚烷基- β -内酰胺产物的方法. 作者通过 X 射线单晶衍射确定了产物的结构和

相对构型, 也发现该反应的立体选择性不同于用炔丙醇作为底物时的情况(Scheme 35).

图式 35 PdCl_2 催化炔丙基胺的高效转化对合成(*E*)- α -氯亚烷基- β -内酰胺

Scheme 35 PdCl_2 -catalyzed efficient transformation of propargylic amines to (*E*)- α -chloroalkylidene- β -lactams

2012 年, Aronica 课题组^[76]报道了金属铑纳米颗粒的合成及其催化末端炔烃硅碳环化合成 β -内酰胺的反应. 铑纳米颗粒的制备是通过将均三甲苯溶剂化的铑原子气相沉积在无机材料(C , $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, Fe_2O_3)上制备的, 该方法制备的催化剂相比于商业化的 Rh/C 、 $\text{Rh}/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 以及均相催化剂 $\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$ 活性更高, 其催化反应具有中等至良好的收率(17%~98%)和区域选择性(89%~91%) (Scheme 36).

图式 36 铑纳米颗粒催化剂催化 β -内酰胺的合成

Scheme 36 Synthesis of β -lactams catalyzed by rhodium nanoparticles

2014 年, 雷爱文课题组^[77]报道了钌催化 *N*-烯丙胺的氧化羰基化反应合成 β -内酰胺. 经过条件筛选, 产物具有中等至优秀的收率(41%~98%). DFT 计算表明形成 β -内酰胺四元环的过渡态是稳定的(Scheme 37).

图式 37 钌催化 *N*-烯丙胺的氧化羰基化反应合成 β -内酰胺

Scheme 37 Pd-catalyzed oxidative carbonylation of *N*-allyl amines for the synthesis of β -lactams

2016 年, Arndtsen 课题组^[78]报道了钌催化多组分法以卤代炔为底物发生羰基化反应制备 β -内酰胺的方法. 该反应以 $\text{Pd}(\text{P}^t\text{Bu}_3)_2$ 作为催化剂前体, 串联两步羰基化反应制备了目标产物, 底物普适性良好(收率为 28%~89%) (Scheme 38).

6 总结与展望

β -内酰胺的合成经过近几十年发展出多种合成方

图式 38 钯催化多组分法制备 β -内酰胺

Scheme 38 Pd-catalyzed multicomponent approach to β -lactams

法, 但是如何高效合成 β -内酰胺仍然有许多限制因素: 例如利用卡宾前体合成 β -内酰胺的大规模应用, 稳定的重氮化合物合成 β -内酰胺的经济性问题, 利用 Staudinger 反应合成高光学活性的 β -内酰胺产物, 起始原料结构的局限而难以合成结构多样性的药物分子等. 这些问题都是未来科研工作者的研究热点问题. 本文综述了一氧化碳参与过渡金属催化的羰基化反应合成 β -内酰胺的多种方法. 可以看出, 利用一氧化碳参与过渡金属催化的羰基化反应能够以较宽广的底物普适性合成目标产物(特别是 Staudinger 反应的应用). 但是过渡金属-手性配体(添加剂)体系在 β -内酰胺的合成研究中仍处于初级阶段研究, 展望未来能够发现更多合成高非对映选择性以及高光学活性的 β -内酰胺的方法. 其次, 通过胺类化合物 $C(sp^3)-H$ 键的活化进一步插羰构建 β -内酰胺的方法也是近几年的研究热点, 期望未来能够通过该方法合成更多结构多样性的 β -内酰胺分子. 羰基化反应旨在合成高附加值产品, 并且能够在工业生产和人们的生活中广泛应用, 展望未来能够将一氧化碳插羰构建 β -内酰胺分子的策略应用到大规模工业生产以及药物中间体合成中.

References

- [1] Fleming, A. *Br. J. Exp. Pathol.* **1929**, *10*, 226.
- [2] Brandi, A.; Cicchi, S.; Cordero, F. M. *Chem. Rev.* **2008**, *108*, 3988.
- [3] Cossio, F. P.; Arrieta, A.; Sierra, M. A. *Acc. Chem. Res.* **2008**, *41*, 925.
- [4] Liang, Y.; Jiao, L.; Zhang, S.; Yu, Z. X.; Xu, J. J. *Am. Chem. Soc.* **2009**, *131*, 1542.
- [5] Liu, M. S.; Fu, N. Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2010**, *30*, 499 (in Chinese). (刘明舜, 傅南雁, 有机化学, **2010**, *30*, 499.)
- [6] Maree, C. L.; Daum, R. S.; Boyle-Vavra, S.; Matayoshi, K.; Miller, L. G. *Emerging Infect. Dis.* **2007**, *13*, 236.
- [7] Ojima, I.; Delalogue, F. *Chem. Soc. Rev.* **1997**, *26*, 377.
- [8] Tuba, R. *Org. Biomol. Chem.* **2013**, *11*, 5976.
- [9] Doyle, M. P.; Forbes, D. C. *Chem. Rev.* **1998**, *98*, 911.
- [10] Cheung, W. H.; Zheng, S. L.; Yu, W. Y.; Zhou, G. C.; Che, C. M. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 2535.
- [11] Choi, M. K. W.; Yu, W. Y.; Che, C. M. *Org. Lett.* **2005**, *7*, 1081.
- [12] Brandi, A.; Cicchi, S.; Cordero, F. M. *Chem. Rev.* **2008**, *108*, 3988.
- [13] Lo, M. M. C.; Fu, G. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2002**, *124*, 4572.
- [14] Shintani, R.; Fu, G. C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2003**, *42*, 4082.
- [15] Saito, T.; Kikuchi, T.; Tanabe, H.; Yahiro, J.; Otani, T. *Tetrahedron Lett.* **2009**, *50*, 4969.
- [16] Gilman, H.; Speeter, M. *J. Am. Chem. Soc.* **1943**, *65*, 2255.
- [17] Benaglia, M.; Cinquini, M.; Cozzi, F. *Eur. J. Org. Chem.* **2000**, 563.
- [18] Beller, M.; Wu, X. F. *Transition Metal Catalyzed Carbonylation Reactions: Carbonylative Activation of C—X Bonds*, Springer, Amsterdam, **2013**.
- [19] Nienburg, H. J.; Elschnigg, G. *Chem. Abstr.* **1961**, *55*, 10323h.
- [20] Piens, N.; D'hooghe, M. *Eur. J. Org. Chem.* **2017**, *40*, 5943.
- [21] Mele, G. G. *Curr. Org. Chem.* **2006**, *10*, 1397.
- [22] Huang, C. Y. D.; Doyle, A. G. *Chem. Rev.* **2014**, *114*, 8153.
- [23] Alper, H.; Urso, F. *J. Am. Chem. Soc.* **1983**, *105*, 6737.
- [24] Alper, H.; Hamel, N. *Tetrahedron Lett.* **1987**, *28*, 3237.
- [25] Calet, S.; Urso, F.; Alper, H. *J. Am. Chem. Soc.* **1989**, *111*, 931.
- [26] Spears, G. W.; Nakanishi, K.; Ohfun, Y. *Synlett* **1991**, 91.
- [27] Tanner, D.; Somfaib, P. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **1993**, *3*, 2415.
- [28] Tanner, D.; Somfaib, P. *Tetrahedron* **1988**, *44*, 619.
- [29] Piotti, M. E.; Alper, H. *J. Am. Chem. Soc.* **1989**, *111*, 931.
- [30] Davoli, P.; Forni, A.; Moretti, I.; Prati, F.; Torre, G. *Tetrahedron* **2001**, *57*, 1801.
- [31] Chamchaang, W.; Pinhas, A. R. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1998**, *61*, 710.
- [32] Mahadevan, V.; Getzler, Y. D. Y. L.; Coates, G. W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2002**, *41*, 2781.
- [33] Ardura, D.; Lopez, R.; Sordo, T. L. *J. Org. Chem.* **2006**, *71*, 7315.
- [34] Fontana, F.; Tron, G. C.; Barbero, N.; Ferrini, S.; Thomas, S. P.; Aggarwal, V. K. *Chem. Commun.* **2010**, *46*, 267.
- [35] Piens, N.; Hecke, K. V.; Vogt, D.; D'hooghe, M. *Org. Biomol. Chem.* **2017**, *15*, 4816.
- [36] Staudinger, H. *Justus Liebigs Ann. Chem.* **1907**, *356*, 51.
- [37] Tidwell, T. T. *Ketenes*, 2nd ed., John Wiley and Sons, Hoboken, NJ, **2006**.
- [38] Torii, S.; Okumoto, H.; Sadakane, M.; Hai, A. K. M. A.; Tanaka, H. *Tetrahedron Lett.* **1993**, *34*, 6553.
- [39] Tanaka, H.; Hai, A. K. M. A.; Sadakane, M.; Okumoto, H.; Torii, S. *J. Org. Chem.* **1994**, *59*, 3040.
- [40] Troisi, L.; Vitis, L. D.; Granito, C.; Pilati, T.; Pindinelli, E. *Tetrahedron* **2004**, *60*, 6895.
- [41] Troisi, L.; Vitis, L. D.; Granito, C.; Epifani, E. *Eur. J. Org. Chem.* **2004**, 1357.
- [42] Wartski, L. *Bull. Soc. Chim. Fr.* **1975**, 1663.
- [43] Dhawan, R.; Dghaym, R. D.; Cyr, D. J. S.; Arndtsen, B. A. *J. Org. Chem.* **2006**, *8*, 3927.
- [44] Troisi, L.; Pindinelli, E.; Strusi, V.; Trincheria, P. *Tetrahedron: Asymmetry* **2009**, *20*, 368.
- [45] Clarke, J. F.; Gerard, G. W. A.; David, A. *J. Org. Chem.* **1974**, *74*, 417.
- [46] Vaccari, D.; Davoli, P.; Spaggiari, A.; Prati, F. *Synlett* **2008**, 1317.
- [47] Zhang, Z. H.; Liu, Y. Y.; Ling, L.; Li, Y. X.; Dong, Y. A.; Gong, M. X.; Zhao, X. K.; Zhang, Y.; Wang, J. B. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 4330.
- [48] Xie, P.; Qian, B.; Huang, H. M.; Xia, C. G. *Tetrahedron Lett.* **2012**, *53*, 1613.
- [49] Li, L. L.; Ding, D.; Song, J.; Han, Z. Y.; Gong, L. Z. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2019**, *58*, 7647.
- [50] Ye, T.; McKervey, M. A. *Chem. Rev.* **1994**, *94*, 1091.
- [51] Doyle, M. P.; McKervey, M. A.; Ye, T. *Modern Catalytic Methods for Organic Synthesis with Diazo Compounds*, Wiley-Interscience, New York, **1998**.
- [52] Zhang, Z.; Wang, J. *Tetrahedron* **2008**, *64*, 6577.
- [53] Zhang, Z. H.; Zhang, Y.; Wang, J. B. *ACS Catal.* **2011**, *1*, 1621.
- [54] Wentrup, C.; Heilmayer, W.; Kollenz, G. *Synthesis* **1994**, 1219.
- [55] Tidwell, T. T. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2005**, *44*, 5778.
- [56] Tidwell, T. T. *Eur. J. Org. Chem.* **2006**, 563.
- [57] Fördös, E.; Tuba, R.; Párkányi, L.; Kégl, T.; Ungváry, F. *Eur. J. Org. Chem.* **2009**, *74*, 1994.
- [58] Paul, N. D.; Chirila, A.; Lu, H. J.; Zhang, X. P.; Bruin, B. *Chem.-Eur. J.* **2013**, *19*, 12953.
- [59] Tang, Z.; Mandal, S.; Paul, N. D.; Lutz, M.; Li, P.; Vlught, J. I.; Bruin, B. *Org. Chem. Front.* **2015**, *2*, 1561.
- [60] Pedroni, J.; Boghi, M.; Saget, T.; Cramer, N. *Angew. Chem., Int.*

- Ed.* **2014**, 53, 9064.
- [61] McNally, A.; Haffemayer, B.; Collins, B. S. L. Gaunt, M. J. *Science* **2014**, 510, 129.
- [62] Willcox, D.; Chappell, B. G. N.; Hogg, K. F.; Calleja, J.; Smalley, A. P.; Gaunt, M. J. *Science* **2016**, 354, 851.
- [63] Dailier, D.; Rocaboy, R.; Baudoin, O. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2017**, 56, 7218.
- [64] Zhang, Q.; Chen, K.; Rao, W.; Zhang, Y.; Chen, F. J.; Shi, B. F. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, 52, 13588.
- [65] Sun, W. W.; Cao, P.; Mei, R. Q.; Li, Y.; Ma, Y. L.; Wu, B. *Org. Lett.* **2014**, 16, 480.
- [66] Zhang, S. J.; Sun, W. W.; Cao, P.; Dong, X. P.; Liu, J. K.; Wu, B. *J. Org. Chem.* **2016**, 81, 956.
- [67] Zhang, Q.; Chen, K.; Shi, B. F. *Synlett* **2014**, 25, 1941.
- [68] Cabrera-Pardo, J. R.; Trowbridge, A.; Nappi, M.; Ozaki, K.; Gaunt, M. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2017**, 56, 11958.
- [69] Hogg, K. F.; Trowbridge, A.; Perezand, A. A.; Gaunt, M. J. *Chem. Sci.* **2017**, 8, 8189.
- [70] Mori, M.; Chiba, K.; Okita, M.; Ban, Y. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1979**, 698.
- [71] Chiba, K.; Mori, M.; Ban, Y. *Tetrahedron* **1985**, 41, 387.
- [72] Mori, M.; Chiba, K.; Okita, M.; Kayo I.; Ban, Y. *Tetrahedron* **1985**, 41, 375.
- [73] Matsuda, I.; Sakakibara, J.; Nagashima, H. *Tetrahedron Lett.* **1991**, 32, 7431.
- [74] Zhou, Z. X.; Alper, H. *J. Org. Chem.* **1996**, 61, 1256.
- [75] Ma, S. M.; Wu, B.; Jiang, X. F. *J. Org. Chem.* **2005**, 70, 2588.
- [76] Aronica, L. A.; Caporusso, A. M.; Evangelisti, C.; Botavina, M.; Alberto, G.; Martra, G. *J. Organomet. Chem.* **2012**, 700, 20.
- [77] Li, W.; Liu, C.; Zhang, H.; Ye, K. Y.; Zhang, G. H.; Zhang, W. Z.; Duan, Z. L.; You, S. L.; Lei, A. W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2014**, 53, 2443.
- [78] Torres, G. M.; Macias, M. H.; Quesnel, J. S.; Williams, O. P.; Yempally, V.; Bengali, A. A.; Arndtsen, B. A. *J. Org. Chem.* **2016**, 81, 12106.

(Cheng, F.)