可见光驱动 α -氨基酸/多肽脱羧与烯烃原位偶联构建 γ -氨基酸类化合物赵燕飞^{a,b} 刘志敏^{*,a,b}^(a) 中国科学院化学研究所 北京 100190)^(b) 中国科学院大学 北京 100049)Visible-Light-Driven Decarboxylation of α -Amino Acids/Peptides and *in-situ* Coupling with Alkenes to γ -Amino Acid DerivativesZhao, Yanfei^{a,b} Liu, Zhimin^{*,a,b}^(a) Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190)^(b) University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049)

脱羧交叉偶联反应是构建碳-碳键的重要策略,是当前有机合成的研究热点。 α -氨基酸广泛存在于自然界,在生物体内起着重要作用^[1]。它绿色无毒,廉价易得,易于存储和处理,在脱羧偶联反应中得到广泛应用。通常,脱羧偶联反应会释放化学计量的二氧化碳(CO₂),而 CO₂ 很少被重新利用,使得该类反应具有较低的原子经济性。CO₂ 是主要的温室气体,在大规模生产中大量排放气体存在潜在的环境和安全问题。同时,CO₂ 也是一种无毒无害的可再生 C1 资源^[2]。基于“变废为宝”和“CO₂ 资源化利用”的理念,循环利用催化脱羧反应中原位产生的 CO₂ 合成高附加值化学品对绿色化学和可持续发展具有重要意义。

γ -氨基酸是多种药物和受体拮抗剂中的核心结构单元,具有结构多样性和显著的生物活性。但是,相较于

α -氨基酸, γ -氨基酸难以获得,其结构多样性受到限制,因此 γ -氨基酸类化合物的合成受到人们关注^[3-4]。

四川大学化学学院余达刚课题组^[5-9]一直致力于发展基于“可见光促进 CO₂ 活化和转化”策略的新方法和新反应。最近,他们^[10]基于原位利用脱羧反应中产生的 CO₂ 的研究思想,发展了可见光驱动 α -氨基酸/多肽脱羧与烯烃偶联羧基化反应的新途径,高收率地获得一系列结构多样的 γ -氨基酸类化合物(Scheme 1)。

作者首先以 1,1-二苯乙烯和 *N*-苄氧羰基-脯氨酸反应为模型,考察了不同光催化体系对反应的影响,并对反应条件进行了优化。在 30 W 的蓝色发光二极管(LED)辐照和 N₂ 氛围下,以二甲基乙酰胺为溶剂、CsF 作碱、Ir[dF(CF₃)(ppy)]₂(dtbbpy)•PF₆ 光催化剂对生成相应的 γ -氨基酸显示出很高的催化活性和选择性,目标产物分离

图式 1 α -氨基酸脱羧与烯烃原位偶联合成 γ -氨基酸类化合物Scheme 1 α -Amino acids decarboxylation coupled with carbo-carboxylation of alkenes to γ -amino acid derivatives

* Corresponding author. E-mail: liuzm@iccas.ac.cn. Published online May 14, 2021.

收率高达 81%; 添加 5 Å 分子筛(MS)可以抑制烯烃的氢烷基化产物, 从而提高目标产物分离收率至 86%. 在获得最优反应条件后, 作者对底物的适用范围进行了拓展. 一系列羧酸类化合物, 如 α -氨基酸、二肽、三肽和烷基羧酸均能与不同取代的烯烃如 1,1-二芳基乙烯类、苯乙烯类底物进行反应, 获得相应的 γ -氨基酸化合物. 此外, 对于含有生物活性分子基团的丙烯酸酯类底物, 该催化体系也显示出良好的催化性能和广泛的底物适用性、官能团兼容性. 随后, 作者对反应的实用性进行了研究, 在太阳光辐照下, 以 56% 的分离收率获得目标产物. 值得一提的是, 千分之一的催化剂用量即可实现克级规模反应, 目标产物收率高达 74%. 作者利用此克级规模产物, 衍生化地合成了吡咯里西啶类生物碱中的

千里光次碱单元、4-氨基丁醇类化合物以及二肽类化合物(Scheme 2).

作者进行了反应机理研究. 在标准反应条件下进行了 ^{13}C 同位素示踪试验, 证实了目标产物的羧基源自起始原料; 通过对比实验验证了反应过程中产生的碳自由基和碳负物种中间体. 基于此, 他们提出了可能的反应机理, 如 Scheme 3 所示. 首先, 在碱存在下, *N*-苄氧羰基-脯氨酸 **2a** 去质子化形成 *N*-苄氧羰基-脯氨酸盐 **2a'**, 可见光激发态的 $[\text{Ir}^{\text{III}}]$ 光催化剂与之发生单电子转移, 脱去 CO_2 得到 α -氨基自由基 **D**. 随后, **D** 与 1,1-二苯乙烯 **1a** 加成产生更稳定的苄基自由基 **E**. 该自由基被还原态的 $[\text{Ir}^{\text{II}}]$ 光催化剂单电子还原, 得到苄基碳负离子 **F**. 最后, **F** 亲核进攻原位产生的 CO_2 产生羧酸盐 **G**, **G** 通过酸

图式 2 反应底物普适性和实用性
Scheme 2 Substrate scope and utility of this strategy

图式 3 可能的反应机理

Scheme 3 Possible reaction mechanism

化处理后得到目标产物 γ -氨基酸 **3aa**。

综上，余达刚课题组创建了 Ir 基光催化剂/CsF 的光化学体系，在氮气氛围中首次实现了 α -氨基酸/多肽与烯烃的选择性碳羧基化反应，得到了结构多样的 γ -氨基

酸类化合物。该策略不仅开拓了 CO_2 的高值化利用的新路径，实现了温和条件下低浓度 CO_2 的高效转化；还发展了高效、温和的 γ -氨基酸类化合物的绿色合成途径，具有广阔的应用前景。

References

- [1] Wang, J.; Liu, X.; Feng, X. *Chem. Rev.* **2011**, *111*, 6947.
- [2] He M. Y.; Sun Y. H.; Han B. X. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2013**, *52*, 9620.
- [3] Hou, J.; Ee, A.; Cao, H.; Ong, H. W.; Xu, J. H.; Wu, J. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2018**, *57*, 17220.
- [4] Zhang, B.; Yi, Y.; Wu, Z. Q.; Chen, C.; Xi, C. *Green Chem.* **2020**, *22*, 5961.
- [5] Song, L.; Fu, D. M.; Chen, L.; Jiang, Y. X.; Ye, J. H.; Zhu, L.; Lan, Y.; Fu, Q.; Yu, D. G. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2020**, *59*, 21121.
- [6] Huang, H.; Ye, J. H.; Zhu, L.; Ran, C. K.; Miao, M.; Wang, W.; Chen, H.; Zhou, W. J.; Lan, Y.; Yu, B.; Yu, D. G. *CCS Chem.* **2020**, *2*, 1746.
- [7] Fu, Q.; Bo, Z. Y.; Ye, J. H.; Ju, T.; Huang, H.; Liao, L. L.; Yu, D. G. *Nat. Commun.* **2019**, *10*, 3592.
- [8] Ju, T.; Fu, Q.; Ye, J. H.; Zhang, Z.; Liao, L. L.; Yan, S. S.; Tian, X. Y.; Luo, S. P.; Li, J.; Yu, D. G. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2018**, *57*, 13897.
- [9] Ye, J. H.; Miao, M.; Huang, H.; Yan, S. S.; Yin, Z. B.; Zhou, W. J.; Yu, D. G. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2017**, *56*, 15416.
- [10] Liao, L. L.; Cao, G. M.; Jiang, Y. X.; Jin, X. H.; Hu, X. L.; Chruma, J. J.; Sun, G. Q.; Gui, Y. Y.; Yu, D. G. *J. Am. Chem. Soc.* **2021**, *143*, 2812.

(Cheng, F.)