新型含咔唑环和芳环/芳稠杂环的 *N*-酰肼衍生物的合成及蛋白酪氨酸磷酸酶 1B (PTP1B)抑制活性评价

李英俊^{*,a} 林乐弟^a 刘季红^b 高立信^c 盛 丽^c
靳 焜^d 刘雪洁^a 杨鸿境^a 李 佳^{*,c}

(^a 辽宁师范大学化学化工学院 辽宁大连 116029)

(^b 大连理工大学化学分析测试中心 辽宁大连 116023)

(^c 中国科学院上海药物研究所国家新药筛选中心 药物研究国家重点实验室 上海 201203)

(^d 大连理工大学精细化工国家重点实验室 辽宁大连 116012)

摘要 为寻找高效、低毒的新型蛋白酪氨酸磷酸酶 1B (PTP1B)抑制剂,设计并合成出了一系列新型含咔唑环和芳环/芳稠杂环的 *N*-酰肼衍生物 **6**~**8** 和 **11**。利用 IR、¹H NMR、¹³C NMR 和 2D NMR(包括 ¹H-¹H COSY 和 NOESY)谱及元素分析确定了其结构和构型。评价了目标化合物对 PTP1B 的抑制活性。实验结果表明,目标化合物对 PTP1B 均有较强的抑制活性,除了化合物 *N*'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-苯氨基乙酰肼(**6a**)、*N*'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-(4-甲基苯氨基)乙酰肼(**6b**)、*N*'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-(3-硝基苯氨基)乙酰肼(**6g**)和 *N*'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-(4-硝基苯氨基)乙酰肼(**6h**)外,其它化合物的活性均高于阳性对照药物齐墩果酸,其中 *N,N'*-(9-丁基咪唑基)-3,6-二甲氨基-2,2'-[二(4-硝基苯氨基)]双乙酰肼(**11b**)的活性最高,IC₅₀=(0.89±0.06) μmol/L。利用分子对接分别研究了代表目标化合物 *N*'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-(4-溴苯氨基)乙酰肼(**6d**)、*N*'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-((2-(1-萘氧基)甲基)苯并咪唑-1-基)乙酰肼(**7f**)和 **11b** 与 PTP1B 酶的结合模式。

关键词 PTP1B 抑制剂; 咪唑; *N*-酰肼; 合成; 分子对接

Synthesis and Protein Tyrosine Phosphatase 1B (PTP1B) Inhibitory Activity Evaluation of Novel *N*-Acylhydrazone Derivatives Containing Carbazole and Aromatic Ring/Aromatic Fused Heterocycle

Li, Yingjun^{*,a} Lin, Ledi^a Liu, Jihong^b Gao, Lixin^c Sheng, Li^c
Jin, Kun^d Liu, Xuejie^a Yang, Hongjing^a Li, Jia^{*,c}

(^a College of Chemistry and Chemical Engineering, Liaoning Normal University, Dalian, Liaoning 116029)

(^b Chemistry Analysis and Inspection Center, Dalian University of Technology, Dalian, Liaoning 116023)

(^c State Key Laboratory of Drug Research, National Center for Drug Screening, Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201203)

(^d State Key Laboratory of Fine Chemicals, Dalian University of Technology, Dalian, Liaoning 116012)

Abstract In order to find more efficient and low toxicity protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitors, a series of novel *N*-acylhydrazone derivatives containing carbazole and aromatic ring/aromatic fused heterocycle **6**~**8** and **11** were designed and synthesized. Their structures and configurations were confirmed by IR, ¹H NMR, ¹³C NMR, two-dimensional NMR spectra (including ¹H-¹H COSY and NOESY) and elemental analysis. The inhibitory activities of all the target compounds against PTP1B were evaluated. The experimental results indicated that all the target compounds had potent inhibitory activity against PTP1B, and the activities were higher than the control drug oleanolic acid except for *N*'-[9-(2-chlorothiazole-5-

* Corresponding authors. E-mail: chemlab.lnnu@163.com; jli@simm.ac.cn

Received May 17, 2021; revised June 21, 2021; published online July 12, 2021.

Project supported by the Natural Science Foundation of Liaoning Province (No. 20102126).

辽宁省自然科学基金(No. 20102126)资助项目.

methyl)carbazole-3-methylene]-2-phenylaminoacethydrazide (**6a**), *N'*-[9-(2-chlorothiazole-5-methyl)carbazole-3-methylene]-2-(4-methylphenylamino)acethydrazide (**6b**), *N'*-[9-(2-chlorothiazole-5-methyl)carbazole-3-methylene]-2-(3-nitrophenylamino)acethydrazide (**6g**) and *N'*-[9-(2-chlorothiazole-5-methyl)carbazole-3-methylene]-2-(4-nitrophenylamino)acethydrazide (**6h**). Among them, *N,N'*-(9-butylcarbazolyl)-3,6-dimethylene]-2,2'-[di(4-nitrophenylamino)]bisacetohydrazide (**11b**) had the highest inhibitory activity against PTP1B with IC_{50} of $(0.89 \pm 0.06) \mu\text{mol/L}$. Molecular docking was used to study the bind of the representative target compounds *N'*-[9-(2-chlorothiazole-5-methyl)carbazole-3-methylene]-2-(4-bromophenylamino)acethydrazide (**6d**), *N'*-[9-(2-chlorothiazole-5-methyl)carbazole-3-methylene]-2-((2-(1-naphthyl)oxy)methyl)benzimidazol-1-yl)-acethydrazide (**7f**) and **11b** with PTP1B enzyme, respectively.

Keywords PTP1B inhibitor; carbazole; *N*-acetylhydrazone; synthesis; molecular docking

蛋白酪氨酸磷酸酶 1B (PTP1B)使酪氨酸磷酸化胰岛素受体(IR)和下游胰岛素受体底物(IRS)去磷酸化,从而下调胰岛素的转导,其过表达诱导胰岛素抵抗^[1-2]. 2型糖尿病(T2D)的主要原因之一是胰岛素抵抗,当激素不能激活主要代谢组织(肌肉、脂肪和肝脏)的信号通路时,就会发生胰岛素抵抗^[3]. 因此,PTP1B抑制剂是治疗T2D 有希望的靶标. 虽然已报道了许多 PTP1B 抑制剂,但迄今尚无临床应用的 PTP1B 抑制剂^[4-5],因此,开发新型高效的、特异性的、低毒的 PTP1B 抑制剂仍是一项十分重要任务.

酰肼类化合物因有活性基团 $\text{CONHN}=\text{CH}$ 而具有广谱的生物活性,如抗糖尿病^[6]、抗癌^[7-8]、抗炎^[9]、抗菌^[10-12]、抗病毒^[13]和抗阿尔茨海默症^[14]等,此类化合物已成为药物设计与发现的一类重要化合物. 咪唑(Cz)杂环是许多天然生物碱和合成衍生物的主要成分,此类化合物具有多种药理活性,如抗糖尿病^[15-16]、抗炎^[17]、抗癌^[18-21]、抗氧化^[22]、抗老年痴呆^[23]、抗菌^[24-25]、抗病毒^[26]等. 因此,咪唑衍生物已成为研究热点. 噻唑环是当今药物发现中最重要组成部分,噻唑类化合物具有抗癌^[27-29]、抗菌^[29-31]、抗氧化^[31]、抗结核^[32]和抗病毒^[33]等广谱的生物活性. 因此,噻唑类化合物具有重要的生物学和药理学意义. 苯并咪唑(BZM)环是药物化学中的重要药效团,是许多药物的设计模板和组成部分,其衍生物具有抗癌^[34-35]、降血压^[36]、抗糖尿病^[37]、止痛^[38]、抗

结核^[39]、抗凝血^[40]和抗焦虑^[41]等许多重要的生物活性. 由于苯并咪唑衍生物在医学领域的潜在应用,近年来已被广泛研究. 稠杂环化合物三嗪并咪唑也具有抗糖尿病^[42-44]、抗癌^[45-46]、抗结核^[47]和抗病毒^[48]等活性. 此外,近年来研究显示,含有芳氨基甲基骨架的衍生物具有抗癌^[35]、抗菌^[35-37]、抗凝血^[38]、抗病毒^[39-41]等生物活性. 因此,含有酰肼、咪唑、噻唑及芳氨基甲基/苯并咪唑/三嗪并咪唑骨架的化合物已成为研究热点.

本研究室的前期研究工作证明,含有 *N*-烷基咪唑环的 *N*-酰肼衍生物 **1~3** 和含有 *N*-烷基咪唑环及苯并咪唑环的 *N*-酰肼衍生物 **4** 对 PTP1B 具有较高的抑制活性,是潜在的 PTP1B 抑制剂^[49-51],化合物 **1~4** 的结构中酰肼和咪唑骨架对活性起主要作用(图 1). 基于上述事实,为了继续我们的研究工作,即开发小分子 PTP1B 抑制剂,本研究在前期工作基础上,首先设计保留酰肼和咪唑骨架,并通过亚甲基桥将 2-氯噻唑杂环与咪唑氮原子相连,酰肼基团的羰基与芳氨基甲基/稠杂环(2-取代的苯并咪唑或三嗪并咪唑-3-硫基)药效团相连接,合成出一系列新型含咪唑环和芳环/芳稠杂环的 *N*-酰肼衍生物 **5**(图 2); 其次设计保留 *N*-烷基咪唑和酰肼骨架,将芳氨基甲基与酰肼的羰基相连,合成出基于 *N*-烷基咪唑的双芳氨基乙酰肼衍生物 **6**(图 2). 测定目标化合物对 PTP1B 的抑制活性. 合成路线见 Schemes 1 和 2.

图 1 已报道的具有 PTP1B 抑制活性的含咪唑环 *N*-酰肼衍生物的结构

Figure 1 Structures of reported *N*-acylhydrazone derivatives containing carbazole moiety possessing PTP1B inhibitory activity

图2 目标化合物 5 和 6 的设计思想

Figure 2 Design strategies of the target compounds 5 and 6

图式1 目标化合物 6~8 的合成路线

Scheme 1 Synthetic routes of target compounds 6~8

1 结果与讨论

1.1 目标化合物的合成

将自行合成的中间体 9-(2-氯噻唑-5-基)吡啶-3-甲醛(2)与芳氨基乙酰肼(3)/2-芳氧甲基苯并咪唑-1-乙酰肼(4)/3-肟基甲基硫代-5H-1,2,4-三嗪并吡啶(5), 在乙醇和催化量冰醋酸存在下 1:1 缩合得到了单 *N*-酰肼目标

化合物 6~8. 将自行合成的中间体 3,6-二甲氧基-9-烷基咪唑(10)与中间体芳氨基乙酰肼(3), 在乙醇和催化量冰醋酸存在下 1:2 缩合得到了双 *N*-酰肼目标化合物 11.

1.2 目标化合物的结构确定

1.2.1 IR 谱

目标化合物 6~8 和 11 的 IR 谱图, 在 3142~3437、

图式 2 目标化合物 11 的合成路线
Scheme 2 Synthetic routes of target compounds 11

1666~1692 和 1615~1632 cm^{-1} 区域分别显示出 N—H、C=O 和 C=N 的伸缩振动特征吸收峰。这说明含有酰胺结构，由此初步证明目标化合物 6~8 和 11 已被合成出来。

1.2.2 ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 谱

众所周知, *N*-酰肼类化合物可能存在 I~IV 四种异构体(Scheme 3)。在 I 和 III 异构体中关于 C=N 双键是 *E* 构型, 在 II 和 IV 异构体中关于 C=N 双键是 *Z* 构型。根据文献[52]可知, 由于空间位阻的影响, *E* 构型较 *Z* 构型更稳定, 所以 *Z* 异构体存在的可能性相对较小。又由于酰胺键(C—N 单键)是具有部分双键性质的单键[53], C—N 键不能自由旋转, 因此还存在着两个几何异构体, 即羰基 O 原子与 NH 中的 H 原子处于异侧的 *Z* 异构体(I 和 II)和羰基 O 原子与 NH 中的 H 原子处于同侧的 *E* 异构体(III 和 IV)。因此, *N*-酰肼类化合物可能存在如 Scheme 3 中的 I 和 III 两种异构体。

图式 3 *N*-酰肼化合物四种可能的异构体结构

Scheme 3 Four possible isomers structures of *N*-acylhydrazine compounds

观察目标化合物 6~8 的 ^1H NMR 和 ^{13}C NMR 发现, CONH 和 COCH₂ 中的质子以及碳信号峰均显示出两组信号峰, 分子中大部分的质子和碳信号也显示出了成对的信号峰, 说明在氘代二甲基亚砜(DMSO-*d*₆)中, 目标化合物存在着 Scheme 3 所示的 I 和 III 两种异构体。

为了确定目标化合物 6~8 两种异构体的构型、质子信号峰的归属及异构体含量, 测试了代表目标化合物 7d 的 ^1H NMR、 ^{13}C NMR 和 2D NMR 谱(包括 NOESY 和 ^1H - ^1H COSY)谱, 并进行详细的研究与归属。

为了便于信号峰归属, 对目标化合物 7d 的两种异

构体 A 和 B 的相关原子给予了编号, 见 Scheme 4。

目标化合物 7d 构型的确定: 根据化合物的结构, ^1H NMR 谱中低场 δ_{H} 11.74 和 11.80 可直接归属为 H-10 和 H-10'。由 NOESY 谱图 3(a)可知, H-10/H-10'与 δ_{H} 8.20 (H-9)/8.37 (H-9')存在着明显的 NOE 信号, 说明 H-10 与 H-9、H-10'与 H-9'空间上距离较近, A 和 B 两种异构体关于 C=N 键均为 *E* 构型。在 NOESY 谱图 3(a)中还观察到 H-10'与 δ_{H} 5.17 (H-11')存在着强的 NOE 信号峰, 而 H-10 与 δ_{H} 5.68 (H-11)存在着弱的 NOE 信号峰, 说明 H-10'与 H-11'空间上距离较近, H-10 与 H-11 空间上距离较远, 即 B 异构体中羰基氧原子与 H-10'处于异侧, A 异构体中羰基氧原子与 H-10 处于同侧。上述实验证明, A 异构体为 *E* 构型, B 构体为 *Z* 构型(Scheme 4)。因酰胺键(C—N 单键)具有部分双键性质, *E* 构型异构体 A 比 *Z* 构型异构体 B 更稳定, 所以 A 异构体占优势。

芳氧甲基基团和噻唑甲基的氢(H-13)归属: 根据化合物 7d 的电子云密度和 ^1H NMR 谱的积分面积可知, δ_{H} 7.10 (d, $J=9.5$ Hz, 2H)可直接归属为 H-19。由 ^1H - ^1H COSY 谱(图 4)可知, H-19 与 δ_{H} 7.26 (d, $J=9.0$ Hz, 2H)存在相关峰, 所以, δ_{H} 7.26 归属为 H-20。

由 NOESY 谱图 3(b)可观察到, H-19 与 δ_{H} 5.44 存在交叉峰, 由此可确定 δ_{H} 5.44 为 H-12。 ^1H NMR 谱中高场 H-11/H-11'和 H-12 已归属, 根据积分面积, 高场剩余的峰 δ_{H} 5.95 和 5.94 可归属为 H-13 和 H-13'。

咪唑环取向的确定及其氢归属: 由 NOESY 谱图 3(b)可知, H-9 与 δ_{H} 7.93 (dd, $J=8.8, 1.3$ Hz)、H-9'与 δ_{H} 7.86 存在着交叉峰, 则 δ_{H} 7.93 和 7.86 可分别归属为 H-2 和 H-2'。这说明 H-9 与 H-2、H-9'与 H-2'空间上距离较近, 由此可确定 A 和 B 两种异构体中咪唑环的取向如 Scheme 4 所示。由 ^1H - ^1H COSY 谱可知, H-2 与 δ_{H} 7.86 (d, $J=8.5$ Hz)和 8.50 (d, $J=1.0$ Hz)存在相关峰, 根据电子云密度和偶合常数可确定 δ_{H} 7.86 为 H-1, δ_{H} 8.50 为 H-4。根据积分面积 δ_{H} 8.47 可归属为 H-4'。

图式 4 代表目标化合物 **7d** 的两种异构体 **A** 和 **B** 的结构及原子编号

Scheme 4 Structures and atomic labels for isomers **A** and **B** of the representative target compound **7d**

图 3 代表目标化合物 **7d** 的 NOESY 谱

Figure 3 NOESY spectra of representative target compound **7d**

(a) Full spectrum; (b) Partial enlarged spectrum

图 4 代表目标化合物 **7d** 的 ^1H - ^1H COSY 谱(部分放大图)

Figure 4 ^1H - ^1H COSY spectrum of representative target compound **7d** (Partial enlarged spectrum)

由 NOESY 谱图 3(b)可知, H-13 与 δ_{H} 7.83 (d, $J=8.5$ Hz)存在交叉峰, 而在 ^1H - ^1H COSY 谱中 δ_{H} 7.83 与 7.53 (td, $J=7.8, 1.0$ Hz)、 δ_{H} 7.53 与 7.29 (t, $J=7.5$ Hz)、 δ_{H} 7.29 与 8.24 (d, $J=8.0$ Hz)存在相关峰, 所以 δ_{H} 7.83、7.53、

7.29 和 8.24 可分别归属为 H-8、H-7、H-6 和 H-5.

苯并咪唑环取向的确定及其氢归属: 由 NOESY 谱图 3(b)可知, H-11 与 δ_{H} 7.614 (d, $J=7.5$ Hz)存在着相关峰, 而 H-11' 与 δ_{H} 7.606 (d, $J=7.5$ Hz)无交叉峰, 则可归属 δ_{H} 7.614 和 7.606 分别为 H-15 和 H-15', 由此可确定 **A** 和 **B** 两种异构体中苯并咪唑环的取向如 Scheme 4 所示.

在 ^1H - ^1H COSY 谱中, H-15 与 δ_{H} 7.27 (t, $J=7.0$ Hz)存在着交叉峰, 因此 δ_{H} 7.27 可归属为 H-16. ^1H NMR 谱中剩余的双峰 δ_{H} 7.69 (d, $J=7.5$ Hz)可归属为 H-18. 在 ^1H - ^1H COSY 谱中, H-18 与 δ_{H} 7.24 (td, $J=7.5, 1.0$ Hz)存在着交叉峰, 因此 δ_{H} 7.24 可归属为 H-17.

噻唑环的氢(H-14)归属: 由 NOESY 谱图 3(b)可知, H-13 与 H-8 (δ_{H} 7.83)和 7.88 有交叉峰, H-8 已归属, 剩余 δ_{H} 7.88 为 H-14.

目标化合物 **7d** 异构体含量的计算: 根据 ^1H NMR 谱中两种异构体吸收峰面积的平均值, 可求出 **A(E)** 和 **B(Z)** 两种异构体的含量分别为 75.6% 和 24.4%, **A(E)** 异构体占优势.

至此, 目标化合物 **7d** 的 ^1H NMR 谱归属完毕, 其

^1H NMR 谱归属见表 1. 根据代表目标化合物 **7d** 的构型及 ^1H NMR 谱归属, 即可确定出目标化合物 **6~8** 均是 *E* 构型为主要异构体, 并可对它们的 ^1H NMR 谱进行归属.

目标化合物含咪唑环的双酰胺衍生物 **11a** 和 **11b** 的结构虽然与化合物 **6~8** 类似, 都含有咪唑和酰胺基团, 观察它们的 ^1H NMR 谱发现, 低场 CONH 和高场 COCH₂ 中的质子出现多重峰, 分子中其它质子也有谱峰增多的现象, 说明有多种异构体存在. 因此, 化合物 **11a** 和 **11b** 的构型难于确定. 但各组峰的积分面积与结构相符, 说明化合物 **11a** 和 **11b** 已合成出来.

由目标化合物 **6~8** 的 ^{13}C NMR 谱数据可知, 在低场 δ_{C} 162.79~171.42 之间出现的峰为 C=O 的碳吸收峰, 在 δ_{C} 144.32~148.56 之间出现的峰为 CH=N 的碳吸收峰. 这些吸收峰的出现, 说明目标化合物酰胺已合成出来.

1.2.3 MS 谱

为了进一步证明双酰胺化合物 **11a** 和 **11b** 已合成出来, 测试了 **11a** 和 **11b** 的 HRMS 谱. 结果显示, 化合物 **11a** 的 HRMS 为 $[\text{M}-\text{H}]^-$ 的 m/z 634.2157 (计算值 m/z 634.2163), 化合物 **11b** 的 HRMS 为 $[\text{M}-\text{H}]^-$ 的 m/z 662.2479 (计算值 m/z 662.2476). 由 $[\text{M}-\text{H}]^-$ 的 m/z 数据可证明, 目标化合物双酰胺 **11a** 和 **11b** 已被合成出来.

根据上述波谱数据 (IR、 ^1H NMR 和 ^{13}C NMR、MS) 可知, 目标化合物 **6~8** 和 **11** 已被成功合成出来, 结构正确.

1.3 目标化合物 **6~8** 和 **11** 的生物活性研究

为了发现高效、低毒的新型 PTP1B 抑制剂, 本文合成出了一系列新型含咪唑环的 *N*-酰胺衍生物 **6~8** 和 **11**. 以齐墩果酸 (OA, Oleanolic acid) 为阳性对照药物, 在初筛浓度为 20 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 条件下, 对目标化合物 **6~8** 和 **11** 进行了活性测试, 结果见表 2.

由表 2 活性测试结果可知, 目标化合物 **6~8** 和 **11** 对 PTP1B 显示出较强的抑制作用, $\text{IC}_{50} = [(0.89 \pm 0.06) \sim (6.14 \pm 0.00)] \mu\text{mol}/\text{L}$, 除了化合物 **6a**、**6b**、**6g** 和 **6h** 外, 其它化合物的活性均高于阳性对照药物齐墩果酸 [$\text{IC}_{50} = [(2.93 \pm 0.92) \mu\text{mol}/\text{L}]$, 其中化合物 **11b** 的活性最高, $\text{IC}_{50} = (0.89 \pm 0.06) \mu\text{mol}/\text{L}$, 大约是对照药物齐墩果酸 (OA) 的 2.3 倍. 在化合物 **6a~6h** 中, 化合物 **6d** 活性最高 [$\text{IC}_{50} = (2.01 \pm 0.16) \mu\text{mol}/\text{L}$], 约为 OA 的 0.5 倍. 在化合物 **7a~7f** 中, 化合物 **7f** 的活性最高 [$\text{IC}_{50} = (1.83 \pm 0.11) \mu\text{mol}/\text{L}$], 约为 OA 的 0.6 倍. 化合物 **11a** 和 **11b** 的活性基本相当, 分别是对照药物 OA 的 1.99 和 2.3 倍. 化合物 **6b** 的活性与对照药物相当. 这说明咪唑、噻唑、酰胺与芳氨基/苯并咪唑/三嗪并咪唑药效团的杂交是有效的.

表 1 目标化合物 **7d** 的 ^1H NMR 归属 (DMSO-*d*₆, 500 MHz)

Table 1 ^1H NMR spectral data of target compound **7d** (DMSO-*d*₆, 500 MHz)

Position	δ_{H}		$^1\text{H}-^1\text{H}$ COSY A (B)	NOESY A (B)
	A	B		
1 (1')	7.86 (d, $J=8.5$ Hz)	— ^a	H-2 (—)	/
2 (2')	7.93 (dd, $J=8.8, 1.3$ Hz)	7.86	H-1, 4	H-9/H-9'
3 (3')	/ ^b	/	/	/
4 (4')	8.50 (d, $J=1.0$ Hz)	8.47	H-2 (H-2')	/
5 (5')	8.24 (d, $J=8.0$ Hz)	8.23 (d, $J=8.0$ Hz)	H-6 (—)	/
6 (6')	7.29 (t, $J=7.5$ Hz)	—	H-5, 7 (—)	/
7 (7')	7.53 (td, $J=7.8, 1.0$ Hz)	—	H-6, 8 (—)	/
8 (8')	7.83 (d, $J=8.5$ Hz)	—	H-7 (—)	H-13 (—)
9 (9')	8.20	8.37	/	H-2/H-2'/H-10/H-10'
10 (10')	11.74	11.80	/	H-9/H-9'/H-11/H-11'
11 (11')	5.68	5.17	/	H-10/H-10'/H-15 (—)
12 (12')	5.44	—	/	H-19 (—)
13 (13')	5.95	5.94	/	H-8 (—)/H-14 (—)
14 (14')	7.88	—	/	H-13 (—)
15 (15')	7.614 (d, $J=7.5$ Hz)	7.606 (d, $J=7.5$ Hz)	H-16 (—)	H-11 (—)
16 (16')	7.27 (t, $J=7.0$ Hz)	—	H-15, 17 (—)	/
17 (17')	7.24 (td, $J=7.5, 1.0$ Hz)	—	H-16, 18 (—)	/
18 (18')	7.69 (d, $J=7.5$ Hz)	—	H-17 (—)	/
19 (19')	7.10 (d, $J=9.5$ Hz)	—	H-20 (—)	H-12 (—)
20 (20')	7.26 (d, $J=9.0$ Hz)	—	H-19 (—)	/

^a “—”: There should be a peak, but it was not observed in the spectrum. ^b “/”: No peak.

表 2 目标化合物 6~8 和 11 对 PTP1B 的抑制活性
Table 2 Inhibitory activities of target compounds 6~8 and 11 against PTP1B

Compd.	Ar/Ar'	IC ₅₀ /(μmol·L ⁻¹)	Compd.	Ar/Ar'	IC ₅₀ /(μmol·L ⁻¹)
6a	C ₆ H ₅	6.14 ± 0.00	7a	4-CH ₃ C ₆ H ₄	1.91 ± 0.32
6b	4-CH ₃ C ₆ H ₄	3.05 ± 0.96	7b	2,4-(CH ₃) ₂ C ₆ H ₃	2.40 ± 0.17
6c	4-CH ₃ OC ₆ H ₄	2.26 ± 0.32	7c	4-CH ₃ OC ₆ H ₄	2.46 ± 0.27
6d	4-BrC ₆ H ₄	2.01 ± 0.16	7d	4-ClC ₆ H ₄	1.92 ± 0.47
6e	3-ClC ₆ H ₄	2.44 ± 0.35	7e	3-O ₂ NC ₆ H ₄	2.35 ± 0.25
6f	4-ClC ₆ H ₄	2.91 ± 0.67	7f	1-C ₁₀ H ₇	1.83 ± 0.11
6g	3-O ₂ NC ₆ H ₄	3.53 ± 0.21	8		2.71 ± 0.60
6h	4-O ₂ NC ₆ H ₄	3.29 ± 0.39	11a	3-O ₂ NC ₆ H ₄	0.98 ± 0.00
OA		2.93 ± 0.92	11b	4-O ₂ NC ₆ H ₄	0.89 ± 0.06

结构与活性关系的分析发现, 双酰胺化合物(11a 和 11b)的活性明显高于单酰胺化合物(6~8), 这说明酰胺基团及其数目对活性起决定性作用. 在化合物 6 系列中, 当苯环上连有取代基时, 化合物的活性明显高于苯环上无取代的化合物(6a), 但苯环上连有强吸电子基团时化合物的活性有所降低(6g 和 6h). 将化合物 6 结构中的芳氨基基团用稠杂环 2-芳氧甲基苯并咪唑基团(含 2 个 N 原子的双环)替换, 所形成的化合物 7 的活性明显提高(7a > 6b, 7d > 6f, 7e > 6g). 将化合物 7 结构中的 2-芳氧甲基苯并咪唑环用稠杂环 3-噻基三嗪并咪唑(含 4 个 N 原子的三环)替换, 所形成的化合物 8 的活性较化合物 7 有所降低. 在双酰胺化合物 11 中, 咪唑环上烷基链的长度及取代基的位置对活性影响不太大.

1.4 分子对接研究

选择代表目标化合物 6d、7f 和 11b, 利用 Dockingserver 软件对其进行了分子对接研究, 以便了解其与 PTP1B 酶(PDB ID: 1NNY)的结合模式及相互作用情况.

由目标化合物 6d 与 PTP1B 的分子对接结果(图 5 和表 3)可以看出, 化合物 6d 嵌入到了 PTP1B 酶 α3 和 α6 螺旋形成的活性位点部位, 具有较高的结合能(-31.25

kJ/mol). 酰胺基团中的两个氮原子(N(3)和 N(4))和芳氨基基团中的氮原子(N(5))与 α6 螺旋周围的 PHE182、VAL184 和 GLU186 氨基酸残基形成了 6 个氢键. 此外, 酰胺基团的氢原子(H(12))与 GLU186 还存在着极性作用. 咪唑环和席夫碱(CH=N)基团位于 α3 螺旋边缘, 芳环位于 α6 螺旋边缘, 咪唑环、芳环和席夫碱(CH=N)基团中的碳原子与氨基酸残基存在着 π-π/疏水作用. 咪唑环上的氯原子与氨基酸残基还具有卤键作用. 由此可以看出, 酰胺骨架对化合物抑制 PTP1B 的活性起着主要作用, 而引入的芳氨基基团和 5-氯咪唑基团可增加其活性, 咪唑环和芳环对化合物的脂溶性起着主要作用.

由目标化合物 7f 与 PTP1B 的分子对接结果(图 6 和表 4)可以看出, 化合物 7f 也嵌入到了 PTP1B 酶的 α3 和 α6 螺旋形成的活性位点部位, 具有较高的结合能(-26.1 kJ/mol). 酰胺基团中的两个氮原子(N(3)和 N(4))与 α6 螺旋周围的 PHE182、VAL184 和 GLU186 氨基酸残基形成了 5 个氢键. 此外, 酰胺基团的氢原子(H12)与 GLU186 还存在着极性作用. 咪唑环和噻唑环位于 α3 螺旋边缘, 苯并咪唑和蔡环位于 α6 螺旋边缘. 咪唑环、席夫碱(CH=N)基团、苯并咪唑环的 2-位亚甲基和蔡环中

表 3 目标化合物 6d 与 PTP1B 的结合能及相互作用
Table 3 The binding energy and interactions between the target compound 6d with PTP1B (PDB ID: 1NNY)

Est. free energy of binding/(kJ·mol ⁻¹)	No. of H-bond	H-bonds (length/nm)	Polar (length/nm)	Hydrophobic (length/nm)	Pi-Pi (length/nm)	Halogen bond (length/nm)
-31.25	6	N(3)-PHE182 (0.345) N(3)-VAL184 (0.328) N(4)-VAL184 (0.272) N(5)-VAL184 (0.300) N(3)-GLU186 (0.319) N(4)-GLU186 (0.348)	H12-GLU186 (0.343)	C(8)-PRO180 (0.372) C(9)-PRO180 (0.375) C(10)-PRO180 (0.331) C(11)-PRO180 (0.305) C(12)-PRO180 (0.326) C(17)-PRO180 (0.350) C(20)-VAL184 (0.370) C(21)-VAL184 (0.354)	C(1)-PHE182 (0.357) C(2)-PHE182 (0.377)	Cl(1)-TRP179 (0.389)

图5 化合物 6d 与 PTP1B 酶的 3D 对接模式(A)及 6d 附近结合位点的关键相互作用残基(B)

Figure 5 3D docking mode of compound 6d with PTP1B enzyme (A) and key interaction residues in binding site surrounding 6d (B)

图6 化合物 7f 与 PTP1B 酶的 3D 对接模式(A)及 7f 附近结合位点的关键相互作用残基(B)

Figure 6 3D docking mode of compound 7f with PTP1B enzyme (A) and key interaction residues in binding site surrounding 7f (B)

表4 目标化合物 7f 与 PTP1B 的结合能及相互作用

Table 4 Binding energy and interactions between the target compound 7f with PTP1B (PDB ID:1NNY)

Est. free energy of binding/(kJ·mol ⁻¹)	No. of H-bond	H-bonds (length/nm)	Polar (length/nm)	Hydrophobic (length/nm)	Pi-Pi (length/nm)
-26.11	5	N(4)-PHE182 (0.347)	H(12)-GLU186 0.328	C(17)-PRO180 (0.342)	C(3)-TYR152 (0.387) C(31)-PHE182 (0.356) C(32)-PHE182 (0.359) C(34)-PHE182 (0.357) C(35)-PHE182 (0.385)
		N(4)-VAL184 (0.299)		C(11)-PRO180 (0.299)	
		N(3)-VAL184 (0.330)		C(10)-PRO180 (0.313)	
		N(4)-GLU186 (0.317)		C(9)-PRO180 (0.370)	
		N(3)-GLU186 (0.310)		C(12)-PRO180 (0.345)	
				C(27)-PHE182 (0.371)	
				C(1)-PRO185 (0.349)	
				C(12)-PRO185 (0.384)	

的碳原子与氨基酸残基存在着疏水/ π - π 作用。由此可看出, 酰胺骨架对化合物抑制 PTP1B 的活性起着主要作用, 而咪唑环和 2-(1-萘氧甲基)苯并咪唑基团对化合物

的脂溶性起着主要作用。

由目标化合物 11b 与 PTP1B 的分子对接结果(图 7 和表 5)可以看出, 化合物 11b 嵌入到了 PTP1B 酶的活性

图7 化合物 11b 与 PTP1B 酶的 3D 对接模式(A)及 11b 附近结合位点的关键相互作用残基(B)

Figure 7 3D docking mode of compound 11b with PTP1B enzyme (A) and key interaction residues in binding site surrounding 11b (B)

表5 目标化合物 11b 与 PTP1B 的结合能及相互作用

Table 5 Binding energy and interactions between the target compound 11b with PTP1B (PDB ID: 1NNY)

Est. free energy of binding/(kJ·mol ⁻¹)	No. of H-bond	H-bonds (length/nm)	Polar a (length/nm)	Hydrophobic (length/nm)	Pi-Pi (length/nm)
-20.25	3	N(1)-GLN102 (0.324)	O(2)-LYS103 (0.384)	C(20)-HIS60 (0.325)	C(32)-HIS60 (0.384)
		N(3)-GLU207 (0.339)	H(24)-HIS208 (0.375)	C(3)-PRO210 (0.374)	C(33)-HIS60 (0.335)
		N(6)-GLU207 (0.276)		C(4)-PRO210 (0.332)	C(11)-HIS60 (0.389)
					C(34)-HIS60 (0.349)
					C(27)-HIS208 (0.377)
					C(28)-HIS208 (0.358)
					C(29)-HIS208 (0.383)

位点部位, 具有较高的结合能(-20.25 kJ·mol⁻¹). 位于活性位点的咪唑环上的 N 原子(N(1))、酰胺基团中的 N 原子(N(3))和芳氨基基团中的 N 原子(N(6))分别与氨基酸残基 GLN102 和 GLU207 形成了 3 个氢键. 偏离活性位点的酰胺基团的 O 原子(O(2))和位于活性位点的芳氨基基团中的 H 原子(H(24))分别与氨基酸残基 LYS103 和 HIS208 存在着极性作用. 咪唑环和席夫碱中的碳原子与氨基酸残基有着疏水作用. 咪唑环和苯环中的碳原子与氨基酸残基还有着 π - π 相互作用. 由此可看出, 酰胺和咪唑骨架对化合物抑制 PTP1B 的活性起着主要作用, 芳氨基基团可增加其活性. 而咪唑环和芳环对化合物的脂溶性起着主要作用.

2 结论

利用药效团拼合的方法, 设计并合成了 17 个未见文献报道的新型含咪唑环和芳环/芳稠杂环的 N-酰胺衍生物 6~8 和 11, 利用 2D NMR (¹H-¹H COSY 和 NOESY) 技术确定了其构型. 评价了目标化合物对 PTP1B 的抑制活性. 实验结果显示, 目标化合物 6~8 和 11 对 PTP1B 均有较强的抑制活性, 除了化合物 6a、6b、6g 和 6h 外, 其它化合物的活性均高于对照药物齐墩果酸, 其中含咪唑环的双酰胺化合物 11b 的活性最高, IC₅₀ 值为(0.89±0.06) μmol/L. 对代表目标化合物 6d、7f 和 11b

的分子对接研究表明, 酰胺骨架对抑制 PTP1B 的活性起着决定性作用. 设计并合成出的新型含咪唑环和芳环/芳稠杂环的 N-酰胺衍生物是潜在的 PTP1B 抑制剂, 在抗癌/抗糖尿病方面具有潜在的应用价值.

3 实验部分

3.1 仪器与试剂

德国 BRUKER 500 MHz 核磁共振仪, TMS 为内标, DMSO-*d*₆ 为溶剂; 美国 Waters 公司 Synapt G2-Si 高分辨质谱仪; 德国 TENSOR 27 型 FT-IR 光谱仪(KBr 压片); 德国 Elementar 公司 Vario EL 型元素分析仪; X-5 显微熔点测定仪(温度计未经校正). 所用试剂均购置于试剂公司且为分析纯.

3.2 中间体化合物的合成

中间体化合物 1~5 和 7 按参考文献[50, 54~58]的方法合成.

3.3 目标化合物 6~8 的合成通法

向 50 mL 三口瓶中加入 0.5 mmol 中间体 9-(2-氯咪唑-5-甲基)-咪唑-3-甲醛(2)和 4 mL 无水乙醇, 在浴温为 80 °C 下搅拌至固体完全溶解, 加入 6 滴冰醋酸(约 10 μL), 继续搅拌 0.5 h 后, 加入 0.5 mmol 中间体酰肼(3/4/5)至反应瓶中, 回流反应 6~14 h. 反应结束后, 待

反应瓶冷却至室温, 抽滤出固体粗产物, 用少量乙醇淋洗滤饼, 将粗产物再用乙醇加热至沸, 以便除去未反应的原料, 冷却至室温, 抽滤, 少量乙醇淋洗滤饼, 干燥后得到纯的目标化合物 **6~8**。

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-苯氨基乙酰肼(**6a**): 米黄色固体, 产率 87.8%. m.p. 247.4~248.2 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 11.48, 11.40 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.48, 8.45 (s, 1H, Cz-H₄, Cz-H₄'), 8.20, 8.42 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.28, 8.24 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₅, Cz-H₅'), 7.76~7.98 (m, 4H, Cz-H₁, Cz-H₂, Cz-H₈, thiazolyl-H), 7.53 (t, *J*=7.8 Hz, 1H, Cz-H₇), 7.25~7.32 (m, 1H, Cz-H₆), 7.06~7.15 (m, 2H, ArH), 6.68, 6.63 (d, *J*=7.8 Hz, 2H, ArH, ArH'), 6.52~6.60 (m, 1H, ArH), 5.74, 6.00 (t, *J*=5.8 Hz, 1H, NH, NH'), 5.94, 5.93 (s, 2H, NCH₂, NCH'₂), 4.31, 3.83 (d, *J*=5.5 Hz, 2H, COCH₂, COCH'₂). Isomer A: 57.1%, Isomer B: 42.9%; ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ: 171.1, 166.5 (C=O, C'=O), 149.7, 148.3, 148.2, 144.3, 147.7 (CH=N, C'H=N), 140.27, 140.26, 140.2, 139.7, 137.04, 137.03, 128.73, 128.69, 126.37, 126.35, 125.94, 125.92, 124.8, 124.3, 122.7, 122.4, 122.3, 120.8, 120.7, 120.1, 120.02, 119.96, 119.8, 116.3, 115.9, 112.24, 112.23, 109.9, 109.8, 109.7, 43.7, 45.9 (COCH₂, COCH'₂), 38.3 (NCH₂); IR (KBr) ν: 3365, 3183, 3080, 3049, 2961, 2852, 1677, 1626, 1598, 1511, 1487, 1473, 1463, 1259 cm⁻¹. Anal. calcd for C₂₅H₂₀ClN₅OS: C 63.35, H 4.25, N 14.78; found C 63.61, H 4.43, N 14.57.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-(4-甲基苯氨基)乙酰肼(**6b**): 浅米黄色固体, 产率 85.6%. m.p. 209.4~210.4 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 11.47, 11.36 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.48, 8.45 (s, 1H, Cz-H₄, Cz-H₄'), 8.20, 8.41 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.27, 8.23 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₅, Cz-H₅'), 7.76~7.99 (m, 4H, Cz-H₁, Cz-H₂, Cz-H₈, thiazolyl-H), 7.53 (t, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₇), 7.26~7.31 (m, 1H, Cz-H₆), 6.92, 6.93 (d, *J*=8.0 Hz, 2H, ArH, ArH'), 6.60, 6.55 (d, *J*=8.5 Hz, 2H, ArH, ArH'), 5.94, 5.93 (s, 2H, NCH₂, NCH'₂), 5.52, 5.80 (s, 1H, NH, NH'), 4.28, 3.79 (s, 2H, COCH₂, COCH'₂), 2.17, 2.16 (s, 3H, CH₃, CH'₃). Isomer A: 55.9%, Isomer B: 44.1%; ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ: 171.3, 166.8 (C=O, C'=O), 149.8, 146.2, 146.0, 144.4, 147.8 (CH=N, C'H=N), 140.4, 140.3, 139.8, 137.2, 129.28, 129.26, 126.5, 126.07, 126.05, 124.92, 124.90, 124.42, 124.38, 122.8, 122.5, 122.4, 120.9, 120.8, 120.2, 120.13, 120.07, 119.9, 112.51, 112.47, 110.0, 109.9, 109.8, 44.1, 46.4 (COCH₂,

COCH'₂), 38.4 (NCH₂), 20.1 (CH₃); IR (KBr) ν: 3391, 3313, 3183, 3049, 2966, 2863, 1671, 1626, 1598, 1518, 1487, 1473, 1460, 1335 cm⁻¹. Anal. calcd for C₂₆H₂₂ClN₅OS: C 63.99, H 4.54, N 14.35; found C 63.80, H 4.69, N 14.22.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-(4-甲氧基苯氨基)乙酰肼(**6c**): 米白色固体, 产率 85.5%. m.p. 219.2~220.2 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 11.45, 11.34 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.48, 8.44 (s, 1H, Cz-H₄, Cz-H₄'), 8.19, 8.41 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.28, 8.23 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₅, Cz-H₅'), 7.75~8.01 (m, 4H, Cz-H₁, Cz-H₂, Cz-H₈, thiazolyl-H), 7.52 (t, *J*=7.8 Hz, 1H, Cz-H₇), 7.29, 7.28 (t, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₆, Cz-H₆'), 6.75, 6.76 (d, *J*=9.0 Hz, 2H, ArH, ArH'), 6.65, 6.59 (d, *J*=9.0 Hz, 2H, ArH, ArH'), 5.94, 5.93 (s, 2H, NCH₂, NCH'₂), 5.34, 5.62 (t, *J*=5.8 Hz, NH, NH'), 4.25, 3.77 (d, *J*=6.0 Hz, 2H, COCH₂, COCH'₂), 3.65, 3.64 (s, 3H, CH₃, CH'₃). Isomer A: 54.6%, Isomer B: 45.4%; ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ: 166.9, 171.4 (C=O, C'=O), 151.3, 151.1, 149.8, 144.4, 147.8 (CH=N, C'H=N), 142.4, 140.42, 140.39, 140.4, 140.3, 139.8, 137.2, 137.1, 126.49, 126.47, 126.08, 126.05, 125.0, 124.5, 122.8, 122.5, 122.4, 120.9, 120.8, 120.2, 120.13, 120.07, 119.9, 114.56, 114.55, 113.6, 113.5, 110.0, 109.9, 109.8, 55.28, 55.26 (CH₃O), 47.0, 44.8 (COCH₂, COCH'₂), 38.4 (NCH₂); IR (KBr) ν: 3385, 3313, 3183, 3065, 2971, 2878, 1667, 1626, 1598, 1577, 1532, 1494, 1335, 1294, 1044 cm⁻¹. Anal. calcd for C₂₆H₂₂ClN₅O₂S: C 61.96, H 4.40, N 13.90; found C 62.12, H 4.17, N 13.73.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-(4-溴苯氨基)乙酰肼(**6d**): 白色固体, 产率 83.7%. m.p. 217.3~218.0 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ: 11.50, 11.42 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.48, 8.46 (s, 1H, Cz-H₄, Cz-H₄'), 8.19, 8.41 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.27, 8.24 (d, *J*=8.0 Hz, 1H, Cz-H₅, Cz-H₅'), 7.80~7.97 (m, 4H, Cz-H₁, Cz-H₂, Cz-H₈, thiazolyl-H), 7.53 (t, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₇), 7.290, 7.285 (t, *J*=7.3 Hz, 1H, Cz-H₆, Cz-H₆'), 7.23, 7.25 (d, *J*=8.5 Hz, 2H, ArH, ArH'), 6.65, 6.59 (d, *J*=9.0 Hz, 2H, ArH, ArH'), 6.05, 6.27 (t, *J*=5.8 Hz, NH, NH'), 5.94, 5.93 (s, 2H, NCH₂, NCH'₂), 4.30, 3.83 (d, *J*=5.5 Hz, 2H, COCH₂, COCH'₂). Isomer A: 60.9%, Isomer B: 39.1%; ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ: 170.9, 166.3 (C=O, C'=O), 149.8, 147.9, 147.8, 144.5, 147.7 (CH=N, C'H=N), 140.41, 140.39, 140.3, 139.8, 137.2, 131.4, 131.3, 126.51, 126.48, 126.0, 124.9, 124.5, 122.8, 122.5, 122.4, 120.9,

120.8, 120.20, 120.15, 120.1, 120.0, 114.3, 110.0, 109.9, 109.8, 107.1, 106.6, 43.8, 45.7 (COCH₂, COC'H₂), 38.4 (NCH₂); IR (KBr) ν : 3391, 3313, 3183, 3080, 2971, 2878, 1671, 1626, 1598, 1532, 1494, 1473, 1460, 1335 cm⁻¹. Anal. calcd for C₂₅H₁₉BrClN₅OS: C 54.31, H 3.46, N 12.67; found C 54.09, H 3.58, N 12.81.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-(3-氯苯氨基)乙酰肼 (**6e**): 米白色固体, 产率 86.3%. m.p. 252.6~253.6 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 11.49, 11.44 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.48, 8.46 (s, 1H, Cz-H₄, Cz-H_{4'}), 8.19, 8.40 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.27, 8.24 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₅, Cz-H_{5'}), 7.78~7.98 (m, 4H, Cz-H₁, Cz-H₂, Cz-H₈, thiazolyl-H), 7.53 (t, *J*=7.8 Hz, 1H, Cz-H₇), 7.29 (t, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₆), 7.07~7.13 (m, 1H, ArH), 6.54~6.73 (m, 3H, ArH), 6.18, 6.38 (t, *J*=5.8 Hz, NH, NH'), 5.94, 5.93 (s, 2H, NCH₂, NCH'₂), 4.32, 3.85 (d, *J*=6.0 Hz, 2H, COCH₂, COCH'₂). Isomer A: 60.6%, Isomer B: 39.4%; ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ : 170.8, 166.2 (C=O, C'=O), 150.1, 149.9, 149.8, 144.5, 147.9 (CH=N, C'H=N), 140.4, 140.39, 140.38, 140.3, 139.82, 139.80, 137.2, 133.6, 133.5, 130.34, 130.26, 126.50, 126.46, 126.0, 125.0, 124.5, 122.78, 122.77, 122.5, 122.4, 120.9, 120.8, 120.3, 120.14, 120.08, 120.0, 115.7, 115.3, 111.6, 111.01, 110.96, 110.0, 109.9, 109.8, 43.7, 45.5 (COCH₂, COC'H₂), 38.4 (NCH₂); IR (KBr) ν : 3416, 3350, 3189, 3080, 2961, 2847, 1677, 1626, 1598, 1525, 1487, 1473, 1463, 1335 cm⁻¹. Anal. calcd for C₂₅H₁₉Cl₂N₅OS: C 59.06, H 3.77, N 13.77; found C 59.26, H 3.52, N 13.92.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-(4-氯苯氨基)乙酰肼 (**6f**): 米白色固体, 产率 85.6%. m.p. 208.4~209.1 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 11.49, 11.42 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.48, 8.45 (s, 1H, Cz-H₄, Cz-H_{4'}), 8.19, 8.40 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.27, 8.24 (d, *J*=8.0 Hz, 1H, Cz-H₅, Cz-H_{5'}), 7.74~8.00 (m, 4H, Cz-H₁, Cz-H₂, Cz-H₈, thiazolyl-H), 7.53 (t, *J*=7.8 Hz, 1H, Cz-H₇), 7.29, 7.28 (t, *J*=7.3 Hz, 1H, Cz-H₆, Cz-H_{6'}), 7.12, 7.14 (d, *J*=8.5 Hz, 2H, ArH, ArH'), 6.69, 6.63 (d, *J*=9.0 Hz, 2H, ArH, ArH'), 6.01, 6.24 (t, *J*=5.8 Hz, NH, NH'), 5.94, 5.93 (s, 2H, NCH₂, NCH'₂), 4.30, 3.83 (d, *J*=6.0 Hz, 2H, COCH₂, COCH'₂). Isomer A: 60.8%, Isomer B: 39.2%; ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ : 170.9, 166.3 (C=O, C'=O), 149.8, 147.9, 147.5, 144.5, 147.3 (CH=N, C'H=N), 140.42, 140.39, 140.4, 140.3, 139.81, 139.80, 137.14, 137.12, 128.54, 128.46, 126.49, 126.46, 126.0,

125.0, 124.5, 122.8, 122.5, 122.4, 120.9, 120.8, 120.2, 120.13, 120.07, 120.0, 119.7, 119.2, 113.71, 113.69, 109.94, 109.87, 109.8, 43.9, 45.8 (COCH₂, COC'H₂), 38.4 (NCH₂); IR (KBr) ν : 3391, 3354, 3173, 3059, 2946, 2826, 1666, 1626, 1598, 1515, 1487, 1463, 1335, 1238 cm⁻¹. Anal. calcd for C₂₅H₁₉Cl₂N₅OS: C 59.06, H 3.77, N 13.77; found C 59.31, H 3.94, N 13.88.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-(3-硝基苯氨基)乙酰肼 (**6g**): 黄色固体, 产率 87.7%. m.p. 260.6~261.4 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 11.54, 11.53 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.50, 8.47 (d, *J*=1.0 Hz, 1H, Cz-H₄, Cz-H_{4'}), 8.21, 8.41 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.27, 8.24 (d, *J*=8.0 Hz, 1H, Cz-H₅, Cz-H_{5'}), 7.76~8.02 (m, 4H, Cz-H₁, Cz-H₂, Cz-H₈, thiazolyl-H), 7.53 (t, *J*=7.8 Hz, 1H, Cz-H₇), 7.33~7.50 (m, 3H, ArH), 7.30, 7.29 (t, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₆, Cz-H_{6'}), 7.12, 7.07 (d, *J*=8.0 Hz, 1H, ArH, ArH'), 6.67, 6.82 (t, *J*=6.0 Hz, NH, NH'), 5.95, 5.93 (s, 2H, NCH₂, NCH'₂), 4.44, 3.97 (d, *J*=5.5 Hz, 2H, COCH₂, COCH'₂). Isomer A: 63.0%, Isomer B: 37.0%; ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ : 170.5, 165.8 (C=O, C'=O), 149.80, 149.77, 149.6, 148.8, 144.6, 147.9 (CH=N, C'H=N), 140.4, 140.3, 139.8, 137.2, 129.9, 129.8, 126.5, 126.0, 124.9, 124.5, 122.8, 122.5, 122.4, 120.9, 120.8, 120.3, 120.2, 120.09, 120.06, 118.7, 118.6, 110.5, 110.1, 110.0, 109.9, 109.8, 105.7, 105.6, 43.9, 45.3 (COCH₂, COC'H₂), 38.4 (NCH₂); IR (KBr) ν : 3437, 3391, 3183, 3085, 3049, 2961, 2852, 1674, 1622, 1601, 1525, 1491, 1473, 1463, 1345, 1335 cm⁻¹. Anal. calcd for C₂₅H₁₉ClN₆O₃S: C 57.86, H 3.69, N 16.19; found C 57.72, H 3.90, N 15.93.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-(4-硝基苯氨基)乙酰肼 (**6h**): 黄色固体, 产率 87.2%. m.p. 256.4~257.2 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 11.59, 11.56 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.50, 8.47 (d, *J*=0.5 Hz, 1H, Cz-H₄, Cz-H_{4'}), 8.20, 8.39 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.27, 8.24 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₅, Cz-H_{5'}), 8.30, 8.43 (d, *J*=9.5 Hz, 2H, ArH, ArH'), 7.95 (dd, *J*=8.8, 1.3 Hz, 1H, Cz-H₂), 7.88 (s, 1H, thiazolyl-H), 7.84 (d, *J*=8.5 Hz, 1H, Cz-H₁), 7.83 (d, *J*=8.5 Hz, 1H, Cz-H₈), 7.53 (t, *J*=7.8 Hz, 1H, Cz-H₇), 7.46, 7.58 (t, *J*=5.8 Hz, NH, NH'), 7.291, 7.288 (t, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₆, Cz-H_{6'}), 6.78, 6.72 (d, *J*=9.0 Hz, 2H, ArH, ArH'), 5.95, 5.94 (s, 2H, NCH₂, NCH'₂), 4.50, 4.02 (d, *J*=6.0 Hz, 2H, COCH₂, COCH'₂). Isomer A: 67.2%, Isomer B: 32.8%; ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ : 169.8, 165.1 (C=O, C'=O), 154.6, 154.4,

149.8, 148.8, 144.8, 148.1 (CH=N, C'H=N), 140.5, 140.4, 140.3, 139.8, 137.1, 136.4, 136.1, 126.5, 126.0, 125.9, 125.0, 124.6, 122.8, 122.5, 122.4, 120.9, 120.8, 120.3, 120.2, 120.1, 111.3, 109.9, 109.8, 43.6, 44.8 (COCH₂, COC'H₂), 38.4 (NCH₂); IR (KBr) ν : 3375, 3333, 3282, 3080, 3049, 2919, 2836, 1687, 1625, 1601, 1525, 1490, 1462, 1311, 1255 cm⁻¹. Anal. calcd for C₂₅H₁₉Cl-N₆O₃S: C 57.86, H 3.69, N 16.19; found C 58.04, H 3.53, N 15.99.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-((2-(4-甲基苯氧基)甲基)苯并咪唑-1-基)乙酰肼(**7a**): 浅米黄色固体, 产率 89.8%. m.p. 253.4~254.2 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 11.74, 11.80 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.49, 8.47 (s, 1H, Cz-H₄, Cz-H₄'), 8.20, 8.38 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.24 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₅), 7.80~7.97 (m, 4H, Cz-H₁, Cz-H₂, Cz-H₈, thiazolyl-H), 7.68 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, BZM-H₄), 7.61 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, BZM-H₇), 7.53 (t, *J*=7.8 Hz, 1H, Cz-H₇), 7.20~7.33 (m, 3H, Cz-H₆, BZM-H₅, BZM-H₆), 6.92~7.12 (m, 4H, Ar'H), 5.95, 5.93 (s, 2H, NCH₂, NCH'₂), 5.67, 5.17 (s, 2H, COCH₂, COCH'₂), 5.37 (s, 2H, CH₂O), 2.11, 2.20 (s, 3H, CH₃, CH'₃). Isomer A: 75.5%, Isomer B: 24.5%; ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ : 167.9, 162.9 (C=O, C'=O), 150.2, 150.1, 149.8, 144.9, 148.5 (CH=N, C'H=N), 141.8, 140.5, 140.41, 140.36, 139.8, 137.2, 137.1, 136.5, 136.1, 130.0, 129.9, 129.8, 129.7, 126.5, 125.9, 124.9, 124.6, 122.80, 122.75, 122.7, 122.5, 122.4, 121.9, 121.7, 120.8, 120.3, 120.1, 119.3, 119.2, 114.8, 114.7, 110.6, 110.5, 109.9, 109.8, 63.1, 62.9 (OCH₂), 44.6, 45.2 (COCH₂, COC'H₂), 38.4 (NCH₂), 20.02, 19.95 (CH₃); IR (KBr) ν : 3215, 3142, 3049, 2946, 2857, 1691, 1626, 1601, 1508, 1463, 1335, 1224, 1044 cm⁻¹. Anal. calcd for C₃₄H₂₇ClN₆O₂S: C 65.96, H 4.40, N 13.57; found C 65.73, H 4.26, N 13.69.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-((2-(4-二甲氧基苯氧基)甲基)苯并咪唑-1-基)乙酰肼(**7b**): 白色固体, 产率 93.1%. m.p. 238.5~239.4 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 11.73, 11.77 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.48, 8.45 (s, 1H, Cz-H₄, Cz-H₄'), 8.19, 8.34 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.23 (d, *J*=8.0 Hz, 1H, Cz-H₅), 7.79~7.97 (m, 4H, Cz-H₁, Cz-H₂, Cz-H₈, thiazolyl-H), 7.70 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, BZM-H₄), 7.60 (d, *J*=7.0 Hz, 1H, BZM-H₇), 7.53 (t, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₇), 7.20~7.35 (m, 3H, Cz-H₆, BZM-H₅, BZM-H₆), 7.05, 7.08 (d, *J*=8.0 Hz, 1H, Ar'H, Ar'H'), 6.83~6.97 (m, 2H, Ar'H), 5.95, 5.93 (s, 2H, NCH₂,

NCH'₂), 5.69, 5.18 (s, 2H, COCH₂, COCH'₂), 5.38 (s, 2H, CH₂O), 2.14, 2.17 (s, 3H, CH₃, CH'₃), 2.08, 2.11 (s, 3H, CH₃, CH'₃). Isomer A: 77.5%, Isomer B: 22.5%; ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ : 167.8, 162.8 (C=O, C'=O), 162.3, 153.7, 150.2, 149.8, 144.9, 148.4 (CH=N, C'H=N), 141.8, 141.6, 140.43, 140.40, 140.37, 139.8, 137.2, 137.1, 136.5, 136.1, 131.3, 131.2, 129.5, 129.4, 126.9, 126.5, 125.9, 125.82, 125.75, 125.6, 124.6, 122.74, 122.67, 122.5, 122.4, 121.7, 120.7, 120.24, 120.18, 120.1, 119.3, 119.2, 111.7, 111.6, 110.8, 110.0, 109.89, 109.86, 109.8, 63.1, 62.9 (OCH₂), 44.7 (COCH₂), 38.4 (NCH₂), 20.0, 19.9 (CH₃), 15.8, 15.7 (CH₃); IR (KBr) ν : 3204, 3059, 3018, 2919, 2857, 1677, 1626, 1601, 1577, 1525, 1501, 1494, 1463, 1335, 1255, 1041 cm⁻¹. Anal. calcd for C₃₅H₂₉Cl-N₆O₂S: C 66.39, H 4.62, N 13.27; found C 66.11, H 4.84, N 13.03.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-((2-(4-甲氧基苯氧基)甲基)苯并咪唑-1-基)乙酰肼(**7c**): 淡黄色固体, 产率 88.0%. m.p. 239.4~230.3 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 11.74, 11.81 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.50, 8.48 (s, 1H, Cz-H₄, Cz-H₄'), 8.21, 8.38 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.25 (d, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₅), 7.80~7.97 (m, 4H, Cz-H₁, Cz-H₂, Cz-H₈, thiazolyl-H), 7.68 (d, *J*=8.0 Hz, 1H, BZM-H₄), 7.61 (d, *J*=8.0 Hz, 1H, BZM-H₇), 7.53 (t, *J*=7.5 Hz, 1H, Cz-H₇), 7.20~7.35 (m, 3H, Cz-H₆, BZM-H₅, BZM-H₆), 7.02, 7.03 (d, *J*=9.0 Hz, 2H, Ar'H, Ar'H'), 6.78, 6.85 (d, *J*=9.0 Hz, 2H, Ar'H, Ar'H'), 5.95, 5.93 (s, 2H, NCH₂, NCH'₂), 5.68, 5.18 (s, 2H, COCH₂, COCH'₂), 5.35 (s, 2H, CH₂O), 3.57, 3.66 (s, 3H, CH₃, CH'₃). Isomer A: 75.7%, Isomer B: 24.3%; ¹³C NMR (DMSO-*d*₆, 125 MHz) δ : 167.9, 162.9 (C=O, C'=O), 153.9, 153.8, 151.8, 151.7, 150.3, 149.8, 144.9, 148.5 (CH=N, C'H=N), 141.8, 141.7, 140.5, 140.41, 140.36, 139.8, 137.2, 137.1, 136.5, 136.1, 126.6, 126.5, 125.9, 125.8, 124.9, 124.7, 122.8, 122.7, 122.5, 122.4, 121.9, 121.7, 120.8, 120.3, 120.2, 120.1, 119.3, 119.2, 115.94, 115.92, 114.52, 114.45, 110.6, 110.5, 110.0, 109.9, 109.8, 63.7, 63.5 (OCH₂), 55.3, 55.2 (OCH₃), 44.6, 45.2 (COCH₂, COC'H₂), 38.4 (NCH₂); IR (KBr) ν : 3287, 3204, 3054, 2950, 2935, 2832, 1692, 1626, 1598, 1508, 1463, 1335, 1231, 1044 cm⁻¹. Anal. calcd for C₃₄H₂₇ClN₆O₃S: C 64.30, H 4.28, N 13.23; found C 64.43, H 4.09, N 13.39.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-((2-(4-氯苯氧基)甲基)苯并咪唑-1-基)乙酰肼(**7d**): 米白色固体, 产率 90.1%. m.p. 255.6~256.4 °C. ¹H NMR (500 MHz,

DMSO- d_6) δ : 11.74, 11.80 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.50, 8.47 (d, $J=1.0$ Hz 1H, Cz-H₄, Cz-H₄'), 8.20, 8.37 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.24, 8.23 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, Cz-H₅, Cz-H₅'), 7.93, 7.86 (dd, $J=8.8, 1.3$ Hz, 1H, Cz-H₂, Cz-H₂'), 7.88 (s, 1H, thiazolyl-H), 7.86 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, Cz-H₁), 7.83 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, Cz-H₈), 7.69 (d, $J=7.5$ Hz, 1H, BZM-H₄), 7.614, 7.606 (d, $J=7.5$ Hz, 1H, BZM-H₇, BZM-H₇'), 7.53 (td, $J=7.8, 1.0$ Hz, 1H, Cz-H₇), 7.29 (t, $J=7.5$ Hz, 1H, Cz-H₆), 7.27 (t, $J=7.0$ Hz, 1H, BZM-H₅), 7.26 (d, $J=9.0$ Hz, 2H, Ar'H), 7.24 (td, $J=7.5, 1.0$ Hz, 1H, BZM-H₆), 7.10 (d, $J=9.5$ Hz, 2H, Ar'H), 5.95, 5.94 (s, 2H, NCH₂, NCH₂'), 5.68, 5.17 (s, 2H, COCH₂, COCH₂'), 5.44 (s, 2H, CH₂O). Isomer A: 75.6%, Isomer B: 24.4%; ¹³C NMR (DMSO- d_6 , 125 MHz) δ : 167.9, 162.8 (C=O, C'=O), 162.3, 156.6, 149.80, 149.77, 145.0 (CH=N), 141.74, 141.71, 140.5, 140.41, 140.37, 139.8, 137.2, 137.1, 136.4, 136.1, 129.2, 129.1, 126.5, 125.9, 124.9, 124.6, 122.8, 122.5, 121.9, 121.8, 120.8, 120.3, 120.1, 119.3, 119.2, 116.7, 116.6, 110.7, 109.89, 109.85, 63.2, 63.1 (OCH₂), 44.6, 45.3 (COCH₂, COCH₂'), 38.5 (NCH₂); IR (KBr) ν : 3204, 3069, 2961, 2864, 1677, 1629, 1598, 1567, 1491, 1463, 1339, 1241, 1044 cm⁻¹. Anal. calcd for C₃₃H₂₄Cl₂N₆O₂S: C 61.97, H 3.78, N 13.14; found C 61.72, H 3.99, N 13.41.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-((2-(3-硝基氧基)甲基)苯并咪唑-1-基)乙酰肼(**7e**): 黄色固体, 产率 91.2%. m.p. 262.4~263.2 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.76, 11.80 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.47 (s, 1H, Cz-H₄), 8.18, 8.36 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.24 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, Cz-H₅), 7.79~7.94 (m, 5H, Cz-H₁, Cz-H₂, Cz-H₈, thiazolyl-H, Ar'H), 7.66~7.77 (m, 2H, BZM-H₄, Ar'H), 7.63 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, BZM-H₇), 7.47~7.60 (m, 3H, Cz-H₇, Ar'H×2), 7.21~7.35 (m, 3H, Cz-H₆, BZM-H₅, BZM-H₆), 5.944, 5.935 (s, 2H, NCH₂, NCH₂'), 5.71, 5.61 (s, 2H, CH₂O, CH₂O'), 5.62, 5.20 (s, 2H, COCH₂, COCH₂'). Isomer A: 76.7%, Isomer B: 23.3%; ¹³C NMR (DMSO- d_6 , 125 MHz) δ : 167.9, 162.9 (C=O, C'=O), 162.3, 158.3, 149.8, 149.4, 149.3, 148.6, 148.5, 144.9, 148.6 (CH=N, C'H=N), 141.74, 141.70, 140.5, 140.40, 140.35, 139.8, 137.2, 137.1, 136.5, 136.2, 130.6, 130.5, 126.5, 125.8, 124.9, 124.6, 123.0, 122.9, 122.7, 122.5, 122.4, 122.1, 122.01, 121.97, 121.8, 120.8, 120.23, 120.18, 120.1, 119.4, 119.3, 116.1, 116.0, 110.8, 110.6, 109.9, 109.84, 109.75, 109.4, 63.41, 63.35 (OCH₂), 44.6, 45.3 (COCH₂, COCH₂'), 38.4 (NCH₂); IR (KBr) ν : 3289, 3201,

3082, 3062, 2954, 2930, 2864, 1688, 1626, 1615, 1598, 1526, 1484, 1463, 1348, 1334, 1283, 1048 cm⁻¹. Anal. calcd for C₃₃H₂₄ClN₇O₄S: C 60.97, H 3.72, N 15.08; found C 61.15, H 3.83, N 14.94.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-((2-(1-蔡氧基)甲基)苯并咪唑-1-基)乙酰肼(**7f**): 奶白色固体, 产率 85.3%. m.p. 214.0~214.9 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 11.72, 11.77 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.43 (s, 1H, Cz-H₄), 8.14, 8.29 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.19 (d, $J=7.5$ Hz, 1H, Cz-H₅), 8.15~8.26 (m, 1H, Ar'H), 7.76~7.94 (m, 5H, Cz-H₁, Cz-H₂, Cz-H₈, thiazolyl-H, Ar'H), 7.73 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, BZM-H₄), 7.63 (d, $J=7.5$ Hz, 1H, BZM-H₇), 7.17~7.57 (m, 9H, Cz-H₆, Cz-H₇, BZM-H₅, BZM-H₆, Ar'H×5), 5.94 (s, 2H, NCH₂), 5.78, 5.63 (s, 2H, CH₂O, CH₂O'), 5.64, 5.26 (s, 2H, COCH₂, COCH₂'). Isomer A: 77.0%, Isomer B: 23.0%; ¹³C NMR (DMSO- d_6 , 125 MHz) δ : 167.9, 162.9 (C=O, C'=O), 162.3, 153.2, 149.9, 149.8, 144.9, 148.4 (CH=N, C'H=N), 141.79, 141.76, 140.4, 140.3, 139.81, 139.80, 137.2, 137.1, 136.5, 136.3, 134.0, 127.4, 127.3, 126.5, 126.4, 125.99, 125.95, 125.83, 125.81, 125.40, 125.37, 124.8, 124.5, 122.9, 122.8, 122.74, 122.70, 122.44, 122.42, 121.8, 121.7, 121.4, 120.8, 120.6, 120.4, 120.2, 120.1, 119.4, 119.3, 110.8, 109.92, 109.87, 109.8, 105.84, 105.75, 63.3, 63.0 (OCH₂), 45.28, 45.34 (COCH₂, COCH₂'), 38.4 (NCH₂); IR (KBr) ν : 3282, 3189, 3054, 2951, 2934, 2854, 1677, 1626, 1598, 1581, 1525, 1487, 1463, 1335, 1269, 1044 cm⁻¹. Anal. calcd for C₃₇H₂₇ClN₆O₂S: C 67.83, H 4.15, N 12.83; found C 67.64, H 3.91, N 12.62.

N'-[9-(2-氯噻唑-5-甲基)咪唑-3-亚甲基]-2-((1,2,4-三嗪并咪唑)-3-硫基)乙酰肼(**8**): 米白色固体, 产率 85.2%. m.p. 226.2~226.8 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO- d_6) δ : 12.67, 12.64 (s, 1H, NH, NH'), 11.63, 11.75 (s, 1H, CONH, CONH'), 8.48 (s, 1H, Cz-H₄), 8.32, 8.31 (d, $J=7.5$ Hz, 1H, Ti-H₉, Ti-H₉'), 8.25, 8.43 (s, 1H, CH=N, CH'=N), 8.23 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, Cz-H₅), 7.93, 7.90 (dd, $J=8.8, 1.3$ Hz, 1H, Cz-H₂, Cz-H₂'), 7.86 (s, 1H, thiazolyl-H), 7.84 (d, $J=6.5$ Hz, 1H, Cz-H₁), 7.82 (d, $J=8.5$ Hz, 1H, Cz-H₈), 7.69 (td, $J=7.8, 1.0$ Hz, 1H, Ti-H₇), 7.58, 7.59 (d, $J=8.0$ Hz, 1H, Ti-H₆, Ti-H₆'), 7.52, 7.53 (td, $J=7.8, 1.0$ Hz, 1H, Cz-H₇, Cz-H₇'), 7.44 (t, $J=7.5$ Hz, 1H, Ti-H₈), 7.26, 7.29 (t, $J=7.5$ Hz, 1H, Cz-H₆, Cz-H₆'), 5.926, 5.933 (s, 2H, NCH₂, NCH₂'), 4.69, 4.22 (s, 2H, COCH₂, COCH₂'). Isomer A: 62.9%, Isomer B: 37.1%; ¹³C NMR (DMSO- d_6 , 125 MHz) δ : 168.8, 166.4 (C=O, C'=O), 166.7 (Ti-C₃),

163.5, 149.8, 146.53, 146.48, 144.4, 147.8 (CH=N, C'H=N), 141.2, 141.0, 140.43, 140.37, 140.35, 140.3, 139.81, 139.78, 137.13, 137.12, 130.9, 130.8, 126.49, 126.47, 126.01, 125.98, 137.13, 137.12, 130.9, 130.8, 126.49, 126.47, 126.01, 125.98, 124.9, 124.4, 122.8, 122.5, 122.4, 121.5, 121.4, 120.81, 120.78, 120.21, 120.15, 120.12, 120.09, 117.60, 117.56, 112.70, 112.65, 109.94, 109.92, 109.8, 32.7, 33.5 (COCH₂, COC'H₂), 38.4 (NCH₂); IR (KBr) ν : 3381, 3204, 3173, 3065, 2971, 2863, 1677, 1626, 1601, 1581, 1528, 1491, 1473, 1460, 1335, 1183 cm⁻¹. Anal. calcd for C₂₈H₁₉ClN₈O₅: C 57.68, H 3.28, N 19.22; found C 57.47, H 3.51, N 19.07.

3.4 目标化合物 11 的合成通法

向 50 mL 三口瓶中加入 0.3 mmol 中间体 3,6-二甲酰基-9-烷基吡唑(10)和 4 mL 无水乙醇, 在浴温为 80 °C 下搅拌至其完全溶解, 加入 7 滴冰醋酸(约 11 μ L), 继续搅拌 0.5 h 后, 加入 0.6 mmol 中间体芳氨基乙酰肼(3), 回流反应 9 h. 反应结束后, 待反应瓶冷却至室温, 抽滤出固体粗产物, 用少量乙醇淋洗滤饼, 将粗产物用乙醇加热至沸, 以便除去未反应的原料, 冷却至室温, 抽滤, 少量乙醇淋洗滤饼, 干燥后得到纯的目标化合物 11.

N,N'-(9-乙基吡唑基)-3,6-二亚甲基-2,2'-[二(3-硝基苯氨基)]双乙酰肼(11a): 橙黄色固体, 产率 36.8%. m.p. 258.1~258.9 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 11.52, 11.51 (s, 2H, CONH $\times$ 2), 8.57, 8.53 (d, *J*=9.5 Hz, 2H, Cz-H₂ $\times$ 2), 8.22, 8.40 (s, 2H, CH=N $\times$ 2), 7.96, 7.90 (d, *J*=8.5 Hz, 2H, Cz-H₁ $\times$ 2), 7.67~7.78 (m, 2H, Cz-H₄ $\times$ 2), 7.32~7.49 (m, 6H, ArH $\times$ 6), 7.10, 7.06 (d, *J*=8.0 Hz, 2H, ArH $\times$ 2), 6.66, 6.80 (t, *J*=6.0 Hz, 2H, NH $\times$ 2), 4.47~4.56 (m, 2H, NCH₂), 4.43, 3.95 (s, 4H, COCH₂ $\times$ 2), 1.32~1.42 (m, 3H, CH₃); IR (KBr) ν : 3437, 3396, 3308, 3210, 3074, 2971, 2894, 1677, 1618, 1598, 1528, 1483, 1349, 1241 cm⁻¹. HRMS (ESI) calcd for C₃₂H₂₉N₉O₆ [M-H]⁻ 634.2163, found 634.2157.

N,N'-(9-丁基吡唑基)-3,6-二亚甲基-2,2'-[二(4-硝基苯氨基)]双乙酰肼(11b): 黄色固体, 产率 85.4%. m.p. > 270 °C. ¹H NMR (500 MHz, DMSO-*d*₆) δ : 11.28~11.81 (m, 2H, CONH $\times$ 2), 8.47~8.69 (m, 2H, Cz-H₂ $\times$ 2), 8.21, 8.40 (s, 2H, CH=N $\times$ 2), 7.79~8.13 (m, 6H, Cz-H₄ $\times$ 2, ArH $\times$ 4), 7.72 (d, *J*=8.5 Hz, 2H, Cz-H₁ $\times$ 2), 7.46, 7.58 (t, *J*=5.3 Hz, 2H, NH $\times$ 2), 6.78, 6.72 (d, *J*=9.0 Hz, 4H, ArH $\times$ 4), 4.50, 4.03 (d, *J*=6.0 Hz, 4H, COCH₂ $\times$ 2), 4.23~4.63 (m, 2H, NCH₂), 1.66~1.84 (m, 2H, NCH₂-CH₂), 1.22~1.37 (m, 2H, NCH₂CH₂CH₂), 0.89 (t, *J*=7.3 Hz, 3H, CH₃); IR (KBr) ν : 3344, 3277, 3075, 2956, 2867,

1684, 1632, 1598, 1528, 1501, 1466, 1314, 1249 cm⁻¹. HRMS (ESI) calcd for C₃₄H₃₃N₉O₆ [M-H]⁻ 662.2476, found 662.2479.

3.5 目标化合物生物活性测试

按照参考文献[59]的方法进行PTP1B抑制活性筛选实验.

3.6 代表目标化合物 6d、7f 和 11b 与 PTP1B 的分子对接

分子对接采用 Dockingserver 软件, 靶标 PTP1B 蛋白晶体结构(PDB ID:1NNY)从 RCSB 的 PDB 库 (<http://www.rcsb.org>)下载.

辅助材料(Supporting Information) 化合物 6~8 和 11 的 IR、¹H NMR、¹³C NMR、¹H-¹H COSY、NOESY 和 MS 谱图. 这些材料可以免费从本刊网站(<http://sioc-journal.cn/>)上下载.

References

- [1] Ji, W. J.; Chen, X. L.; Lv, J.; Wang, M.; Ren, S. T.; Yuan, B. X.; Wang, B.; Chen, L. N. *Int. J. Endocrinol.* **2014**, 2014, 312452.
- [2] Yang, L. L.; Chen, F.; Gao, C.; Chen, J. B.; Li, J. Y.; Liu, S. Y.; Zhang, Y. Y.; Wang, Z. Y.; Qian, S. J. *Enzyme Inhib. Med. Chem.* **2020**, 35, 152.
- [3] Salinas-Arellano, E.; Pérez-Vásquez, A.; Rivero-Cruz, I.; Torres-Colin, R.; González-Andrade, M.; Rangel-Grimaldo, M.; Mata, R. *Molecules* **2020**, 25, 3530.
- [4] Krishnan, N.; Konidaris, K. F.; Gasser, G.; Tonks, N. K. *J. Biol. Chem.* **2018**, 293, 1517.
- [5] Guo, S. J.; Wang, L. J.; Chen, D.; Jiang, B. *RSC Adv.* **2020**, 10, 3429.
- [6] Costa, G. C.; Montagnoli, T. L.; Silva, M. M. C.; Gamba, L. E. R.; Alves, B. E. O.; Silva, M. M. C.; Trachez, M. M.; Nascimento, J. H. M.; Pimentel-Coelho, P. M.; Mendez-Otero, R.; Lima, L. M.; Barreiro, E. J.; Sudo, R. T.; Zapata-Sudo, G. *Drug Des. Dev. Ther.* **2020**, 14, 3337.
- [7] Lu, Y. J.; Zhao, Z. D.; Chen, Y. X.; Wang, J.; Xu, S. C.; Gu, Y. J. *Asian Nat. Prod. Res.* **2021**, 23, 545.
- [8] Liu, K.; Ding, Y. Y.; Kang, C. M. *Pharm. Chem. J.* **2020**, 54, 345.
- [9] Mota, F. V. B.; Neta, M. S. A.; Franco, E. S.; Bastos, I. V. G. A.; Correia da Araújo, L. C.; Cabral da Silva, S.; Bezerra de Oliveira, T.; Souza, E. K.; Moraes de Almeida, V.; Ximenes, R. M.; Maia, M. B. S.; Junior, F. J. B. M.; Marchand, P.; Rodolfo de Faria, A.; Gonçalves da Silva, T. *Med. Chem. Commun.* **2019**, 10, 1916.
- [10] Sulaiman, A. T.; Sarsam, S. W. *Iraqi J. Pharm. Sci.* **2020**, 29, 207.
- [11] Aarjane, M.; Aouidate, A.; Slassi, S.; Amine, A. *Arab. J. Chem.* **2020**, 13, 6236.
- [12] Senthilkumar, S.; Seralathan, J.; Muthukumaran, G. *J. Mol. Struct.* **2021**, 1226, 129354.
- [13] Yang, Z.-B.; Li, P.; He, Y. J. *Molecules* **2019**, 24, 3766.
- [14] Silva M. F.; Lima E. T.; Pruccoli L.; Castro, N. G.; Guimarães, M. J. R.; Silva, F. M. R.; Nadur, N. F.; Luiz de Azevedo, L.; Kümmerle, A. E.; Guedes, I. A.; Dardenne, L. E.; Gontijo, V. S.; Tarozzi, A.; Viegas Jr, C. *Molecules* **2020**, 25, 3165.
- [15] Palwankar, S. M.; Kale, P. P.; Kadu, P. K.; Prabhavalkar, K. *J. Rep. Pharm. Sci.* **2020**, 9, 79.
- [16] Aminah, N. S.; Thant, T. M.; Kristanti, A. N.; Ramadhan, R.; Aung, H. T.; Takaya, Y. *Nat. Prod. Commun.* **2020**, 14, 1.
- [17] Chena, Y. M.; Cao, N. K.; Lv, H. N.; Zeng, K. W.; Yuan, J. Q.; Guo,

- X. Y.; Zhao, M. B.; Tu, P. F.; Jiang, Y. *Phytochemistry* **2020**, *170*, 112186.
- [18] Liu, Y. H.; Wu, Y. B.; Sun, L. Q.; Gu, Y. X.; Hu, L. X. *Eur. J. Med. Chem.* **2020**, *191*, 112181.
- [19] Yamashita, S.; Honda, R.; Fukuoka, M.; Kimura, T.; Hosokawa-Mutoc, J.; Kuwata, K. *Prion* **2020**, *14*, 42.
- [20] Wang, W. B.; Zhou, Z. G.; Zhou, X. H.; Chen, L. M.; Bie, S.; Jing, Z. *J. AMB Expr.* **2020**, *10*, 148.
- [21] Taheri, B.; Taghavi, M.; Zarei, M.; Chamkouri, N.; Mojaddami, A. *Bull. Chem. Soc. Ethiop.* **2020**, *34*, 377.
- [22] Balakrishnan, R.; Vijayaraja, D.; Jo, S.-H.; Ganesan, P.; Su-Kim, I.; Choi, D.-K. *Antioxidants* **2020**, *9*, 101.
- [23] Sadeghian, B.; Sakhteman, A.; Faghhi, Z.; Nadri, H.; Edraki, N.; IRaji, A.; Sadeghian, I.; Rezaei, Z. *J. Mol. Struct.* **2020**, *1221*, 128793.
- [24] Telehoiu, A. T.; Nuță, D. C.; Căprioaru, M. T.; Dumitrascu, F.; Zaru, I.; Ioniță, P.; Badiceanu, C. D.; Avram, S.; Chifiriuc, M. C.; Bleotu, C.; Limban, C. *Molecules* **2020**, *25*, 266.
- [25] Sutkuvienė, S.; Sakalauskaitė, S.; Kuliešienė, N.; Ragelienė, L.; Daugelavičius, R. *Biologija* **2020**, *66*, 80.
- [26] Caruso, A.; Ceramella, J.; Iacopetta, D.; Saturnino, C.; Mauro, M. V.; Bruno, R.; Aquaro, S.; Sinicropi, M. S. *Molecules* **2019**, *24*, 1912.
- [27] Ramalingam, A.; Sarvanan, J. *Int. J. Pharm. Investigation* **2020**, *10*, 594.
- [28] Du, L. F.; Wang, X. Y.; Cui, G. N.; Xu, B. L. *Bioorg. Med. Chem.* **2021**, *29*, 115878.
- [29] Alsantali, R. I.; Hussein, E. M.; Obaid, R. J.; Morad, M.; Altass, H. M.; Alharbi, A.; Hameed, A. M.; Jassas, R. S.; Abourehab, M. A. S.; Asghar, B. H.; Moussa, Z.; Ahmed, S. A. *Arab. J. Chem.* **2020**, *13*, 5451.
- [30] Wu, D. X.; Liu, M. H.; Li, Z.; Dang, M. M.; Liu, X. P.; Li, J. M.; Huang, L.; Ren, Y. G.; Zhang, Z.; Liu, W. D.; Liu, A. P. *Heterocycl. Commun.* **2019**, *25*, 8.
- [31] Abdel-Galil, E.; Girges, M. M.; Said, G. E. *ChemistrySelect* **2020**, *5*, 3075.
- [32] Shinde, V.; Mahulikar, P.; Mhaske, P. C.; Chakraborty, S.; Choudhari, A.; Phalle, S.; Choudhari, P.; Sarkar, D. *Med. Chem. Res.* **2019**, *28*, 805.
- [33] Singh, I. P.; Gupta, S.; Kumar, S. *Med. Chem.* **2020**, *16*, 4.
- [34] Morcos, M. M.; Abdelhafez, E. S. M. N.; Abdel-Rahman, H. M.; Abdel-Aziz, M.; El-Ella, D. A. A. *J. Adv. Biomed. Pharm. Sci.* **2020**, *3*, 45.
- [35] Özdemir, A.; Turanlı, S.; Çalýþkan, B.; Arka, M.; Banoglu, E. *Pharm. Chem. J.* **2020**, *53*, 1036.
- [36] Tokuhara, H.; Imaeda, Y.; Fukase, Y.; Iwanaga, K.; Taya, N.; Watanabe, K.; Kanagawa, R.; Matsuda, K.; Kajimoto, Y.; Kusumoto, K.; Kondo, M.; Snell, G.; Behnke, C. A.; Kuroita, T. *Bioorg. Med. Chem.* **2018**, *26*, 3261.
- [37] Adegboye, A. A.; Khan, K. M.; Salar, U.; Aboaba, S. A.; Kanwal, Chigurupati, S.; Fatima, I.; Taha, M.; Wadood, A.; Mohammad, J. I.; Khan, H.; Perveen, S. *Eur. J. Med. Chem.* **2018**, *150*, 248.
- [38] Brown, A. D.; Bagal, S. K.; Blackwell, P.; Blakemore, D. C.; Brown, B.; Bungay, P. J.; Corless, M.; Crawforth, J.; Fengas, D.; Fenwick, D. R.; Gray, V.; Kemp, M.; Klute, W.; Sanz, L. M.; Miller, D.; Murata, Y.; Payne, C. E.; Skerratt, S.; Stevens, E. B.; Warmus, J. S. *Bioorg. Med. Chem.* **2019**, *27*, 230.
- [39] Antoci, V.; Cucu, D.; Zbancioc, G.; Moldoveanu, C.; Mangalagiu, V.; Amariuca-Mantu, D.; Aricu, A.; Mangalagiu, I. I. *Future Med. Chem.* **2020**, *12*, 207.
- [40] Zhang, T. R.; Liu, Q. Q.; Ren, Y. J. *Tetrahedron* **2020**, *76*, 131027.
- [41] Spasov, A. A.; Zhukovskaya, O. N.; Maltsev, D. V.; Miroshnikov, M. V.; Skripka, M. O.; Sultanova, K. T.; Morkovnik, A. S. *Russ. J. Bioorg. Chem.* **2020**, *46*, 107.
- [42] Rahim, F.; Ullah, K.; Ullah, H.; Wadood, A.; Taha, M.; Rehman, A. U.; Uddin, I.; Ashraf, M.; Shaikat, A.; Rehman, W.; Hussain, S.; Khan, K. M. *Bioorg. Chem.* **2015**, *58*, 81.
- [43] Zhan, J. Y.; Ma, K.; Zheng, Q. C.; Yang, G. H.; Zhang, H. X. *J. Biomol. Struct. Dyn.* **2019**, *37*, 1724.
- [44] Rahima, F.; Tariq, S.; Taha, M.; Ullah, H.; Zaman, K.; Uddin, I.; Wadood, A.; Khan, A. A.; Rehman, A. U.; Uddin, N.; Zafar, S.; Shah, S. A. A. *Bioorg. Chem.* **2019**, *92*, 103284.
- [45] Zhang, Q.; Ding, D. R.; Zeng, S. X.; Ye, Q. Z.; Lu, H. *PloS One* **2012**, *7*, e46294.
- [46] Ali, R. S.; Saad, H. A. *Molecules* **2018**, *23*, 693.
- [47] Sivendran, S.; Jones, V.; Sun, D. Q.; Wang, Y.; Grzegorzewicz, A. E.; Scherman, M. S.; Napper, A. D.; McCammon, J. A.; Lee, R. E.; Diamond, S. L.; McNeil, M. *Bioorg. Med. Chem.* **2010**, *18*, 896.
- [48] Upadhyay, K.; Manvar, A.; Loddo, R.; Colla, P. L.; Virsodiya, V.; Trivedi, J.; Chaniyara, R.; Shah, A. *Med. Chem. Res.* **2013**, *22*, 3675.
- [49] Li, Y. J.; Wang, S. Y.; Jin, K.; Gao, L. X.; Sheng, L.; Zhang, N.; Liu, J.-H.; Li, J. *Chin. J. Org. Chem.* **2019**, *39*, 491 (in Chinese). (李英俊, 王思远, 靳焜, 高立信, 盛丽, 张楠, 刘继红, 李佳, 有机化学, **2019**, *39*, 491.)
- [50] Li, Y. J.; Liu, X. J.; Liu, J. H.; Gao, L. X.; Jin, K.; Sheng, L.; Yang, H. J.; Lin, L. D.; Li, J. *Chin. J. Org. Chem.* **2020**, *40*, 478 (in Chinese). (李英俊, 刘雪洁, 刘季红, 高立信, 靳焜, 盛丽, 杨鸿境, 林乐弟, 李佳, 有机化学, **2020**, *40*, 478.)
- [51] Li, Y. J.; Zhao, Y.; Jin, K.; Gao, L. X.; Sheng, L.; Liu, X. J.; Yang, H. J.; Lin, L. D.; Li, J. *Chin. J. Org. Chem.* **2019**, *39*, 2599 (in Chinese). (李英俊, 赵月, 靳焜, 高立信, 盛丽, 刘雪洁, 杨鸿境, 林乐弟, 李佳, 有机化学, **2019**, *39*, 2599.)
- [52] Hidrazitler, A. K.; Karakterizasyonu, S. *Hacettepe J. Biol. Chem.* **2018**, *46*, 169.
- [53] Ning, Y.-C. *Structural Identification of Organic Compounds and Organic Spectroscopy*, 2nd ed., Science Press, Beijing, **2000**, p. 53 (in Chinese). (宁永成, 有机化合物结构鉴定与有机波谱学, 第 2 版, 科学出版社, 北京, **2000**, p. 53.)
- [54] Li, Y. J.; Zhang, N.; Jin, K.; Xu, Y. T.; Wang, S. Y.; Zhou, X. X. *Chin. J. Org. Chem.* **2017**, *37*, 2640 (in Chinese). (李英俊, 张楠, 靳焜, 许永廷, 王思远, 周晓霞, 有机化学, **2017**, *37*, 2640.)
- [55] Li, Y. J.; Liu, L. J.; Jin, K.; Sun, S. Q.; Xu, Y. T. *Acta Chim. Sinica* **2010**, *68*, 1577 (in Chinese). (李英俊, 刘丽军, 靳焜, 孙淑琴, 许永廷, 化学学报, **2010**, *68*, 1577.)
- [56] Li, Y. J.; Yang, H. J.; Jin, K.; Lin, L. D.; Liu, X. J. *Chin. J. Magn. Reson.* **2020**, *37*, 496 (in Chinese). (李英俊, 杨鸿境, 靳焜, 林乐弟, 刘雪洁, 波谱学杂志, **2020**, *37*, 496 (in Chinese).)
- [57] Li, Y. J.; Li, J. Y.; Xu, Y. T.; Jin, K.; Cao, X. *Chin. J. Org. Chem.* **2017**, *37*, 896 (in Chinese). (李英俊, 李继阳, 许永廷, 靳焜, 曹欣, 有机化学, **2017**, *37*, 896.)
- [58] Grigoras, M.; Antonoia, N.-C. *Eur. Polym. J.* **2005**, *41*, 1079.
- [59] Sun, L. P.; Shen, Q.; Piao, H. H.; Ma, W. P.; Gao, L. X.; Zhang, W.; Nan, F. J.; Li, J.; Piao, H. R. *Eur. J. Med. Chem.* **2011**, *46*, 3630.

(Lu, Y.)