连续流动电化学促进的 Aza-Wacker 环化反应

彭西超 冯鹏举*

(暨南大学化学与材料学院 广州 510632)

Continuous-Flow Electrochemistry Promoted
Aza-Wacker Cyclizations

Peng, Xichao Feng, Pengju*

(Department of Chemistry, Jinan University, Guangzhou 510632)

饱和 *N*-杂环结构片段广泛存在于各类天然产物和生物活性物质中, 且有研究表明提高小分子药物的饱和度和有益于改善其临床表现^[1]. 鉴于此, 饱和 *N*-杂环化合物的合成受到化学家的广泛关注. 在众多饱和 *N*-杂环合成的方法中, Aza-Wacker 环化反应显示出独特的优越性, 这类反应以胺作为亲核试剂, 合成具有烯烃支链的饱和氮杂环分子, 产物可方便地进行多样化衍生. 经过一段时间的发展, 这类反应能够在催化量钯试剂及氧气为氧化剂的条件下完成^[2]. 该反应需要经过氨钯化历程生成产物, 该步骤具有可逆性, 且受烯烃位阻效应影响, 致使一些多取代烯烃的 Aza-Wacker 环化反应仍具有很大挑战. 发展无贵金属试剂、无化学氧化剂条件下的 Aza-Wacker 环化反应则有利于立足新机理, 拓展反应底物的实用范围, 同时能有效降低反应成本, 发展绿色合成化学^[3].

电化学合成通常在电压驱动下促使反应物电子得失, 发生后续的氧化还原反应, 在反应过程中无需使用化学氧化剂或还原剂, 直接提供电子或攫取电子, 反应符合绿色化学要求^[4]. 大多数电合成方法的报道主要是用单电解槽或 H 型电解槽, 这类反应常伴随底物转化率慢, 反应选择性较低及反应复现较低的缺点^[5]. 连续流动电化学能有效解决传统电解槽反应的缺点, 促进化学反应快速高选择性转化^[6]. 厦门大学化学化工学院徐海超课题组^[7]一直致力于利用有机电化学, 为有机合成开发可持续的氧化还原反应, 在连续流动电化学合成方法和工艺探索方面做了一系列原创工作. 近日, 该团队^[8]利用连续流动电化学实现了无催化剂、无添加剂、无电解质的形式 Aza-Wacker 环化反应, 温和条件下合

成了结构丰富的饱和 *N*-杂环化合物, 值得注意的是该转化反应在传统电解槽装置中无任何产物生成(图 1).

Continuous-flow electrochemistry:

Batch electrochemistry:

图 1 流动型电化学实现 Aza-Wacker 环化

Figure 1 Formal Aza-Wacker cyclizations in a continuous-flow cell via radical cyclization

该方法基于反应物与电极片表面的紧密接触进行电化学反应, 不同溶剂的选择对于该反应的收率有着显著的影响. 相较于以前的报道, 该反应底物兼容性更好, 如硅基醚、缩酮、羟基、叠氮、烯烃和杂芳环等都能在反应中幸存(图 2). 各类二取代、三取代、四取代的烯烃均可经过此策略合成各类单环、螺环、并环、多环饱和 *N*-杂环化合物. 不同于金属催化的 Aza-Wacker 环化反应, 该方法中所使用到的磺胺底物所产生的磺胺氮自由基具有更好的亲电性, 从而高效地与烯烃进行链反应, 值得一提的是三取代和四取代的烯烃反应效果往往比

* Corresponding author. E-mail: pfeng@jnu.edu.cn. Published online June 9, 2021.

二取代的烯烃反应更佳. 复杂分子也能高效地完成连续流动电化学 Aza-Wacker 环化反应, 显示出该策略的普适性. 反应可以采用并联流动电化学装置的方式进行放大, 作者以 10 g 级进行较大规模制备, 结果显示反应收率与小量反应相当.

机理研究表明, 底物的磺酰胺基团可能经质子耦合电子转移机制在电极表面发生氧化反应, 失去单电子形成 N 自由基, 该自由基与双键相互作用生成氮杂环, 再经

由后续电极表面氧化脱氢, 形成最终产物.

徐海超团队成功实现了这类电化学 Aza-Wacker 反应, 操作简单、条件温和、后处理方便、基本不产生化学废弃物、兼容于各类取代烯烃以及在医药和工业方面有很好的应用前景. 同时这项工作表明连续流动电化学在开发新反应、探索新反应模式、推动绿色可持续合成化学发展具有显著优势.

图 2 流动电化学促进的 Aza-Wacker 环化的代表性产物举例

Figure 2 Represent products of continuous-flow electrochemical Aza-Wacker cyclization

References

- [1] Vitaku, E.; Smith, D. T.; Njardarson, J. T. *J. Med. Chem.* **2014**, *57*, 10257.
- [2] McDonald, R. I.; Liu, G. S.; Stahl, S. S. *Chem. Rev.* **2011**, *111*, 2981.
- [3] Caron, S.; Dugger, R. W.; Ruggeri, S. G.; Ragan, J. A.; Ripin, D. H. *Chem. Rev.* **2006**, *106*, 2943.
- [4] Yuan, Y.; Lei, A. *Acc. Chem. Res.* **2019**, *52*, 3309.
- [5] Yan, M.; Kawamata, Y.; P. S. Baran, *Chem. Rev.* **2017**, *117*, 13230.
- [6] Pletcher, D.; Green, R. A.; Brown, R. C. D. *Chem. Rev.* **2018**, *118*, 4573.
- [7] Chen, N.; Xu, H.-C. *Chem. Rec.* **2021**, *21*, doi: 10.1002/tcr.202100048
- [8] Huang, C.; Li, Z.-Y.; Song, J.; Xu, H.-C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2021**, *60*, 11237.

(Lu, Y.)