氮杂环卡宾配位的双核钴碳基配合物催化炔烃与三级硅烷的 马氏选择性硅氢化反应

陈杰坪 陆展*

(浙江大学化学系 杭州 310027)

Markovnikov Hydrosilylation of Alkynes with Tertiary Silanes via N-Heterocyclic Carbene-Promoted Dinuclear Cobalt Carbonyl Catalysis

Chen, Jieping Lu, Zhan*

(Department of Chemistry, Zhejiang University, Hangzhou 310027)

烯基硅化合物是一类重要的原料, 被广泛用于有机合成、高分子化学和材料科学领域^[1]. 过渡金属催化炔烃的直接硅氢化反应是合成烯基硅化合物最高效和最原子经济性的方法之一. 因此, 该反应受到越来越广泛的关注^[2]. 然而, 炔烃与硅烷化合物的硅氢化反应过程中存在着化学选择性和区域选择性问题(图 1). 例如炔烃可以和硅烷反应生成半氢化的副产物, 炔烃可以发生单次硅氢化生成烯基硅产物, 也可能发生过度转化生成双硅化合物. 同时, 炔烃的硅氢化可以生成三种不同的加成产物, 即马氏加成产物(α -烯基硅)和反马氏加成产物(β -*E*)-烯基硅和 β -*Z*-烯基硅. 因此, 实现炔烃硅氢化的选择性调控是一个具有挑战性的难题.

图 1 炔烃的硅氢化反应
Figure 1 Hydrosilylation of alkynes

在以往文献报道中, 金属催化炔烃的硅氢化反应一般得到反马氏选择性的产物. 目前, 金属催化炔烃的马氏选择性硅氢化反应报道例子较少. 2001 年, Trost 课题组^[3]报道了[CpRu(MeCN)₃][PF₆]₃催化的非导向末端炔烃

的硅氢化反应. 随后, 陆展^[4]和黄正课题组^[5]各自独立报道了地球丰产金属钴催化剂催化炔烃与一级或二级硅烷的硅氢化反应, 高效制备 α -烯基硅化合物, 但这些催化剂一般不适用于三级硅烷. Pawluc 和 Isobe 课题组^[6]分别报道了利用三级硅烷的炔烃马氏选择性硅氢化反应, 但这些反应存在底物范围受限以及反应选择性差等问题. 因此, 发展地球丰产金属催化剂催化炔烃与三级硅烷的区域选择性硅氢化反应具有重要意义.

最近, 中国科学院上海有机化学研究所邓亮团队^[6]利用羰基双钴氮杂环卡宾配合物[(IPr)₂Co₂(CO)₆]作为预催化剂, 实现了末端炔烃与三级硅烷的马氏选择性硅氢化反应(图 2). 该催化体系可以用于高效制备 α -烯基硅和含硅聚合物, 并具有反应选择性高、官能团兼容性好以及底物范围广等优点. 机理研究表明, 单氮杂环卡宾(NHC)-二钴物种可能是反应过程中真正的催化活性物种; 催化体系中炔烃独特的配位模式以及 NHC 配体的空间位阻特性导致反应具有较高的 α -选择性.

作者对该催化体系的底物适用范围进行探索时发现, 反应具有很好的底物兼容性. 带有醇、醚、卤代烃、胺、腈、酯等取代基的芳香炔烃、烷基炔烃均能参与反应, 并具有较高的选择性. 同时, 反应体系也可以兼容多种三级硅烷. 但对于大位阻的炔烃, β -*E*的产物比例显著提升. 利用这种方法, 作者进行了克级产物的合成, 并且实现了其后续的转化, 通过 Hiyama 偶联制备了高附加值的 1,1-二取代烯烃化合物.

* Corresponding author. E-mail: luzhan@zju.edu.cn. Published online August 23, 2021.

图2 $[(\text{IPr})_2\text{Co}_2(\text{CO})_6]$ 催化的炔烃硅氢化反应Figure 2 Hydrosilylation of alkynes catalyzed by $[(\text{IPr})_2\text{Co}_2(\text{CO})_6]$

作者进一步对反应的机理进行探究. 预催化剂 **1** 的化学计量反应, 钴配合物 **1**~**5** 的催化反应动力学实验和氘代实验表明, 单(NHC)-二钴物种可能是反应过程

中真正的催化物种. 预催化剂 **1** 与苯乙炔在 $60\text{ } ^\circ\text{C}$ 下反应, 可以分离得到炔桥二钴配合物 **2** 和 **3**. **1** 与三乙基硅烷在 $60\text{ } ^\circ\text{C}$ 下反应, 可以分离得到钴硅配合物 **4**. 单(NHC)二钴炔桥配合物 **2** 可以与硅烷在室温下反应生成 α -烯基硅以及钴硅配合物 **4**. 配合物 **2** 与硅烷反应生成钴硅物种 **4**, 而不是 $(\text{IPr})\text{Co}_2(\text{CO})_5$, 表明高活性的 $(\text{IPr})\text{-Co}_2(\text{CO})_5$ 一旦形成, 可能会迅速与硅烷反应生成配合物 **4**. 相比于配合物 **2**, 配合物 **3** 需要在 $60\text{ } ^\circ\text{C}$ 下才能与硅烷反应, 生成 α -烯基硅及二(NHC)-四羰基二钴配合物 **5**(图 3). 动力学实验表明, 单(NHC)-二钴炔桥配合物 **2** 与苯乙炔、硅烷的催化活性高于其他配合物 **1, 3**~**5**. 氘代实验表明反应经历了 Si-H 的顺式加成过程.

根据相应的实验结果, 作者提出了可能的反应机理. 在诱导期内, 预催化剂 **1** 与炔烃反应产生 **2** 和 **3**. 配合物 **2** 和 **3** 中的 CO、IPr 配体解离生成中间体 **6**, 硅烷与 **6** 配位生成 **7**, 然后经历 σ -复分解生成炔桥钴硅物种, 然后炔桥解离形成中间体 **8**, **8** 与炔烃反应再生成活性中间体 **6**. 由于氮杂环卡宾配体和 R' 取代基的空间位阻, 使得在配合物 **9** 中, $\angle 1$ (144.6°) 远大于 $\angle 2$ (124.9°). 在

图3 钴催化硅氢化反应的机理研究

Figure 3 Mechanistic studies on the cobalt-catalyzed hydrosilylation reaction

图4 硅烷与钴-碳键可能的作用模式

Figure 4 Possible interaction modes of hydrosilane with Co—C bonds

这种空间环境下, HC-Co(CO)_2 与 H-SiR_3 发生的 σ -复分解反应具有一定的立体选择性(图 4). 由于硅取代基与炔烃取代基的空间互斥, 在四元环过渡态中, 硅取代基倾向于位于钴的 α 位而非 β 位. 因此, 这种空间位阻使得反应的选择性以马氏选择性为主. 同时, 这也解释了使用位阻较小的氮杂环卡宾配体(IMes)会使反应区域选择性变差; 使用大位阻的炔烃底物, 会使反应倾向于生成反马氏硅氢化的产物.

该结果不仅为合成全取代烯基硅提供了一种有效的方法, 而且还提出了硅氢化反应的新机制, 为后续的选择性反应提供了参考依据.

References

- [1] Almeida, L. D.; Wang, H.; Junge, K.; Cui, X.; Beller, M. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2021**, 60, 550.
- [2] (a) Sun, J.; Deng, L. *ACS Catal.* **2016**, 6, 290.
(b) Chen, J.; Guo, J.; Lu, Z. *Chin. J. Chem.* **2018**, 36, 1075.
(c) Cheng, Z.; Guo, J.; Lu, Z. *Chem. Commun.* **2020**, 56, 2229.
- [3] Trost, B. M.; Ball, Z. T. *J. Am. Chem. Soc.* **2001**, 123, 12726.
- [4] Guo, J.; Lu, Z. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2016**, 55, 10835.
- [5] Zuo, Z.; Yang, J.; Huang, Z. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2016**, 55, 10839.
- [6] (a) Skrodzki, M.; Patroniak, V.; Pawluc, P. *Org. Lett.* **2021**, 23, 663.
(b) Huang, K.-H.; Isobe, M. *Eur. J. Org. Chem.* **2014**, 2014, 4733.
- [7] Wang, D.; Lai, Y.; Wang, P.; Leng, X.; Xiao, J.; Deng, L. *J. Am. Chem. Soc.* **2021**, 143, 12847.

(Lu, Y.)