基于自由基 Smiles 重排的芳基迁移还原交叉偶联反应

颜婉莹 黄华文*

(湘潭大学化学学院 湖南湘潭 411105)

Radical Smiles Rearrangement Enabling Migratory Reductive Cross Coupling

Yan, Wanying Huang, Huawen*

(Department of Chemistry, Xiangtan University, Xiangtan, Hunan 411105)

Smiles 重排是指分子内的亲核芳香取代反应, 该类型反应最早可追溯到 1894 年 Henricque 的研究发现, 并在 20 世纪 30 年代由 Smiles 教授发展并进行了系统的研究. 此后, 这类反应得到了蓬勃发展, 在有机化学、材料化学、药物化学等领域中得到了广泛的应用. 20 世纪 70 年代, Speckamp 等^[1]报道了单电子转移 Smiles 重排过程, 此后自由基型 Smiles 反应得到了一定程度的发展. 这些新方法一定程度上弥补了传统离子型 Smiles 重排反应常见的底物局限性, 但一般情况下需额外加入当量的氧化剂. 近年来, 镍催化的双亲电试剂还原交叉偶联取得快速发展, 此类反应条件温和, 能避免对空气及湿气敏感的金属试剂的使用, 是传统经典交叉偶联反应的重要补充, 引起了合成研究者的广泛关注^[2].

近日, 吉首大学化学化工学院唐石团队与南昌航空大学环境与化学工程学院李金恒以及北京理工大学化学化工学院陈世超等合作, 创造性地设计了一类芳基迁移分子骨架前体 *N*-苄基- β -溴氨基酸酯, 发展了一种新颖的镍催化串联 Smiles 重排/还原交叉偶联反应, 实现远程迁移交叉偶联反应, 高非对映选择性地合成一系列 β -芳基化氨基酸酯^[3].

如图 1 所示, 作者认为氨基酸酯溴化物(**1a**)可以在镍和还原剂的作用下发生单电子还原及脱溴, 形成烷基自由基中间体 **Int-I**, 然后分子内原位进攻苄基芳环, 生成螺环自由基 σ -复合物 **Int-II**, 随后 C(sp²)-C(sp³)键发生均裂生成 α -氨基烷基自由基 **Int-III**. 在另一侧交叉偶联催化循环中, Ni^{II} 首先与 Zn 作用被还原为 Ni⁰ 物种, 然后与芳基溴(**2a**)进行氧化加成产生 ArNi^{III}Br 复合物, 该复合物与 α -氨基烷基自由基中间体 **Int-III** 进行加形成

成三价镍络合物 **Int-IV**. 最后, 络合物 **Int-IV** 经过还原消除反应生成最终产物 **3aa**.

图 1 镍催化 Smiles 重排的还原偶联

Figure 1 Ni-catalyzed Smiles rearrangement/reductive coupling

对底物芳基溴化物范围的考察结果表明, 含各种功能性取代基的底物, 比如氰基、酯基、乙酰基、乙酰氧基、卤素和频哪醇硼酸酯等, 都能得到较好的反应产率和优异的非对映选择性. 此外, 杂环化合物比如喹啉、吡啶溴化物也能顺利发生反应, 生成对应的 β -芳基化的氨基酸酯. 然而, 富含电子的芳基溴化物, 如间甲基溴苯、对甲氧基溴苯等在这个串联反应中, 反应效果不太理想. 通过对 *N*-苄基- β -溴氨基酸酯底物普适性研究表明, 该方法兼容各种烷基、卤素和芳基等官能团.

* Corresponding author. E-mail: hwhuang@xtu.edu.cn. Published online August 24, 2021.

图2 镍催化 Smiles 重排的还原偶联代表性产物举例

Figure 2 Represent products of Ni-catalyzed Smiles rearrangement/reductive coupling

对于对称性芳烃和非对称性芳烃都有较好的反应效果。同时,作者对芳基的迁移顺序进行研究,发现富电子芳环相较其他芳环会优先迁移。

作者通过一系列控制实验研究,证实了反应经历了自由基的历程。同时,密度泛函理论(DFT)计算结果表明,烷基自由基物种 **Int-I** 形成关键的螺环中间体 σ -复合物 **Int-II** 是吸热过程,过渡态能垒为 61.5 kJ/mol。螺环复合物 **Int-II** 的 C—C 键均裂解离需克服 54.4 kJ/mol 的能垒。基于控制实验和理论计算结果,作者提出了一种基于 Smiles 重排与还原交叉偶联两种催化循环相偶联的反应机制。此外,通过镍物种[Ar-Ni(L)-Br]的设计合成及运用,以及反应副产物的监测与捕捉,也为催化循环的偶联机制提供了有力证据^[4]。

唐石等将 Smiles 重排反应与还原交叉偶联结合,构建了一种新的基团迁移骨架分子 *N*-苄基氨基酸酯,在镍的催化之下成功地实现串联自由基 1,4-芳基迁移/还原交叉偶联反应,产物具有很好的立体选择性。该反应具有步骤简单、条件温和、后处理简便等优点。

References

- [1] (a) Tang, S.; Yuan, L.; Deng, Y.-L.; Li, Z.-Z.; Wang, L.-N.; Huang, G.-X.; Sheng, R.-L. *Tetrahedron Lett.* **2017**, *58*, 329.
(b) Tang, S.; Deng, Y.-L.; Li, J.; Wang, W.-X.; Ding, G.-L.; Wang, M.-W.; Xiao, Z.-P.; Wang, Y.-C.; Sheng, R.-L. *J. Org. Chem.* **2015**, *80*, 12599.
(c) Wang, S.-W.; Yu, J.; Zhou, Q.-Y.; Chen, S.-Y.; Xu, Z.-H.; Tang, S. *ACS Sustainable Chem. Eng.* **2019**, *7*, 10154.
- [2] (a) Ye, Y.; Gong, H. *Chin. J. Org. Chem.* **2020**, *40*, 2588 (in Chinese).
(叶杨, 龚和贵, 有机化学, **2020**, *40*, 2588.)
(b) Tang, S.; Li, S.-H.; Zhou, D.; Zeng, H.-Q.; Wang, N.-X. *Sci. China Chem.* **2013**, *56*, 1293.
(c) Tang, S.; Zhou, D.; Li, S.-H.; Wang, N.-X. *Res. Chin. Univ.* **2013**, *29*, 678.
- [3] Tang, S.; Xu, Z.-H.; Liu, T.; Wang, S.-W.; Yu, J.; Liu, J.; Hong, Y.; Chen, S.-L.; He, J.; Li, J.-H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2021**, *60*, 21360.
- [4] (a) Zhang, H.; Gu, Q.; You, S. *Chin. J. Org. Chem.* **2019**, *39*, 15 (in Chinese).
(张慧君, 顾庆, 游书力, 有机化学, **2019**, *39*, 15.)
(b) Yu, J.; Sheng, H.-X.; Wang, S.-W.; Xu, Z.-H.; Tang, S.; Chen, S.-L. *Chem. Commun.* **2019**, *55*, 4578.
(c) Tang, S.; Deng, Y.-L.; Li, J.; Wang, W.-X.; Wang, Y.-C.; Li, Z.-Z.; Yuan, L.; Chen, S.-L.; Sheng, R.-L. *Chem. Commun.* **2016**, *52*, 4470.

(Lu, Y.)