c 型硫肽抗生素中二氢咪唑并哌啶的生物合成

朱宏杰 戈惠明*

(南京大学医药生物技术国家重点实验室 南京 210023)

Biosynthesis of Central Imidazopiperidine Heterocycle in Series c Thiopeptide Antibiotic

Zhu, Hongjie Ge, Huiming*

(State Key Laboratory of Pharmaceutical Biotechnology, Nanjing University, Nanjing 210023)

硫肽类抗生素是一类高度修饰的核糖体肽类天然产物,具有良好的抗菌活性,特别是针对许多耐药病原体,因此一直被视为开发新型抗生素的候选分子^[1-2]. 硫肽类抗生素结构中一般包含唑杂环、脱水氨基酸以及一个以氮杂六元环为核心的大环骨架. 其中,根据核心氮杂六元环氧化程度和取代基的不同,可以将硫肽类抗生素分为 *a*, *b*, *c*, *d* 和 *e* 五种类型(图 1A). 在合成机制上,

氮杂六元环通过[4+2]环加成反应生成,随后通过进一步脱水、还原形成 *b* 型硫肽中的脱氢哌啶环,若再次还原则形成 *a* 型硫肽中的哌啶环;而环加成后发生脱水 and 前导肽切除,则形成 *d* 型硫肽的吡啶环,进一步羟基化可形成 *e* 型硫肽的羟基吡啶环. 目前,关于 *a*, *b*, *d* 和 *e* 型硫肽的生物合成过程已有较多研究^[3-4],但对于具有复杂二氢咪唑并哌啶结构的 *c* 型硫肽,还缺乏对应的生

图 1 硫肽类抗生素分类(A)及 Sch40832 的生物合成过程(蓝色表示咪唑并哌啶合成,绿色表示糖基化)

Figure 1 Thiopeptide classification (A) and biosynthesis of Sch40832 (blue for imidazopiperidine formation and green for glycosylation)

* Corresponding author. E-mail: hmge@nju.edu.cn. Published online September 4, 2021.

物合成研究。

中国科学院上海有机化学研究所刘文课题组一直致力于硫肽类抗生素的生物合成研究,特别是在唑杂环的合成及双环硫肽的侧环构建方面取得了一系列重要的研究成果^[5-8]。近期,该课题组对 *c* 型硫肽核心二氢咪唑并哌啶的生物合成过程进行了完整解析(图 1B),填补了关于 *c* 型硫肽生物合成机制研究方面的空白^[9]。

产自 *M. carbonacea* ATCC 39149 的 Sch40832,是目前唯一报道的 *c* 型硫肽抗生素。通过与产生 *a* 或 *b* 型硫肽抗生素的生物合成基因簇比较,作者首先定位到 4 个可能与 Sch40832 中咪唑并哌啶形成相关的基因: *schW*(编码 NADPH 依赖的还原酶)、*schX*(编码 SAM 依赖的甲基转移酶)、*schY*(编码细胞色素 P450 酶)和 *schZ*(编码 F_{420} 依赖的还原酶)。由于 *M. carbonacea* ATCC 39149 无法进行遗传操作,因此作者选择能产生类似前体的菌株作为宿主,将 *schZ*, *schW*, *schX* 和 *schY* 以不同组合进行异源表达,并完成了由脱氢哌啶硫肽(*b* 型)经哌啶硫肽(*a* 型)到最终咪唑并哌啶硫肽(*c* 型)

的生成,证实这四个基因参与了 *c* 型硫肽中咪唑并哌啶环的构建。随后作者通过进一步的体外生化实验分析,阐释了完整的咪唑并哌啶环的生物合成机制:在硫肽基本骨架形成之后,首先由 F_{420} 依赖的还原酶 SchZ 催化脱氢哌啶还原为哌啶环,然后由细胞色素 P450 酶 SchY 催化氧化重排。首先使与哌啶环相邻的噻唑环环氧化,随后伴随 C—N 键形成和 C—S 键断裂得到具有咪唑并哌啶环的 *c* 型硫肽中间产物(图 2)。生成的中间产物进一步经 SchX 和 SchW 分别对咪唑并哌啶环上的巯基和醛基进行甲基化和还原,从而得到稳定的硫肽分子(图 2)。

该项工作结合体内体外生化实验,完整解析了独特的 *c* 型硫肽中核心单元二氢咪唑并哌啶的生物合成机制,拓展了对硫肽类抗生素的认知,为通过合成生物学手段改造和创建新的硫肽类抗生素提供了启发。解读了一种罕见的自然界加工核糖体肽序列,以增加其结构复杂性和多样性的过程,为以后通过生物工程构造不同的功能生物分子提供了指导。

图 2 SchZYXW 的催化过程
Figure 2 Catalytic process of SchZYXW

References

- [1] Bagley, M. C.; Dale, J. W.; Merritt, E. A.; Xiong, X. *Chem. Rev.* **2005**, *105*, 685.
- [2] Ortega, M. A.; van der Donk, W. A. *Cell. Chem. Biol.* **2016**, *23*, 31.
- [3] Wang, S.; Zhou, S.; Liu, W. *Curr. Opin. Chem. Biol.* **2013**, *17*, 626.
- [4] Li, C.; Kelly, W. L. *Nat. Prod. Rep.* **2010**, *27*, 153.
- [5] Lin, Z.; Ji, J.; Zhou, S. X.; Zhang, F.; Wu, J. Q.; Guo, Y. L.; Liu, W. *J. Am. Chem. Soc.* **2017**, *139*, 12105.
- [6] Du, Y. N.; Qiu, Y. P.; Meng, X.; Feng, J. Y.; Tao, J.; Liu, W. *J. Am. Chem. Soc.* **2020**, *142*, 8454.
- [7] Zheng, Q. F.; Wang, S. F.; Duan, P. P.; Liao, R. J.; Chen, D. D.; Liu, W. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **2016**, *113*, 14318.
- [8] Qiu, Y. P.; Du, Y. N.; Zhang, F.; Liao, R. J.; Zhou, S. X.; Peng, C.; Guo, Y. L.; Liu, W. *J. Am. Chem. Soc.* **2017**, *139*, 18186.
- [9] Cheng, B. T.; Guo, H.; Wang, H. Y.; Zhao, Q. F.; Liu, W. *J. Am. Chem. Soc.* **2021**, *143*, 13790.

(Lu, Y.)