基于 SmI_2/Sm -芳基硼酸酯组合的芳香叔酰胺还原芳基化

王爱娥* 黄培强*

(厦门大学化学化工学院化学系 福建省化学生物学重点实验室 福建厦门 361005)

 SmI_2/Sm -Arylbaboronic Esters Combination for the Reductive Arylation of Aromatic Tertiary Amides

Wang, Ai-E* Huang, Pei-Qiang*

(Fujian Provincial Key Laboratory of Chemical Biology, Department of Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)

低活性分子或低活性化学键的选择性活化和转化是合成化学的一个重要研究方向,可彻底改变有机合成的途径和策略,实现资源的高效利用,具有十分重要的科学意义和应用价值。

酰胺是有机化学中一种常见的官能团,广泛存在于许多功能分子如肽、蛋白质、药物、农药和天然产物中。然而,由于酰胺氮原子上孤对电子和羰基的强共振作用,使得酰胺的 C—N 键难于断裂,同时酰胺羰基的亲电性显著降低,从而导致酰胺转化十分困难,通常需要剧烈的反应条件或多步骤过程。而从合成角度出发,将自然界广泛存在的酰胺化合物,通过酰胺键活化实现官能团转化具有广阔的应用前景,特别是通过酰胺还原(脱氧)烷基化形成 C—C 键直接将酰胺转化为结构多样的胺类化合物,在有机和药物合成中有诸多需求,是有机合成领域的挑战之一。

2010 年,黄课题组以三氟甲磺酸酐($\text{ Tf}_2\text{O}$)为活化试剂,发展了普通叔酰胺的还原双烷基化^[1]和还原烷基化反应^[2]。自此,酰胺的还原(脱氧)官能化引起化学工作者的广泛关注^[3]。目前,国内外多个课题组发展了酰胺的还原官能化方法。所报道的策略可大致分为三类(Scheme 1):一是使用 $\text{ Tf}_2\text{O}$ 等亲电活化试剂,二是采用 $\text{ Cp}_2\text{ZrHCl}$ 等金属氢化物还原,三是基于过渡金属如 Ir 催化的硅氢化体系。

黄课题组在 $\text{ Tf}_2\text{O}$ 活化酰胺还原烷基化方面做了深入研究,取得了具有重要影响的成果。而 Chida/Sato 课题组在 Ganem 开创性内酰胺还原氰基化的工作基础上^[4],成功地将 $\text{ Cp}_2\text{ZrHCl}$ 试剂应用于普通酰胺的还原

图式 1 酰胺还原官能化的方法

Scheme 1 Methods for the reductive functionalization of amides

官能化中^[5]。Dixon 课题组则在 Nagashima 发展的 Ir 催化硅烷还原酰胺的基础上^[6],首次将 Ir 催化的硅氢化体系应用于内酰胺的分子内还原 Nitro-Mannich 反应^[7],自此,金属催化的酰胺还原官能化也得到蓬勃发展。

目前,酰胺还原官能化已发展成为一类合成含氮化合物的直接高效的新方法,被成功应用于许多天然产物的合成。然而,发展新型的酰胺还原官能化方法仍然具有重要意义。

最近,中国科学院上海有机化学研究所王晓明课题组在 Ogawa/Sonoda $\text{ SmI}_2/\text{Sm}$ 单电子还原酰胺方法的基础上^[8],巧妙地将 SmI_2 还原和有机硼试剂的 1,2-芳基迁移化学融合,采用 $\text{ SmI}_2/\text{Sm}$ 混合体系和硼酸酯结合,在催化量 $[\text{ Pd}(\text{ PPh}_3)_4]$ 存在下,实现了芳香叔酰胺的还原芳基化(Scheme 2)^[9]。该方法具有对杂环兼容性好,操作简单,反应条件温和,且避免了对水汽敏感的芳基金属

* Corresponding authors. E-mail: aiewang@xmu.edu.cn; pqhuang@xmu.edu.cn. Published online August 22, 2021.

图式 2 SmI₂/Sm 还原和有机硼的 1,2-芳基迁移融合策略用于叔酰胺还原芳基化

Scheme 2 Merging SmI₂/Sm reduction system with 1,2-aryl migration of organoboranes for the reductive arylation of tertiary amides

试剂的使用等优点, 可以以中等至良好的收率方便地合

成一系列具有潜在生物活性的二芳基甲胺类化合物 (Scheme 3A).

为了展示所发展方法的实用性和应用价值, 作者将该方法应用于一些药物分子的后期转化和修饰 (Scheme 3A) 以及药物分子的合成中 (Scheme 3B). 如二级胺 Norquetiapine 和 Desloratadine 衍生的酰胺和一些含苯甲酰胺结构的药物分子, 如 CX-546 和 Trimetozine, 都可通过该方法转化得到相应的二芳基甲胺. 从苯甲酰胺类化合物出发, 该方法也可以直接合成如 Mecilizine、Buclizine 和 Cinnarizine 等包含二芳基甲胺结构的药物分子. 初步的机理研究表明, 反应可能涉及 α -氨基卡宾类中间体, 而 Pd(PPh₃)₄ 作为添加剂提高反应活性的作用尚不清楚, 具体的机理有待于进一步的研究.

图式 3 药物分子的后期修饰和合成

Scheme 3 Late-stage functionalization of drug molecules and synthesis of drug molecules

References

- [1] Xiao, K.-J.; Luo, J.-M.; Ye, K.-Y.; Wang, Y.; Huang, P.-Q. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2010**, *49*, 3037.
- [2] Xiao, K.-J.; Wang, Y.; Ye, K.-Y.; Huang, P.-Q. *Chem.-Eur. J.* **2010**, *16*, 12792.
- [3] Czerwiński, P. J.; Furman, B. *Trends Chem.* **2020**, *2*, 782.
- [4] Xia, Q.; Ganem, B. *Org. Lett.* **2001**, *3*, 485.
- [5] Oda, Y.; Sato, T.; Chida, N. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 950.
- [6] Motoyama, Y.; Aoki, M.; Takaoka, N.; Aoto, R.; Nagashima, H. *Chem. Commun.* **2009**, 1574.
- [7] Gregory, A. W.; Chambers, A.; Hawkins, A.; Jakubec, P.; Dixon, D. *J. Chem.-Eur. J.* **2015**, *21*, 111.
- [8] Ogawa, A.; Takami, N.; Sekiguchi, M.; Ryu, I.; Kambe, N.; Sonoda, N. *J. Am. Chem. Soc.* **1992**, *114*, 8729.
- [9] Jiao, J.; Wang, X. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2021**, *60*, 17088.

(Cheng, F.)