光电技术在含硒杂环合成中的应用研究

王 薪^a 张 艳^b 孙 凯^{*,b} 孟建萍^b 张 冰^{*,a}^(a) 郑州大学化学工程学院 郑州 450001^(b) 烟台大学化学与化学工程学院 山东烟台 264005

摘要 含硒杂环是一类重要的有机分子,在医药、农用化学品、有机材料等领域有着广泛的应用。因此,有机分子中引入硒原子在合成化学中具有重要意义。可见光和电化学技术是较为绿色、可持续的合成方法之一,在不饱和键的双官能化、环化以及 C—H 键的直接官能化等领域开辟了广阔的应用前景。近年来,发展新颖的利用光电技术驱动不饱和键的硒环化反应和 C—H 键的直接硒化反应备受关注。分别描述了近年快速发展的电化学驱动、可见光诱导含硒杂环的合成反应,并对部分反应的适用范围和机理进行了讨论。

关键词 有机硒化合物; 硒环化; 烯炔烃; 可见光; 电化学

Study on the Application of Photoelectric Technology in the Synthesis of Selenium-Containing Heterocycles

Wang, Xin^a Zhang, Yan^b Sun, Kai^{*,b} Meng, Jianping^b Zhang, Bing^{*,a}^(a) School of Chemical Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001^(b) School of Chemistry and Chemical Engineering, Yantai University, Yantai, Shandong 264005

Abstract Selenium-containing heterocycles are a kind of important organic molecules, which are widely used in medicine, agrochemicals, organic materials and other fields. Therefore, the introduction of selenium atom into organic molecules is of great significance in synthetic chemistry. Visible light and electrochemical technology is one of the green and sustainable synthesis methods, which has opened up broad application prospects in the fields of bifunctionalization and cyclization of unsaturated bonds and direct functionalization of C—H bonds. In recent years, the development of novel selenium cyclization reaction using photoelectric technology to drive unsaturated bonds and direct selenization reaction of C—H bonds has attracted much attention. Therefore, this paper describes the electrochemical-driven and visible-light-induced synthesis reactions of selenium-containing heterocycles, and discusses the applicable scope and mechanism of some reactions.

Keywords organic selenium compounds; selenium cyclization; alkenes and alkynes; visible light; electrochemistry

有机硒化合物在合成领域引起了越来越多的关注^[1],其在生物科学等领域具有重要的潜在应用^[2],可以作为抗癌^[3]、抗阿尔茨海默病^[4]、抗菌^[5]、抗病毒^[6]、抗炎^[7]、抗糖尿病^[8]、抗抑郁药物等用途^[9](图 1)。它们在现代有机合成和材料科学中也发挥着重要作用^[10]。20 世纪 70 年代以来,拥有生物活性结构的有机硒化合物的设计和合成已经达到了一个新的领域,许多报道描述了多种硒蛋白的鉴定,这些硒蛋白参与了广泛的生物过程,如抗氧化防御、免疫反应和甲状腺激素的产生^[11a]。其中,二硒化合物是非常有价值的有机分子,因为 Se—

Se 键的存在赋予了其特殊的特性,可以作为亲电试剂、亲核试剂或自由基试剂参与反应。此外,二硒化合物已被广泛用作多种有机转化的催化剂,并且涌现出诸多手性亲硒试剂在不对称合成中的应用成果。

电化学合成技术因其环境友好性和经济性,近年逐渐成为有机合成领域的热门课题^[11b]。新兴的电化学合成技术可以作为化学氧化还原剂的绿色替代品,在电化学环境中,利用持续、可再生的电流作为反应的驱动力,通过微调外加电势,达到精确控制氧化还原反应,为有机合成提供了新的机遇。利用电化学合成技术,国内外

* Corresponding authors. E-mail: sunk468@nenu.edu.cn; zhangb@zzu.edu.cn

Received September 29, 2021; revised October 14, 2021; published online October 20, 2021.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21801007).

国家自然科学基金(No. 21801007)资助项目。

合成化学家开展了高效、高选择性的不饱和键的硒环化反应和 C—H 键的直接硒化反应. 此外, 可见光反应被认为是一种绿色、可持续的合成方法, 常常可以避免传统化学中的污染, 近年来可见光诱导的有机合成反应蓬勃发展. 一方面, 将可见光作为反应能源与传统热反应相比, 通常反应在室温下即可发生, 并且反应具有更高的原子和步骤经济性. 另一方面, 随着光催化的不断发展, 已经发现了一些反应在光照辐射下的有机转化是不需要外部光催化剂, 化学家已经开始重视并认识到这一领域的巨大发展潜力. 鉴于光化学反应的诸多优点, 可见光诱导的不饱和键的硒环化反应近年来被有机合成化学家广泛研究. 基于近年来快速发展的电化学驱动、可见光诱导的含硒杂环的合成反应, 本文对此类反应进行归纳总结, 并对反应的适用范围和机理进行讨论.

图 1 含硒的杂环生物活性分子

Figure 1 Selenium-containing heterocyclic bioactive molecules

1 电化学合成含硒杂环

电化学作为有机化学中一种强大、可持续的合成工

具, 符合当前绿色化学的发展趋势. 电化学合成可以在无氧化剂和金属条件下实现氧化还原转化^[12a], 并且能够对各种有机分子的功能化进行高效和选择性反应. 考虑到硒原子在电化学中的重要性^[12b-12c], 以下综述了近些年发表的合成含硒杂环衍生物的主要电化学策略.

1.1 电化学驱动不饱和键的硒环化构建含硒杂环

2020 年, 潘英明等^[13]报道了一种无需金属和氧化剂, 通过烯烃双官能团化制备含硒甲基取代环醚或内酯的电化学方法(Scheme 1). 在最优条件下, 目标产物的产率高达 98%. 当改变电解质、溶剂、电流时, 反应终止或者产率降低. 更重要的是, 通过对烯烃醇链不同长度的研究得到了相应的 5~7、9 和 11 元环硒甲基取代醚, 收率较高. 相反, 他们不能获得相应的 4、8 和 10 元环硒甲基取代醚, 而获得开环产物.

图式 1 电化学合成四氢呋喃类化合物

Scheme 1 Electrochemical synthesis of tetrahydrofurans

为了探讨反应机理, 作者在不同条件下进行了对照实验. 为确定是否涉及自由基途径, 向体系中加入四甲基哌啶氧化物(TEMPO), 反应并未受到抑制, 这些结果排除了自由基机理的可能性. 当对该反应进行循环伏安实验时, 发现二苯基二硒醚 6 可能参与氧化和还原过程. 作者根据循环伏安对照实验提出可能的反应机理

图式 2 电化学合成二氢呋喃和噁唑啉的可能机理

Scheme 2 Possible mechanism electrochemical synthesis of dihydrofurans and oxazolines

(Scheme 2). 在阳极, I^- 失去两个电子氧化形成 I^+ , 然后与烯醇反应以提供碘鎓阳离子中间体 **8**. 中间体 **8** 进行分子内环化并释放质子得到中间体 **9**. 最后, 通过快速硒化得到目标产物 **10** 和 0.5 mol 的 I_2 . 之后 I_2 和氢质子经阴极还原为碘阴离子和氢气, 从而完成这一反应循环.

2020 年, Sarkar 课题组^[14]报道了在无过渡金属的条件下 *N*-烯丙基酰胺和 β,γ -不饱和酮通过串联电化学氧化环化过程合成噁唑啉和异噁唑啉衍生物(Scheme 3). 该反应条件温和, 而且不使用任何外部氧化剂. 使用这种方法, 作者进一步优化了邻位、间位和对位取代二芳基二硒化物的反应范围. 结果表明, 富电子和缺电子二硒化合物均具有良好的产率.

图式 3 电化学合成硒化噁唑啉和异噁唑啉衍生物

Scheme 3 Electrochemical synthesis of selenide oxazolines and isoxazoline derivatives

为了进一步了解反应机理, 作者设计反应在自由基捕捉剂 TEMPO 存在下进行, 产物噁唑啉的收率明显降低. 此外, 还高产率地分离出与 TEMPO 捕获自由基中间体相对应的加合物. 这些观察表明, 在整个环化和硒化过程中可能涉及自由基和离子反应.

在上述对照实验的基础上, 作者提出了可能存在的反应机理(Scheme 4). 首先, 二苯基二硒醚在阳极被氧化(氧化峰值在 1.66 V vs. Ag/AgCl)生成苯基硒阳离子 **23** 和自由基 **14**. 自由基 **14** 失去一个电子氧化生成另一个阳离子 **23**. 之后, 阳离子 **23** 对双键进行加成生成中间体 **15**, 该中间体通过酰胺氧亲核环化生成噁唑啉 **18** (途径 I). 或者, 在最佳条件下对二苯基二硒醚进行还原也是可行的(还原峰在 -1.44 V vs. Ag/AgCl), 首先, 二苯基二硒化物得到一个电子生成自由基 **14** 和苯基硒阴离子 **16**. 随后, **16** 失去一个电子氧化形成另一个自由基

14. 另一方面, 酰胺 **11** 经氧化(氧化峰在 1.32 V vs. Ag/AgCl)可以产生离域自由基 **17**, 最后, 自由基 **17** 自身环化并与 **14** 偶联生成 **18**(途径 II).

图式 4 电化学合成硒化噁唑啉和异噁唑啉衍生物的可能机理

Scheme 4 Possible mechanism of electrochemical synthesis of selenized oxazolines and isoxazoline derivatives

2019 年, 郭凯小组^[15]利用恒流电解在无金属和无氧化剂条件下, 开发了高效的活性炔烃与二硒化合物或二硫化物的分子内环化反应(Scheme 5). 以一系列烷基酸盐和烷基酰胺为底物, 与二硒酸盐和二硫化物反应得到相应的产物. 因此, 该策略提供了一系列硫代香豆素和喹啉酮类化合物, 具有广泛的应用范围和良好的官能团相容性, 收率中等到良好.

为了深入了解香豆素和喹啉酮的合成反应机理, 作者加入自由基捕获剂 TEMPO, 发现该电化学过程受到抑制, 证实该过程是通过自由基途径进行的. 同时, 通过循环伏安实验测定了底物的氧化还原电位, 结果表明 **28** 在阳极上优先氧化. 在上述结果和相关文献报道的基础上^[16], 提出了电化学氧化环化的可能机理(Scheme

图式5 电化学合成香豆素和喹啉酮类化合物

Scheme 5 Electrochemical synthesis of coumarins and quinolinone compounds

图式6 电化学合成香豆素和喹啉酮类化合物的可能机理

Scheme 6 Possible mechanism electrochemical synthesis of coumarins and quinolinone compounds

6). 最初, 阳离子自由基中间体 **21** 是由二苯基二硒醚 **28** 在阳极氧化产生, 随后中间体 **21** 均裂为苯基硒自由基 **14** 和苯基硒阳离子 **23**. 自由基 **14** 对 **19** 的 C≡C 进行加成提供了高区域选择性的乙烯基自由基 **24**. 随后, 乙烯基自由基 **24** 通过分子内环化得到中间体 **25**, 在阳极进一步被氧化得到中间体 **26**. 最后, 中间体 **26** 通过去质子化和芳族体系的再生得到 3-硒化香豆素产物 **20**. 同时, 苯基硒阳离子 **23** 在阴极处被还原为二苯基二硒醚 **28**, 用于下一个循环.

2019 年, 雷爱文等^[17]报道了以 2-烯丙基-1,3-双(4-氟苯基)丙烷为原料, 与二苯基二硒化物在电解池中, 以石墨棒为阳极, 铂片为阴极, nBu_4NPF_6 为支撑电解液, HOAc 为添加剂, 乙腈为溶剂, 得到了(4-氟苯基)(2-(4-氟苯基)-5-((苯基硒基)甲基)-4,5-二氢呋喃-3-基)甲酮高

产率的目标产物(Scheme 7). 当在其他溶剂中, 反应则完全被抑制, 并形成副产物. 在优化后的条件下, 对该反应的底物范围进行一系列实验, 结果证明苯环对位具有吸电子基团或给电子基团的对称烯烃羰基, 可以与二苯基二硒顺利反应, 得到中等产率的二氢呋喃化合物. 总之, 该反应开发了一种经济实用的电化学氧化串联环化 C—Se 和 C—O 键生成方法, 成功地获得了一系列硒化二氢呋喃和噁唑啉, 产率适中至优良.

图式7 电化学合成二氢呋喃和噁唑啉

Scheme 7 Electrochemical synthesis of dihydrofurans and oxazolines

2021 年, 潘英明课题组^[18]研究了电化学氧化促进丙烯酰胺与二硒化物的串联环化合成硒化氧吡咯反应(Scheme 8). 该策略为构建 C—Se 键提供了一种环境友好的方法. 利用该方法可以成功获得一系列硒代氧吡咯类化合物, 其药理活性明显优于其他氧吡咯衍生物. 研究表明, 硒化氧吡咯具有较好的抗肿瘤活性.

图式8 电化学合成吡咯衍生物

Scheme 8 Electrochemical synthesis of indole derivatives

为了进一步了解该方法的机理, 作者进行了若干对照实验. 即底物在标准条件下加入 2.0 equiv. TEMPO 或

2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)自由基捕捉剂,得到相应的目标产物产率为75%。这些结果排除了自由基机制的可能性。此外,还进行了循环伏安实验,检测出的阳极氧化的收率为75%,说明该反应可以直接在阳极氧化中完成。

根据上述结果和文献报道^[18],作者给出了电化学生成硒自由基33和硒阳离子34。之后,33自由基加成到31提供了自由基中间体35,而中间体35通过分子内环化产生了自由基中间体36,进一步的阳极氧化和脱质子得到产物39(路径I)。同时对其离子途径也进行了探究,发现在31的双键上添加硒阳离子34可以生成中间产物39,39进一步氧化环化和脱质子化形成产物38(路径II)。

2020年,郭凯和同事^[19]报道了通过炔烃与二硒醚

的脱芳螺环化,电化学生成螺环[4.5]三烯酮(Scheme 10)。在 $n\text{Bu}_4\text{NPF}_6$ 存在的情况下,这些反应都在一个配备了石墨阳极和铂阴极的未分裂电池中进行,电流为15 mA。在最佳条件下,对反应底物进行探究,发现烷基酸酯和烷基酰胺都能与二硒酸酯很好地反应,形成预期的产品,收率适中到良好。二苯基双酰胺也适用于这一方法,以适中的产率得到了所需的产物。

为了进一步了解该方法的机理,作者进行了对照实验。化合物40在标准条件下加入自由基捕获剂TEMPO和BHT后,未检测到螺环化产物。结果表明,这一过程可能涉及自由基途径,另外,循环伏安实验结果表明,二苯基二硒醚在阳极上优先氧化。

基于上述结果和相关文献报道^[20],作者提出可能的电化学生成反应机理(Scheme 11)。二苯基二硒化物

图式9 电化学生成吲哚衍生物的可能机理

Scheme 9 Possible mechanism of electrochemical synthesis of indole derivatives

图式10 电化学生成螺环[4.5]三烯酮

Scheme 10 Electrochemical synthesis of spiro[4.5]trienones

图式 11 螺[4.5]三烯酮的电化学合成机理

Scheme 11 Mechanism for electrochemical synthesis of spiro [4.5] trienones

43 首先被氧化生成阳离子自由基中间体 **44**, 然后被分解生成苯硒自由基 **45** 和苯硒阳离子 **46**. 然后苯硒自由基 **45** 与 **47** 对 C≡C 进行自由基加成生成乙烯基自由基 **48a**. 由于共振自由基的相对稳定性和五元环结构, 乙烯基自由基 **48a** 倾向于进行分子内螺旋环化以提供中间体 **49**, 中间体 **49** 在阳极上进一步氧化, 得到含氧阳离子中间体 **50**. 最后, 通过阳离子 **50** 的去甲基化和芳香环的去芳构化(路径 I)生成产物 **51**. 但不能排除苯基硒阳离子 **46** 与 **47** 反应生成中间产物 **48b** 的可能性. 随后, 富电子芳香环对环硒离子进行分子内亲核进攻, 生成中间产物 **50**, **50** 经过去甲基化生成产物 **51**(路径 II).

2020 年, Braga 等^[21]报道了一种电合成分子内氧硒化烯丙基萘酚/苯酚衍生物的方法(Scheme 12). 该反应以 0.2 equiv. 的 ${}^n\text{Bu}_4\text{NClO}_4$ 作为电解质, 铂作为工作电极, 在一个未分裂电池中进行, 结果证明硒取代二氢呋喃类衍生物的产率中等到优良. 随后又对该反应的底物普适性进行探究, 值得注意的是, 当底物中含有氮元素时, 并未检测到其目标产物.

2020 年, Ackermann 和 Júnior 课题组^[22]报道了一种有效的电化学方法, 通过阳极氧化硒化/环化反应, 合成多种含硒多功能氧化还原醌类化合物(Scheme 13). 该方案操作简单, 用途广泛, 产率高, 对所选二硒醚和醌的性质不敏感. 重要的是该电化学方法产生的一些醌杂化分子也表现出相当大的生物活性.

2021 年, 郭凯课题组^[23]提出了一种无金属和无氧化剂的电化学策略, 以 2-乙烯基苯甲酰胺和二硒化物为原料, 在连续电化学微反应器中合成了一种绿色高效的硒取代亚氨基异苯并呋喃(Scheme 14). 这一环境友好

图式 12 电化学合成含硒二氢呋喃

Scheme 12 Electrochemical synthesis of selenium-containing dihydrofurans

图式 13 电化学合成醌类化合物

Scheme 13 Electrochemical synthesis of quinone compounds

策略显示了它广泛的底物普适性和功能基团耐受能力, 提供了一系列中等到良好的硒化异苯并呋喃. 值得注意的是, 当 NO_2 基团附着在苯环上时, 产率发生了显著变化. 此外, 连续流与电合成相结合的系统还克服了传统间歇式电解难以实现放大反应的问题.

图式 14 电化学合成亚氨基异苯并呋喃

Scheme 14 Electrochemical synthesis of iminoisobenzofurans

2021 年, 陈前进等^[24]报道了一种通过电化学氧化 *N*-芳基酰胺来合成螺旋[4.5]三烯酮的绿色合成方法 (Scheme 15). 该方法从容易获得的卤化物盐 LiX , $\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$, 利用廉价的石墨电极, 获得了多种脱芳烃的卤螺旋环化产物, 其产率非常高, 具有广泛的普适性和良好的基团耐受能力.

图式 15 电化学合成螺旋[4.5]三烯酮

Scheme 15 Electrochemical synthesis of helix [4.5] trienones

1.2 碳氢键直接硒化构建含硒杂环

2020 年, 徐艳丽课题组^[25]提出了一种简单有效的以尿嘧啶进行硒化反应合成 5-硒化尿嘧啶的方法 (Scheme 16). 该方法在 NH_4I (20 mol%) 作电解质, *N,N*-二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂, 碳棒为阳极, Pt 片为阴极的条件下, 对其底物的适用性也进行了探究, 当苯环上具有给电子基或吸电子基的芳基取代二硒化物, 都可转化为相应的产物, 产率优良, 而尿苷在最优条件下则不能得到所需的产物.

图式 16 电化学合成 5-硒化尿嘧啶

Scheme 16 Electrochemical synthesis of 5-selenide uracils

2021 年, 何卫民等^[26]提出了一种环保、可持续、实用的合成 5-有机硒基酰尿嘧啶的方法 (Scheme 17). 以 6-氨基嘧啶和二苯基二硒化物为底物, KI 为催化剂, 二甲基亚砜(DMSO)为反应溶剂, 用铂板作为阳极, 石墨棒作为阴极, 在室温下以 10 mA 恒流条件下形成目标产物 68, 收率为 98%. 除此之外, 当用 MeCN 、DMF 或 EtOH 替代 DMSO 收率降低, 而以纯水为反应介质时, 仅检测到微量的目标产物.

图式 17 电化学合成 5-有机硒基酰尿嘧啶

Scheme 17 Electrochemical synthesis of 5-organoselenenyluracils

2020 年, 孙培培等^[27]描述了一种电化学氧化咪唑

吡啶或富电子芳烃的 C—H 硫氰化或硒氰化的方法. 该方法使用便宜易得的 KSeCN 作为 SeCN 源, 来合成可广泛应用于药物合成等领域的硒氰化咪唑吡啶 (Scheme 18). 在最优条件下, 考察了咪唑吡啶 C—H 硫氰化反应的底物范围和局限性, 对于 2-苯基咪唑[1,2-*a*]吡啶类化合物, 苯环上有供电子取代基或吸电子取代基的底物均在反应中表现出了较好的耐受性, 产率良好.

图式 18 咪唑吡啶或富电子芳烃的电化学氧化

Scheme 18 Electrochemical oxidation of imidazopyridines or electron-rich aromatic hydrocarbons

2020 年, 曹华等^[28]开发了一种 *N*-烷基异喹啉盐与多种二硒醚类化合物的高效、新颖且环境友好的电化学区域选择性硒化/氧化反应. 该反应可通过不饱和 C(sp²)—H 键功能化在电解条件下得到表现出优异的抗病毒活性的硒化异喹诺酮类化合物. 在此, 研究了含有不同取代基的二硒醚类化合物对反应的影响 (Scheme 19). 发现在最优条件下, 二苯基二硒醚类化合物芳基环上的各种官能团的耐受性良好.

图式 19 电化学合成硒化异喹诺酮类

Scheme 19 Electrochemical synthesis of selenized isoquinolones

为了进一步了解异喹啉盐与二硒化物的电化学 1,4-双功能化的机理, 作者进行了几个对照实验. 首先, 进行了 ¹⁸O 标记实验, 表明羰基中的氧原子可能来源于分

子氧和水. 此外, 在电催化体系中加入等量的 TEMPO 和 1,1-二苯乙烯时, 产率降低, 表明自由基参与了转化过程. 为了探测底物的氧化还原电位, 他们在 MeCN 中对 3 种底物进行循环伏安实验. 结果表明 74 和 KI 在阳极优先氧化. 在不含二苯二烯酰胺的电催化条件下, 异喹啉盐反应生成中间体 2-甲基异喹啉-1(2*H*)-酮, 进一步与二苯二硒化物反应生成最终的硒化产物. 为了说明 KI 的作用, 他们使用 I₂ 代替 KI 作为碘源. 没有得到目标产物. 结果表明 I₂ 不能氧化异喹啉盐.

在自由基和循环伏安的对照实验基础上, 该作者提出了电化学 1,4-二官能化异喹啉盐的合理反应机理 (Scheme 20). 首先, H₂O 作为亲核试剂加成到 73 生成中间体 76, 然后 76 在阳极表面被氧化生成自由基中间体 77. 自由基中间体 77 氧化为 78 可能涉及两条途径. 首先, 中间体 77 与氧分子结合形成烷基过氧化物 79, 烷基过氧化物 79 经过质子的损失产生以氧为中心的自由基 80. 然后, 在阴极上 80 中的 O—O 键被裂解, 得到中间体 78. 第二, 中间体 77 被氧直接氧化生成中间体 78. 同时, I⁻ 直接在阳极氧化生成 I₂, I₂ 与二硒化物反应生成活性物质 RSeI. 最后, RSeI 被 78 捕获, 得到产物 75 和两个质子, 最后氢质子在阴极还原生成氢气.

2 光化学合成含硒杂环

过去的十多年里, 可见光诱导的光催化环化反应在有机化学和材料化学等领域得以蓬勃发展^[29], 成为化学转化的独特工具. 这种反应通常都可在很温和的条件下进行, 避免了过量的金属或非金属催化剂的使用^[30a-30c], 为有机合成提供清洁、廉价的能源和绿色的催化体系^[30d], 可见光诱导的硒自由基合成含硒杂环在有机化学转化具有广阔的研究前景.

2.1 可见光诱导不饱和键的硒环化构建含硒杂环

进入新世纪以来, 化学家对借助可见光触发的有机化学反应十分感兴趣, 因为有机光合成具有绿色环保、原子经济性高、低能耗等特点^[31]. 因此, 迫切需要发展可见光参与有机反应. 2011 年, Ogawa 课题组^[32]描述了一种在光照条件下, 有机二硒醚化合物与邻炔基芳基异氰化物 81 可以选择性地发生分子内环化获得 2,4-二硒代喹啉 (Scheme 21). 此外, 这种光化学环化反应还可用于异氰酸酯与氢转移试剂 (如氢硅烷、锆氢化物、硫醇和硒醇) 制备 3-取代喹啉. 随后, 作者又对该反应的底物适用范围进行探究, 发现当使用二苯基二硒醚进行光化学反应时, 产率相较于其他取代基产率明显降低, 猜测这可能是由于脂肪族二硒醚化合物的碳基捕获能力较芳香族二硒醚化合物低.

图式 20 异喹诺酮的机理
Scheme 20 Mechanism of isoquinolones

图式 21 光诱导合成 2,4-二硒代喹啉
Scheme 21 Light-induced synthesis of 2,4-diselenoquinolines

2013 年, Ragains 课题组^[33]提出了一种可见光催化烯炔硒化(碲化)的方法(Scheme 22). 该反应是在 Blue LEDs 照射下, 以甲醇作溶剂展开的, 具有操作简单, 无需使用惰性气氛, 产率优良等特征. 在同等条件下, 碲化获得的预期产物与硒化相比明显降低.

图式 22 光诱导促进烯炔环化
Scheme 22 Light-induced promotion of olefins cyclization

2018 年, Baidya 等^[34]报道了一种在室温、氧气气氛和无光催化剂的条件下, 可见光诱导的丙烯酰胺通过自

由基氧化脱芳构化合成 3-硒螺旋[4.5]三烯酮(Scheme 23), 产率高达 92%. 该方案具有操作简单、可扩展性好、底物范围广、使用分子氧作为氧化剂等特点.

图式 23 光诱导促进合成三烯酮
Scheme 23 Photo-induced synthesis of triketenes

为探讨反应机理, 作者在标准体系中加入 TEMPO 或 BHT 自由基捕捉剂, 产率明显降低. 此外, 在标准条件下, 底物 85 与叔丁基过氧化氢结合时, 自由基捕获产物的收率为 15%. 基于这些发现, 证实了该反应涉及自由基途径. Scheme 24 中概述了这样一个合理的反应机理, 芳基硒经 Blue LEDs 照射产生了芳基硒自由基与 87 的 C=C 加成并产生乙烯基自由基 88, 随后进行分子内

图式 24 光诱导促进合成三烯酮的机理

Scheme 24 Mechanism of photo-induced synthesis of triketenes

自由基环化得到中间体 **89**，然后在氧气气氛下和二芳基二硒化物存在下，中间体 **89** 转化为中间体 **90**，最终 O—O 键断裂后形成螺环化产物 **91**。这里提出的机理与之前的文献先例一致^[54a,54b]，同样没有观察到双硒化产物 **92** 的形成^[35e]。

同年，王华课题组^[36]报道了通过可见光诱导合成 3-苯硒基取代氮螺[4.5]三烯酮的方案(Scheme 25)。在非常温和的反应条件下，以 Eosin Y 为光催化剂，使用 *N*-(对甲氧基芳基)丙酰胺与二苯基二硒醚作为底物发生硒化环化反应，产率适中到良好。

图式 25 光诱导促进合成 3-苯硒基取代氮螺[4.5]三烯酮

Scheme 25 Photoinduction promote the synthesis of 3-phenylselenyl substituted nitrospirone[4.5]trienones

该反应是通过串联自由基加成和环化过程实现炔烃的双功能化，通过硒基与反应物相互作用产生乙烯基自由基 **96**，然后，乙烯基自由基发生分子内螺旋环化得到 **97**，自由基中间体 **97**，在空气中氧化形成相应的氧中间体 **98**，最终，该中间体转化为目标产物 **95**。

2017 年，王磊等^[37]提出了一种在 H_2O_2 存在下，通过可见光促进 2-炔苯胺与二硒醚的串联环化合成 3-硒基吲哚的方法(Scheme 26)。在室温、无过渡金属和无光催化剂的条件下，反应顺利进行，以优良的收率和较好的官能团兼容性得到预期产物。然而，在最优反应条件下，2-苯乙炔苯胺和其他 2-苯乙炔苯胺的 *N*-取代衍生物，如 *N*-苄基、*N*-乙酰基、*N*-三氟乙酰基、*N*-叔丁基羰基、*N*-甲基和 *N*-苯甲酰苯胺与 **99** 反应，均未得到相应的产物。

图式 26 光诱导促进合成 3-硒基吲哚

Scheme 26 Light induction promotes the synthesis of 3-selenoindoles

根据自由基验证实验，作者提出了一个合理的反应机理(Scheme 27)。首先， H_2O_2 在 Blue LEDs 照射下发生均裂产生羟基自由基和羟基阴离子，羟基自由基与底物 **101** 通过一个单电子转移过程形成中间体 **102**。然后，得到的中间体 **102** 进行分子内环化得到中间体 **103**，经过去质子化得到中间体 **104**。最后，**104** 与二苯基二硒醚 **106** 相互作用得到产物 3-亚苯基吲哚 **105**，同时释放的

一个硒自由基 $\text{PhSe}^\cdot$ 与另一个中间体 **104** 反应生成 **105**。

图式 27 光诱导促进合成 3-硒基吲哚的可能机理

Scheme 27 Possible mechanism of light-induced promoting synthesis of 3-selenoindoles

2019 年, 潘英明及其同事^[38]开发了一种简单高效的合成含硒杂环的方法, 即在 40 °C, 25 W White LEDs 照射下, 经可见光诱导的炔系环己二烯酮、二硒醚和水发生多组分串联环化反应(Scheme 28). 该反应在环己酮骨架中同时引入硒基和羟基, 以串联方式形成三个新的立体异构。除此之外, 用四甲基偶氮唑盐比色法(MTT)检测了产物的体外抗癌活性, 发现化合物 **110a** 和 **110b** 具有较强的肿瘤细胞生长抑制活性。

图式 28 光诱导的炔系环己二烯酮与二硒醚环化

Scheme 28 Photoinduced cyclization of acetylenic cyclohexadienones and diselenides

为了进一步阐明反应机理, 作者向标准体系中加入 TEMPO, 发现该过程受到抑制, 表明这一转化过程中可能涉及自由基途径。根据实验结果和相关报道^[39], 提出并描述了一种可能的机理如 Scheme 29. 首先, 二苯基二硒醚在光照下产生苯硒基自由基 **111**, 然后, 底物 **108** 进行自由基加成得到烯基 **112**. 生成的烯基自由基参与分子内自由基反应生成中间体 **113**, 随后被另一分子苯硒基自由基捕获得到产物 **114**, 最终, **114** 在 CsOAc

存在下与水进行亲核取代, 得到所需的产物。

图式 29 光诱导的炔系环己二烯酮与硒环化的机理

Scheme 29 Mechanism of photoinduced cyclization of acetylenic cyclohexadienones and seleniums

2019 年, Reuter 课题组^[40]报道了一种可见光催化的分子内脱芳碳螺旋环化(IDCS)反应。在最优条件下, 以分子氧为氧化剂, **115** 为起始底物, 二苯基二硒化物 **116** 为硒源, 最高产率可达 88% (Scheme 30). 随着反应条件的优化, 芳香环中不同取代基上的供电子和吸电子基均能得到所需产物, 收率中等到优良, 而且取代苯基的二硒化物也能很好地提供预期产物。

图式 30 可见光催化的分子内脱芳碳螺旋环化

Scheme 30 Visible-light catalyzed intramolecular dearomatic carbon helical cyclization

2019 年, Kim 及其同事^[41]开发了一种光氧化还原催化烯基环丁醇衍生物 **118** 与二硒醚 **119** 串联得到硒化环

戊酮衍生物 **120** 的策略(Scheme 31). 本实验采用二硒化物作为硒自由基源, 以 Blue LEDs 作为能量源, 在空气气氛下, 为硒化环戊酮衍生物的制备提供了一种简便的方法, 且反应条件温和, 底物适用范围广, 产率良好.

图式 31 可见光催化合成硒化环戊酮衍生物

Scheme 31 Visible-light catalyzed synthesis of selenized cyclopentanone derivatives

2019 年, 刘强等^[42]报道了一种以分子氧为末端氧化剂, 在可见光照射下, 烯炔与二硒化物硒化合成杂环化合物的方法(Scheme 32). 经实验验证, 各种芳基/烷基联硒化物和烯炔都适合这种转化, 并获得了较高收率的杂环化合物噁唑啉、异噁唑啉、吡咯烷、内酯等. 这种无过渡金属参与的反应, 具有较好的实用性, 原子经济性高, 官能团兼容性好, 可以高效地构建五元和六元杂环化合物.

图式 32 光催化烯炔与二硒醚的脱氢环化

Scheme 32 Photocatalytic dehydrogenation cyclization of olefins and diselenide ethers

根据观察和文献报道^[43], 作者提出了一个可能的机理(Scheme 33), 在可见光照射下, 4CzIPN 被转化为激发态的 4CzIPN*. 二苯基二硒醚 **122** 与 4CzIPN* 之间的单电子转移得到 **122a**^{•+} 自由基阳离子, 并且生成 4CzIPN^{•-} 自由基阴离子. 光氧化还原循环是通过分子氧氧化 4CzIPN^{•-} 到基态来完成的. 二硒基自由基阳离子

122a^{•+} 随后与 *N*-烯酰胺 **123** 反应生成硒态阳离子 **124** 和 0.5 equiv. 的二苯基二硒醚. 最后, 通过中间体 **124b** 的分子内亲核环化生成所需产物.

图式 33 可能的机理

Scheme 33 Possible mechanism

2020 年, Wang 课题组^[44]开发了一种在没有金属和无氧化剂的情况下, 通过可见光诱导甲苯磺酰基自由基引发未活化烯炔的环化, 并同时被苯甲酰基自由基与原位生成的烯基自由基捕获以合成含硫源的取代吡咯烷(Scheme 34). 该反应在极温和的条件下产生了三个新键, 即 C—S、C—C 和 C—Se. 总之, 可见光诱导的未活化氮系 1,6-烯炔与硫属元素的自由基串联环化已经以五元环方式实现, 以提供带有硫属元素的取代吡咯烷. 该反应体系反应条件温和、环境友好、对多种官能团具有良好的耐受性、产率中等至良好, 且不产生有毒废物.

图式 34 可见光出促进合成含硫属元素的取代吡咯烷

Scheme 34 Visible light promotes the synthesis of substituted pyrrolidines containing chalcogen elements

为探究反应机理, 作者进行了初步的控制实验, 在 TEMPO 反应中, 没有产生所需的产物, 这表明自由基机理的存在, 此外, **125** 和 **126** 在氮气气氛下反应, 反应产率较低, 这表明溶解的 O_2 是硫代自由基生成的必要条件。

根据上述结果, 作者提出了一种合理的机理 (Scheme 35)。首先, 硒苯基 4-甲基苯磺基硒酸酯 **128** 在光照射下产生甲苯磺酰基 **129** 和苯基硒基 **130** 自由基, 然后甲苯磺酰基自由基选择性加成到底物 **131** 提供烷基自由基中间体 **132**。所得的烷基自由基 **132** 又选择性地形成五元环提供中间体 **133**; 同时, 乙烯基自由基中间体 **133** 被苯基硒基 **130** 自由基捕获得到所需的产物 **134**。

图式 35 合成取代吡咯烷的机理

Scheme 35 Mechanism of synthesis of substituted pyrrolidines

2020 年, 杨华及其同事们^[45]成功地开发了一种可见光诱导的、无催化剂自由基交叉偶联的二硒化物或二硫化物与 *N*-烯丙基溴二氟乙酰胺的环化反应 (Scheme 36)。该反应可以在温和的条件下得到各种 4-硫代和 4-硒代 3,3-二氟- γ -内酰胺。作者还对其底物普适性进行了探究, 实验证明, 该反应具有良好的官能团耐受性, 且收率中等到良好。

为了深入了解这个过程, 作者进行了控制实验。即在标准的反应条件下, **136** 和 2.0 equiv. TEMPO 混合得到了相应的 TEMPO-**136**, 收率为 19%, 而 **135** 和 2.0 equiv. TEMPO 没有反应。基于这些发现, 提出了一个合理的反应机理 (Scheme 37)。首先, $Ph-X-X-Ph$ 被可见光激发, 进行均裂, 产生自由基 $Ph-X^{\cdot}$ (**138**)。随后, $Ph-X^{\cdot}$ 从 **135** 中提取溴原子提供了自由基 **139** 和 $Ph-XBr$, 推测碱 K_2HPO_4 会消耗生成的 $PhXBr$ **140**, 从而促

进这一转化, 然后进行快速的 5-*exo-trig* 环化, 得到了自由基中间体 **141**。最后, 自由基中间体 **141** 与 $Ph-X^{\cdot}$ 之间进行自由基交叉偶联从而得到最终产物 **142**。

图式 36 可见光催化合成 4-硒代 3,3-二氟- γ -内酰胺

Scheme 36 Visible light catalyzed synthesis of 4-seleno 3,3-difluoro- γ -lactam

图式 37 可见光催化合成 4-硒代 3,3-二氟- γ -内酰胺的机理

Scheme 37 Visible-light catalyzed synthesis of 4-seleno 3,3-difluoro- γ -lactam mechanism

2020 年, Ogawa 课题组^[46]研究了以二芳基或二烷基二硒醚为原料, 通过光诱导氧化邻二异氰芳烃与二芳基或二烷基二硒醚环化合成 2,3-双硒酰嗪啉 (Scheme 38)。本实验不需要使用添加剂或金属催化剂, 具有较高转化率、底物适用范围广、反应条件温和。

2020 年, 徐艳丽等^[47]研究了一种无金属、可见光诱导的吡啶酮与二硒醚类化合物在室温空气中螺旋环化制备 3-硒代螺烯类化合物的方法 (Scheme 39)。在确定了最佳反应条件后, 考察了不同吡啶酮和二苯基硒醚的范围和通用性, 绝大部分都能得到令人满意的产率, 仅少部分产率极低。

图式 38 可见光催化合成 2,3-双硒酰喹啉

Scheme 38 Visible light catalyzed synthesis of 2,3-diselenoyl-quinoxalines

图式 39 可见光催化合成 3-硒代螺烯类化合物

Scheme 39 Visible light catalyzed synthesis of 3-selenospiro compounds

2021 年, 曹华及其同事^[48]公开了一种通过可见光诱导的三组分串联反应, 从 3-氨基吡啶、炔和硒苯中制备硒取代吡啶并[1,2-*b*]吡啶的绿色途径(Scheme 40). 接下来, 探索了不同硫族元素的可见光串联环化反应的底物范围, 在最优条件下, 二硒化合物参与了反应, 获得了中等到良好的产率, 而二硫化物则不能实现串联转化。

根据对化合物 **150** 的光物理性能的研究和文献报

图式 40 可见光促进的三组分串联反应

Scheme 40 Visible light promoted three-component cascade reaction

道^[48], 作者描述了这种串联环化反应的两种可能机理(Scheme 41). 在途径 I 中, RB 在可见光照射下转化为激发态 RB*. 随后, 联硒化物 **151** 与 RB* 进行单电子转移反应, 产生 PhSe⁺ 自由基正离子和 RB 自由基负离子. 然后 RB 被 O₂ 氧化到基态, 完成光氧化还原循环. 相反, FeCl₃ 促进了 **147** 和 **148** 的分子间缩合, 给予中间体 **149**. 活性中间体 **149** 捕获 PhSe⁺ 自由基阳离子, 得到硒鎓阳离子 **150** 和 0.5 equiv. 的 (PhSe)₂. 最后, 硒鎓阳离子中间体 **150** 经分子内亲核环化得到硒化物产物 **151**. 在途径 II 中, 反应可能涉及能量转移过程. 在光照射下, RB 转化为激发态 RB*. 其次, 基态氧与 RB* 之间的能量转移形成单线态氧, 单线态氧与二硒化物 **151** 发生单电子转移反应生成 PhSe⁺ 自由基阳离子. 自由基阳离子 PhSe⁺ 可以进一步转化为中间体 PhSe⁺. 最后, 通过中间体 **149** 和中间体 PhSe⁺ 的亲电环化得到产物 **151**.

2021 年, 朱绍群课题组^[49]描述了一种利用二硒化合物作为自由基源与烯炔的硒化环化反应(Scheme 42), 该反应混合物在可见光照射下产生的硒原子自由基经自由基加成/环化/硒化的顺序, 得到预期产物. 作者还对端炔和内炔衍生的 1,6-烯进行探究, 实验证明都适合目前的合成方案, 并且可以提供各种含硒产物, 收率良好。

图式 41 可见光促进的三组分串联反应机理

Scheme 41 Visible light-promoted three-component cascade reaction mechanism

图式 42 可见光促进烯醚的硒化环化

Scheme 42 Visible light promotes the selenization and cyclization of alkenyl ethers

为确定该反应机理, 作者进行了自由基实验, 当 1.0 equiv. 的 TEMPO 为添加剂时, 没有得到目标产物. 根据实验结果, 作者提出了自由基链环化机理(Scheme

43), 即在可见光照射下, 硒原子自由基 **154** 通过 Se—Se 键的均裂作用产生. 将自由基 **154** 加成到 **155** 就得到了乙烯基中间体 **156**; 然后经过分子内 5-*exo-trig* 环化得到叔碳烷基自由基 **157**, 二硒化物直接将自由基 **157** 芳基硒化得到预期产物 **158** 和硒原子自由基 **154** 进行循环.

图式 43 可见光促进烯醚的硒化环化机理

Scheme 43 Visible light promotes the selenization and cyclization mechanism of alkenyl ethers

2.2 可见光诱导的碳氢键硒化

2014 年, Ranund 和他的同事们^[50]提出了一种将芳基和杂芳基胺直接转化为硒化物的新策略(Scheme 44), 这一方法避免了重氮盐和金属的使用, 而且底物适用范围广. 更重要的是, 在此过程中, 杂芳基和 2-乙基苯胺也能成功地转化为相应的硒化物, 这在以前的报道中没有提到, 是一种绿色的合成策略, 对杂芳胺的硒化具有重要意义.

图式 44 光诱导促进芳基和杂芳基胺直接硒化

Scheme 44 Light-induced promotes direct selenization of aryls and heteroaryl amines

2017 年, Ackermann 课题组^[51]发表了一篇光诱导、铜催化的 C—H 键硒化反应. 该方法使用唑类化合物与杂芳基亲电试剂和硒化反应底物, 最终得到硒代的芳基化产物(Scheme 45), 产率中等. 接下来, 作者通过对芳

基碘化物带有不同取代基来探究该反应的适用范围,发现它们均能表现出良好的官能团耐受性,即使在 8~25 °C 的反应温度下也表现出很好的催化效果。

图式 45 光诱导铜催化的硒代芳基化产物

Scheme 45 Light-induced copper-catalyzed seleno-arylation products

2017 年,刘强等^[52]报道了一种可见光驱动芳烃直接硒化的方法(Scheme 46)。本实验在可见光照射下,5-甲氧基吲哚与二苯基二硒化物在含有合铱双[2-4,6-二氟苯基吡啶-C2, N]甲基吡啶铱(III) 2 mol% 的 CH₃CN 溶液中直接 C—H 键硒化。实验证明各种芳基/杂芳基/烷基二硒化物和富电子芳烃都适合这种转化,并以优异的产率提供不对称硒化物。在对位具有吸电子基团的二硒化物,如氯、氟和氰基,也表现出良好的反应性。此外,空间效应对该反应的影响不大,邻对位取代的二硒化物也

图式 46 光诱导 5-甲氧基吲哚与二苯基二硒化物直接 C—H 键硒化

Scheme 46 Light-induced direct C—H bond selenization of 5-methoxyindole and diphenyl diselenides

同样适用。

2019 年, Sarkar 等^[53]揭示了镍(II)四苯基卟啉配合物(NiTPP)作为光氧化还原催化剂具有很大的合成用途。本文使用 2-氨基苯胺、市售的二苯基二硒化物和亚硝基叔丁基,在二甲基亚砜(DMSO)溶剂中氩气气氛下,暴露在 Blue LEDs 中可以得到令人满意脱氮硒化产物,分离收率高达 94% (Scheme 47)。在最佳条件下,当没有光和叔丁基亚硝酸盐(TBN)参与时没有检测到预期产物;没有光催化剂 NiTPP 时产率明显降低。在非极性溶剂如甲苯,则对反应完全无效,氯化溶剂如 1,2-二氯乙烷(DCE),对反应结果有负面影响。

图式 47 光诱导合成脱氮硒化产物

Scheme 47 Light-induced synthesis of denitrification and selenization products

2018 年,杨道山等^[54]报道了一种在室温、无金属和光催化剂条件下,仅利用 Blue LEDs 和过硫酸铵在乙腈溶剂中就能使 4-氨基取代香豆素衍生物与二硒醚发生硒化的反应(Scheme 48),从而合成含硒的香豆素,产率

图式 48 光诱导合成含硒的香豆素

Scheme 48 Light-induced synthesis of coumarins containing selenium

中等到良好. 重要的是, 采用甲基保护的 4-苯基氨基-2*H*-铬-2-酮, 还可以选择性地得到了双硒化合物.

虽然目前可见光诱导的硒化途径的机理尚不清楚, 但根据之前的报道^[55-57]和实验结果, 作者提出了两条可行的途径(Scheme 49). 在可见光照射下, $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 产生自由基阴离子 $\text{SO}_4^{\cdot-}$. 这时, 在 **168** 和 $\text{SO}_4^{\cdot-}$ 之间发生单电子转移, 得到相应的关键自由基阳离子 **168**. 中间体 **169** 与联硒化物反应得到的中间 **170**, 然后通过异构化产生最终产物 **171**. 在路径 2 中, 中间体 **172** 与二硒化物反应生成 C-3 硒化合物 **173**. 随后, **173** 与 $\text{SO}_4^{\cdot-}$ 发生单

电子转移, 得到相应的自由基阳离子 **174**. 中间体 **174** 与二硒化物反应生成中间体 **175**, 通过异构化得到最终产物 **176**.

2018 年, Tlili 等^[58]证明了在无金属条件下, 可见光可以介导三氟甲基硒化芳烃的合成(Scheme 50). 在 White LEDs 照射下, DMSO 作溶剂, 5 mol% Eosin Y 为光催化剂, 将重氮盐 **177** 与三氟甲基苯磺酸盐 **178** 混合, 以 77% 的收率得到了期望的产物. 该反应不需要任何添加剂的存在, 具有较广泛的底物适用性, 产率中等到良好.

图式 49 光诱导合成含硒香豆素的机理

Scheme 49 Mechanism of light-induced synthesis of coumarins containing selenium

图式 50 光诱导合成三氟甲基硒化芳烃

Scheme 50 Light-induced synthesis of trifluoromethyl selenide aromatic hydrocarbons

根据对该反应的光化学量子产率的研究, 作者提出以下机理(Scheme 51): 首先重氮通过 Eosin Y 进行单电子转移 SET 还原. 生成的芳烃自由基可以与试剂 **178a** 均解后得到的 $\text{CF}_3\text{SeSeCF}_3$ 二聚体反应, 提供一个三价硒自由基 **178b**, 然后中间体 **179** 被芳烃重氮盐氧化, 生成亲电子中间体 **180**, **180** 与 DMSO 溶液反应生成所需的产物和加合物 **181**.

图式 51 光诱导合成三氟甲基硒化芳烃的可能机理

Scheme 51 Possible mechanism of light-induced synthesis of trifluoromethyl selenide aromatic hydrocarbons

2018 年, Vijaykumar 课题组^[59]实现了芳烃和杂芳烃在室温下条件下的直接硒化反应(Scheme 52), 该方案是通过一个可见光促进的单电子转移途径进行的. 实验证明, 一系列芳烃和杂芳烃, 如吲哚、吡咯和功能化的芳基底物均可以通过这种硒化反应, 具有较高的产率和区域选择性. 该方案的显著特点是通过可见光照射两个有机分子中的一个来实现单电子转移, 从而避免了光敏剂形成自由基离子对.

图式 52 光诱导芳烃和杂芳烃直接硒化反应

Scheme 52 Light-induced direct selenization of aromatics and heteroaromatics

2018 年, Braga 等^[60]开发了一种通过 $\text{C}(\text{sp}^2)\text{—H}$ 键硒化制备硒基吲哚、硒基咪唑和硒基芳烃的方案(Scheme 53). 该反应以 Rose Bengal 为光催化剂, 在氧气气氛下室温反应 6 h, 便可得到预期的目标产物. 本文还对吲哚的底物范围进行了探究, 实验发现, 吸电子基团($\text{R} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}, \text{CO}_2\text{Me}$)的产率明显优于给电子基团($\text{R} = \text{Me}, \text{MeO}, \text{OH}$), 当 *N*-Boc 和 *N*-Ts 作为底物时, 反应失败. 同样, 以 3-甲基吲哚为底物时, 在优化条件下未见反应.

图式 53 光诱导制备硒代吲哚、咪唑和芳烃

Scheme 53 Light-induced preparation of selenoindoles, imidazoles and aromatics

2018 年, Tlili 和他的同事们^[61]首次报道了在无金属条件下可见光介导的三氟甲基硒化芳烃的合成. 该策略使用有机光催化剂在室温条件下利用稳定试剂三氟甲基苯磺酸对芳烃重氮盐进行三氟甲基硒化(Scheme 54). 即在可见光照射、Eosin Y 存在的情况下, 试剂 **186** 可在室温下均裂产生新的自由基, 可以与芳香重氮盐发生

图式 54 光诱导合成三氟甲基硒化芳烃

Scheme 54 Light-induced synthesis of trifluoromethyl selenide arenes

C(sp²)-SeCF 成键过程. 另一方面, 试剂 **186** 在可见光照射下与烯炔或炔炔也能反应, 生成相应的 α -[氟烷基硒基]烷基或乙烯基砷.

2019 年, Kumar 课题组^[62]提出了一种利用光催化剂和无过渡金属参与构建 C-S, C-Se, C-Te 的方法 (Scheme 55). 利用这种方法人们已经获得了 3-芳基硒代吲哚、3-芳基硫代吲哚、3-芳基碲代吲哚, 收率良好至极好. 当吲哚或芳基二硒化合物上引入各种官能团, 均能显示其良好的适用范围.

图式 55 可见光诱导 3-芳基硒代吲哚的合成

Scheme 55 Visible light-induced synthesis of 3-arylselenoindoles

通过自由基控制实验、对底物的紫外-可见光谱和循环伏安法研究, 以及对反应混合物的电子顺磁共振光谱(EPR)研究, 可以合理地假设吲哚在光激发下与氧反应产生自由基阳离子 **191** (Scheme 56). 经测试吲哚的氧化电位为 +0.455 V, 其中氧的还原电位为 +0.65 V, 这表明氧化吲哚是可行的. 吲哚自由基阳离子 **191** 可以通

图式 56 可见光诱导吲哚合成 3-芳基硒基吲哚的机理

Scheme 56 Visible light-induced indole synthesis mechanism of 3-arylselenoindoles

过共振形成 **192**. 吲哚自由基 **192** 将加成到二芳基二硫属化物上, 形成芳基硫属化物吲哚阳离子 **193** 和自由基 PhE' (**194**). 经可见光照射产生的 O₂⁻ 阴离子自由基会从阳离子 **193** 中提取质子, 从而促进所需的不对称硒化物 **195** 和过羟基自由基 HO₂[•] 的形成. 在第二个循环中, 过羟基自由基 HO₂[•] 将从 **188** 中夺取一个电子, 随后从 **193** 中夺取一个质子得到过氧化氢.

2019 年, Arguello 和他的同事们^[63]开发了一种新的合成方法 (Scheme 57), 即在可见光促进下, 以二硒醚和吲哚为原料选择性地获得几种 3-硒代吲哚. 该反应在温和的条件下进行, 乙醇作溶剂, 空气中的氧气作为绿色氧化剂. 此外, 利用中间体的亲电性, 在最优条件下也可利用富电子芳炔合成一些不对称二芳基硒化物.

图式 57 可见光促进 3-硒基吲哚的合成

Scheme 57 Visible light promotes the synthesis of 3-selenoindoles

为确定反应机理, 作者在空气和氮气气氛下, 用 TEMPO 进行反应, 得到化合物 **198** 的收率分别为 84% 和 91%. 这一结果表明, TEMPO 作为氧化剂而不是自由基捕获试剂. 另一方面, *N*-3-丁烯吲哚被用作底物时, 3-硒基吲哚衍生物的分收率为 70%, 烯基部分保持不变, 这一结果表明硒反应中间体对吲哚杂环对附近的 C=C 基团具有选择性. 对于吲哚类化合物, C-3 是亲电取代反应中最活跃的位置, 当 3 号位被甲基占据时, 相应的也不存在 2-硒基吲哚, 这些结果表明纯自由基途径不会在这些反应中运行.

根据上述结果, 作者提出了几种可能的路径 (Scheme 58). 路径 A 中, 二硒化物 **199** 经可见光激发形成激发态 **199***, **199*** 可能与氧反应产生亲电物质 **199⁺** 和超氧阴离子 ⁻O₂. 中间体 **199⁺** 能够与芳香环反应如吲哚 **200** 或芳炔 **201** 通过 S_EAr 得到芳基化物 **202** 和 **203**, 连同硒基自由基二聚产生 **199**, 质子 H⁺ 和超氧阴离子反应生成过氧化氢. 路径 B, **199** 均裂形成硒基自由基 **204**, 随后 **204** 自由基被氧分子氧化, 形成了超氧阴离子 ⁻O₂ 和亲电子硒物质 **205**, 然后, 芳基硒基阳离子能够通过

SeAr 与吡啶或富电子芳烃反应得到目标产物。另一种可能的情况如路径 C 所示, 在这种情况下, 光生成的硒基自由基 **204** 与芳香环反应生成自由基中间体 **206**。为了恢复芳香性, 芳基自由基 **206** 脱去一个氢自由基被 **204** 捕获得到 RSeH , RSeH 又被氧气氧化为 RSeSeR 。或者自由基 **206** 被氧化成芳基正离子 **207**, 最后通过脱质子得到目标产物。

图式 58 可见光促进 3-硒基吡啶合成的反应机理

Scheme 58 Visible light promotes the reaction mechanism of 3-selenoindoles

2020 年, Oksdath-Mansilla 等^[64]报道了一种化学还原和光化学 $\text{C}(\text{sp}^2)\text{—H}$ 活化反应的高效组合, 通过连续流动过程实现了生物相关的富电子芳烃。本方案使用绿色、经济的 EtOH 作为溶剂, 通过简单、环保的方法合成了 3-硒代吡啶和不对称二芳基硒化物(Scheme 59), 产

图式 59 电化学合成 3-硒代吡啶和不对称二芳基硒化物

Scheme 59 Electrochemical synthesis of 3-selenoindoles and unsymmetrical diarylselenides

率良好。

2020 年, 赵霞课题组^[65]设计了一种室温条件下合成不对称芳基硒化物的绿色方案(Scheme 60)。为了验证该方案的可行性, 研究了 4-甲基磺酰二氮酰基苯甲酸乙酯和二苯基二硒化物之间的反应, 在最佳反应条件, 21 W Blue LEDs 灯照射下, 芳基硒化物产率高达 91%。有趣的是, 与富电子取代基相比, 当硒化剂(ArSe)₂ 上含吸电子取代基时, 该反应产率降低。

图式 60 可见光诱导不对称杂芳基硒化物的合成

Scheme 60 Visible light-induced synthesis of asymmetric heteroaryl selenides

3 结论与展望

本文对近年来有机硒参与的杂环硒化新方法, 按照电化学驱动, 可见光驱动的类型进行了较为详细地介绍, 并对反应的部分机理和底物适用范围进行了讨论。从上述讨论可以看出, 将有机硒引入杂环化合物中进行衍生化修饰已经引起合成化学家的广泛关注, 并且已经取得了很大的进步。有机硒参与的硒环化反应和 C—H 键直接硒化反应, 为咪唑、吡啶、噻唑、喹啉等杂环化合物的合成提供了经济、高效的合成途径。

尽管此类反应已取得重大进展, 但部分工作仍需在较高温度、昂贵的过渡金属催化剂存在条件下进行。此外, 电化学驱动和可见光驱动的有机硒参与的环化反应普适性不够广泛。因此, 在发展传统反应的同时, 通过引入可见光、电化学等其他形式的催化体系, 开发新型高效、经济实用的有机硒参与的硒环化和碳氢键硒化反应, 并将其应用于工业化生产与药物研发, 为后期硒化反应提供方向。

References

- [1] Walter, R.; Roy, J. J. *Org. Chem.* **1971**, *36*, 2561.
- [2] Huang, G.; Zhao, H.-R.; Meng, Q.-Q.; Zhang, Q.-J.; Dong, J.-Y.; Zhu, B.; Li, S.-S. *Eur. J. Med. Chem.* **2018**, *143*, 166.
- [3] Some examples: (a) Zhao, L.; Li, J.; Li, Y.; Liu, J.; Wirth, T.; Li, Z. *Bioorg. Med. Chem.* **2012**, *20*, 2558.

- (b) Wen, Z.; Xu, J.; Wang, Z.; Qi, H.; Xu, Q.; Bai, Z.; Zhang, Q.; Bao, K.; Wu, Y.; Zhang, W. *Eur. J. Med. Chem.* **2015**, *90*, 184.
- (c) Goodman, L.; Ross, L. O.; Baker, B. R. *J. Org. Chem.* **1958**, *23*, 1251.
- (d) Huang, G.; Zhao, H.-R.; Meng, Q.-Q.; Zhang, Q.-J.; Dong, J.-Y.; Zhu, B.; Li, S.-S. *Eur. J. Med. Chem.* **2018**, *143*, 166.
- [4] Some examples: (a) Min, J.; Wang, P.; Srinivasan, S.; Nwachukwu, J. C.; Guo, P.; Huang, M.; Carlson, K. E.; Katzenellenbogen, J. A.; Nettles, K. W.; Zhou, H. B. *Eur. J. Med. Chem.* **2013**, *56*, 3346.
- (b) Mao, F.; Chen, J.; Zhou, Q.; Luo, Z.; Huang, L.; Li, X. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2013**, *23*, 6737.
- [5] Some examples: (a) Jadhav, A. A.; Dhanwe, V. P.; Joshi, P. G.; Khanna, P.-K. *Chem. Heterocycl. Compd.* **2015**, *51*, 102.
- (b) Kumar, S.; Sharma, N.; Maurya, I. K.; Bhasin, A. K.; Wangoo, N.; Brandão, P.; Félix, V. K.; Bhasin, K.; Sharma, R. K. *Eur. J. Med. Chem.* **2016**, *123*, 916.
- (c) Empel, A.; Kisiel, E.; Wojtyczka, R.; Kępa, M.; Idzik, D.; Sochanik, A.; Waśik, T.; Zięba, A. *Molecules* **2018**, *23*, 218.
- [6] Some examples: (a) Sahu, P. K.; Kim, G.; Yu, J.; Ahn, J. Y.; Song, J.; Choi, Y.; Jin, X.; Kim, J. H.; Lee, S. K.; Park, S.; Jeong, L. S. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 5796.
- (b) Xiong, L.; Liu, S.; Chen, S.; Xiao, Y.; Zhu, B.; Gao, Y.; Zhang, Y.; Chen, B.; Luo, J.; Deng, Z.; Chen, X.; Wang, L.; Chen, S. *Nat. Commun.* **2019**, *10*, 1688.
- (c) Yu, J.; Kim, J. H.; Lee, H. W.; Alexander, V.; Ahn, H. C.; Choi, W. J.; Choi, J.; Jeong, L. S. *Chem.-Eur. J.* **2013**, *19*, 5528.
- [7] Some examples: (a) Sarma, B. K.; Mugesh, G. *Chem.-Eur. J.* **2008**, *14*, 10603.
- (b) Nogueira, C. W.; Quinhones, E. B.; Jung, E. A.; Zeni, G.; Rocha, J. B. *Inflammation Res.* **2003**, *52*, 56.
- (c) Lee, D. Y.; Li, H.; Lim, H. J.; Lee, H. J.; Jeon, R.; Ryu, J. H. *J. Med. Food* **2012**, *15*, 992.
- [8] [8] Some examples: (a) Nishiguchi, T.; Yoshikawa, Y.; Yasui, H. *Int. J. Mol. Sci.* **2017**, *18*, 2647.
- (b) Meltzer-Mats, E.; Babai-Shani, G.; Pasternak, L.; Uritsky, N.; Getter, T.; Viskind, O.; Eckel, J.; Cerasi, E.; Senderowitz, H.; Sasson, S.; Gruzman, A. *J. Med. Chem.* **2013**, *56*, 5335.
- [9] Some examples: (a) Victoria, F. N.; Anversa, R.; Pentead, F.; Castro, M.; Lenardão, E. J.; Savegnago, L. *Eur. J. Pharmacol.* **2014**, *742*, 131.
- (b) Donato, F.; De Gomes, M. G.; Goes, A. T.; Seus, N.; Alves, D.; Jesse, C. R.; Savegnago, L. *Life Sci.* **2013**, *93*, 393.
- (c) Jin, Q.; Fu, Z.; Guan, L.; Jiang, H. *Mar. Drugs* **2019**, *17*, 430.
- (d) Goto, K.; Nagahama, M.; Mizushima, T.; Shimada, K.; Kawashima, T.; Okazaki, R. *Org. Lett.* **2001**, *3*, 3569.
- [10] Some examples: (a) Freudendahl, D. M.; Santoro, S.; Shahzad, S. A.; Santi, C.; Wirth, T. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2009**, *48*, 8409.
- (b) Modha, S. G.; Mehta, V. P.; Van der Eycken, E. V. *Chem. Soc. Rev.* **2013**, *42*, 5042.
- (c) Mahmudov, K. T.; Kopylovich, M. N.; Guedes da Silva, M. F.; Pombeiro, A.-J. *Dalton Trans.* **2017**, *46*, 10121.
- (d) Brutchey, R. L. *Acc. Chem. Res.* **2015**, *48*, 2918.
- [11] Some examples: (a) Albert, E. E.; Do nascimento, V.; Braga, A. L. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *21*, 2032.
- (b) Xu, L.; Wang, F.; Chen, F.; Zhu, S.-Q.; Chu, L.-L. **2022**, *42*, DOI: 10.6023/cjoc202109002 (in Chinese).
- (徐磊, 王方, 陈凡, 朱圣卿, 储玲玲, 有机化学, **2022**, *42*, DOI: 10.6023/cjoc202109002.)
- [12] Some examples: (a) Pan, C.; Liu, P.; Wu, A.-G.; Li, M.; Wen, L.-R.; Guo, W.-S. *Chin. J. Org. Chem.* **2020**, *40*, 2855 (in Chinese).
- (潘超, 刘鹏, 武安国, 李明, 文丽荣, 郭维斯, 有机化学, **2020**, *40*, 2855.)
- (b) Mukherjee, A. J.; Zade, S. S.; Singh, H. B.; Sunoj, R. B. *Chem. Rev.* **2010**, *110*, 4357.
- (c) Nogueira, C. W.; Zeni, G.; Rocha, J.-B. *Chem. Rev.* **2004**, *104*, 6255.
- [13] Meng, X.-J.; Zhong, P.-F.; Wang, Y.-M.; Wang, H.-S.; Tang, H.-T.; Pan, Y.-M. *Adv. Synth. Catal.* **2020**, *362*, 506.
- [14] Mallick, S.; Baidya, M.; Mahanty, K.; Maiti, D.; Sarkara, S. D. *Adv. Synth. Catal.* **2020**, *362*, 1046.
- [15] Hua, J.-W.; Fang, Z.; Xu, Jia.; Bian, M.-X.; Liu, C.-K.; He, W.; Zhu, N.; Yang, Z.; Guo, K. *Green Chem.* **2019**, *21*, 4706.
- [16] Some examples: (a) Dakova, B.; Lamberts, L.; Evers, M. *Electrochim. Acta* **1994**, *39*, 2363.
- (b) Kunai, A.; Harada, J.; Izumi, J.; Tachihara, H.; Sasaki, K. *Electrochim. Acta* **1983**, *28*, 1361.
- (c) Torii, S.; Uneyama, K.; Ono, M.; Bannou, T. *J. Am. Chem. Soc.* **1981**, *103*, 4606.
- [17] Guan, Z.-P.; Wang, Y.-K.; Wang, H.-M.; Huang, Y.-G.; Wang, S.-Y.; Tang, H.-D.; Zhang, H.; Lei, A.-W. *Green Chem.* **2019**, *21*, 4976.
- [18] Wang, X.-Y.; Zhong, Y.; Mo, Z.-Y.; Wu, S.-H.; Xu, Y.-L.; Tang, H.-T.; Pan, Y.-M. *Adv. Synth. Catal.* **2021**, *363*, 208.
- [19] Hua, J.-W.; Fang, Z.; Bian, M.-X.; Ma, T.; Yang, M.; Xu, J.; Liu, C.-K.; He, W.; Zhu, N.; Yang, Z.; Guo, K. *ChemSusChem* **2020**, *13*, 2053.
- [20] Some examples: (a) Torii, S.; Uneyama, K.; Ono, M.; Bannou, T. *J. Am. Chem. Soc.* **1981**, *103*, 4606.
- (b) Dakova, B.; Lamberts, L.; Evers, M. *Electrochim. Acta* **1994**, *39*, 2363.
- (c) Sun, K.; Wang, X.; Fu, F.; Zhang, C.; Chen, Y.; Liu, L. *Green Chem.* **2017**, *19*, 1490.
- (d) Kim, Y. J.; Kim, D. Y. *Org. Lett.* **2019**, *21*, 1021.
- (e) Yang, X.-H.; Yang, X.-H.; Wei, W.-T.; Song, R.-J.; Li, J.-H. *Adv. Synth. Catal.* **2015**, *357*, 1161.
- (f) Reddy, C. R.; Yarlagadda, S.; Ramesh, B.; Reddy, M. R.; Sri-dhar, B.; Reddy, B. V. *Eur. J. Org. Chem.* **2017**, *2017*, 2332.
- [21] Scheide, M. R.; Schneider, A. R.; Jardim, G. A. Martins, G. M.; Durigon, D. C.; Saba, S.; Rafiqueb, J.; Braga, A. L. *Org. Biomol. Chem.* **2020**, *18*, 4916.
- [22] Kharma, A.; Jacob, C.; Bozzi, A. O.; Jardim, G. M.; Braga, A. L.; Salomão, K.; Gatto, C. C.; Silva, M. F.; Pessoa, C.; Stangier, M.; Ackermann, L.; Júnior, E. N. *Eur. J. Org. Chem.* **2020**, 4474.
- [23] Bian, M.-X.; Hua, J.-W.; Ma, T.; Xu, J.; Cai, C.; Yang, Z.; Liu, C.-K.; He, W.; Fang, Z.; Guo, K. *Org. Biomol. Chem.* **2021**, *19*, 3207.
- [24] Yu, K.; Kong, X.-Q.; Yang, J.-J.; Li, G. D.; Xu, B.; Chen, Q.-J. *J. Org. Chem.* **2021**, *86*, 917.
- [25] Wang, Q.; Ma, X.-L.; Chen, Y.-Y.; Jiang, C.-N.; Xu, Y.-L. *Eur. J. Org. Chem.* **2020**, *2020*, 4384.
- [26] Chen, J.-Y.; Zhong, C.-T.; Gui, Q.-W.; Zhou, Y.-M.; Fang, Y.-Y.; Liu, K.-J.; Lin, Y.-W.; Cao, Z.; He, W.-M. *Chin. Chem. Lett.* **2021**, *32*, 475.
- [27] Cui, T.; Zhang, X.-F.; Lin, J.; Zhu, Z.-T.; Liu, P.; Sun, P.-P. *Synlett* **2020**, 267.
- [28] Liu, X.; Wang, Y.-J.; Song, D.; Wang, Y.-H.; Cao, H. *Chem. Commun.* **2020**, *56*, 15325.
- [29] Tan, H.; Li, H.; Ji, W.; Wang, L. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, *54*, 8374.
- [30] Some examples: (a) Nicewicz, D. A.; MacMillan, D. W. *Science* **2008**, *322*, 77.
- (b) Prior, C. K.; Rankic, D. A.; MacMillan, D. W. *Chem. Rev.* **2013**, *113*, 5322.
- (c) Yoon, T. P.; Ischay, M. A.; Du, J. *Nat. Chem.* **2010**, *2*, 527.
- (d) Chen, J.-Y.; Zhong, C.-T.; Gui, Q.-W.; Zhou, Y.-M.; Fang, Y.-Y.; Liu, K.-J.; Lin, Y.-W.; Cao, Z.; He, W.-M. *Chin. Chem. Lett.* **2021**, *32*, 01.
- [31] Some examples: (a) Yang, W.; Yang, S.; Li, P.; Wang, L. *Chem. Commun.* **2015**, *51*, 7520.
- (b) Chen, Y.; Lu, L.-Q.; Yu, D.-G.; Zhu, C.-J.; Xiao, W.-J. *Sci. China Chem.* **2019**, *62*, 24.
- (c) Liu, Y.; Lin, L.; Han, Y.; Liu, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2020**, *40*, 4216 (in Chinese).
- (刘洋, 林立青, 韩莹徽, 刘颖杰, 有机化学, **2020**, *40*, 4216.)
- (d) Yang, W.; Zhang, M.; Chen, W.; Yang, X.; Feng, J. *Chin. J. Org. Chem.* **2020**, *40*, 4060 (in Chinese).
- (杨文超, 张明明, 陈旺, 杨小虎, 冯建国, 有机化学, **2020**, *40*,

- 4060.)
 (e) He, S.-Q.; Li, H.-C.; Chen, X.-L.; Krylov, I. B.; Terentev, A. O.; Qu, L.-B.; Yu, B. *Chin. J. Org. Chem.* **2021**, *41*, 4661 (in Chinese). (贺帅旗, 李昊聪, 陈晓岚, Igor B. Krylov, Alexander O. Terentev, 屈凌波, 於兵, 有机化学, **2021**, *41*, 4661.)
 (f) Yang, W.-C.; Zhang, M.-M.; Sun, Y.; Chen, C.-Y.; Wang, L. *Org. Lett.* **2021**, *23*, 6691.
- [32] Mitamura, T.; Iwata, K.; Nomoto, A.; Ogawa, A. *Org. Biomol. Chem.* **2011**, *9*, 3768.
- [33] Conner, E. S.; Crocker, K. E.; Fernando, R. G.; Fronczek, F. R.; Stanley, G. G.; Ragains, J. R. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 5558.
- [34] Sahoo, H.; Mandal, A.; Dana, S.; Baidya, M. *Adv. Synth. Catal.* **2018**, *360*, 1099.
- [35] Some examples: (a) Jin, D.-P.; Gao, P.; Chen, D.-Q.; Chen, S.; Wang, J.; Liu, X.-Y.; Liang, Y.-M. *Org. Lett.* **2016**, *18*, 3486.
 (b) Wen, J.-W.; Wei, W.; Xue, S.-N.; Yang, D.-S.; Lou, Y.; Gao, C.-Y.; Wang, H. *J. Org. Chem.* **2015**, *80*, 4966.
 (c) Kobiki, Y.; Kawaguchi, S.; Ogawa, A. *Tetrahedron Lett.* **2013**, *54*, 5453.
- [36] Wei, W.; Cui, H.; Yang, D.; Yue, H.; He, C.; Zhang, Y.; Wang, H. *Green Chem.* **2017**, *19*, 5608.
- [37] Shi, Q.; Li, P.-H.; Zhang, Y.; Wang, L. *Org. Chem. Front.* **2017**, *4*, 1322.
- [38] Ma, X.-Li.; Wang, Q.; Feng, X.-Y.; Mo, Z.-Y.; Pan, Y.-M.; Chen, Y.-Y.; Xin, M.; Xu, Y.-L. *Green Chem.* **2019**, *21*, 3547.
- [39] Some examples: (a) Huang, M.-H.; Hao, W.-J.; Li, G.; Tu, S.-J.; Jiang, B. *Chem. Commun.* **2018**, *54*, 10791.
 (b) Zhu, S.; Pathigoolla, A.; Lowe, G.; Walsh, D. A.; Cooper, M.; Lewis, W.; Lam, H. W. *Chem.-Eur. J.* **2017**, *23*, 17598.
 (c) Kawaguchi, S.; Shirai, T.; Ohe, T.; Nomoto, A.; Sonoda, M.; Ogawa, A. *J. Org. Chem.* **2009**, *74*, 1751.
 (d) Kobiki, Y.; Kawaguchi, S.; Ogawa, A. *Tetrahedron Lett.* **2013**, *54*, 545.
- [40] Sahoo, S. R.; Das, B.; Sarkar, D.; Henkel, F.; Reuter, H. *Eur. J. Org. Chem.* **2020**, *2020*, 891.
- [41] Jung, H. I.; Kim, D. Y. *Synlett* **2019**, *30*, 1361.
- [42] Zhang, Q.-B.; Yuan, P.-F.; Kai, L.-L.; Liu, K.; Ban, Y.-L.; Wang, X.-Y.; Wu, L.-Z.; Liu, Q. *Org. Lett.* **2019**, *21*, 885.
- [43] Some examples: (a) Orgies, S.; Rieger, R.; Rode, K.; Koszinowski, K.; Kind, J.; Thiele, C. M.; Rehbein, J.; Breder, A. *Adv. Synth. Catal.* **2017**, *7*, 7578.
 (b) Wilken, M.; Orgies, S.; Breder, A.; Siewert, I. *Adv. Synth. Catal.* **2018**, *8*, 10901.
 (c) Minakata, S.; Morino, Y.; Oderaotoshi, Y.; Komatsu, M. *Org. Lett.* **2006**, *8*, 3335.
- (d) Nagaraju, K.; Rajesh, N.; Krishna, P. R. *Synth. Commun.* **2018**, *48*, 1001.
- [44] Mutra, M. R.; Kudale, V. S.; Li, J.; Tsaia, W. H.; Wang, J. J. *Green Chem.* **2020**, *22*, 2288.
- [45] Ye, Z.-P.; Xia, P.-J.; Liu, F.; Hu, Y.-Z.; Song, D.; Xiao, J.-A.; Huang, P.; Xiang, H.-Y.; Chen, X.-Q.; Yang, H. *J. Org. Chem.* **2020**, *85*, 5670.
- [46] Tran, C. C.; Kawaguchi, S.; Sato, F.; Nomoto, A.; Ogawa, A. *J. Org. Chem.* **2020**, *85*, 7258.
- [47] Zhou, X.-J.; Liu, H.-Y.; Mo, Z.-Y.; Ma, X.-L.; Chen, Y.-Y.; Tang, H.-T.; Pan, Y.-M.; Xu, Y.-L. *Chem. Asian J.* **2020**, *15*, 1536.
- [48] Zhou, J.-L.; Li, W.; Zheng, H.-T.; Pei, Y.-Y.; Liu, X.; Cao, H. *Org. Lett.* **2021**, *23*, 2754.
- [49] Hou, H.; Sun, Y.; Pan, Y.-J.; Yu, H.-G.; Han, Y.; Shi, Y.-C.; Yan, C.-G.; Zhu, S.-Q. *J. Org. Chem.* **2021**, *86*, 1273.
- [50] Kundu, D.; Ahammed, S.; Ranund, B. C. *Org. Lett.* **2014**, *16*, 1814.
- [51] Gandeepan, P.; Mo, J.; Ackermann, L. *Chem. Commun.* **2017**, *53*, 5906.
- [52] Zhang, Q.-B.; Ban, Y.-L.; Yuan, P.-F.; Peng, S.-J.; Fang, J.-G.; Wu, L.-Z.; Liu, Q. *Green Chem.* **2017**, *19*, 5559.
- [53] Andal, T.; Das, S.; Sarkar, S. D. *Adv. Synth. Catal.* **2019**, *361*, 3200.
- [54] Yang, D.-S.; Li, G.-Q.; Xing, C.-Y.; Cui, W.-W.; Li, K.-X.; Wei, W. *Org. Chem. Front.* **2018**, *5*, 2974.
- [55] Jin, J.; MacMillan, D. W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2015**, *54*, 1565.
- [56] Devari, S.; Shah, B. A. *Chem. Commun.* **2016**, *52*, 1490.
- [57] Zhao, Y.-T.; Huang, B.-B.; Yang, C.; Xia, W.-J. *Org. Lett.* **2016**, *18*, 3326.
- [58] Ghiazza, C.; Debrauwer, V.; Monnereau, C.; Khrouz, L.; Medebielle, M. D.; Billard, T. D.; Tlili, A. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2018**, *57*, 11781.
- [59] Kumaraswamy, G.; Ramesh, V.; Gangadhar, M.; Vijaykumar, S. *Asian J. Org. Chem.* **2018**, *7*, 1689.
- [60] Saba, S.; Rafifique, J.; Franco, M. S.; Schneider, A. R.; Espindola, L.; Silva, D. O.; Braga, A. L. *Org. Biomol. Chem.* **2018**, *16*, 880.
- [61] Ghiazza, C.; Monnereau, C.; Khrouz, L.; Médebielle, M.; Billard, T.; Tlili, A. *Synlett* **2018**, *29*, 777.
- [62] Rathore, V.; Kumar, S. *Green Chem.* **2019**, *21*, 2670.
- [63] Lemir, I. D.; Castro-Godoy, W. D.; Heredia, A. A.; Schmidt, L. C.; Arguella, J. E. *RSC Adv.* **2019**, *9*, 22685.
- [64] Heredia, A. A.; Soria-Castro, S. M.; Castro-Godoy, W. D.; Lemir, I. D.; Lopez-Vidal, M.; Bisogno, F. R.; Argüello, J. E.; Oksdath-Mansilla, G. *Org. Process Res. Dev.* **2020**, *24*, 540.
- [65] Liu, J.-J.; Tian, M.-M.; Li, Y.-X.; Shan, X.-W.; Li, A.-K.; Lu, K.; Fagnoni, M.; Protti, S.; Zhao, X. *Eur. J. Org. Chem.* **2020**, *47*, 7358.

(Cheng, F.)