可见光诱导简单烷烃碳氢活化以实现菲啉类化合物的绿色合成

李文艺^a 何卫民^{*,b}^(a) 衡阳师范学院化学与材料科学学院 湖南衡阳 421010)^(b) 南华大学化学化工学院 湖南衡阳 411201)

Visible Light-Induced Green Synthesis of Phenanthridines via C—H Activation of Simple Alkanes

Li, Wenyi^a He, Weimin^{*,b}^(a) College of Chemistry and Materials Science, Hengyang Normal University, Hengyang, Hunan 421008)^(b) School of Chemistry and Chemical Engineering, University of South China, Hengyang, Hunan 421001)

简单烷烃作为石油和天然气的主要成分,广泛存在于自然界中.但由于烷烃碳氢活化过程中本身的化学惰性和难以控制的化学选择性,对烷烃的利用仍以燃烧供能为主,如何将此类丰富的有机碳源直接作为合成子进行高原子利用率及高附加值转化,是一个亟待解决的科学问题.有机光化学合成作为一种条件温和、环境友好且可持续性的合成策略,受到了化学工作者的广泛关注.其中,光诱导氢原子转移(HAT)过程为碳氢活化领域提供了一类温和、高效、可行的合成方案,与传统热反应相比,光反应过程大大避免了能源浪费与环境污染问题.近年来,光诱导碳氢活化领域取得了迅猛发展,大量具有代表性的研究工作相继被报道^[1].

氮杂环类化合物广泛存在于天然产物和生物活性分子中,其出色的成盐及促溶能力,使其在药物分子开发方面发挥着重要作用^[2].菲啉及其衍生物作为一类高价值药物活性分子,表现出丰富的抗癌、消毒和杀菌等活性.碳氢活化的异腈与自由基加成环化反应是一类行之有效的菲啉合成方法,但此类反应所需温度通常较高,且需要一些强氧化剂共同参与反应,如有机过氧化物、氟试剂以及高价碘试剂等,因此该类反应面临成本较高、副产物多、原子利用率低及官能团耐受性差等问题.鉴于此,开发一种绿色环保、经济高效的基于碳氢活化合成菲啉类化合物的方法十分必要.

近日,大连理工大学张大煜学院金云鹤/段春迎课题组^[3]在其长期对光催化合成反应的研究基础上,开发了一种在无金属条件下,以2-异氰基联苯和简单烷烃为

底物,2,4,5,6-四(9-呋唑基)-间苯二腈(4-CzIPN)为光敏剂,双氧水溶液作为氢原子转移催化剂前驱体,有效实现了基于烷烃碳氢活化的菲啉衍生物绿色合成新方法^[4],相比于传统方法取得了明显进步(Scheme 1).

图式 1 光诱导烷烃 C—H 键活化构建菲啉衍生物

Scheme 2 Photo-induced construction of phenanthridine derivatives via C—H activation of alkanes

金云鹤/段春迎课题组以 2-异氰基联苯和环己烷作为模板底物,对反应所需的光敏剂、氧化剂、添加剂以及溶剂进行了系统筛选.研究发现在氮气及 395 nm LED 光照的环境下,以 4-CzIPN 作为光敏剂, H₂O₂ 作为氧化剂,乙腈作为溶剂以及 *N,N*-二异丙基乙胺(DIPEA)作为添加剂,能够以 89% 的产率得到目标产物 6-环己基菲啉.对照实验表明,光照和惰性气体氛围是反应进行的必要条件.随后,该课题组考察了异腈和烷烃的底物适应性(Scheme 2).对于 2-异氰基联苯,研究发现分别在两个苯环上引入不同的取代基后,都可以以较高收率

* Corresponding author. E-mail: weiminhe2016@yeah.net. Published online October 15, 2021.

得到相应的目标产物, 说明反应体系对不同官能团的耐受性良好. 值得一提的是, 三球啉(trisphaeridine)作为一种非常有价值的生物碱, 其烷基化衍生物同样能够通过该策略成功合成. 对于烷烃底物, 环烷和链状烷烃都具有较好的适用性, 两种气态烷烃丁烷和异丁烷同样适用于该反应体系. 区域选择性研究表明, 该碳氢活化过程

选择性发生在仲碳和叔碳 C—H 键上, 而伯碳 C—H 键不会参与反应. 为进一步拓展应用范围, 该课题组还成功实现了对醚类、胺类和醛类等不同类别有机化合物的 C—H 活化, 合成了对应的菲啉衍生物. 最后, 为了验证这个方法的实用性, 作者还对模板反应进行了克量级放大实验, 发现反应收率依旧可观.

2-Isocyanobiphenyl scope

Alkane scope

Other compounds

图式 2 底物拓展
Scheme 2 Substrate scope

为了推测该体系的反应机理, 作者进行了包括自由基捕获实验、动力学同位素实验、荧光淬灭实验以及量子产率测定在内的一系列探究实验, 并阐明了如下机理 (Scheme 3): 首先, 在光照射下, 光敏剂 4-CzIPN 转变为激发态 **I**, DIPEA 和 **I** 之间发生单电子转移 (SET) 得到自由基 **II** 和 **III**, **II** 与双氧水间的 SET 进一步生成氢氧根负离子和 HAT 活化试剂羟基自由基, 随后羟基自由基和烷烃之间的 HAT 过程得到烷基自由基 **IV**, **IV** 被异腈捕获后发生分子内加成反应分别得到自由基中间体 **V** 和 **VI**, **VI** 与 **III** 以及氢氧根负离子发生脱氢氧化便得到

最终产物 **3**. 探究还发现, 当 DIPEA 不存在的时候, 反应能够以中等产率得到目标产物, 这主要得益于 **I** 与双氧水之间进行的能量转移过程, 因此添加剂 DIPEA 的引入能够有效调控该体系的反应进程.

综上所述, 金云鹤/段春迎课题组利用光诱导无金属条件下的简单烷烃 C—H 活化过程, 开发出一种条件温和、绿色高效的菲啉类化合物制备方法. 该反应体系具有原子利用率高、经济环保、底物和官能团适用性广以及区域选择性高等优点. 该项策略对菲啉衍生物的合成研究具有重要的指导意义.

图式 3 反应机理
Scheme 3 Reaction mechanism

References

- [1] (a) Kong, Y.; Kim, J. K.; Li, Y.; Zhang, J.; Huang, M.; Wu, Y. *Green Chem.* **2021**, *23*, 1274.
(b) Pan, C.; Liu, P.; Wu, A.; Li, M.; Wen, L.; Guo, W. *Chin. J. Org. Chem.* **2020**, *40*, 2855.
(c) Li, M.; Wang, R.; Hao, W.; Jiang, B. *Chin. J. Org. Chem.* **2020**, *40*, 1540 (in Chinese).
(李梦帆, 王榕, 郝文娟, 姜波, 有机化学, **2020**, *40*, 1540.)
- [2] (a) Sun, K.; Xiao, F.; Yu, B.; He, W.-M. *Chin. J. Catal.* **2021**, *42*, 1921.
(b) Tang, H.; Pan, Y. *Chin. J. Org. Chem.* **2021**, *41*, 435 (in Chinese).
(唐海涛, 潘英明, 有机化学, **2021**, *41*, 435.)
(c) Han, Y.; Cui, X. *Chin. J. Org. Chem.* **2021**, *41*, 2929 (in Chinese).
(韩宇轩, 崔秀灵, 有机化学, **2021**, *41*, 2929.)
- [3] (a) Zhang, T.; Jin, Y.; Shi, Y.; Li, M.; Li, J.; Duan, C. *Coord. Chem. Rev.* **2019**, *380*, 201.
(b) Jin, Y.; Zhang, Q.; Wang, L.; Wang, X.; Meng, C.; Duan, C. *Green Chem.* **2021**, *23*, 6984.
- [4] Zhang, Y.; Jin, Y.; Wang, L.; Zhang, Q.; Meng, C.; Duan, C. *Green Chem.* **2021**, *23*, 6926.

(Zhao, C.)